

Victor Lacusta

TRATAT DE ACUPUNCTURĂ CLINICĂ



Centrul European de Studii
Postuniversitare în Acupunctură

615.89
L 12

Victor Lacusta

TRATAT DE ACUPUNCTURĂ CLINICĂ

**VOLUMUL I
MERIDIANELE ȘI PUNCTELE
DE ACUPUNCTURĂ**

**VOLUMUL II
DIAGNOSTICUL ȘI TRATAMENTUL
ACUPUNCTIC**

599834 *sl*

UNIVERSITATEA DE STAT
DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
"NICOLAE TESTEMIȚEANU"
BIBLIOTECA

Centrul European de Studii Postuniversitare în Acupunctură

Victor Lacusta, Dac(Nanjing), doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar.

Șeful catedrei Acupunctură și Recuperare Medicală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"; șeful grupului științific Acupunctura Stresului și Dereglărilor Funcționale al Institutului de Fiziologie al Academiei de Științe a Republicii Moldova; directorul Centrului European de Studii Postuniversitare în Acupunctură; specialistul principal în acupunctură al Ministerului Sănătății al Republicii Moldova; președintele Societății de Acupunctură din Republica Moldova; președintele Asociației Europene de Acupunctură.

Victor Lacusta. Tratat de acupunctură clinică Vol.I-II, Chișinău, Centrul European de Studii Postuniversitare în Acupunctură, 1998, 792 pagini.

Vol.I. Meridianele și punctele de acupunctură. Lucrarea oferă descrierea funcțiilor și relațiilor energetice ale meridianelor principale și secundare, localizării punctelor de acupunctură în conformitate cu *State Standard of the People's Republic of China for the Location of Acupoints*; se pune accent pe proiecția anatomică, inervația și vascularizația în zonele de amplasare a punctelor, tehnica stimulării acestora (acupunctura, moxibustia, tehnica de sângerare). Indicațiile terapeutice ale punctelor sunt sistematizate conform conceptului teoretico-practic al medicinei tradiționale chineze și medicinei moderne occidentale. Informația este expusă în baza sistemului terminologic *Pin-Yin*.

Vol.II. Diagnosticul și tratamentul acupunctic. Volumul conține informația despre principiile fundamentale de diferențiere a sindroamelor conform medicinei tradiționale chineze, diagnosticul și tratamentul acupunctic în afectarea meridianelor principale și secundare, aplicarea clinică a metodelor de bază ale cronoacupuncturii. Este sistematizată informația referitoare la diagnosticul clinic și tratamentul acupunctic al sindroamelor tradiționale, depistate în diferite patologii (boli interne și infecțioase, neurologie, psihiatrie, obstetrică și ginecologie, dermatologie, ORL, stomatologie, oftalmologie, hematologie, pediatrie).

Tratatul este adresat medicilor ce posedă sau studiază acupunctura.

Editat cu sprijinul Fundației SOROS MOLDOVA și European Postgraduate Centre of Acupuncture

FOREWORD


Traditional Chinese Medicine (TCM) has a long history of treating different diseases with acupuncture and moxibustion. Acupuncture has now become internationally accepted by both doctors and patients. An increasing number of European doctors are starting to use different methods based on the theories of TCM in their clinical practice.

Dr. V.Lacusta has studied acupuncture at the Nanjing University of TCM and has had clinical experience in a variety of clinics in the People's Republic of China. He has been active in the field of acupuncture for more than 20 years. The results of his scientific and clinical research have been published in more than 200 publications in different countries. As a result of this experience Dr.V.Lacusta has written this book which provides the reader with the opportunity to combine TCM and Western Medicine. One of the advantages of this book is that the information about the acupuncture point locations, their energetic functions and therapeutic indications are described in a systematic and practical way. An important part of the book is dedicated to the differentiation and treatment of different diseases.

I believe this book will contribute to an improvement in the quality of treatment based on the integration of Traditional and Western Medicine and will certainly promote the popularity of acupuncture. Both students and practitioners of acupuncture will find this publication to be a useful handbook in their clinical practice and scientific research.

For these reasons it gives me great pleasure to write this foreword.

Peigen Li



Professor

Nanjing University of Traditional Chinese Medicine
WHO Collaborative Centre on Traditional Medicine

January 1998

CUVÂNT ÎNAINTE

Medicina tradițională chineză (MTC) are o istorie lungă de tratament prin acupunctură și moxibustie al diverselor maladii. În prezent, acupunctura este acceptată la nivel internațional atât de medici, cât și de pacienți. Tot mai mulți medici europeni au început să aplice în practica lor clinică metode bazate pe teoriile MTC.


Dr.V.Lacusta a studiat acupunctura la Universitatea de Medicină Tradițională Chineză din Nanjing și a efectuat un stagiu în diferite clinici din Republica Populară Chineză. Domnia Sa activează în domeniul acupuncturii de peste 20 de ani. Rezultatele investigațiilor științifice și clinice efectuate de Dr.Lacusta sunt incluse în peste 200 de publicații apărute în mai multe țări. Prezenta lucrare constituie o sinteză a experienței Dr.Lacusta, oferind cititorului posibilitatea de a asocia MTC cu medicina occidentală. Un avantaj al acestei cărți este faptul că informația despre localizarea acupunctelor, funcțiile lor energetice și indicațiile terapeutice este expusă în mod sistematic, având orientare practică. O parte importantă a lucrării este dedicată descrierii și tratamentului diverselor maladii.

Cred că această carte va contribui la ameliorarea calității tratamentului bazat pe integrarea MTC și a medicinei occidentale și la promovarea popularității acupuncturii.

Atât pentru cei care studiază acupunctura, cât și pentru practicieni lucrarea de față va constitui un ghid util în practica clinică și în cercetările științifice.

Din aceste considerente, mi-a făcut mare plăcere să scriu acest cuvânt înainte.

Peigen Li



Profesor universitar

Universitatea de Medicină Tradițională Chineză, Nanjing
Centrul OMS de colaborare în Medicina Tradițională

Ianuarie 1998

PREFAȚĂ

Succesele medicinei moderne în diagnosticul, tratamentul și profilaxia celor mai diverse afecțiuni sunt legate de aplicarea unor tehnologii avansate. Din acest punct de vedere s-ar părea că ne aflăm în fața unei crize a metodelor vechi de diagnostic și tratament. Realitatea însă este alta. Modul în care se afirmă astăzi și la amploare acupunctura, una din metodele cele mai vechi de diagnostic și tratament, o adevărată perlă a medicinei tradiționale chineze (MTC), atestă contrariul. Având o istorie de circa cinci milenii, acupunctura modernă respectă întru totul prescripțiile vechilor tratate, fără să se lase influențată de descoperirile recente din știință și medicină. Este firesc să ne întrebăm în acest context, cum se explică faptul că un sistem atât de vechi nu-și pierde valabilitatea nici chiar într-un secol al informatizării și energiei atomice. Răspunsul ar fi unul singur: actualitatea acupuncturii este determinată de gradul înalt de eficacitate terapeutică și lipsa unor efecte nocive secundare.

Prezentul studiu își propune misiunea de a oferi tuturor celor interesați un volum amplu de informație, familiarizându-i astfel cu experiența de o valoare inestimabilă a medicilor antici, experiență verificată și cizelată pe parcursul mileniilor. Oportunitatea editării unui studiu bazat pe concepția tradițional-orientală a acupuncturii este cu atât mai evidentă cu cât medicina occidentală pare să se fi îndepărtat prea mult de un domeniu care nu și-a pierdut valoarea și resursele.

La acest sfârșit de mileniu medicina trebuie să facă față unor probleme grave de sănătate și de profilaxie a maladiilor. Integrarea MTC în medicina occidentală ar constitui în acest sens una din soluțiile benefice. O integrare deloc formală însă presupune buna cunoaștere a particularităților MTC.

- MTC se ocupă de sănătatea fizică, mentală și spirituală a pacientului, omul fiind privit ca un sistem cu diverse nivele de organizare (psiho-social, spiritual, fiziologic, biochimic etc). Omul reprezintă pentru MTC o entitate genetică, biologică și psihologică cu caracteristici unice, irepetabile. Medicul ce profesează MTC stabilește în procesul diagnosticului «universul individual» al pacientului.
- În cadrul MTC un loc foarte important îl ocupă nivelul de cultură, familia și starea mediului ambiant. MTC operează o distincție netă între boala pacientului și atitudinea acestuia față de ea, fiind nevoie adesea să fie «trată» tocmai aceasta din urmă.
- Unul din postulatele de bază ale MTC spune că identificarea (diagnosticul) bolii este importantă, dar tot atât de importantă este și stabilirea absenței bolii. MTC include metode și procedee cu ajutorul cărora poate fi stabilită «cantitatea de sănătate». Sunt frecvente cazurile când profilaxia și tratamentul încep cu mult

Înainte de primele simptome ale bolii. Obiectivele de bază ale MTC sunt modul sănătos de viață și profilaxia bolilor. Unul din principiile MTC relevă că orice persoană este responsabilă atât de bolile sale, cât și de sănătatea sa.

- În procesul stabilirii diagnosticului și tratamentului medicul ce profesează MTC efectuează o «macroanaliză», în cadrul căreia pacientul este examinat în ansamblul particularităților sale și în contextul vieții pe care o duce, spre deosebire de medicul alopatic, ale cărui concluzii se întemeiază pe o «microanaliză», ce nu permite adesea sintetizarea multiplelor informații parvenite de la nivel celular și subcelular. În cadrul MTC informația de bază despre starea sănătății este obținută prin metode simple, naturale de investigare (palpare, auscultare etc.). MTC nu neagă necesitatea unor investigații aprofundate prin intermediul unor metode din ce în ce mai sofisticate, dar reabilitează importanța metodelor naturale de investigație.
- Strategia de terapie în cadrul MTC este orientată în primul rând spre impulsionarea reacțiilor de apărare ale organismului și spre lupta cu maladia în paralel cu anihilarea agentului patogen, în timp ce medicina alopatică pune în prim-plan lupta cu agenții patogeni. MTC utilizează ca remedii de bază medicamente și metode naturale, în timp ce medicina occidentală folosește în principal medicamente sintetice.

În prezenta lucrare, autorul, posedând o experiență amplă de aplicare a acupuncturii în domeniul diagnosticului și tratamentului, a încercat să sistematizeze informația din această sferă. La apariția acestui studiu au contribuit mai mulți factori. În primul rând, acupunctura cunoaște o aplicare tot mai largă în practica medicală contemporană și drept urmare se face resimțită necesitatea unui număr din ce în ce mai mare de specialiști în acest domeniu. Pe de altă parte, dispunem de tezaurul experienței medicilor antici și ar fi păcat să-l irosim. În sfârșit, așa cum menționam mai sus, devine tot mai actual imperativul integrării medicinei occidentale cu cea orientală.

Acupunctura, ca și oricare altă disciplină medicală, conține prescripții și valențe terapeutice bine delimitate. Experiența acumulată ne îndreptățește să susținem cu toată convingerea că acupunctura își atinge scopul atunci când sunt respectate următoarele principii:

- selectarea bolnavilor pentru tratament;
- aplicarea diferențiată a tratamentului;
- aplicarea complexă a tratamentului (acupunctura ca monoterapie sau ca un component al tratamentului complex);
- flexibilitatea tratamentului (în funcție de faza maladiei -- acutizare sau remisie, agravare sau ameliorare, precum și de ritmurile biologice ale organismului corelate cu cele ale naturii);
- succesiunea tratamentului (relația cu rezultatele tratamentului anterior și ale tratamentului viitor).

Analiza rezultatelor obținute relevă că efectul pozitiv al acupuncturii va pune știința medicală modernă în fața faptului de a recunoaște că pe lângă mecanismele sanogene cunoscute mai există și altele, cu importantă valoare terapeutică.

Elaborând acest studiu, autorul a urmărit scopul de a-l face cât mai util pentru medicii practicieni. Un spațiu important al lucrării este dedicat descrierii localizării punctelor de acupunctură în conformitate cu *State Standard of the People's Republic of China for the Location of Acupoints* (Beijing, 1990). Una din particularitățile distincte ale cărții este prezentarea detaliată și sistematizarea indicațiilor curative ale punctelor de acupunctură, precum și a metodelor de stimulare a acestora. Sunt expuse sindroamele conform tratatelor antice și tratamentul lor prin acupunctură. Din punct de vedere practic considerăm foarte utilă examinarea corelației dintre unitățile nozologice moderne și diagnozele sindromale antice. Credem că această perspectivă va facilita în mod considerabil înțelegerea și aplicarea acupuncturii de către medicii occidentali.

Apariția unei lucrări științifice este legată de efortul și contribuția a numeroși oameni. Această participare este cu atât mai prețioasă cu cât ne aflăm în fața unui domeniu care face primii pași la noi. Recunoștința autorului se îndreaptă în mod firesc către toți acei fără priosul cărora ar fi fost imposibilă elaborarea acestei lucrări. În acest sens îmi fac o datorie de onoare de a aduce mulțumiri cordiale profesorilor Li Peigen și Xiang Ping de la Universitatea de Medicină Tradițională din Nanjing (China) pentru efortul considerabil pe care l-au depus pentru a mă iniția în tainele Medicinii Tradiționale.

Cu mulți ani în urmă mi-am început cariera de medic MTC și este un noroc că la aceste începuturi ale mele l-am avut ca prim dascăl pe talentatul specialist chinez, domnul Ling Jin, reprezentantul unei dinastii eminente de medici MTC, dinastie ce numără circa 500 de ani.

Adresez cordiale mulțumiri domnului academician Gh. Ghidirim, care, fiind ministru al sănătății, a făcut tot ce i-a stat în puteri, pentru a spori prestigiul acupuncturii și pentru ca aceasta să obțină statutul de specialitate medicală în Republica Moldova. Fondarea catedrei de acupunctură în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu" a fost și ea posibilă grație intervenției dlui Gh. Ghidirim.

Îi datorez enorm de mult academicianului T. Furdui, directorul Institutului de Fiziologie al Academiei de Științe a Republicii Moldova, pentru sprijinul pe care mi l-a acordat pe parcursul multor ani, cât am lucrat și continui să lucrez sub conducerea și părințeasca sa îndrumare. Domnia sa deține deosebitul merit de a fi unul dintre foarte puținii reprezentanți ai științelor fundamentale, care a conștientizat importanța acupuncturii ca sistem teoretico-practic. Într-o epocă în care acupunctura nu era acceptată ca disciplină științifică de către mediile academice și universitare, domnul academician a încurajat

scrierea și susținerea de către subsemnat a tezelor de doctor și doctor habilitat în acest domeniu, o realizare care a fost posibilă prin lupte înverșunate cu opiniile necompetente. Aportul academicianului T. Furdui s-a manifestat și în fondarea grupului științific Acupunctura Stresului și Dereglărilor Funcționale în cadrul Academiei, ce permite realizarea investigațiilor fundamentale în acest domeniu.

Disciplina ce constituie obiectul de studiu al prezentei lucrări a avut de câștigat și prin contribuția academicienilor V. Anestiade, D. Gherman, Gh. Ghidirim, T. Furdui, Gh. Paladi, semnatori ai adresării către Comisia Superioară de Atestare, acupuncturii astfel atribuindu-i-se cifra științifică. Ca rezultat, sub auspiciile catedrei sunt elaborate teze de doctor în medicină în domeniul acupuncturii clinice și experimentale.

Îmi exprim toată gratitudinea în fața colaboratorilor catedrei de acupunctură, care, pe lângă sprijinul moral, mi-au oferit prețioase sugestii, idei și observații ce au îmbogățit tratatul de față. Am privilegiul să lucrez cu niște adevărați entuziaști ai acupuncturii, în serviciul căreia își pun tot timpul și toate puterile. În câțiva ani de existență catedra de acupunctură a reușit să se impună în atenția oamenilor de știință și a opiniei publice.

În încheiere, dar nu și în ultimul rând adresez calde mulțumiri bunului meu prieten domnului C. Ionescu-Târgoviște, membru al Academiei de Științe Medicale din România, Președintele Asociației Române de Acupunctură, care pe parcursul mai multor ani mi-a împărtășit cu generozitate din bogata sa experiență. Fiind o personalitate cunoscută în Europa și în întreaga lume, Domnia Sa susține în mod constant activitatea Societății de Acupunctură din Republica Moldova și se bucură de succesele și realizările noastre.

Mulțumesc pacienților mei cu speranța că alinarea suferințelor lor este cel mai convingător argument în favoarea acupuncturii.

Sunt conștient de faptul că numai grație atitudinii și ajutorului colegilor mei lucrarea "Acupunctura clinică", editată acum trei ani, a putut să evolueze până la nivelul unui "Tratat de acupunctură clinică".

CUPRINS

VOLUMUL I	
MERIDIANELE ȘI PUNCTELE DE ACUPUNCTURĂ.....	1
I. Meridianele principale.....	13
I.1. Meridianul Plămân (P).....	14
I.2. Meridianul Intestin Gros (GI).....	26
I.3. Meridianul Stomac (E).....	44
I.4. Meridianul Splină-Pancreas (RP).....	78
I.5. Meridianul Inimă (C).....	97
I.6. Meridianul Intestin Subțire (IG).....	107
I.7. Meridianul Vezică Urinară (V).....	122
I.8. Meridianul Rinichi (R).....	166
I.9. Meridianul Pericard (MC).....	188
I.10. Meridianul Trei Focare (TR).....	197
I.11. Meridianul Veziculă Biliară (VB).....	215
I.12. Meridianul Ficat (F).....	248
II. Meridianele secundare	263
II.1. Meridianele extraordinare.....	264
II.2. Meridianele secundare Lo.....	305
II.3. Meridianele tendino-musculare.....	309
II.4. Meridianele distincte.....	313
VOLUMUL II	
DIAGNOSTICUL ȘI TRATAMENTUL ACUPUNCTIC.....	317
III. Opt principii de diferențiere a sindroamelor.....	333
III.1. Yin-Yang	334
III.2. Insuficiență-Exces	347
III.3. Frig-Căldură	357
III.4. Interior-Exterior	367
IV. Diagnosticul și tratamentul acupunctic în afectarea meridianelor.....	369
IV.1. Meridianele principale	370
IV.2. Meridianele extraordinare	390
IV.3. Meridianele secundare Lo	396
IV.4. Meridianele tendino-musculare	399
IV.5. Meridianele distincte	402
V. Acupunctura în tratamentul tulburărilor psihice	407

V.1. Confuzia mentală	408
V.2. Psihoza maniaco-depresivă.....	411
V.3. Tulburările anxioase.....	414
V.4. Tulburările asteno-depresive	418
V.5. Nevroza isterică	426
V.6. Vomele psihogene	430
V.7. Tulburările de somn	431
V.8. Scăderea capacității de memorare	440
VI. Acupunctura în tratamentul bolilor neurologice	443
VI.1. Sindromul de neuron motor central	444
VI.2. Sindromul parkinsonian.....	449
VI.3. Cefaleea. Migrena.....	451
VI.4. Hiperhidroza	460
VI.5. Nevralgia de trigemen.....	461
VI.6. Nevralgia intercostală	464
VI.7. Sindromul de neuron motor periferic	466
VI.8. Paralizia facială periferică	469
VI.9. Spasmul facial	472
VII. Acupunctura în tratamentul algiiilor musculo-osteo-articulare ...	475
VII.1. Algiile cervico-brahiale	476
VII.2. Torticolisul.	479
VII.3. Algiile scapulo-humerale	480
VII.4. Algiile în regiunea cotului	481
VII.5. Algiile radio-carpene și carpo-metacarpene	482
VII.6. Algiile coxo-femorale.....	483
VII.7. Algiile în regiunea genunchiului.....	484
VII.8. Algiile tibio-tarsiene și tarso-metatarsiene	485
VII.9. Lombalgia	486
VII.10. Sciatica.....	490
VIII. Acupunctura în tratamentul bolilor aparatului respirator	493
VIII.1. Infecțiile respiratorii virale acute (I.R.V.A.). Răceala.....	494
VIII.2. Bronșita acută și cronică	498
VIII.3. Astmul bronșic	503
IX. Acupunctura în tratamentul bolilor digestive.	509
IX.1. Gastrita. Ulcerul gastric și duodenal.....	510
IX.2. Colecistita. Dischinezia căilor biliare. Litiaza biliară.....	514
IX.3. Hepatita	516
IX.4. Ciroza hepatică.....	520
IX.5. Intestinul iritabil. Rectocolita ulcerohemoragică.....	522
IX.6. Apendicita cronică	529

IX.7. Hemoroizii. Prolapsul rectal	529
IX.8. Alergia alimentară	531
IX.9. Sughitul	535
X. Acupunctura în tratamentul bolilor cardiovasculare	539
X.1. Hipertensiunea arterială	540
X.2. Insuficiența circulatorie periferică	542
X.3. Cardiopatia ischemică dureroasă	544
X.4. Aritmiile cardiace	548
X.5. Arteriopatiile periferice	553
XI. Acupunctura în tratamentul bolilor urogenitale	557
XI.1. Cistita	558
XI.2. Prostatita cronică	560
XI.3. Retenția de urină	562
XI.4. Nefrita acută și cronică	565
XI.5. Urolitiaza	569
XI.6. Insuficiența renală acută	570
XI.7. Tulburările de dinamică sexuală la bărbați	571
XI.8. Spermatoreea	576
XI.9. Sterilitatea masculină	578
XII. Acupunctura în obstetrică și ginecologie	579
XII.1. Menstrele neregulate	580
XII.2. Dismenoreea	586
XII.3. Amenoreea	589
XII.4. Sterilitatea	592
XII.5. Sindromul premenstrual	596
XII.6. Leucoreea	599
XII.7. Pruritul vulvar	602
XII.8. Malpoziția fetală	603
XII.9. Gestozele precoce	605
XII.10. Amenințarea de avort	607
XII.11. Eclampsia	608
XII.12. Retenția placentei	609
XII.13. Patologia lohiilor	611
XII.14. Durerile abdominale în postpartum	613
XII.15. Vertijul în postpartum	615
XII.16. Hipogalactia	616
XII.17. Mastita	617
XII.18. Mastopatia fibrochistică	619
XII.19. Prolapsul uterin	621
XII.20. Fibromul uterin	622

XII.21. Diminuarea libidoului.....	625
XIII. Acupunctura în tratamentul bolilor endocrino-metabolice	627
XIII.1. Diabetul zaharat.....	628
XIII.2. Obezitatea	629
XIII.3. Hiperlipoproteinemii (dislipidemiile)	634
XIII.4. Cașexia	636
XIII.5. Disfuncția glandei tiroide	637
XIII.6. Disfuncția glandei paratiroide	638
XIII.7. Tulburările de menopauză.....	639
XIV. Acupunctura în oftalmologie.....	643
XIV.1. Hordeolumul	644
XIV.2. Conjunctivita.....	644
XIV.3. Dacrioreea	648
XIV.4. Cheratita.....	649
XIV.5. Sindromul Bao Mang	650
XIV.6. Hemeralopia	653
XIV.7. Miopia.....	655
XIV.8. Blefaroptoza	656
XIV.9. Strabismul	656
XV. Acupunctura în afecțiunile ORL și stomatologie.....	659
XV.1. Rinita. Sinuzitele.....	660
XV.2. Laringofaringita. Tonzilita.....	664
XV.3. Afonia.....	665
XV.4. Aftoza bucală.....	667
XV.5. Sialoreea	669
XV.6. Odontalgia.....	670
XV.7. Boala Meniere. Vertijele.....	671
XV.8. Tinitusul. Hipoacuzia.....	674
XV.9. Otita medie. Pruritul auricular	678
XVI. Acupunctura în tratamentul bolilor de piele.....	681
XVI.1. Bolile de piele în afecțiunile organelor Zang.....	682
XVI.2. Eruptiile cutanate	683
XVI.3. Urticaria și angioedemul Quincke	685
XVI.4. Neurodermita	689
XVI.5. Eczema	690
XVI.6. Psoriazisul	691
XVI.7. Acneea vulgaris	692
XVI.8. Alopecie.....	694
XVI.9. Verucile	697
XVI.10. Vitiligo.....	698

XVI.11. Furunculoza, abcese și limfadenite	699
XVII. Acupunctura în tratamentul bolilor infecțioase	701
XVII.1 Dizenteria	702
XVII.2. Tusea convulsivă	704
XVII.3. Parotidita epidemică	706
XVII.4. Zona Zoster	707
XVII.5. SIDA	709
XVIII. Acupunctura în tratamentul bolilor de sânge și hemoragiilor	715
XVIII.1. Anemia	716
XVIII.2. Leucopenia	718
XVIII.3. Epistaxisul recidivant	719
XVIII.4. Hemoptizia	722
XVIII.5. Gingivoragia	723
XVIII.6. Hemoragiile gastrointestinale	724
XVIII.7. Hematuria	726
XVIII.8. Menoragia, Metroragia	728
XVIII.9. Menstruația vicariantă	731
XVIII.10. Peteșiile cutaneo-mucoase	732
XIX. Acupunctura în pediatrie	735
XIX.1. Malnutriția infantilă	736
XIX.2. Diareea infantilă	736
XIX.3. Ascarioza	737
XIX.4. Enurezisul	738
XIX.5. Hiperchinezia infantilă	740
XIX.6. Convulsiile infantile	740
XIX.7. Boala ticurilor	743
XIX.8. Pavorul nocturn	744
XIX.9. Surdomutismul	745
XIX.10. Hernia inghinală	746
XX. Cronoacupunctura	749
XX.1. Ritmicitatea diurnă a organelor și meridianelor	750
XX.2. Metoda Zi Wu Liu Zhu	752
XX.3. Metoda Ling Kwei Liao Fa	763
XX.4. Metoda "balanței spațiale complexe"	767
Bibliografie selectivă	775

**Tratat
de acupunctură
clinică**

**VOLUMUL
I**

**MERIDIANELE
ȘI PUNCTELE
DE ACUPUNCTURĂ**

La sfârșitul mileniului al II-lea organismul uman este privit atât din punct de vedere al corpului fizic, cât și din punct de vedere bioenergetic. Acupunctura este una din științele a cărei bază o constituie bioenergetica umană. Concepțiile antice ale acupuncturii, fiind verificate pe parcursul mileniilor, corespund cerințelor medicinei moderne. Unele din concepții însă nu sunt acceptate de mediile academice sau sunt privite cu un scepticism total. Conform medicinei orientale, Energia circulă în organism de-a lungul așa-numitelor meridiane. Scheletul energetic al corpului omenesc îl formează meridianele principale, care la rândul lor sunt completate de un șir de meridiane secundare, formând împreună sistemul meridianelor:

I. Meridianele principale.

II. Meridianele secundare:

- meridianele distincte;
- meridianele tendino-musculare;
- meridianele extraordinare;
- meridianele Lo-longitudinale;
- meridianele Lo transversale;
- meridianele Lo profunde.

Noțiunea de meridiane trezește multe discuții și interpretări contradictorii. Există diferite concepții ale meridianelor (energetică, morfologică, funcțională, informațională etc.), însă noțiunea de meridian poate fi interpretată fără antagonism din punct de vedere atât al medicinei occidentale, cât și al celei orientale.

Câteva exemple care ilustrează cele spuse:

- în stenocardie durerea iriază pe suprafața internă a membrului superior, ce corespunde cu traseul meridianului Inimă; punctele meridianului Inimă, localizate pe suprafața medială a membrului superior, sunt folosite în tratamentul afecțiunii inimii (Inervația acestor zone ale membrului superior, ca și a inimii, se referă la segmentele C8-Th2);
- conform interrelației dintre meridiane numită "soț-soție" patologia organului Zang Inimă duce la tulburarea altui organ Zang – Plămâni (este bine cunoscut că afectarea inimii duce la fenomene de stagnare în plămâni, ca urmare fiind posibilă apariția bronșitelor sau pneumoniilor);
- la stimularea punctelor care aparțin segmentar nivelelor Th7-Th10 apare fenomenul de hiperhidroză în regiunile piciorului, proiectate pe traseul meridianului Veziculă Biliară (este cunoscut faptul că aceste segmente inervează preponderent ficatul și vezicula biliară) etc.

Interpretarea noțiunii de meridian din punct de vedere oriental (tradițional-empiric) și occidental (științific):

<i>Interpretare orientală</i>	<i>Interpretare occidentală</i>
Este posibilă afectarea "nucleului energetic" al meridianului (organ Zang sau Fu).	Este posibilă afectarea organelor interne.
Meridianele și organele Zang-Fu se află în anumite interrelații (ciclul celor cinci elemente, regula "mamă-fiu", "soț-soție", "miezul zilei/miezul nopții" etc.).	Organele și sistemele organismului sunt în anumite interrelații cu alte organe și sisteme (legăturile viscero-viscerale).
Punctele de acupunctură a meridianelor sunt în conexiune cu anumite organe Zang sau Fu.	Pielea și mușchii sunt în conexiune cu anumite organe interne (legăturile somato-viscerale).
Starea energetică a organului Zang sau Fu se reflectă asupra stării anumitor puncte de acupunctură.	În afectarea organelor interne apar diferite modificări ale pielii și pragului de durere (legăturile viscero-somatice).
Diferite regiuni ale corpului pot fi afectate în funcție de traseul meridianului sau a ramurilor lui.	În afectarea structurilor somatice este posibilă apariția proceselor patologice în alte structuri somatice (legăturile somato-somatice).
Fiecare lojă energetică (Zang+Fu) corespunde unei caracteristici psiho-emoționale.	Afectarea organelor interne duce la tulburări psiho-emoționale și viceversa (legăturile psiho-somatice și psiho-viscerale).

Pe cele 12 meridiane principale și 2 meridiane extraordinare (Ren Mai și Du Mai) sunt situate 361 puncte de acupunctură. Semnificația punctelor de acupunctură este multiplă. Funcțiile de bază ale acupuncturilor sunt: fiziologică, energetică, diagnostică și terapeutică. Punctele de acupunctură au o valoare funcțională multiplă, ceea ce creează dificultăți în clasificarea acceptabilă a acestora.

În linii generale, toate punctele de acupunctură pot fi împărțite în trei grupe mari.

1. Punctele meridianelor. Aceste puncte sunt localizate pe meridiane și au funcții fiziologice, energetice, diagnostice și terapeutice.
2. Punctele extraordinare (puncte în afara meridianelor). Această categorie de puncte au următoarele particularități: localizare precisă în afara rețelei de meridiane; acțiune specifică asupra unor simptome sau maladii; sensibilitate particulară.
3. Punctele locale. Apariția acestor puncte se explică prin intervenția reflexelor viscero-somatice, somato-viscerale, somato-somatice și viscero-viscerale. Ele sunt lipsite de o acțiune energetică specifică, sunt temporare și posedă la stimulare efecte locale.

În literatura modernă punctele de acupunctură sunt repartizate în

diferite categorii, în funcție de localizare și efectul obținut la stimularea lor.

1. Punctele cu acțiune generală. Posedă un efect general asupra organismului, în special modifică starea funcțională a sistemului nervos central.
2. Punctele segmentare. Sunt localizate pe proiecția nervilor somatici și vegetativi. La stimularea lor apar efecte segmentare cu influență reflectorie asupra organelor și țesuturilor.
3. Punctele spinale. În mare măsură au efecte similare cu punctele segmentare, însă sunt localizate pe liniile paravertebrale și vertebrale.
4. Punctele regionale. Aceste puncte sunt localizate în regiunile de proiecție cutanată a organelor interne.
5. Punctele locale. Sunt localizate în locurile care corespund zonei afectate.

Repartizarea punctelor de acupunctură conform regiunilor anatomice:

<i>Regiunea anatomică</i>	<i>Punctele de acupunctură</i>
<i>Regio parietalis</i>	V7 Tongtian, V8 Luoque, VB10 Fubai, VB11 Qiaoyin, VB17 Zhengying, VB18 Chengling, VG19 Houding, VG20 Baihui, VG21 Qinding.
<i>Regio temporalis</i>	E8 Touwei, TR18 Qimai, TR19 Luxi, TR20 Jiaosun, TR22 Heliao, TR23 Sizhukong, VB3 Shangguan, VB4 Hanyan, VB5 Xuanlu, VB6 Xuanli, VB7 Qubin, VB8 Shuaigu, VB9 Tianchong.
<i>Regio frontalis</i>	V3 Meichong, V4 Quchai, V5 Wuchu, V6 Chengguang, VB13 Benshen, VB14 Yangbai, VB15 Linqi, VB16 Muchuang, VG22 Xinhui, VG23 Shangxing, VG24 Shenting.
<i>Regio orbitalis</i>	E1 Chengqi, E2 Sibai, V1 Jingming, V2 Zanzhu, VB1 Tongziliao.
<i>Regio parotideo-maseterica</i>	E6 Jiache, E7 Xiaguan, TR21 Ermen, IG18 Quanliao, IG19 Tinggong, VB2 Tinghui.
<i>Regio nasalis</i>	GI20 Yingxiang, VG25 Suliao.
<i>Regio buccalis</i>	E4 Dicang, E5 Daying.
<i>Regio oralis</i>	GI19 Heliao, E3 Juliao, VG26 Renzhong, VG27 Duiduan.
<i>Cavitas oris</i>	VG28 Yinjiao.
<i>Regio mentalis</i>	VC24 Chengjiang.
<i>Regio cervicalis anterior</i>	E9 Renying, E10 Shuitu, VC22 Tiantu, VC23 Lianquan.
<i>Regio sternocleido-mastoidea</i>	GI17 Tianding, GI18 Futu, E11 Qishe, IG16 Tianchuang, IG17 Tianrong, VB12 Wangu.

<i>Regio cervicalis lateralis</i>	GI16 Jugu, E12 Quepen.
<i>Regio occipitalis</i>	V9 Yuzhen, VB19 Naokong, VG16 Fengfu, VG17 Naohu, VG18 Qiangjian.
<i>Regio cervicalis posterior</i>	V10 Tianzhu, TR16 Tianyou, TR17 Yifeng, VB20 Fengchi, VG15 Yamen.
<i>Regio presternalis</i>	VC16 Zhongting, VC17 Shanzhong, VC18 Yutang, VC19 Zigong, VC20 Huagai, VC21 Xuanji.
<i>Regio mammaria</i>	E17 Ruzhong, E18 Rugen.
<i>Regio inframammaria</i>	E19 Burong, F14 Qimen.
<i>Regio pectoralis</i>	P1 Zhongfu, P2 Yunmen, E13 Qihu, E14 Kufang, E15 Wuyi, E16 Yingchuang, RP17 Shidou, RP18 Tianxi, RP19 Xiongxiang, RP20 Zhourong, R22 Bulang, R23 Shenfeng, R24 Lingxu, R25 Shencang, R26 Yuzhong, R27 Shufu, MC1 Tianchi.
<i>Regio axillaris</i>	RP21 Dabao, VB22 Yuanye, VB23 Zhejin.
<i>Regio epigastrica</i>	E20 Chengman, E21 Liangmen, E22 Guanmen, R18 Shiguan, R19 Yindu, R20 Tonggu, R21 Youmen, VC11 Jianli, VC12 Zhongwan, VC13 Shangwan, VC14 Juque, VC15 Jiuwei.
<i>Regio umbilicalis</i>	E23 Taiyi, E24 Huaroumen, E25 Tianshu, E26 Wailing, E27 Daju, R14 Siman, R15 Zhongzhu, R16 Huangshu, R17 Shangqu, VC5 Shimen, VC6 Qihai, VC7 Yinjiao, VC8 Shenque, VC9 Shuifen, VC10 Xiawan.
<i>Regio abdominalis lateralis</i>	RP14 Fujie, RP15 Daheng, RP16 Fuai, VB24 Riyue, VB25 Jingmen, VB26 Daimai, F13 Zhangmen.
<i>Regio inguinalis</i>	RP13 Fushe, VB27 Wushu, VB28 Weidao.
<i>Regio pubica</i>	E28 Shuidao, E29 Guilai, E30 Qichong, R11 Henggu, R12 Dahe, R13 Qixue, VC2 Qugu, VC3 Zhongji, VC4 Guanyuan.
<i>Regio scapularis</i>	IG11 Tianzong, IG12 Bingfeng, IG13 Quyuan, IG14 Jianwaishu, IG15 Jianzhongshu, V41 Fufen, V42 Puhu, V43 Gao Huangshu, V44 Shentang, V45 Yixi, V46 Geguan, TR15 Tianliao, VB21 Jianjing.
<i>Regio infrascapularis</i>	V47 Hunmen, V48 Yanggang, V49 Yishe.
<i>Regio vertebralis</i>	V11 Dazhu, V12 Fengmen, V13 Feishu, V14 Jueyinshu, V15 Xinshu, V16 Dushu, V17 Geshu, V18 Ganshu, V19 Danshu, V20 Pishu, V21 Weishu, V22 Sanjiaoshu, V23 Shenshu, V24 Qihai shu, V25 Dachangshu, VG3 Yaoyangguan, VG4 Mingmen, VG5 Xuanshu, VG6 Jizhong, VG7 Zhongshu, VG8 Jinsuo, VG9 Zhiyang, VG10 Lingtai, VG11 Shendao, VG12 Shenzhu, VG13 Taodao, VG14 Dazhui.
<i>Regio lumbalis</i>	V26 Guanyuanshu, V50 Weicang, V51 Huangmen, V52 Zhishi.

<i>Regio sacralis</i>	V27 Xiaochangshu, V28 Pangguangshu, V29 Zhonglushu, V30 Baihuanshu, V31 Shangliao, V32 Ciliao, V33 Zhongliao, V34 Xialiao, V35 Huiyang, VG2 Yaoshu.
<i>Regio perinealis</i>	VC1 Huiyin.
<i>Regio analis</i>	VG1 Changqiang.
<i>Regio deltoidea</i>	GI15 Jianyu, IG10 Naoshu, TR14 Jianliao.
<i>Regio brachialis anterior</i>	P3 Tianfu, P4 Xiabai, C1 Jiquan, C2 Qingling, MC2 Tianquan.
<i>Regio cubitalis anterior</i>	P5 Chize, GI11 Quchi, C3 Shaohai, MC3 Quze.
<i>Regio antebrachialis anterior</i>	P6 Kongzui, P7 Lieque, P8 Jingqu, C4 Lingdao, C5 Tongli, C6 Yinxi, MC4 Ximen, MC5 Jianshi, MC6 Neiguan.
<i>Regio carpalis</i>	P9 Taiyuan, C7 Shenmen, MC7 Daling.
<i>Thenar anterior</i>	P10 Yuji.
<i>Palma manus</i>	C8 Shaofu, MC8 Laogong, MC9 Zhongchong.
<i>Regio brachialis posterior</i>	GI12 Zhouliao, GI13 Wuli, GI14 Binao, IG9 Jianzhen, TR10 Tianjing, TR11 Qinglengyuan, TR12 Xiaoluo, TR13 Naohui.
<i>Regio cubitalis posterior</i>	IG8 Xiaohai.
<i>Regio antebrachialis posterior</i>	GI6 Pianli, GI7 Wenliu, GI8 Xialian, GI9 Shanglian, GI10 Shousanli, IG6 Yanglao, IG7 Zhizheng, TR5 Waiguan, TR6 Zhigou, TR7 Huizong, TR8 Sanyangluo, TR9 Sidu.
<i>Regio carpalis posterior</i>	GI5 Yangxi, IG4 Wangu, IG5 Yanggu, TR4 Yangchi.
<i>Dorsum manus</i>	P11 Shaoshang, GI1 Shangyang, GI2 Erjian, GI3 Sanjian, GI4 Hegu, C9 Shaochong, IG1 Shaoze, IG2 Qiang, IG3 Houxi, TR1 Guanchong, TR2 Yemen, TR3 Zhongzhu.
<i>Regio glutealis</i>	V36 Chengtu, V53 Baohuang, V54 Zhibian, VB30 Huantiao.
<i>Regio femoralis posterior</i>	V37 Yinmen.
<i>Regio genus posterior</i>	V38 Fuxi, V39 Weiyang, V40 Weizhong, R10 Yingu, F8 Ququan.
<i>Regio cruralis posterior</i>	RP6 Sanyinjiao, RP7 Lougu, RP8 Dijl, RP9 Yinlinguan, V55 Heyang, V56 Chengjin, V57 Chengshan, V58 Feiyang, V59 Fuyang, R7 Fuli, R8 Jiaoxin, R9 Zhubin, VB35 Yangjiao, F5 Ligou, F6 Zhongdu, F7 Xiguan.
<i>Regio talocruralis posterior</i>	V60 Kunlun, R3 Taixi, R5 Shuiquan.
<i>Regio calcanea</i>	V61 Pushen, R4 Dazhong.
<i>Regio plantaris</i>	R1 Yongquan.
<i>Regio femoralis anterior</i>	E31 Biguan, E32 Futu, E33 Yinshi, E34 Liangqiu, RP10 Xuehai, RP11 Jimen, RP12 Chongmen, VB29 Juliao, VB31 Fengshi, VB32 Zhongdu, F9 Yinbao, F10 Wuli, F11 Yinlian, F12 Jimai.

<i>Regio genus anterior</i>	E35 Dubi, VB33 Xiyangguan.
<i>Regio cruralis anterior</i>	E36 Zusanli, E37 Shangjuxu, E38 Tiaokou, E39 Xiajuxu, E40 Fenglong, E41 Jiexi, B34 Yanglingquan, VB36 Waiqiu, VB37 Guangming, VB38 Yangfu, VB39 Xuanzhong.
<i>Regio talocruralis anterior</i>	V62 Shenmai.
<i>Regio dorsalis pedis (dorsum pedis)</i>	E42 Chongyang, E43 Xiang, E44 Neiting, E45 Lidui, RP1 Yinbai, RP5 Shangqiu, VB40 Qixu, VB41 Zulinqi, VB42 Diwuhui, VB43 Xiapi, VB44 Zuqiaoyin, F1 Dadun, F2 Xingjian, F3 Taichong, F4 Zhongfeng.
<i>Margo medialis pedis</i>	RP2 Dadu, RP3 Taibai, RP4 Gongsun, R2 Rangu, R6 Zhaohai.
<i>Margo lateralis pedis</i>	V63 Jinmen, V64 Jinggu, V65 Shugu, V66 Tonggu, V67 Zhiyin.

Divizarea acupunctelor conform localizării și efectului obținut la stimularea lor este relativă. La stimularea unui punct de acupunctură pot apărea cele mai diferite efecte, în funcție de starea generală a organismului, specificul maladiei și alți factori.

Practica demonstrează că în diferite afecțiuni acupunctele suportă diferite modificări și, în special, schimbări de sensibilitate. În funcție de pragul de sensibilitate, punctele pot fi împărțite în trei categorii:

1. Punctele latente. Aceste puncte nu sunt dureroase la presiune și sunt caracteristice omului sănătos.
2. Punctele pasive. Această categorie de puncte devine sensibilă la presiune și reflectă apariția unor tulburări în țesuturi și organe.
3. Punctele active. Aceste puncte sunt spontan dureroase și însoțesc tulburările pronunțate în organe și țesuturi.

Din punct de vedere morfologic, punctele de acupunctură pot fi neuro-cutanate, neuro-musculare, neuro-tendino-musculare, neuro-vasculare etc. Investigațiile efectuate nu au depistat structuri morfologice specifice pentru punctele de acupunctură.

Sistematizarea informației privind punctele de acupunctură face posibilă clasificarea acupunctelor din punct de vedere funcțional:

- I. Punctele de comandă ale meridianelor principale.
 1. Punctele de tonifiere (Mu).
 2. Punctele de dispersie (Zi).
 3. Punctele sursă (Yuan).
 4. Punctele Lo ordinare.
 5. Punctele de asentiment (Shu-post.).
 6. Punctele de alarmă (Mu-ant.).
 7. Punctele de intrare în meridiane.
 8. Punctele de ieșire din meridiane.
 9. Punctele antice Jing-dist.
 10. Punctele antice Ying.

11. Punctele antice Shu.
12. Punctele antice Yuan sau Shu-Yuan.
13. Punctele antice Jing-prox.
14. Punctele antice He.
15. Punctele centro-reunire ordinare.
16. Punctele Xi (de clivaj).
17. Punctele Guan ("barieră").

II. Punctele energetice acționând pe meridianele secundare.

1. Punctele centro-reunire generale.
2. Punctele cheie (de comandă) a celor opt vase curioase.
3. Punctele de reunire periferică a meridianelor distincte.
4. Punctele de reunire centrală a meridianelor distincte.
5. Punctele de inserție a meridianelor tendino-musculare.
6. Punctele de reunire a meridianelor tendino-musculare.
7. Punctele Lo generale.
8. Punctele Lo de grupă.
9. Punctele "nod" ale axelor energetice.
10. Punctele "rădăcină" ale marilor meridiane.

III. Punctele energetice cu acțiune asupra unor funcții sau regiuni ale corpului.

1. Punctele "ferestrele cerului".
2. Punctele "constelație".
3. Punctele de mobilizare ("mișcare", punctele Shu psiho-dorsale) ale organelor Zang.
4. Punctele de "proiecție periferică" (He-infer.) a organelor.
5. Punctele Hui (Roe), punctele de reunire particulare.
6. Punctele distale cu acțiune proximală.
7. Punctele specializate (cu acțiune specifică) ale afecțiunilor.
8. Punctele de acțiune regională asupra Energiei.

IV. Punctele simptomatice (punctele "ramuri") și punctele pentru profilaxia bolărilor.

În celebra lucrare de acupunctură *Nei Jing Su Wen* se spune că bolnavul se însănătoșește când sunt punctate anumite puncte speciale de pe suprafața corpului omenesc (puncte de acupunctură). Din contra, când sunt punctate pielea, mușchii sau oasele, fără a lua în considerare localizarea punctelor de acupunctură, boala se va agrava. Pornind de la această premisă, eficacitatea aplicării acupuncturii în tratamentul diverselor maladii în mare măsură depinde de gradul exactității de depistare și inserție a punctelor. În acupunctura modernă sunt folosite trei metode de localizare a punctelor pe suprafața corpului:

1. După repere anatomice. Pentru depistarea punctelor sunt folosite atât repere fixate (urechea, ochiul, vertebra, unghia ș.a.), cât și repere mobile (pliuri de flexie, depresiuni musculare ș.a.).
2. După divizarea diferitelor porțiuni ale corpului în cuni. Cun-ul este o unitate de măsură. Se deosebesc cun-ul individual (distanța dintre pliurile de flexie ale degetului mijlociu) și cun-ul proporțional

(împărțirea într-un număr exact de segmente, numite cuni, a distanțelor dintre două repere anatomice).

3. După datele obținute cu ajutorul diverselor metode instrumentale de diagnostic (electrice, termice ș.a.).

Principalele distanțe folosite pentru localizarea exactă a acupunctelor și numărul corespunzător de cuni proporționali sunt următoarele (fig.1.a, 1.b, 1.c):

În regiunea capului și a gâtului

linia frontală a părului – linia părului cefei	12 cun
glabellă – linia frontală a părului	3 cun
glabellă – marginea superioară a protuberanței occipitale ..	12 cun
glabellă – apofiza spinoasă C7	18 cun
linia părului cefei – apofiza spinoasă C7	3 cun
proeminența mastoidă din stânga – proeminența mastoidă din dreapta	9 cun
punctul E8 Touwei din stânga – punctul E8 Touwei din dreapta	9 cun
punctul E9 Renying din stânga – punctul E9 Renying din dreapta	3 cun

În regiunea toracoabdominală

marginea superioară a manubriului sternal – joncțiunea xifosternală	9 cun
---	-------




Fig.1.a. Modalități de apreciere a cun-ului




Fig.1.b. Unitatea de măsură (cun) folosită în acupunctură pentru localizarea punctelor.




Fig.1.c. Unitatea de măsură (cun) folosită în acupunctură pentru localizarea punctelor.

În regiunea lombodorsală

marginea internă a omoplatului – linia mediană a spatelui ...	3 cun
marginea internă a omoplatului stâng – marginea internă a omoplatului drept	6 cun

În regiunea membrelor superioare

extremitatea anterioară a pliului axilar – pliul cotului	9 cun
extremitatea posterioară a pliului axilar – olecran	9 cun
pliul de flexie al cotului – pliul (proximal) de flexie al pumnului	12 cun

În regiunea membrelor inferioare

marele trohanter – mijlocul rotulei	19 cun
mijlocul rotulei – vârful maleolei externe	16 cun
marginea superioară a maleolei externe – nivelul tălpii	3 cun
marginea superioară a simfizei pubiene – marginea superioară a epicondilului femural	18 cun
mijlocul pliului fesier – mijlocul pliului de flexie al genunchiului	14 cun
marginea inferioară a epicondilului tibial medial – vârful maleolei interne	13 cun

Pentru aplicarea acupuncturii cu o eficacitate înaltă este necesar să se țină cont atât de aspectul tradițional, cât și de cel contemporan privitor la posibilitățile terapice ale acupuncturii (funcțiile energetice, conexiunile nervoase). Deseori diverse funcții ale acupunctelor sunt determinate de anumite condiții (stări fiziologice sau patologice ale organismului, anotimp ș.a.) sau de modul de stimulare a lor (dispersie, tonifiere, armonizare ș.a.). În cele ce urmează sunt sistematizate funcțiile energetice de bază și indicațiile terapeutice principale ale punctelor. Această sistematizare demonstrează clar polifuncționalitatea acupunctelor. O mare atenție se acordă localizării punctelor de acupunctură, inervației și vascularizației în zona proiecției lor. Cunoașterea particularităților de inervație permite aplicarea diferențiată a tehnicii de stimulare (punctare superficială, la nivelul pielii sau profundă – intramusculară) în funcție de efectul terapeutic urmărit.

Meridianele principale

- I.1. Meridianul Plămân (P)**
- I.2. Meridianul Intestin Gros (GI)**
- I.3. Meridianul Stomac (E)**
- I.4. Meridianul Splină-Pancreas (RP)**
- I.5. Meridianul Inimă (C)**
- I.6. Meridianul Intestin Subțire (IG)**
- I.7. Meridianul Vezică Urinară (V)**
- I.8. Meridianul Rinichi (R)**
- I.9. Meridianul Pericard (MC)**
- I.10. Meridianul Trei Focare (TR)**
- I.11. Meridianul Veziculă Biliară (VB)**
- I.12. Meridianul Ficat (F)**

I.1. Meridianul Plămân (P)

Meridianul Plămân este de natură Yin, centrifug, pereche, conține 11 puncte (fig.2-9).

Relațiile energetice:

1. În cadrul marii circulații energetice este precedat de meridianul Ficat și urmat de meridianul Intestin Gros (F-P-GI).
2. În cuplu cu meridianul Intestin Gros realizează loja energetică Metal (P-GI). În cadrul ciclului celor 5 elemente este stimulat de RP și inhibat de C.
3. În cuplu cu meridianul Splină-Pancreas formează axul energetic Tai Yin (P-RP).
4. După regula "miezul zilei/miezul nopții" este cuplat cu meridianul Vezică (P-V).
5. După regula "soț/soție" este cuplat cu meridianul Cord (P-C).

Funcțiile energetice:

1. Plămânul este "stăpânul absolut" al întregii Energii a organismului, este un organ ce determină, dirijează și propulsează ritmul energetic.
2. Controlează funcțiile respiratorii, domină funcția de asimilare a "Energiei aerului" și asigură unirea acesteia cu "Energia alimentelor", producând Energia Ying Qi, trimisă apoi în marea circulație a celor 12 meridiane.
3. Joacă un rol important în apărarea organismului, efectuând controlul pielii și al glandelor sudoripare (participă la dirijarea cantității de lichid în organism, termoreglare, este legat de circulația limfatică etc.).
4. Controlează circulația și transformarea substanțelor în organism. Omul inspiră "Qi pură" și expiră "Qi impură". "Qi pură" a aerului se unește cu Qi a apei și alimentelor și se repartizează în tot organismul. Plămânii controlează repartizarea (difuzarea) Energiei în organism, alimentează și umectează pielea și părul.
5. Controlează descendența Qi și mișcarea apei (metabolismul hidric). În cazul alterării descendenței Qi poate urma o acumulare de spută în plămâni și bronhii. Controlează metabolismul hidric împreună cu meridianele Rinichi, Vezică, Stomac, Splină și de asemenea mucoasele și pielea, asigurând deschiderea și închiderea porilor cutanați, perspirarea lichidului.
6. Controlează funcția căilor respiratorii superioare. Plămânii domină vocea și simțul olfactiv. "Gâtul este locul de intrare și ieșire a Energiei Plămânilor". Reglează eliminarea secreției nazale.
7. Împreună cu Inima participă la circulația sângelui în organism (propulsare energetică).




Fig.2. Punctele meridianului Plămân (P).

8. Controlează creșterea părului în regiunea trunchiului și a membrelor.
9. Plămânul intră în componența lojei energetice Metal (P/GI), care emană Energia numită Po (corespunde capacității de a se adapta la noi situații, vieții instinctive, intuiției).

Acțiunea sindromal-energetică:

- dispersia Vântului Extern – P7 + GI4 + V12;
- dispersia Vântului și Căldurii în Plămâni – P7 + P11 + VG14 + V12;

- dispersia Vântului și încălzirea Frigului în Plămâni – P7 + GI4 + VG16;
- dispersia Vântului și umectarea Uscăciunii în Plămâni – P7 + P5 + GI4 + V12 + R6;
- dispersia Vântului și normalizarea circulației Lichidelor în organism (edeme – P7 + R6 + GI4 + RP9 + VC9);
- fortificarea Qi a Plămânilor – P9 + E36 + V13;
- fortificarea Qi a Plămânilor și normalizarea circulației Lichidelor în organism – P7 + R6 + VC6 + VC9 + V13 + V23;
- fortificarea Yin-Qi și umectarea Plămânilor – P5 + P9 + R6;
- dispersia Focului în urma Insuficienței Yin-Qi a Plămânilor – P10 + R2;
- dispersia Căldurii în Plămâni – P5 + P11 + VG14; P6 + P9;
- dinamizarea Qi în sindroamele de stagnare – P1 + P7 + VC6 + VC17;
- dispersia Flegmei în Plămâni – P1 + P6 + E40;
- reglarea meridianului extraordinar Ren Mai – P7 + R6;
- armonizarea proceselor psihice (în funcție de organul afectat cu semne de stagnare este efectivă asocierea punctului P7 Lieque cu punctele corespunzătoare Shu-post. și Shu psiho-dorsale).

Afectarea organului și traiectului intern al meridianului:

tuse, dispnee, expectorație, plenitudine toracică, spute hemoptizice, astm bronșic, tonzilită.

Afectarea traiectului extern al meridianului:

dureri în piept, umeri sau spate, durere în antebraț și mână, tulburări distrofice de-a lungul traiectului meridianului, nevrită a nervului radial; mușchii umărului tensionați, mușchiul mare pectoral tensionat, senzație de amorțeală și rece în mâini.

Afectarea conexiunilor energetice ale meridianului:

frisoane, sensibilitate la frig și vânt; febră sau scăderea temperaturii, transpirații excesive sau absența transpirației, uscăciune a gâtului; cefalee; afectarea inimii; epistaxis; tulburări de eliminare a lichidelor (urina, secreția sudorală etc.); prurit cutanat, piele uscată sau edematiată; diaree ușoară sau constipație, plenitudine abdominală; tristețe, anxietate, astenie, insomnie.

P1 Zhongfu

- punct de alarmă al meridianului P;
- punct de intrare în meridianul P;
- punct periferic de reunire a meridianelor distincte P/GI;
- punct de încrucișare a meridianelor P, RP.

Indicații

- tuse, dispnee, astm bronșic; conjunctivită; Insomnie cu trezire la




Fig.3

orele 3-5;

- punct Biao din perechea Biao-Ben*: P1-P9;
- punct antialgic: suprafața anterioară a toracelui, regiunea pectorală (mialgii); nervii intercostali; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – membrele inferioare;
- punct sindromal: stagnarea Qi în Plămâni (bronșită; depresie, melancolie); retenția Flegmei în Plămâni; Căldură și Căldură-Flegmă în Plămâni; perversitatea fluxului Qi a Plămânilor.

Localizarea

regio pectoralis, la 6 cun lateral de linia mediană, în fosa subclaviculară în primul spațiu intercostal, la 1 cun mai jos de P2 Yunmen.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • m.pectoralis major • m. pectoralis minor • fascia thoracica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.supraclaviculares intermedi*i (C3,4), *rr.cutanei anteriores (pectorales) nn.intercostales I et II*; mușchii – *nn.pectorales medialis et lateralis (C5-8, Th1) • a.thoracoacromialis, a.intercostalis suprema, a.thoracica interna, a.axilaris, v.thoracoacromialis, v.intercostalis suprema.*

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit la 0,5 – 0,8 cun, vârful acului va fi orientat puțin lateral, spre fosa axilară (nu se va înțeapa profund, în special la indivizii slabi, din cauza pericolului de lezare a pleurei ori a plămânului). Moxibustie 5-15 minute.

Senzația

în jos, spre partea superioară a cutiei toracice.

P2 Yunmen

Indicații

- tuse; acnee;
- punct antialgic: nervii intercostali; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: umăr (P2) – șold (RP12);
- punct sindromal: identic cu punctul P1, însă efectul terapeutic este mai puțin pronunțat.

Localizarea

fossa infraclavicularis, sub marginea inferioară a extremității

* Perechea de puncte Biao-Ben reiese din teoria meridianelor și colateralelor și reflectă poziția lor pe suprafața corpului uman (membrele superioare și inferioare formează partea Ben, iar regiunea cefalică, fața și trunchiul – Biao. Selectarea punctelor pentru tratament se realizează pornind de la concepția Biao-Ben. De exemplu, punctul V59 Fuyang (Ben) poate fi selectat pentru tratamentul afecțiunilor de ochi (regiunea localizării punctului V1 Jingming – Biao).



Fig. 4




Fig. 5

acromiale a claviculei, în foseta formată de mușchiul deltoid și mușchiul mare pectoral, la 6 cun de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • platysma • fascia pectoralis • m.deltoides • m.pectoralis major • lig.coracoclaviculare.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.supraclaviculares intermedi* (C3,4); mușchii – *n.facialis, nn.pectorales medialis et lateralis* (C5-8, Th1) • *a.thoracica interna* (*rr.intercostales anteriores*), *a.intercostalis suprema*, *v.thoracoacromialis*, *v.intercostalis suprema*.

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit, la 0,5–0,8 cun (vârful acului va fi orientat puțin lateral, spre fosa axilară). Se va înțeapa cu precauții similare celor pentru punctul P1 Zhongfu. Înțepătura profundă poate provoca tahipnee. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

spre partea superioară și centrală a cutiei toracice.

P3 Tianfu

- punct de inserție al meridianului tendino-muscular P.

Indicații

- punct specific pentru senzația de sete, epistaxis (P3 + GI4); dispnee; sughiț; tulburări psihice legate de afectarea plămânilor (depresie, claustrofobie, agorafobie etc.);
- punct Biao din perechea Biao-Ben: P3–P9;
- punct antialgic: regiunea omoplatului, cefalee; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ochiul, pleoapele, partea laterală a cefei;
- punct sindromal: stagnarea Qi în Plămâni; Căldură în Plămân.

Localizarea

regio brachialis anterior, la 3 cun sub pliul axilar anterior, la 6 cun deasupra lui P5 Chize, pe marginea laterală a bicepsului. Dacă

pacientul ridică mâna și o atinge cu nasul, atunci vârful nasului indică localizarea punctului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia brachii • m.biceps brachii • m.brachialis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus brachii lateralis inferior (C5,6)*, ramură a *n.radialis* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.musculocutaneus (C5-7)* • *a.brachialis, v.cephalica, v.brachialis.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–1 cun), în poziția de abducție la nivel orizontal al mâinii; se înțeapă sub un unghi ascuțit (1,5–2,5 cm), vârful acului este orientat spre articulația umărului, de-a lungul marginii laterale a bicepsului; se înțeapă prin toată grosimea bicepsului, de la marginea lui laterală spre cea medială. Moxibustie 5 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

În jos, spre articulație sau în sus.

P4 Xiabai

Indicații

- palpații; tuse, respirație scurtă;
- punct antialgic: inimă; suprafața medială a membrelor superioare, nevralgie a plexului brahial; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ochii, pleoapele.

Localizarea

regio brachialis anterior, la 1 cun sub P3 Tianfu, pe marginea laterală a bicepsului, la 4 cun sub pliul axilar anterior.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia brachii • m.biceps brachii • m.brachialis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus brachii lateralis inferior (C5,6)*, ramuri ale *n.radialis* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.musculocutaneus (C5-7)* • *a.brachialis, v.cephalica, v.brachialis.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–1 cun) după abducția mâinii în poziție orizontală; se înțeapă vertical de la marginea laterală spre cea medială a bicepsului; se înțeapă sub un unghi ascuțit spre articulația umărului. Punctarea profundă poate provoca lipotimie. Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

În jos, spre articulație.

P5 Chize

- punct antic He (elementul Apă);
- punct de dispersie al meridianului P;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular P;
- punct sezonier al organului Zang Plămân (punct de tonifiere în perioada de primăvară și de dispersie în perioada de toamnă).

Indicații

- dispnee, astm; hemoptizie, hematemeză; hipertensiune arterială; vomă, diaree; anghină; agitație, depresie cu plâns, fobii, terori nocturne;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (plămâni);
- punct antialgic: suprafața anterioară a gâtului, centura scapulară, umăr, regiunea cotului; cavitatea bucală, limbă, gât (dureri și uscăciune); uretră; plămâni; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – jumătate de corp, regiunea lombară; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: cot (P5) – genunchi (RP9);
- punct sindromal: Căldură în Plămâni sau Focarul Superior; Căldură-Flegmă sau Frig-Flegmă în Plămâni; Insuficiența Yin-Qi a Plămânilor; perversiunea fluxului Qi a Plămânilor (tuse); tulburarea funcției Vezicii (retenție urinară).




Fig.6

Localizarea

fossa cubitalis, pe plica cotului, pe marginea radială a tendonului bicipital.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *fascia brachii* • *tendo m.bicipitis brachii* • *m.brachioradialis* • *m.brachialis*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii lateralis* (C5,6), ramuri ale *n.musculocutaneus* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.musculocutaneus* (C5-7), *n.radialis* (C5-8) • *a.recurrentis radialis*, *v.brachialis*, *v.intermedia cubiti*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–1 cun). În cazul unei introduceri mai profunde a acului este contraindicată rotirea lui din cauza posibilei alterări a trunchiului nervului radial. Tehnica de sângerare (bronșită, astm bronșic; șoc; hipertermie). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

spre mână (o senzație de curent electric).

P6 Kongzui

- punct Xi al meridianului P.

Indicații

- punct important în diferite hemoragii; afectarea laringelui (afonie); tuse, astm bronșic;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (plămâni);
- punct antialgic: carp, degetele mâinii; punct specific în sindroamele algice legate de hipoxie și tulburarea proceselor de oxidare în țesuturi; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – facies, articulațiile membrelor inferioare;
- punct sindromal: stagnarea Qi a Plămânilor; Căldură în Plămâni; retenția Căldurii-Flegmei în Plămâni.

Localizarea

regio antebrachialis anterior, la 5 cun sub plica cotului, pe marginea internă a radiusului, pe linia ce unește P5 Chize cu P9 Taiyuan.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • m.brachioradialis • m.flexor carpi radialis • m.flexor digitorum superficialis • m.pronator teres • m.flexor pollicis longus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii lateralis (C5,6)*, ramuri ale *n.musculocutaneus* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.radialis (C5,6)*, *n.medianus (C6,7,8, Th1)* • *a.radialis, v.radialis, v.cephalica.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–1 cun). La o inserție mai profundă se vor respecta precauțiile indicate pentru P5 Chize. Punctul se află în regiunea trunchiului nervului radial, de aceea, când apare senzația de "curent electric", acul se va retrage puțin, fără rotirea lui. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în jos, spre laba mâinii.

P7 Lieque

- punct Lo al meridianului P;
- punct de ieșire din meridianul P;
- punct de comandă al meridianului extraordinar Ren Mai;
- punct Lo general.

Indicații

- punct important în diverse edeme și fenomene de stază în organism; paralizie facială; bronșită, tuse, astm bronșic; diaree, hemoroizi; afectarea pielii (eczemă, urticarie);
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (nas);
- punct specific în simpaticotonie;



Fig.7

- punct specific în patologia arterelor membrelor superioare;
- punct antialgic: piele (prurit); cap (occipit, cefalee în hipertensiune intracraniană), nervul trigemen, ochi (algii cu lăcrimare și senzație de arsură), dinți; esofag (senzație de arsură); plămân, bronhii, pleură; vagin, uretră (dureri cu hematurie), penis (nevralgii), anus (algii și prurit); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – regiunea lombară, cutia toracică, capul, ochii, pleoapele;
- punct sindromal: Vânt Extern, Vânt-Frig, Vânt-Căldură; stagnarea Qi în cutia toracică în urma acțiunii emoțiilor excesive; afectarea meridianului curios Ren Mai; stagnarea Qi a Plămânilor; perversitatea fluxului Qi pulmonar; tulburări ale funcției Vezicii (retenție urinară, polakiurie, edeme); tulburări psihice: insomnie cu tulburări respiratorii și vegetative, disperare, depresie, râs nervos, fobii, diminuarea memoriei, tremor psihogen, claustrofobie, halucinații, schizofrenie. La bolnavii cu semne de stagnare Qi este efectivă asocierea punctului P7 Lieque cu punctele Shu psiho-dorsale ale organului afectat: Plămâni (tristețe, anxietate) – P7 + V42; Ficat (frustrație) – P7 + V47; Inimă (depresie, nervozitate) – P7 + V44; Rinichi (frică) – P7 + V52; Splină (îngrijorare) – P7 + V49.

Localizarea

regio antebrachialis anterior, pe marginea laterală a radiusului, la 1,5 cun deasupra pliului mâinii. La încrucișarea palmelor punctul se află sub vârful indicelui.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • m.abductor pollicis longus • tendo m.brachioradialis • m.pronator quadratus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii lateralis* (C5,6), ramuri ale *n.musculocutaneus de la plexus brachialis, r.superficialis n.radialis* (C6, 7,8); mușchii – *n.medianus* (C6,7,8, Th1) • *a.radialis, v.radialis.*

Tehnica

se va înțepa sub un unghi ascuțit (0,3–0,5 cun), vârful acului este orientat spre articulația cotului; se va înțepa sub un unghi ascuțit (0,5 cun), vârful acului este orientat în jos, spre articulația radio-carpiană sau spre punctul P9 Taiyuan (indicat în tuse la bolnavii cu sindromul Vânt-Frig). Introducerea profundă a acului poate provoca vertij și colaps. Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

spre degetul mare sau senzație localizată de durere și distensie.

P8 Jingqu

- punct antic Jing-prox. (elementul Metal);
- punct sezonier al organului Zang Plămân (punct de tonifiere pentru perioada de iarnă și de dispersie pentru al 5-lea sezon).

Indicații

- punct specific în tulburări ale circulației venoase a membrelor

superioare; tuse, astm bronșic; febră fără transpirații; vomă, esofago-spasm;

- punct antialgic: regiunea scapulară (nevralgii), nervul radial (nevralgii); bronhii (dureri persistente în bronșită); inimă (dureri cu vomitare); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ceafă, omoplat, suprafața posterioară a genunchiului și gambei.

Localizarea

regio antebrachialis anterior, la 1 cun deasupra pliului mâinii, pe marginea externă a arterei radiale. La palparea pulsului cu trei degete, degetul III este suprapus acestui punct.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • tendo m.brachioradialis • m.pronator quadratus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii lateralis (C5,6)*, ramuri ale *n.musculocutaneus de la plexus brachialis*; mușchii – *n.medianus (C6,7,8, Th1) • a.radialis, v.radialis.*

Tehnica

se va înțepa vertical (0,1–0,5 cun), evitând alterarea arterei. Moxibustie 5–10 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

în jos, spre degetul mare.

P9 Taiyuan

- punct antic Shu-Yuan (elementul Pământ);
- punct de tonifiere al meridianului P;
- punct sursă al meridianului P;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular P;
- punct sezonier al organului Zang Plămân (punct de tonifiere pentru perioada de toamnă și de dispersie pentru perioada de vară).




Fig.8

Indicații

- punct specific în tulburări ale tonusului arterial și venos; punct cu acțiune de reglare a lichidului (edem pulmonar); hipotensiune arterială, palpitații; conjunctivită; incontinență de urină; tuse, hemoptizie; fobii, dispoziție proastă, ură, dorința de a face rău altora, insomnie cu anxietate;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (plămâni);
- punct Ben din perechea Biao-Ben: P9–P1; P9–P3;
- punct antialgic: suprafața anterioară a cutiei toracice, regiunea

epigastrică (dureri surde); degetele mâinii (dureri ce iradiază în palmă); globli oculari (dureri superficiale); gingii (dureri cu hemoragie); cefalee difuză; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ochi; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: pumn (P9) – gleznă (RP5);

- punct sindromal: Insuficiența Qi a Plămânilor, Insuficiența Qi a Plămânilor și Inimii, Insuficiența Qi a Plămânilor și Splinei, Insuficiența Qi a Plămânilor și Rinichilor; punct important în sindrom Intern și de Insuficiență; posedă efect de diminuare a Flegmei; dispersează Vântul.

Localizarea

regio carpalis anterior, pe pliul inferior al mâinii, la marginea radială a arterei radiale.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • retinaculum flexorum • tendo m.flexor carpi radialis • tendo m.abductor pollicis longus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii lateralis* (C5,6), ramuri ale *n.musculocutaneus*, *r.superficialis* *n.radialis* (C7,8) de la *plexus brachialis* • *a.radialis*, *v.radialis*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,3–0,5 cun), evitând alterarea arterei. Moxibustie 3–5 minute.

Senzația

adânc, în jurul articulației (durere localizată sau distensie).

P10 Yuji

- punct antic Ying (elementul Foc);
- punct sezonier al organului Zang Plămân (punct de tonifiere pentru al 5-lea sezon și de dispersie pentru perioada de primăvară).

Indicații

- hiperhidroză pronunțată; afectarea laringelui (afonie); tuse, astm bronșic, hemoptizie; fobii, claustrofobie, anxietate, insomnie, dispoziție proastă;
- punct antialgic: palmă, degetele mâinii (dureri ce iradiază în palmă); abdomen; regiunea liniei mediane a spatelui; glandele mamare (mastită); inimă (algii precordiale cu palpații); anus (algii cu senzație de greutate); plămâni (dureri în spate); cefalee; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – dinții maxilarului superior, gât, nas, piept (mastită);
- punct sindromal: Căldură în Plămâni; Căldură Xue.




Fig.9

Localizarea

thenar, la mijlocul primului metacarpian, pe linia de graniță între suprafața palmei și suprafața dorsală a mâinii.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.abductor pollicis brevis • m.opponens pollicis • m.flexor pollicis brevis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.superficialis n.radialis* (C7,8), ramuri ale *n.radialis* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.medianus* (C2, Th1) • *a.radialis* (*ramus palmaris superficialis*), *a.princeps pollicis*, *arcus palmaris superficialis*, *v.radialis*.

Tehnica

se va înțepa la 0,5–1 cun în profunzime, vârful acului va fi orientat spre centrul palmei. Tehnica de sângerare (bronșită, astm bronșic; febră; mastită; tonsilită). Moxibustie 1–3 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă). În odontalgie este efectivă moxibustia contralaterală.

Senzația

în jos, spre degetul mare (adeseori apare o contracție musculară sau senzație locală de durere și distensie).

P11 Shaoshang

- punct antic Jing-dist. (elementul Lemn);
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular P;
- punct sezonier al organului Zang Plămân (punct de tonifiere pentru perioada de vară și de dispersie pentru perioada de iarnă).

Indicații

- sughiț; epistaxis; hipertermie; tuse; parotidită, tonsilită acută; epilepsie; comă; exanteme cu prurit; depresie, manie;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (gât);
- punct antialgic: degetele mâinii (dureri cu tulburări senzoriale); gât (anghină), esofag (senzație de arsură); inimă; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – nas, ochi, gât, gambă, suprafața posterioară a articulației genunchiului;
- punct sindromal: Vânt-Căldură cu transformare în Căldură Internă a Plămânilor; Căldură Xue (afecțiuni cutanate); Vânt Intern (apoplexie).

Localizarea

facies dorsalis pollicis, la 0,1 cun în afara unghiului unghial extern al policelui.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • phalanx digitalis distalis I.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.digitalis palmaris proprius* (C6,7,8) de la *n.medianus*, *n.digitalis dorsalis* de la *r.superficialis n. radialis* (C6,7,8), ramură

a *n.radialis* de la *pl.brachialis* • a *princeps pollicis*, vv. *metacarpeae dorsales*, vv. *digitales palmares*.

Tehnica

acul este introdus aproape paralel cu pielea (0,1–0,2 cun), orientând vârful acului în sus, spre articulația radiocarpiană (se evită înțeparea osului, lezarea căruia provoacă o durere violentă). Tehnica de sângerare (edem acut al laringelui, febră, infiltrat sublingval; comă). Moxibustie 3 minute.

Senzația

locală sau în sus, spre mână.

I.2. Meridianul Intestin Gros (GI)

Meridianul Intestin Gros este de natură Yang, centripet, pereche, conține 20 de puncte (*fig.10–23*).

Relațiile energetice:

1. În cadrul marii circulații energetice este precedat de meridianul Plămân și urmat de meridianul Stomac (P-GI-E).
2. În cuplu cu meridianul Plămân realizează loja energetică Metal (GI-P). În cadrul ciclului celor 5 elemente este stimulat de E și inhibat de IG.
3. În cuplu cu meridianul Stomac formează axul energetic Yang Ming (GI-E).
4. După regula "miezul zilei/miezul nopții" este cuplat cu meridianul Rinichi (GI-R).
5. După regula "soț/soție" este cuplat cu meridianul Intestin Subțire (GI-IG).

Funcțiile energetice:

1. Funcția principală constă în digestia și absorbția produselor alimentare, asimilarea Energiei din alimente.
2. Controlul funcției Intestinului Gros, absorbția apei, formarea deșeurilor tari și eliminarea lor din organism.
3. Împreună cu Plămânii participă la controlul funcției căilor respiratorii superioare. Funcția energetică a meridianului Intestin Gros are importante tangențe cu funcția energetică a meridianului Plămân (corelații exterior-interior) – constipațiile pot provoca astmul sau pot fi însoțite de senzație de constricție în torace și invers, dacă Energia din meridianul Plămân nu poate trece în meridianul Intestin Gros, urmează o stază în eliminarea deșeurilor (astmul este însoțit deseori de constipații).
4. Participă la favorizarea circulației arteriale (rezultând din raporturile sale cu marele artere).
5. Are o influență mare în determinarea pragului dureros și deci participă la apariția algilor.




Fig.10. Punctele meridianului Intestin Gros (GI).

6. Intestinul Gros intră în componența lojei energetice Metal (P/GI) care emană Energia numită Po (corespunde capacității de a se adapta noilor situații, vieții instinctive, intuiției).

Acțiunea sindromal-energetică:

- dispersia Vântului Extern – GI4 + P7 + TR5;
- dinamizarea Qi și Xue în sindroamele de stagnare (degetele mâinii – GI1 + GI4 + VG14; cutia toracică și epigastru – GI4 + MC6 + TR6; Intestine – GI10 + TR6 + E25 + E37; uter – GI4 + RP6 + RP8; diferite regiuni ale organismului – GI4 + F3 + TR6);
- dispersia Căldurii (Sânge – GI11 + RP10; Stomac și Intestine – GI4 + GI11 + E44 + E25);
- fortificarea Qi și Xue – GI4 + E36;
- încălzirea Frigului în Intestine – GI10 + VC6 + E25;

- armonizarea circulației Qi a Intestinului – GI4 + GI10;
- eliberarea căilor respiratorii superioare – GI4 + GI20 + P7;
- armonizarea funcțiilor cutanate – GI4 + GI11 + VG10;
- armonizarea proceselor psihice (stres emoțional – GI4 + F3 + Yintang; astenia psihică – GI1 + E45; confuzia mentală – GI1 + VB13 + VG24; senzația de izolare și singurătate – GI4 + GI18 + V42).

Afectarea organului și traiecului intern al meridianului:

dureri abdominale, meteorism, borborigme, scaune uscate, diaree, constipație, dureri în timpul defecației, senzație de arsură în anus, fisuri anale, prolaps rectal, prurit anal; tulburări funcționale ale intestinului gros.

Afectarea traiecului extern al meridianului:

durere, tulburări distrofice, tumefiere și alte semne patologice de-a lungul traiecului meridianului; hipertonia mușchilor din regiunea cervicooccipitală, slăbiciune a mâinii (mușchiul deltoid), scădere în volum a mușchilor centurii scapulare; patologia cavității bucale (stomatită, gingivită, odontalgii etc.); tulburări rinofaringiene (rinită, epistaxis, faringite etc.); tinitus, surditate.

Afectarea conexiunilor energetice ale meridianului:

febră, sete; hipertensiune arterială, patologia inimii; plictiseală, neliniște, irascibilitate, copii plângăreți, nerăbdare.

GI1 Shangyang

- punct antic Jing-dist. (elementul Metal);
- punct de inserție al meridianului tendo-muscular GI;
- punct sezonier al viscerului Fu Intestinul Gros (punct de tonifiere pentru perioada de iarnă și de dispersie pentru al 5-lea sezon).

Indicații

- patologia gâtului; hipertermie; comă, apoplexie; tulburări psihice (GI1 + E45 + VG24);
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (regiunea scapulo-humerală);
- punct antialgic: centura scapulară; dinți, gât (anghină); epicondilită; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ureche, suprafața antero-medială a membrului inferior, cutia toracică;
- punct sindromal: Vânt-Căldură Externă cu transformare în Căldură Internă a Plămânilor; stagnarea Qi și Xue în meridianul Intestin Gros.




Fig.11

Localizarea

facies dorsalis indicis, la 0,1 cun în afara unghiului unghial extern al indexului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • phalanx digitalis distalis II.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.digitalis palmaris proprius (C6,7,8)* de la *n.medianus (plexus brachialis)* • *a.radialis indicis*, *aa.digitales palmares propriae*, *rete venosum dorsale manus*, *vv.digitales palmares*.

Tehnica

se va înțepa sub un unghi ascuțit (0,1 cun), vârful acului va fi orientat spre laba mâinii. Tehnica de sângerare (tonzilită, tuse, astm bronșic; febră; zgomote în urechi; criză hipertonică; spasme ale tubului digestiv). Moxibustie 5 minute.

Senzația

locală.

GI2 Erjian

- punct antic Ying (elementul Apă);
- punct de dispersie al meridianului GI;
- punct sezonier al viscerului Fu Intestin Gros (punct de tonifiere pentru perioada de primăvară și de dispersie pentru perioada de toamnă).



Fig.12

Indicații

- epistaxis; hipertermie; spasme ale intestinului gros; afecțiuni ale cavității bucale și ale dinților;
- punct antialgic: centura scapulară (nevralgii); globii oculari; gât (absces cu dureri pronunțate), dinți (la rece); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ureche, suprafața antero-medială a genunchiului;
- punct sindromal: Căldură în Intestinul Gros (constipație cu scaune uscate). Punctul din dreapta este legat funcțional cu Intestinul Gros, punctul din stânga – cu Intestinul Subțire.

Localizarea

facies dorsalis indicis, pe fața radială a indexului, distal de articulația metacarpofalangiană, la marginea pliului cutanat, pe linia de graniță între fața palmară și dorsală.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • tendo m.lumbricalis I.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.digitalis dorsalis (C6,7,8)*, *r.superficialis n.radialis (plexus brachialis)* • *a.radialis indicis*, *aa.metacarpeae dorsales*, *rete venosum dorsale manus*.

Tehnica

acul va fi introdus aproape paralel cu pielea (0,2–0,3 cun); se va înțepa perpendicular (0,5–1 cun), vârful acului va fi orientat de la partea radială spre cea cubitală a degetului. Moxibustie 5 minute.

Senzația

spre vârful degetului.

GI3 Sanjian

- punct antic Shu (elementul Lemn);
- punct de dispersie al meridianului GI;
- punct sezonier al viscerului Fu Intestin Gros (punct de tonifiere pentru perioada de vară și de dispersie pentru perioada de iarnă).

Indicații

- diaree, meteorism; patologia nasului și faringelui; emotivitate excesivă, fobii, somnolență;
- punct antialgic: regiunea pleoapelor (algii și prurit); centura scapulară (dureri ce se intensifică la ridicarea mâinii), regiunea spatelui (dureri ce iradiază spre omoplați); nervul trigemen (nevralgie); globii oculari; dinți (la rece), gât; ficat și vezicula biliară (dureri cu tulburări ale defecației); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ureche, gât, suprafața medială a articulației genunchiului, articulația tibio-tarsiană, suprafața medială a halucelui;
- punct sindromal: Vânt Extern și Vânt-Căldură (gât); Căldură a Intestinului Gros.

Localizarea

dorsum manus, posterior de capul distal al metacarpianului II pe fața radială, la limita dintre fața palmară și cea dorsală.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia dorsalis manus • mm.interossei dorsales • m.lumbricalis • os metacarpale II • tendo m.flexor indicis superficialis • m.flexor indicis profundus • m.interosseus I.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.digitalis dorsalis (C6,7,8)*, *r. superficialis n.radialis (plexus brachialis)*; mușchii – *n.ulnaris (C8, Th1)* • *a.radialis indicis*, *aa.metacarpeae dorsales, rete venosum dorsale manus.*

Tehnica

se va înțepa vertical (0,3–1 cun), orientând vârful acului spre punctul IG3 Houxi (odontalgie, dureri în gât). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în jurul articulației și de-a lungul degetului.

GI4 Hegu

- punct antic Yuan;

- punct sursă al meridianului GI;
- punct de intrare în meridianul GI;
- punct de centro-reunire generală (reunirea Energiei Yang).





Fig.13

Indicații

- astenie; afecțiunile cutanate (GI4 + GI11); hipertermie; trismus; afecțiunile gâtului; hiperhidroză (GI4, dispersie + R7, tonifiere) sau anhidroză (GI4, tonifiere + R7, dispersie) la bolnavii cu hipertermie; paralizie facială; afectarea nasului (rinită, anosmie, epistaxis), sinusită; amenoree (GI4 + RP6); schizofrenie, insomnie cu slăbiciune, confuzie, depresie, intoxicație cu nicotină și alcool, neurastenii, tensiune nervoasă, hipersensibilitate; în tulburări psihice este efectivă asocierea de puncte GI4 + F3 ("patru porți"), această formulă este potențată prin asocierea punctelor VG24 + VB13; VG20; RP6 + MC6;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (facies, gură);
- punct antialgic: facies (nevralgii, buza superioară, dinți), urechi; globii oculari (algii cu tumefiere, glaucom), articulația mandibulară; gât, glandele parotide; cutia toracică (dureri cu dispnee în afecțiunile plămânilor și pleurei); ciclul menstrual (dismenoree cu hiper- sau hipomenoree), naștere; cap (cefalee, migrenă – GI4 + E36); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ureche, gât, regiunea lombară, suprafața antero-medială a membrului inferior, suprafața medială a halucelui;
- punct sindromal: Vânt Extern (Căldură sau Frig), Vânt Intern (hipertensiune arterială, cefalee etc.); stagnarea Xue în uter (dismenoree, retenția placentei etc.); pervertirea fluxului Qi a Stomacului, Plămânilor, Ficatului sau în ptoze viscerale (armonizează ascendența și descendența Yin-Yang); Insuficiența Qi și Xue (atrofie a mușchilor membrelor superioare); hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului (spasme musculare; cefalee parietală; hipertensiune arterială); expulzează Umiditatea.

Localizarea

dorsum manus, între metacarpienele I și II, mai aproape de mijlocul osului metacarpian II, pe fața sa radială, în punctul cel mai proeminent al mușchiului, când se apropie strâns policele de index.

Protecția

cutis • tela subcutanea • fascia dorsalis manus • m.interosseus dorsalis • m.adductor pollicis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.digitalis dorsalis* (C6,7,8), *r. superficialis n.radialis* (n.

radialis de la plexus brachialis; mușchii – *n.ulnaris* (C8, Th1) • *a. princeps pollicis*, *aa.metacarpeae dorsales*, *rete venosum dorsale manus*, *v.cephalica*, *vv.metacarpeae dorsales*.

Tehnica

se va înțepa vertical (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat în jos, în grosimea mușchiului; se va înțepa sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre articulația radiocarpiană; se va înțepa perpendicular la piele, vârful acului va fi orientat de la partea radială a labei spre cea cubitală, spre punctul IG3 Houx sau MC8 Laogong; se va înțepa sub un unghi ascuțit, acul va fi orientat spre vârful arătătorului, penetrând de-a lungul articulația metacarpo-falangiană (indicat în furunculoză și carbuncul). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în jos, spre degetul mare și index sau în sus.

GI5 Yangxi

- punct antic Jing-prox. (elementul Foc);
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular GI;
- punct sezonier al viscerului Fu Intestin Gros (punct de tonifiere pentru al 5-lea sezon și de dispersie pentru perioada de primăvară).



Fig.14

Indicații

- dispepsie la copii; anghină; afectarea pielii; impotență, orhită; afectarea urechii (surditate);
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (gât);
- punct antialgic: ochi (algii cu hiperemie); dinți; piele (prurit difuz); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ureche, regiunea spatelui și regiunea lombară, suprafața antero-medială a membrelor inferioare, mușchii abdomenului; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: pumn (GI5) – gleznă (E41);
- punct sindromal: indicațiile sunt similare cu punctul GI4 Hegu, însă efectul terapeutic este mai puțin pronunțat.

Localizarea

regio carpalis posterior, în centrul tabacherei anatomice, pe pliul posterior al pumnului (pe vârful inferior al apofizei radiale).

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *retinaculum extensorum* • *tendo m.extensor pollicis brevis* • *m.extensor pollicis longus*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.superficialis n.radialis* (C6,7,8), ramuri ale *n.radialis* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.radialis* (C6,7,8, Th1) • *ramus*

carpeus dorsalis a.radialis, vv.radiales • v.cephalica.

Tehnica

se va înțepa vertical (0,3–0,5 cun). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

adânc, în jurul articulației.

GI6 Pianli

- punct Lo al meridianului GI.

Indicații

- epistaxis; diminuarea auzului; edeme localizate în jumătatea superioară a corpului (GI6 + P7); constipație; paralizie facială; logoree, confuzie, obnubilație (punctul posedă o acțiune psihotonică);
- punct antialgic: dinți (incisivii); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ureche, genunchi, suprafața medială a gambei;
- punct sindromal: Insuficiența Qi a Plămânilor.



Fig. 15

Localizarea

regio antebrachialis posterior, proximal de pliul posterior al pumnului, la 3 cun deasupra punctului GI5 Yangxi, pe linia ce unește GI5 Yangxi cu GI11 Quchi. La încrucișarea palmelor punctul se află sub vârful mediusului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • m.extensor pollicis brevis • tendo m.extensor carpi radialis longus • tendo m.abductor pollicis longus • m.extensor carpi radialis brevis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii lateralis* (C5,6), ramuri ale *n. musculocutaneus*, *n.cutaneus antebrachii posterior* (C5-8), ramuri ale *n.radialis* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.radialis* (C6,7,8, Th1) • *a.interossea posterior, vv.radiales, v.cephalica.*

Tehnica

se va înțepa vertical (0,5 cun); se va înțepa sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în sus, spre articulația cotului. Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jos sau spre index.

GI7 Wenliu

- punct Xi al meridianului GI.

Indicații

- edem al feței; aerofagie; parotidită; stomatită, glosită; halucinații, râs nemotivat;

- punct antialgic: obraji (suprafața internă), dinți; gât; abdomen; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – genunchi, suprafața medială a gambei;
- punct sindromal: Vânt-Căldură (tonzilită).

Localizarea

regio antebrachialis posterior, la 5 cun deasupra lui GI5 Yangxi, pe linia ce unește GI5 Yangxi cu GI11 Quchi,

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • tendo m.extensor carpi radialis longus • m.extensor carpi radialis brevis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii lateralis (C5,6)*, ramuri ale *n.musculocutaneus*, *n.cutaneus antebrachii posterior (C5-8)*; mușchii – *n.radialis (C6,7,8) • a.radialis, v.cephalica, vv.radiales.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–0,8 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în sus, spre articulația cotului. Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jos, spre index.

GI8 Xialian

Indicații

- diaree; dispnee; hematurie; accese de deznădejde, nebunie cu divagații, confuzie;
- punct antialgic: inimă (dureri precordiale); abdomen; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ureche, picior, genunchi, coccis, mușchii regiunii lombare;
- punct sindromal: dispersează Vântul, diminuează Căldura.

Localizarea

regio antebrachialis posterior, la 4 cun sub GI11 Quchi, pe linia ce unește GI5 Yangxi cu GI11 Quchi, la limita treimii superioare și medii a distanței între articulația radiocarpiană și articulația cotului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • m.brachioradialis • m.extensor carpi radialis brevis • m.supinator.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii posterior (C5-8)*, ramuri ale *n.radialis*, *n.cutaneus antebrachii lateralis (C5,6)*; mușchii – *n.radialis (C5-8) • a.radialis, vv.radiales, v.cephalica.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre articulația cotului. Moxibustie 2–5 minute.

Senzația

în jos, spre mână sau degete.

GI9 Shanglian

Indicații

- encefalită; dispnee; sughiț; diplopie;
- punct antialgic: cap (cefalee provocată de un efort psihoemoțional); abdomen; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – membrele inferioare, articulația tibiotarsiană, suprafața medială a gambei și genunchiului, mușchii regiunii lombare.

Localizarea

regio antebrachialis posterior, la 3 cun sub GI11 Quchi, pe linia ce unește GI5 Yangxi cu GI11 Quchi, la marginea laterală a radiusului, la 1/4 distanță între articulația cotului și articulația radiocarpiană.




Fig. 16

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • m. extensor carpi radialis longus • m. extensor carpi radialis brevis • m. supinator • m. abductor pollicis longus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n. cutaneus antebrachii posterior (C5-8), n. cutaneus antebrachii lateralis (C5-6)*; mușchii – *n. radialis (C5-8) • a. radialis, vv. radiales, v. cephalica.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în sus, spre articulația cotului. Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jos, spre mână sau degete.

GI10 Shousanli

Indicații

- punct important în tulburări localizate de-a lungul meridianului Intestin Gros (crampe musculare, atrofii musculare, hemiplegie etc.); astenie; afecțiuni ale pielii (alergice, inflamatorii); vomă, diaree sau constipație; afonie psihogenă (stres); insomnie sau somnolență;
- punct antialgic: articulația cotului (nevralgii), mâini (dureri în degete ce iriază spre suprafața dorsală aabei), nervul radial (nevralgie); dinți (dureri cu pioree alveo-dentară); cefalee (migrenă); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul

noptii) – partea inferioară a spatelui, genunchi, gambă, articulația tibiotarsiană;

- punct sindromal; stagnarea Qi a Stomacului și Intestinului (constipație, distensie abdominală: GI10 + TR6); dispersează Vântul.

Localizarea

regio antebrachialis posterior, la 2 cun sub GI11 Quchi, pe linia ce unește GI5 Yangxi cu GI11 Quchi.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • m.extensor carpi radialis longus • m.extensor carpi radialis brevis • m.extensor digitorum • m.supinator.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii posterior (C5-8)*, ramură a *n. radialis* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.radialis (C5-8)* • *a. recurrens radialis, v.cephalica, vv.radiales.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–1 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în sus spre articulația cotului; se înțeapă spre punctul GI7 Wenliu (indicat în slăbiciune a membrilor superioare). Punctul se localizează deasupra regiunii de amplasare a trunchiului nervului radial, de aceea în cazul unei dureri acute sau unei senzații pronunțate de distensie, tensiune acul trebuie puțin retras, manipulațiile se vor efectua cu precauție. Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jos, spre degete.

GI11 Quchi

- punct antic He (elementul Pământ);
- punct de tonifiere al meridianului GI;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular GI;
- punct sezonier al viscerului Fu Intestin Gros (punct de tonifiere pentru perioada de toamnă și de dispersie pentru perioada de vară).




Fig.17

Indicații

- hipertermii cu scăderea forței de apărare a organismului; afectarea ganglionilor limfatici cervicali; sughiț (punctul din stânga pentru bărbați și punctul din dreapta pentru femei); constipații sau atonie a intestinului gros; afectarea pielii (furunculoză, neurodermatită etc.); alergii, astm bronșic; hipertensiune arterială (GI11 + E9 + E36); confuzie, depresie;
- punct Ben din perechea Biao-Ben: GI11–GI20; GI11–VC24;
- punct antialgic: cutia toracică (afecțiunile plămânilor și ale pleu-

rei); membrele superioare și inferioare (nevralgii); piele (algii și prurit – GI11 + RP10); dinți (dureri cu secreții purulente); gât (algii cu tumefiere); stomac (dureri spasmodice), vezicula biliară (dureri în colecistită cu constipație); ciclul menstrual (dismenoree); hemoroizi (dureri cu constipații); cefalee (GI11 + GI4); apendicită acută; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ureche; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: cot (GI11) – genunchi (E36);

- punct sindromal: Vânt Extern; Căldură sau Umiditate-Căldură în Intestine; Căldură Xue (urticarie, psoriaz, eczemă); hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului; Focul Ficatului (hipertensiune arterială etc.); Umiditate-Căldură cu afectarea pielii, organelor digestive sau urogenitale.

Localizarea

regio cubitalis anterior, la 1/2 distanței între epicondilul radial și punctul P5 Chize, când se flexează antebrațul.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • m.extensor carpi radialis longus • m.extensor carpi radialis brevis • m.brachioradialis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus brachii lateralis inferior* (C5, 6), ramură a *n.radialis de la plexus brachialis*; mușchii – *n.radialis* (C5-8) • *a.recurrentis radialis, v.cephalica, vv.radiales.*

Tehnica

se înțeapă vertical (1–1,5 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în jos, spre articulația radiocarpiană; se va puncta până la punctul C3 Shaohai (indicat în hemiplegie, în algie și tumefiere a articulației cotului). Tehnica de sângerare (febră, tonzilită, faringită; gastralgii, vomitare cu diaree; odontalgie, insolație; maladia hipertonică; conjunctivită). Moxibustie 10–30 minute.

Senzația

locală (senzație puternică în mușchi); în jos, spre degete sau în sus, spre umăr.

GI12 Zhouliáo

Indicații

- contracturi ale cotului;
- punct antialgic: cotul "jucătorului de tenis"; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ureche.

Localizarea

regio brachialis posterior, la 1 cun deasupra lui GI11 Quchi, pe linia de proiecție a meridianului, deasupra epicondilului humeral extern.



Fig.18




Fig.19

Proiecția

cutis • tela subcutanea • septum intermusculare brachii laterale • m.brachioradialis • m.brachialis.

Inervația • Vascularizația

pielea – n.cutaneus brachii posterior (C5-8), ramură a n.radialis de la plexus brachialis; mușchii – n.radialis (C5,6,7,8, Th1) • rete articulare cubiti (a.interossea recurrens, a.collateralis media, a. collateralis radialis), a.profunda brachii, v.cephalica, vv.brachiales.

Tehnica

se punctează vertical (0,5–0,8 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în sus, spre articulația umărului și spre interior. Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jurul cotului.

GI13 Wuli

Indicații

- hematemeză, hemoptizie; tetraplegie; ocluzie spastică intestinală;
- punct antialgic: plexul brahial (nevralgie); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – articulația tibiotarsiană, suprafața medială a genunchiului.

Localizarea

regio brachialis posterior, pe marginea externă a bicepsului brahial, la 3 cun deasupra lui GI11 Quchi, pe linia ce unește GI11 Quchi cu GI15 Jianyu.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • septum intermusculare brachii laterale • m.brachialis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus brachii posterior (C5-8)*, ramură a *n.radialis* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.radialis (C5,6,7,8, Th1)* • *a. et v.collaterales radiales, v.cephalica, vv.brachiales*.

Tehnica

se punctează vertical la 0,5–0,8 cun (punctarea profundă este contraindicată). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în jos, spre degete.

GI14 Binao

- punct al meridianului extraordinar Yang Wei Mai.

Indicații

- obezitate de etiologie alimentară; adenopatie axilară;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (ochi);
- punct antialgic: centura scapulară și regiunea gâtului (dureri profunde); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – cap;
- punct sindromal: stagnarea Qi în membrele superioare provocată de Vânt, Frig și Umiditate.

Localizarea

regio brachialis posterior, la 7 cun deasupra pliului cotului, în locul de inserție a mușchiului deltoid, pe linia ce unește GI11 Quchi cu GI15 Jianyu.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia deltoidea • m.deltoideus • fascia brachii • m.triceps brachii.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus brachii lateralis superior (C5,6)*, ramură a *n.axillaris* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.axillaris (C5,6)*, *n.radialis (C6,7,8, Th1)* • *a.circumflexa humeri posterior, a.profunda brachii, v.cephalica*.

Tehnica

se punctează perpendicular sau sub un unghi ascuțit în sus, la adâncimea de 0,8–1 cun (punctarea profundă este contraindicată). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

la o distanță mică, spre cot sau spre umăr.

GI15 Jianyu

- punct de inserție al meridianelor tendino-musculare GI și V;
- punct de încrucișare al meridianelor GI, Yang Qiao Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Qiao Mai.

Indicații

- punct important în profilaxia ictusului cerebral (hipertensiune arterială); hemiplegie;
- punct antialgic: umăr (GI15 + E38); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – mușchii abdomenului; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: umăr (GI15) – șold (E31);
- punct sindromal: Vânt (membrele superioare).




Fig.20

Localizarea

regio deltoidea, pe punctul de unire a acromionului, claviculei și humerusului, în vârful fosei formate prin ridicarea brațului până la planul orizontal.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia deltoidea • m.deltoideus • bursa subdeltoidea • tendo m.supraspinatus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.supraclaviculares laterales (posteriores)* – C3,4, ramuri ale *plexus cervicalis*, *n.cutaneus brachii lateralis superior* (C5, 6), ramură a *n.axillaris* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.axillaris* (C5,6) • *a. et v.circumflexae humeri posteriores*, *a. et v.suprascapulares*, *a.thoracoacromialis*, *v.scapularis dorsalis*, *vv.brachiales*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,8–1,5 cun); se punctează orientând vârful acului de-a lungul humerusului; se punctează până la punctul TR14 Jianliao (indicat în algii în regiunea articulației umărului); se punctează până la punctul C1 Jiquan în poziție de flexie a cotului și poziție orizontală a mâinii (indicat în afectarea articulației scapulo-humerale și în omalgie). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jos, până la mijlocul brațului (pe partea externă).

GI16 Jugu

- punct de încrucișare a meridianelor GI, Yang Qiao Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Qiao Mai.

Indicații

- convulsii la copii; herpes Zoster; trismus;
- punct antialgic: centura scapulară; orbitele oculare (glaucom, algii posttraumatice); dinți;
- punct sindromal: perversiunea fluxului Qi a Plămânilor (astm, bronșită); stagnarea Qi și Xue în cutia toracică.

Localizarea

regio cervicalis lateralis, în foseta formată de spina omoplatului și extremitatea acromială a claviculei, când brațul e lipit de corp.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.platysma • lamina superficialis fasciae cervicalis • lig.acromioclaviculare • m.supraspinatus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.supraclaviculares laterales (posteriores)* – C3,4, ramurări de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n.facialis*, *n.accessorius*, *nn.cervicales* (C2,3,4), *n. suprascapularis* (C4,5,6) • *a. et v.suprascapulares*, *v.scapularis dorsalis*.



Fig.21

Tehnica

se înțeapă vertical la 0,5–0,8 cm (punctarea profundă poate provoca dispnee); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat puțin spre interior și spre linia mediană posterioară; se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în jos și lateral. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în jos, până la mijlocul brațului (pe partea internă).

GI17 Tianding

- punct "fereastra cerului".

Indicații

- amigdalită, laringită; adenopatie cervicală cronică;
- punct antialgic: regiunea gâtului; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – mușchii spatelui.

Localizarea

regio sternocleidomastoidea, pe marginea posterioară a mușchiului sternocleidomastoidian, la nivelul marginii inferioare a cartilajului tiroid, la mijlocul distanței între GI18 Futu și E12 Quepen.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.platysma • lamina superficialis fasciae cervicalis • m.sternocleidomastoideus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.transversus colli* (C2,3), ramură de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n.facialis*, *n.accessorius*, *nn.cervicales* (C2,3) • *a. et v.transversae colli*, *a.carotis externa*, *v.jugularis externa*.

Tehnica

se înțeapă vertical la 0,5–0,8 cm (pacientul va fi în poziția culcat cu capul întors pe o parte). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în sus, spre regiunea cervicală și în jos, spre cutia toracică.

GI18 Futu

- punct de reunire centrală a meridianelor distincte P/GI;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular GI.

Indicații

- anghină cronică (GI18 + GI4), edem al gâtului, hipersalivație, traheită, laringită, afonie (GI18 + VC23 + F3); acnee localizate în regiunea gâtului (GI18 + GI11 + VG12); senzație de singurătate (GI18 + V52 + V42);
- punct antialgic: globii oculari; esofag; torticolis; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – coapsă, articulația șoldului, adductorii;
- punct sindromal: Flegmă (afectarea gâtului).




Fig.22

Localizarea

regio sternocleidomastoidea, la 3 cun lateral de cartilajul tiroid, în centrul mușchiului sternocleidomastoidian.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.platysma • lamina superficialis fasciae cervicalis • m.sternocleidomastoideus.

Inervația • Vascularizația

pielea – n.auricularis magnus (C3), ramură de la plexus cervicalis; mușchii – n.facialis, n.accessorius, nn.cervicales (C1,2,3) • a. cervicalis ascendens, a.carotis communis, v.jugularis interna.

Tehnica

se înțeapă vertical la 0,5–0,8 cun (punctarea profundă este contraindicată din cauza pericolului de a leza pachetul vasculonervos cervical; vor fi folosite ace subțiri; stimularea forte prin rotire este contraindicată); se înțeapă sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului în jos, spre fosa supraclaviculară. Moxibustie 5–10 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

în sus, spre regiunea temporală sau în jos, spre cutia toracică.

GI19 Heliao

Indicații

- afecțiunile nasului (rinită, polipi, anosmie); paralizie facială;
- punct antialgic: spasm facial (mușchii maseteri);
- punct sindromal: Căldură în Plămâni (epistaxis).

Localizarea

regio oralis, la 0,5 cun lateral de VG26 Renzhong, în foseta canină a maxilarului, la 1/3 distanță între marginea inferioară a aripii nasului și buza superioară, în punctul de intersecție cu linia ce coboară vertical de la comisura palpebrală medială.



Fig.23

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.orbicularis oris.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.labiales superiores n.infraorbitalis*, ramură a *n.maxillaris* de la *n.trigeminus*; mușchii – *n.facialis • a.labialis superior (a. facialis)*, *vv.labiales superiores*.

Tehnica

se înțeapă vertical la 0,3–0,5 cun (se va puncta cu precauție pentru a evita nervul trigemen); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre nas. Moxibustie contraindicată.

Senzația

în interiorul buzei (senzația de durere cu lăcrimare).

GI20 Yingxiang

- punct de ieșire din meridianul GI;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular GI;
- punct de încrucișare a meridianelor GI, E.

Indicații

- rinită, sinusită, anosmie, epistaxis; edem sau prurit al feței, paralizie facială; ascaridoză biliară (GI20 + E2);
- punct Biao din perechea Biao-Ben: GI20–GI11;
- punct sindromal: Vânt Extern, Vânt-Frig, Vânt-Căldură cu afectarea feței, sinusurilor și nasului.

Localizarea

regio nasalis, în șanțul nazo-labial, la nivelul mijlocului marginei laterale a aripii nasului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.levator labii superioris • m.levator labii superioris alaeque nasi.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.nasales posteriores n.infraorbitalis*, ramură a *n.maxillaris* de la *n.trigeminus*; mușchii – *n.facialis • a. et v.faciales*.

Tehnica

se punctează vertical (0,1–0,2 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre punctul E2 Sibai (paralizie facială; ascaridoză biliară); se punctează sub un unghi ascuțit,

vârful acului va fi orientat spre punctul IG18 Quanliao; se punctează sub un unghi ascuțit, acul va fi orientat spre rădăcina nasului. Moxibustie contraindicată.

Senzația

spre nas sau gingii.

I.3. Meridianul Stomac (E)

Meridianul Stomac este de natură Yang, centrifug, pereche, conține 45 puncte (fig.24-40).

Relațiile energetice:

1. În cadrul marii circulații energetice este precedat de meridianul Intestin Gros și urmat de meridianul Splină-Pancreas (GI-E-RP).
2. În cuplu cu meridianul Splină-Pancreas realizează loja energetică Pământ (E-RP). În cadrul ciclului celor 5 elemente este stimulat de IG și inhibat de VB.
3. În cuplu cu meridianul Intestin Gros formează axul energetic Yang Ming (E-GI).
4. După regula "miezul zilei/miezul nopții" este cuplat cu meridianul Pericard (E-MC).
5. După regula "soț/soție" este cuplat cu meridianul Veziculă Biliară (E-VB).

Funcțiile energetice:

1. Funcția principală este legată de asimilarea Energiei din alimente în procesul digestiei.
2. Qi a Stomacului descendează împreună cu hrana prelucrată în Intestinul Subțire. Substanțele nutritive sunt transmise din Stomac în Splină pentru prelucrarea ulterioară (Stomacul asigură primirea și digestia alimentelor, iar Splina – asimilarea și repartizarea lor).
3. Stomacul joacă un rol important în controlul apetitului.
4. Stomacul are un aport important în dirijarea activității psihice. Împreună cu Splina formează loja energetică Pământ, care emană Energia numită Yi (corespunde memoriei, gândirii, reflecției).

Acțiunea sindromal-energetică:

- armonizarea circulației Qi a Stomacului – E36 + E21 + MC6;
- dispersia Căldurii în Stomac și Intestine – E44 + E39 + E25 + GI11;
- dispersia Focului în Stomac – E44 + E21 + GI4 + GI11;
- transformarea Flegmei și reducerea Umidității (în sindromul de Insuficiență este efectiv punctul E36 Zusanli, pe când în cel de Exces – E40 Fenglong);
- fortificarea Jing (impotență și sterilitate – E36 + E30 + VC4);
- încălzirea Frigului în Stomac – E36 + E21 + VC12 + RP4;
- fortificarea Qi – E36 + GI4;




Fig.24. Punctele meridianului Stomac (E).

- fortificarea Xue – E36 + V20 + V17;
- dinamizarea Qi și Xue în sindroamele de stagnare (membrele inferioare – E41 + E30 + RP4; Stomac – E36 + E21 + RP4 + MC6; Intestine – E39 + E25 + VC6 + TR6; uter – E29 + RP6 + VC3);
- ascendența Qi (prolapsul organelor – E36 + GI4 + VG20);
- armonizarea proceselor psihice (punctele E21 Lianqian și E25 Tianshu sunt incluse în formulele terapeutice la bolnavii cu stres emoțional și tulburări gastrointestinale; în tulburările psihice apărute în urma insuficienței energetice este efectiv punctul E36 Zusanli în asocieră cu punctele Shu psiho-dorsale; în tulburările psihice legate de stagnarea Qi și acumularea Flegmei este indicat punctul E40 Fenglong; în cazul de Foc al Stomacului în formulele terapeutice este inclus punctul E44 Neiting).

Afectarea organului și traiectului intern al meridianului:

durere în regiunea stomacului, plenitudine abdominală, hipersecreție și hiperaciditate gastrică, senzație de foame îndată după masă (digestii rapide), anorexie, borborigme, balonare, vomă, diaree, dispepsie, gastroenterită, ulcer gastric.

Afectarea traiectului extern al meridianului:

durere, tulburări de sensibilitate, tumefiere, tulburări distrofice și alte semne patologice de-a lungul traiectului meridianului; cefalee; pareză facială; oftalmalgie; odontalgie; epistaxis; buze și mucoasă bucală uscată și ulcerate, stomatită, dureri la deglutiție, tumefiere a gâtului, sinusite; nevralgie intercostală; mastită; artrite (articulațiile membrelor inferioare); picioare reci; edeme.

Afectarea conexiunilor energetice ale meridianului:

epilepsie, stări depresive sau maniacale, logoree, hipertermie cu agitație, somn neliniștit, coșmaruri nocturne, irascibilitate, preferință pentru solitudine; tulburări respiratorii (dispnee, opresiune toracică); afectarea organelor genitale externe, tulburări ginecologice; hipertensiune arterială.

E1 Chengqi

- punct de intrare în meridianul E;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular E;
- punct de încrucișare a meridianelor E, Yang Qiao Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Qiao Mai.

Indicații

- atrofie optică, conjunctivită, glaucom; insomnie (E1 + VB20 + C7); isterie cu pierderea vederii;
- punct antialgic: ochi;
- punct sindromal: Vânt (Extern sau Intern) cu afectarea ochilor; Vânt-Căldură, Vânt-Frig (lacrimație, edem al ochilor etc.).

Localizarea

regio orbitalis, pe verticala pupilei, între globul ocular și marginea inferioară a fosei orbitale.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • pars orbitalis m.orbicularis oculi • corpus adiposum orbitae.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.palpebrales inferiores n.infraorbitalis*, ramură a *n.maxillaris* de la *n.trigeminus*; mușchii – *n.facialis • a.infraorbitalis, a.ophtalmica, v.ophtalmica inferior.*

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului în jos. Reper pentru orientare va fi marginea inferioară a fosei orbitale. Profunzimea punctării – 2 mm, durata de acțiune este scurtă (30 sec); se înțeapă subcutanat, vârful acului va fi orientat spre comisura palpebrală laterală; se înțeapă subcutanat, vârful acului va fi orientat spre comisura palpebrală medială; se înțeapă de-a lungul marginii interne a fosei orbitale spre nervul optic (1–1,5 cun). Această tehnică necesită o pregătire specială a medicului și se aplică în patologia nervului optic. Înainte de a înțeapa, prin apăsare cu degetul, globul ocular va fi deplasat puțin în sus. Vor fi folosite ace subțiri. Manevre de intensificare a stimulării nu se vor aplica. Acele vor fi scoase cu precauție, fără a le roti. În operele antice punctarea și moxibustia acestui punct sunt interzise.

Senzația

în jurul marginii inferioare a orbitei.

E2 Sibai

- punct de reunire a meridianelor principale E, VB, V.

Indicații

- prurit conjunctival; sinusită; ascaridoză biliară;
- punct antialgic: nervul trigemen (nevralgii ale ramurilor I și II); ochi (prurit conjunctival, dureri în globii oculari);
- punct sindromal: Vânt Extern și Intern cu afectarea ochilor, nasului și nervului facial.




Fig.25

Localizarea

regio orbitalis, la nivelul găurii infraorbitare, la 0,7 cun sub E1 Chengqi.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.orbicularis oculi • m.levator labii superioris • foramen infraorbitale.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.infraorbitalis*, ramură a *n.maxillaris* de la *n.trigeminus*; mușchii – *n.facialis • a. et v.angularis (a. et v.facialis).*

Tehnica

se punctează vertical (0,3–0,5 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, orientând acul spre E6 Jiache. Se punctează cu precauție, pentru a evita lezarea nervului trigemen. Conform anumitor date, punctarea profundă schimbă culoarea ochilor în albastru-gălbui. Moxibustie contraindicată.

Senzația

în jurul marginii inferioare a orbitei.

E3 Juliao

- punct de încrucișare a meridianelor E, Yang Qiao Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Qiao Mai.

Indicații

- miopie, nistagm; sinusită;
- punct antialgic: nervul trigemen (ramura II); globii oculari; dinți (nevralgii);
- punct sindromal: Vânt Extern și Intern (nevralgie de trigemen, paralizie facială, tic facial).

Localizarea

regio oralis, pe verticala pupilei, la nivelul marginii inferioare a aripii nasului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.levator labii superioris • m.levator anguli oris • mm.zigomatici minor et major.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.labiales superiores n.infraorbitalis*, ramură a *n.maxillaris* de la *n.trigeminus*; mușchii – *n.facialis • a. et v.facialis*.

Tehnica

se înțeapă vertical ori sub un unghi ascuțit (0,3–0,5 cun). Moxibustie 5 minute.

Senzația

spre obraz sau buze.

E4 Dicang

- punct de încrucișare a meridianelor E, GI, Yang Qiao Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Qiao Mai.

Indicații

- hipersalivație; paralizie facială, spasme sau tic facial;
- punct antialgic: regiunea maxilarului superior (nevralgii); urechi (algii ce iradiază în jos); odontalgie;
- punct sindromal: Vânt Extern, Vânt-Frig, Vânt-Căldură cu afectarea feței, gurii și a buzelor.

Localizarea

regio buccalis, la intersecția orizontalei unghiului bucal cu vertica-

la pupilei.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.orbicularis oris • m.zigomaticus major • m.risorius • m.depressor anguli oris • m.buccinator.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.labiales superiores n.infraorbitalis*, ramuri ale *n.maxillaris* de la *n.trigeminus*; mușchii – *n.facialis*, *n.buccalis* *n.mandibularis* *n.trigemini* • *a. et v.facialis*, *a. et v.buccalis*.

Tehnica

se înțepă vertical (0,2 cun); în cazul paraliziei faciale se va aplica tehnica înțepării sub unghi ascuțit: punctare subcutanată oblică, spre punctul E6 Jiache, GI20 Yingxiang, E7 Xiaguan; punctare spre punctul VG26 Renzhong sau VC24 Chengjiang. Moxibustie 5 minute.

Senzația

o reacție ușoară în jurul colțurilor gurii.

E5 Daying

- punct de inserție al meridianelor tendino-musculare GI și E.

Indicații

- parotidită; spasme faciale;
- punct antialgic: suprafața anterioară a gâtului (superior de nivelul celei de-a VII vertebre cervicale); nervul trigemen, dinții mandibulei;
- punct sindromal: Vânt Extern (paralizie facială, edeme în regiunea obrazului).




Fig.26

Localizarea

regio buccalis, înaintea unghiului mandibulei, pe marginea anterioară a maseterului, aproximativ la 1/3 distanță între unghiul mandibulei și punctul VC24 Chengjiang. În poziția șezând, gura fiind închisă, punctul se află în șanțul format de marginea mandibulei și marginea anterioară a maseterului, unde poate fi palpată pulsarea arterei.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.platysma • m.maseter.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.auricularis magnus (C3)*, ramură de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n.facialis* • *a. et v.facialis*.

Tehnica

se înțepă sub un unghi ascuțit (0,5–1 cun), orientând vârful acului spre punctul E6 Jiache (se va manipula cu precauție pentru a evita lezarea arterei). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în sus, spre maxilar sau în jos, spre bărbie.

E6 Jiache

Indicații

- trismus (E6 + VG26 + GI4); hemiplegie; parotidită (E6 + TR17 + GI11); acnee în regiunea feței;
- punct antialgic: mușchii gâtului și mușchii maseteri (dureri, tic și contractură); nervul trigemen, dinții mandibulei (dureri la cald);
- punct sindromal: Vânt Extern (paralizie facială), Vânt-Căldură sau Vânt-Frig cu afectarea articulației temporomandibulare și a gingiilor.




Fig.27

Localizarea

regio parotideomasseterica, în fosea, la 0,5 cun deasupra și anterior de unghiul posterior al mandibulei, la 1/2 distanței între locul de inserție a lobului auricular și unghiul posterior al mandibulei; în centrul maseterului încordat, când maxilarul și mandibula sunt încleștate.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia masseterica • m.masseter.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.auricularis magnus (C3)*, ramură de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n.facialis, n.trigeminus • a.masseterica (a.maxilaris), a. et v.facialis.*

Tehnica

se punctează vertical (0,3–0,5 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre dințele bolnav (în odontalgii); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în sus, spre pavilionul auricular; se punctează subcutanat spre punctul E4 Dicang. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în sus, spre ureche și în jos, spre mandibulă și gură.

E7 Xiaguan

- punct "barieră";
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular E;
- punct de încrucișare a meridianelor E, VB.

Indicații

- trismus; vertij; otită, surditate; paralizie facială;
- punct antialgic: urechi; dinți (nevralgii);
- punct sindromal: Vânt-Frig, Vânt-Căldură cu afectarea feței, arti-

culațiilor temporomandibulare, dinților, urechilor.

Localizarea

regio parotideomasseterica, la marginea inferioară a arcadei zigomatice, imediat înaintea condilului mandibular.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia parotidea • glandula parotidea • pars profunda m.masseteris • m.pterygoideus lateralis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.auriculotemporalis*, ramură a *n.mandibularis* de la *n.trigeminus*; mușchii – *n.facialis*, *n.trigeminus • a.transversa faciei*, *a.temporalis superficialis*, *vv.parotidae*, *v.transversa faciei*, *v.retro-mandibularis*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–1 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului spre dintele bolnav; se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat puțin lateral spre pavilionul auricular; se înțeapă sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului spre unghiul mandibulei. Moxibustie 3 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

În sus, spre regiunea temporală și în jos, spre maxilar.

E8 Touwei

- punct de încrucișare a meridianelor E, VB, Yang Wei Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Wei Mai.

Indicații

- conjunctivită, ambliopie; retard mental, astenie (E8 + VG20 + VC4);
- punct antialgic: nervul trigemen (ramura I); globii oculari;
- punct sindromal: cefalee (Umiditate, Flegmă, Vânt, Căldură, Focul Stomacului, hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului, Insuficiența Qi și Xue).

Localizarea

regio temporalis, în afara și deasupra extremității externe a sprâncenei. În poziția șezând mișcările de masticare permit determinarea prin palpare a marginii superioare a maseterului. La nivelul acesta, în fosetă se află punctul.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.auricularis superior • fascia temporalis • m.temporalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.temporales superficiales n.auriculotemporalis*, ramură a *n.mandibularis* de la *n.trigeminus*; mușchii – *n.facialis*, *n.trigeminus • r.frontalis a.temporalis superficialis*, *a. et vv.temporales superficiales*.

Tehnica

se punctează aproape orizontal (0,5–1 cun), vârful acului va fi orientat subcutanat, în sus sau în jos; se înțeapă sub unghi ascuțit, spre punctul V7 Tongtian (indicat în hemiplegie și cefalee). Moxibustie 5–10 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

locală, în jos, spre regiunea temporală sau în sus.

E9 Renying

- punct de reunire centrală a meridianelor distincte RP/E;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular E;
- punct "fereastra cerului";
- punct "marea Energiei" (împreună cu VC17 Shanzhong și V10 Tianzhu).




Fig.28

Indicații

- afectarea coardelor vocale; punct important în reglarea tensiunii arteriale sistolice și diastolice (hipertensiune – E9 + GI11 + E36; hipotensiune – E9 + VG20 + VG26); hipertiroidism;
- punct antialgic: gât; regiunea lombară;
- punct sindromal: pervertirea fluxului Qi a Stomacului (grețuri, sughiț, vomă) și Plămânilor (astm bronșic, tuse).

Localizarea

regio cervicalis anterior, unghiul superoextern al cartilajului tiroid, pe marginea anterioară a sternocleidomastoidianului, deasupra bifurcației arterei carotide comune în artera carotidă internă și artera carotidă externă.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.platysma • lamina superficialis fasciae cervicalis • m.sternocleidomastoideus • m.omohyoideus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.superiores n.transversus colli (C2,3)*, ramuri de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n. facialis • a.carotis interna et externa, sinus caroticus, glomus caroticum, a. et v.thyroideae, a.thyroideae superior, v.jugularis interna.*

Tehnica

se punctează vertical (0,3–0,5 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat intern, spre marginea superioară a cartilajului tiroid. Punctarea profundă este contraindicată, pentru a evita lezarea arterei. Înainte de punctare artera va fi deplasată lateral. Acupunctura va fi efectuată cu un ac foarte subțire, fără rotirea lui. Punctarea acestui punct poate provoca

amețeală și scăderea tensiunii arteriale. În operele antice moxibustia acestui punct este interzisă.

Senzația

în sus, spre maxilar sau în jos, de-a lungul gâtului.

E10 Shuitu

Indicații

- dispnee, tuse; hiperhidroză cu miros fetid, prurit cutanat, urticarie (punctul din dreapta);
- punct antialgic: gât; stomac (dureri spasmodice); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – umăr, suprafața externă a antebrațului, laba mâinii;

Localizarea

regio cervicalis anterior, pe marginea anterioară a sternocleidomastoidianului, la nivelul unghiului infero-extern al cartilajului tiroid, la mijlocul distanței între E9 Renying și E11 Qishe.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.platysma • lamina superficialis fasciae cervicalis • m.sternocleidomastoideus • lamina pretrachealis fasciae cervicalis • m.omohyoideus • m.sternothyroideus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.inferiores n.transversus colli (C2,3)*, ramuri de la *plexus cervicalis*; mușchii – *ansa cervicalis (C1,2,3) • a.carotis communis, v.jugularis interna.*

Tehnica

se înțeapă oblic, puțin intern (0,3–0,5 cun). Acupunctura va fi efectuată cu cel mai subțire ac, fără aplicarea manipulațiilor de intensificare a stimulării. Se va evita punctarea profundă. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în sus, spre ureche și în interiorul gâtului.

E11 Qishe

Indicații

- spasme ale diafragmei; acnee; furunculoză; traheită, dispnee;
- punct antialgic: gât.

Localizarea

regio sternocleidomastoidea, pe marginea superioară a claviculei, între cele două capete de inserție a sternocleidomastoidianului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.platysma • m.sternocleidomastoideus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.supraclaviculares mediales (C3,4)*, ramuri de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n.facialis, n.phrenicus (C3,4,5), plexus cervi-*

calis (C4) • a.carotis communis, v.subclavia.

Tehnica

se punctează sub un unghi ascuțit (0,3–0,8 cun), vârful acului va fi orientat spre interior (se va evita o punctare profundă).
Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în sus, spre regiunea temporală și în interiorul gâtului.

E12 Quepen

- punct de inserție al meridianelor tendino-musculare E, VB și P.

Indicații

- tulburări alimentare; tahicardie paroxistică, hipertensiune arterială; tremor al mâinilor;
- punct antialgic: regiunea centurii scapulare și omoplatului; nervii intercostali;
- punct sindromal: Căldură în Stomac (insomnie, anxietate); perversiunea fluxului Qi (dispnee, astm).




Fig.29

Localizarea

regio cervicalis lateralis, pe marginea superioară a claviculei, în mijlocul fosei supraclaviculare, pe linia mamelonară, 4 cun lateral de linia mediană anterioară.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.platysma • m.trapezius • lamina superficialis fasciae cervicalis • venter inferior m.omohyoideus.

Inervația • Vascularizația

pielea – nn.supraclaviculares intermedi (C3,4), ramuri de la *plexus cervicalis*; mușchii – n. *facialis • a.suprascapularis, a. et v. subclavia, a.transversa colli.*

Tehnica

se înțeapă vertical la 0,3–0,5 cun (punctarea profundă este contraindicată din cauza pericolului de lezare a pleurei și a apexului plămânului. Înțeparea acestui punct poate provoca vertij).
Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jos, spre piept.

E13 Qihu

Indicații

- bronșită cronică cu expectorații matinale; transpirații fetide, acnee; punct empiric în sterilitate la femei; anorexie; sughiț;
- punct antialgic: nervii intercostali.

Localizarea

regio pectoralis, sub mijlocul claviculei, 4 cun lateral de linia mediană anterioară.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.platysma • fascia pectoralis • pars clavicularis m.pectoralis major • m. subclavius.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn. supraclaviculares intermedi*i (C3,4), ramuri de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n.facialis*, *nn. pectorales medialis et lateralis* (C5-8, Th1), *n.subclavius* (C5) • *a. et v.intercostales posteriores prima*, *rr.intercostales anteriores (a.thoracica interna)*, *aa. et vv.intercostales supremae*, *a. et v.thoracoacromialis (r. pectoralis)*, *v.subclavia*.

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,2–0,5 cun (punctarea profundă este contraindicată, pentru a evita lezarea pleurei și a plămânului); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în jos, spre membrele inferioare. Moxibustie 5 minute.

Senzația

în jos și spre umăr.

E14 Kufang

Indicații

- afecțiunile pielii în regiunea feței (punctul din stânga); senzație de plenitudine în cutia toracică (E14 + MC6); surmenaj intelectual, hipersensibilitate emoțională, absența bucuriei, tristețe, melancolie, obsesii, insomnie cu treziri repetate în cursul nopții, șoc emoțional (punctul din dreapta);
- punct antialgic: nervii intercostali; dureri posttraumatice și psihogene, stare postoperatorie;

Localizarea

regio pectoralis, în primul spațiu intercostal, pe linia medio-claviculară, la 4 cun lateral de linia mediană anterioară.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.platysma • fascia pectoralis • pars clavicularis m.pectoralis major • mm.intercostales externus et internus • fascia endothoracica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.supraclaviculares intermedi*i (C3,4), ramuri de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n.facialis*, *nn.pectorales mediales et laterales* (C5-8, Th1), *n.intercostalis I* • *rr.intercostales anteriores (a.thoracica interna)*, *aa. et vv.intercostales supremae*, *a.intercostalis posterior prima*.

Tehnica

se punctează vertical – 0,5–0,8 cun (se evită introducerea profun-

dă a acului); se punctează sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului în jos, spre membrele inferioare; se punctează oblic, vârful acului va fi orientat lateral și puțin în sus de-a lungul spațiului intercostal I (acul se introduce mai aproape de marginea superioară a coastei plasate mai inferior). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

În jos, spre umăr.

E15 Wuyi

Indicații

- esofagită; melancolie, nevroză respiratorie; orgasm dificil;
- punct antialgic: glandele mamare; nervii intercostali; piele (hiperestezie); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – mușchiul mare pectoral.

Localizarea

regio pectoralis, în spațiul intercostal II, la 4 cun lateral de linia mediană, pe linia mamelonară.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • pars sternocostalis m. pectoralis major • fascia clavipectoralis • m.pectoralis minor • fascia thoracica • mm.intercostales externus et internus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.suprclaviculares intermedii (C3,4), r.cutaneus anterior (pectoralis) n.intercostalis II*; mușchii – *nn.pectorales medialis et lateralis (C5-8, Th1), n.intercostalis II • rr.intercostales anteriores (a.thoracica interna), aa. et vv.intercostales supremae.*

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,5-0,8 cun (punctarea profundă este contraindicată); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în jos, spre membrele inferioare; se înțeapă oblic, vârful acului va fi orientat extern și puțin în sus, de-a lungul spațiului intercostal, mai aproape de marginea superioară a coastei III. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

În jos, spre piept.

E16 Yingchuang

Indicații

- pirozis; hipertrofia prostatei; tuse spasmodică nocturnă cu senzație de plenitudine în cutia toracică;
- punct antialgic: nervii intercostali.

Localizarea

regio pectoralis, la 4 cun lateral de linia mediană, în spațiul intercostal III.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • m.pectoralis major • fascia clavipectoralis • m.pectoralis minor • fascia thoracica • mm. intercostales externus et internus • fascia endothoracica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.suprclaviculares intermedi* (C3,4), ramuri de la *plexus cervicalis*, *r.cutaneus anterior n. intercostalis III*; mușchii – *nn. pectorales mediales et laterales* (C5,8, Th1), *n.intercostalis III* • *rr.intercostales anteriores (a.thoracica interna)*, *a.thoracica lateralis (a.axillaris)*, *r.cutaneus lateralis (a.intercostalis posterior III)*.

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,5–0,8 cun (punctarea profundă este interzisă); se înțeapă sub un unghi ascuțit, acul va fi orientat de-a lungul spațiului intercostal, mai aproape de marginea superioară a coastei IV. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în interiorul pieptului și glandele mamare.

E17 Ruzhong

Indicații

punct important în diminuarea libidoului și pentru stimularea lactației (se va efectua o presăție ușoară a punctului).

Localizarea

regio mammaria, în mijlocul mamelonului.

Proiecția

papilla mammae • areola mammae • lobuli glandulae mammariae • fascia pectoralis • m.pectoralis major.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.intercostales* (Th2-7); mușchii – *nn.pectorales mediales et lateralis* (C5-8, Th1) • *a.thoracica lateralis (a.axillaris)*, *v.thoracica lateralis*, *rr.intercostales anteriores (a.thoracica interna)*, *r.cutaneus lateralis (a.intercostalis posterior IV)*.

Tehnica

se aplică numai ca punct de reper în localizarea altor puncte. Înțeparea este contraindicată. În stază de lapte se admite introducerea în mamelon a unui ac cu vârful bont, la 0,5 cun în profunzime. Presăția punctului se va aplica în mastită. În operele antice moxibustia acestui punct este interzisă.

E18 Rugen

Indicații

- dispnee, tuse, bronșită, astm; hipogalactie, mastită (E18 + E36 + VB42);
- punct antialgic: membrele superioare (nevralgii și contracturi); nervii intercostali; glandele mamare.

Localizarea

regio mammaria, în spațiul intercostal V, pe linia mamelonară, la 4 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • pars abdominalis m. pectoralis major • fascia thoracica • mm.intercostales externus et internus • fascia endothoracica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (pectoralis) n.intercostalis V*; mușchii – *nn.pectorales medialis et lateralis (C5-8, Th1), n.intercostalis V • a.thoracica lateralis (a.axillaris), v.thoracica lateralis, rr.intercostales anteriores (a.thoracica interna), r.cutaneus lateralis (a.intercostalis posterior V).*

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,5-0,8 cun (punctarea profundă este contraindicată din cauza pericolului de lezare a pleurei, plămânului și a inimii); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în sus, spre centrul mamelonului. Moxibustie 15-20 minute.

Senzația

În interiorul pieptului și glandele mamare.

E19 Burong

Indicații

- ascaridoză biliară (E19 + VB34 + F14); tuse asociată cu dureri în cutia toracică; punct important în afectarea stomacului (distensie abdominală, vomă, inapetență);
- punct antialgic: nervii intercostali; inimă; abdomen.

Localizarea

regio inframammaria, la 6 cun deasupra ombilicului, la 2 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdominis • m.rectus abdominis • lamina posterior vaginae m.recti abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (pectoralis) n.intercostalis VII*; mușchii – *nn.intercostales (Th5-12), n.lumbalis (L1) • a. et vv.epigastricae superiores, a.musculophrenica, rr.intercostales anteriores (a.thoracica interna), r.cutaneus lateralis (a.intercostalis posterior).*

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,5-0,8 cun (punctarea profundă este contraindicată din cauza pericolului lezării organelor cavității abdominale și al unei hemoragii interne); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în jos, spre membrele inferioare. Moxibustie 5-20 minute.




Fig.30




Fig.31

*Senzația
locală.*

E20 Chengman

Indicații

- hipersialoree; aritmie, tahicardie; dispnee;
- punct antialgic: epigastriu; nervii intercostali.

Localizarea

regio epigastrica, la 5 cun deasupra ombilicului, la 2 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdominis • m.rectus abdominis • lamina posterior vaginae m.recti abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis VII; mușchii – nn.intercostales (Th6-12), n.lumbalis (L1) • a. et vv.epigastricae superiores, a.musculophrenica, rr.intercostales anteriores (a.thoracica interna), r.cutaneus lateralis (a.intercostalis posterior).

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,5–0,8 cun (punctarea profundă este contraindicată); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în jos, spre membrele inferioare. Moxibustie 5–20 minute.

*Senzația
locală.*

E21 Liangmen

Indicații

- gastrita acută, anorexie, indigestie, ulcer gastric și duodenal,

- insuficiența pancreasului; insomnie pe parcursul întregii nopți;
- punct antialgic: stomac (algii cu aerofagie);
- punct sindromal: perversiunea fluxului Qi a Stomacului; Căldură sau Foc al Stomacului; stagnarea hranei în Stomac (E21 + E36 + MC6); dezarmonia Ficat-Stomac (E21 + F3 + MC6); stagnarea Frigului în Stomac (E21 + E36 + VC12, moxa).

Localizarea

regio epigastrica, la 4 cun deasupra ombilicului, la 2 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdominis • m.rectus abdominis • lamina posterior vaginae m.recti abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n. intercostalis VIII*; mușchii – *nn.intercostales (Th5-12), n.lumbalis (L1) • a. et vv.epigastricae superiores, r.cutaneus lateralis (a.intercostalis posterior), v. intercostalis VIII.*

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,5–1 cun (punctarea profundă este contraindicată); se înțeapă sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului în jos, spre membrele inferioare. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

locală.

E22 Guanmen

- punct "barieră".

Indicații

- oligurie și edeme; tulburări gastrice (refluxul bilei, inapetență);
- punct antialgic (abdomen).

Localizarea

regio epigastrica, la 3 cun deasupra ombilicului, la 2 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdominis • m.rectus abdominis • lamina posterior vaginae m.recti abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n. intercostalis VIII*; mușchii – *nn.intercostales (Th5-12), n.lumbalis (L1) • a. et vv.epigastricae superiores, r.cutaneus lateralis (a.intercostalis posterior), v.intercostalis VIII.*

Tehnica

se punctează vertical – 0,5–1 cun (punctarea profundă este

contraindicată); se punctează sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului în jos, spre membrele inferioare. Moxibustie 5–20 minute.

*Senzația
locală.*

E23 Taiyi

Indicații

- enurezis; gastrită acută; manie, melancolie, agitație, demență;
- punct antialgic: stomac (algii cu ptoză), intestin (colică);
- punct sindromal: Insuficiența Qi a Splinei.

Localizarea

regio umbilicalis, la 2 cun deasupra ombilicului, la 2 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdominis • m.rectus abdominis • lamina posterior vaginae m.recti abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n. intercostalis IX*; mușchii – *nn.intercostales (Th5-12), n.lumbalis (L1) • a. et vv.epigastricae superiores, r.cutaneus lateralis (a.intercostalis posterior VIII-IX), v.intercostalis VIII-IX.*

Tehnica

se punctează vertical – 0,5–1 cun (punctarea profundă este contraindicată; se va evita punctarea în ultimele luni de sarcină); se punctează sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului în jos, spre membrele inferioare. Moxibustie 5–20 minute.

*Senzația
locală.*

E24 Huaroumen

Indicații

- afecțiunile stomacului (grețuri, vomă), tulburări de peristaltism și defecație; afectarea glandelor salivare, glosită, afte bucale; edeme renale;
- punct antialgic: regiunea sublinguală, limbă; stomac și intestinul gros (afecțiuni cronice).

Localizarea

regio umbilicalis, la 1 cun deasupra ombilicului, la 2 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdominis • m.rectus abdominis • lamina posterior vaginae m.recti abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis IX*;
mușchii – *nn.intercostales (Th5-12), n.lumbalis (L1) • aa. et vv. epigastricae superiores et inferiores, r.cutaneus lateralis (a.intercostalis posterior IX), v.intercostalis IX.*

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,8-1,2 cun (punctarea profundă este contraindicată; se va evita stimularea punctului în ultimele luni de sarcină); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în jos, spre membrele inferioare. Moxibustie 5-20 minute.

Senzația

locală.

E25 Tianshu

- punct de alarmă al meridianului GI.

Indicații

- tulburări ale tonusului intestinal; insuficiența pancreasului (punctul din stânga); oligurie și edeme; sterilitate funcțională, leucoree excesivă (E25 + VC4 + RP8), dureri premenstruale (E25 + RP6 + V32); irascibilitate, anxietate, schizofrenie, manie, stres emoțional la bolnavii cu afectarea stomacului și intestinelor;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (cap – psihicul);
- punct antialgic: vezicula biliară (colecistită), algii în apendicită acută, afecțiuni cronice ale organelor din cavitatea abdominală; ciclul menstrual (deregări de ritm cu sindrom algic), uter (algii și hemoragii);
- punct sindromal: Căldură a Stomacului și Intestinelor (constipație, ulcer duodenal); Flegmă-Foc în Stomac; Căldură-Umiditate în Intestine (diaree, dizenterie: E25 + E37 + RP9); stagnarea Qi a Intestinelor (constipație, distensie abdominală, durere); Insuficiența Yang-Qi a Splinei.

Localizarea

regio umbilicalis, la nivelul ombilicului, la 2 cun lateral.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdominis • m.rectus abdominis • lamina posterior vaginae m.recti abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis X*;
mușchii – *nn.intercostales (Th5-12), n.lumbalis (L1) • aa. et vv. epigastricae superiores et inferiores, r.cutaneus lateralis (a.intercostalis posterior X), v.intercostalis X.*

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,8-1,2 cun (punctarea profundă este contraindicată; se va evita stimularea punctului în ultimele luni de

sarcină); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în jos, spre membrele inferioare; se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre punctul R16 Huangshu (indicat în diaree). Moxibustie 10-20 minute.

Senzația
locală.

E26 Wailing

Indicații

- algomenoree;
- punct antialgic: bazinul mic; intestin (algii spasmodice, algii cu scaune lichide cotidiene);
- punct sindromal: dispersează Frigul.

Localizarea

regio umbilicalis, la 1 cun sub ombilic, la 2 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdominis • m.rectus abdominis • lamina posterior vaginae m.recti abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis X*;
mușchii – *nn.intercostales (Th5-12), n.lumbalis (L1) • aa. et vv. epigastricae superiores et inferiores, r.cutaneus lateralis (a.intercostalis posterior X), v.intercostalis X.*

Tehnica

se punctează vertical – 0,8-1,2 cun (punctarea profundă este contraindicată din cauza pericolului de lezare a intestinului; se va evita stimularea punctului în ultimele luni de sarcină); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în jos, spre membrele inferioare. Moxibustie 10-20 minute.

Senzația

în jos (aproximativ la 2-3 cun).

E27 Daju

Indicații

- afecțiunile testiculelor, spermatooree; polidipsie; cistită; dizenterie; insomnie, emotivitate excesivă, anxietate, depresie;
- punct antialgic: intestin (algii cu scaune lichide cotidiene); hernie inghinală;
- punct sindromal: Exces al Stomacului; stagnarea Qi în abdomenul inferior.

Localizarea

regio umbilicalis, la 2 cun sub ombilic, la 2 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdominis • m.rectus abdominis • lamina posterior vaginae m.recti abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis XI; mușchii – nn.intercostales (Th5-12), n.lumbalis (L1) • a.epigastrica superficialis, a.epigastrica inferior, vv.epigastricae superiores et inferiores, r.cutaneus lateralis (a.intercostalis posterior XI), v.intercostalis XI.

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,8-1,2 cun (în cazul sarcinii punctarea este contraindicată; în ischiurie se va limita profunzimea inserției); se înțeapă sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului în jos, spre membrele inferioare. Moxibustie 10-20 minute.

Senzația

în jos, spre organele genitale.

E28 Shuidao

Indicații

- tulburări ale metabolismului hidro-salin; retenție urinară, cistită; prolaps rectal; atrofia nervului optic; acufene; depresie, astenie;
- punct antialgic: intestin (colică); organele urogenitale;
- punct sindromal: stagnarea Qi a Focarului Inferior (durere; edeme, senzații de distensie: E28 + VC6 + TR6); Insuficiența Qi a Focarului Inferior (edeme; astenie: E28 + VC4 + E36); Umiditate-Căldură în Focarul Inferior (dizurie: E28 + VC6 + RP9); Frig al Focarului Inferior (prolaps uterin; hernie: E28 + E36 + VG20); stagnarea Xue a uterului (dereglaarea ciclului menstrual: E28 + VC3 + RP6); Insuficiența Yang-Qi a Splinei și Rinichilor.

Localizarea

regio pubica, la 3 cun sub ombilic, la 2 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdominis • m.rectus abdominis • lamina posterior vaginae m.recti abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – r.cutaneus anterior n.subcostalis (Th12); mușchii – nn.intercostales (Th5-12), n.lumbalis (L1) • a.epigastrica superficialis, a. et v.epigastrica inferior, aa.subcostales.

Tehnica

se punctează vertical – 0,8-1,2 cun (se va evita stimularea punctului la gravide; în cazul ischiuriei se va limita profunzimea inserției); se punctează sub un unghi ascuțit, orientând vârful

acului în jos, spre membrele inferioare. Moxibustie 10-30 minute.

Senzația

în jos, spre organele genitale.

E29 Guilai

Indicații

- afecțiunile organelor genitale (impotență);
- punct antialgic: organele genitale externe; uter (ptoza, dureri cu hemoragii);
- punct sindromal: Frig al Focarului Inferior (prolaps uterin; hernie: E29 + E36 + VG20); stagnarea Xue a uterului (E29 + VC3 + RP6); Umiditate-Căldură a Focarului Inferior; Insuficiența Qi a Focarului Inferior.

Localizarea

regio pubica, la 4 cun sub ombilic, 2 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • aponeurosis m.obliquus externus abdominis • m.rectus abdominis • aponeurosis m.obliquus internus abdominis et m.transversus abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior n.iliohypogastrici (Th12, L1)*; mușchii – *nn.intercostales (Th5-12), n.lumbalis (L1) • a. et v.epigastrica superficialis, a. et v.epigastrica inferior.*

Tehnica

se punctează vertical – 0,8-1,2 cun (se va evita stimularea punctului la gravide; în cazul ischiuriei se va limita profunzimea inserției, înainte de ședință pacientul va urina). Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

în jos, spre testicule (la bărbați) sau spre vagin și uretră (la femei).

E30 Qichong

- punct de reunire periferică a meridianelor distincte RP/E;
- punct al meridianului extraordinar Chong Mai;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular E;
- punct de încrucișare a meridianelor E, Chong Mai.

Indicații

- punct specific pentru metabolism și procesele de asimilație (împreună cu punctul E36 Zusanli formează "marea nutriției"); afecțiunile intestinului și organelor bazinului mic; impotență, sterilitate; prolaps al uterului; hernie inghinală (E30 + F8 + F3);
- punct antialgic: abdomen (algii cu balonare); organele genitale externe, ovare, organele bazinului mic; ciclul menstrual (algomenoree); lombalgie, sciatică (acutizări nocturne);

- punct sindromal: stagnarea Qi și Xue a uterului.

Localizarea

regio pubica, la 5 cun sub ombilic, 2 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • aponeurosis m.obliquus externus abdominis • m. obliquus internus abdominis • m.transversus abdominis • funiculus spermaticus (lig.teres uteri).

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior n.iliohypogastrici (Th12, L1)*, ramuri ale *n.ilioinguinalis (L1)* de la *plexus lumbalis • a. et v.epigastrica superficialis, a. et v.epigastrica inferior, a.circumflexa ilium*.

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,5-1 cun (înainte de ședință pacientul va urina; punctul nu se va stimula la gravide; se va înțeapa cu precauție, luând în considerare localizarea apropiată a inelului inghinal); punctare cu sângerare (în hematemeză). Moxibustie 5-15 minute (în operele antice punctarea și moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

în jos, spre testicule (la bărbați) sau spre vagin și uretră (la femei).

E31 Biguan

- punct "barieră".

Indicații

- hemiplegie;
- punct antialgic: stomac, abdomenul inferior, anus; migrenă (forma oftalmoplegică); lombalgie, sciatică; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: șold (E31) – umăr (GI15);
- punct sindromal: punct important pentru dinamizarea circulației Qi și Xue în părțile superioare ale membrilor inferioare (atrofii musculare, spasme musculare, hernii, limfadenite inghinale).

Localizarea

regio femoralis anterior, la vârful triunghiului inghinal (scarp), pe linia ce unește spina iliacă antero-superioară cu unghiul supero-extern al rotulei, la nivelul marginii inferioare a simfizei pubiene, la marginea antero-inferioară a marelui trohanter al femurului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia lata • m.tensor fasciae latae • m.sartorius • m.rectus femoris.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus femoris lateralis (L2,3)* de la *plexus lumbalis*; mușchii – *n.femoralis (L2,3,4) • a.circumflexa ilium superficialis, a. et v.circumflexae femoris laterales (r.ascendens).*




Fig.32




Fig.33

Tehnica

se punctează vertical (1–1,5 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului în jos, spre membrele inferioare. Moxibustie 5–15 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

în sus, spre regiunea inghinală, în interior (spre capul femurului), în jos.

E32 Futu

- punct de inserție al meridianului tendino-muscular VB.

Indicații

- tulburări ale circulației sangvine sau edem al membrelor inferioare; afectarea organelor genitale feminine; schizofrenie, "nebulnia celor posedați de demoni";
- punct antialgic: suprafața laterală a coapsei, lombalgie; cefalee (cu senzație de greutate); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – facies, suprafața anterioară a membrelor superioare;
- punct sindromal: Vânt-Căldură și Căldură Xue cu afectarea pielii (urticarie); dispersează Frigul.

Localizarea

regio femoralis anterior, la 6 cun deasupra marginii superioare a rotulei, pe linia ce leagă marginea externă a rotulei cu spina iliacă antero-superioară.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia lata • m.rectus femoris • m.vastus intermedius.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.cutanei anteriores n.femoralis* (L2,3), ramuri ale *n.cutaneus femoris lateralis* (L2,3) de la *plexus lumbalis*; mușchii – *n.femoralis* (L2,3, 4) • *a. et v.circumflexae femoris lateralis (r.ascendens).*

Tehnica

se înțeapă vertical (1–2 cun). Moxibustie 5–15 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

în jos, spre genunchi.

E33 Yinshi

Indicații

- ascită; polidipsie, diabet; vaginism (cu uscăciune a mucoasei);
- punct antialgic: rinichi; abdomenul inferior, bazinul mic, uter (dureri spasmodice); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – braț, antebraț, mână;
- punct sindromal: dispersează Frigul și Vântul (afectarea membrelor inferioare).

Localizarea

regio femoralis anterior, pe aceeași linie ca și punctul E32 Futu, la 3 cun deasupra unghiului superior extern al rotulei.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia lata • m.rectus femoris • m.vastus lateralis • m.vastus intermedius.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.cutanei anteriores n.femoralis (L2,3)* și ramuri ale *n.cutaneus femoris lateralis (L2,3)* de la *plexus lumbalis*; mușchii – *n.femoralis (L2,3,4)* • *a. et v.circumflexae femoris lateralis (r. descendens)*.

Tehnica

se punctează vertical (0,8–1,5 cun). Moxibustie 5–15 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

în jos, spre genunchi.

E34 Liangqiu

- punct Xi al meridianului E.

Indicații

- tulburări ginecologice (E34 + RP4); emotivitate excesivă, fobii;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (abdomenul inferi-




Fig.34

or);

- punct antialgic: regiunea genunchiului (nevralgii); abdomen (dureri acute, colică biliară); lombalgie; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – glande mamare;
- punct sindromal: Exces al Stomacului (gastrită, ulcer, durere – E34 + RP4); perversitatea fluxului Qi a Stomacului (regurgitație, grețuri, sughiț, vomă); stagnarea Qi și Xue în regiunea membrelor inferioare; Umiditate, Vânt sau Frig cu afectarea articulațiilor genunchilor.

Localizarea

regio femoralis anterior, pe aceeași linie ca și punctul E32 Futu, la 2 cun deasupra unghiului superior extern al rotulei.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • tractus iliotibialis • m.rectus femoris • m.vastus lateralis • m.vastus intermedius.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.cutanei anteriores n.femoralis (L2,3), n.cutaneus femoris lateralis (L2,3)* de la *plexus lumbalis*; mușchii – *n.femoralis (L2,3,4) • a. et v.circumflexae femoris lateralis (r.descendens).*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–1 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat intern și spre partea posterioară a articulației; se înțeapă spre punctul E33 Yinshi (indicat în dureri epigastrice și algii în regiunea genunchiului). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în jos, spre patelă.

E35 Dubi

- punct de inserție al meridianului tendino-muscular E și VB.

Indicații

- afectarea genunchiului;
- punct sindromal: Umiditate, Vânt-Frig sau stagnarea Qi și Xue cu afectarea articulației genunchiului.




Fig.35

Localizarea

regio genus anterior, în foseta subrotuliană, lateral de ligamentul rotulian (genunchiul flectat).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lig.patellae.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.cutanei anteriores n.femoralis (L2,3)* de la *plexus lumbalis • a.recurrentis tibialis anterior, a.inferior lateralis genus, rete articulare genus, v.genus.*

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,8–1,2 cun), vârful acului va fi orientat intern de-a lungul marginii inferioare a rotulei, spre unghiul intero-superior al rotulei. Moxibustie 5–15 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

în sus, spre coapsă și în jos, spre gambă.

E36 Zusanli

- punct antic He (elementul Pământ);
- punct de "proiecție periferică" a Stomacului;
- punct sezonier al viscerului Fu Stomac (punct de tonifiere pentru perioada de toamnă și de dispersie pentru perioada de vară).




Fig.36

Indicații

- astenie și tulburarea proceselor metabolice (împreună cu punctul E30 Qichong formează "marea nutriției"); tonifierea punctului tonifică toate meridianele, sângele, vasele sangvine, nervii, mușchii, pielea; punct cu acțiune de reglare a funcțiilor intestinului (constipație, diaree, durere etc.); punct cu acțiune de reglare a lichidelor (edeme); punct important în reglarea tensiunii arteriale; punct cu acțiune de reglare asupra funcției glandelor mamare (hipogalactie, mastită); punct important în expulzarea calculilor (din rinichi – E36 + E28 + VB25; din vezicula biliară – E36 + VB24); afectivitate, comportament agitat, fobii, irascibilitate, insomnie, anorexie nervoasă, anxietate;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (stomac, inimă – ritm);
- punct antialgic: articulația șoldului, articulația genunchiului, gambă; inimă (stenocardie la hipertonic); stomac; vezicula biliară (dureri în colecistită cu icter); cefalee (migrenă – E36 + GI4); algii în apendicita acută; intestin; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: genunchi (E36) – cot (GI11);
- punct sindromal: Insuficiența Qi a organelor interne (Splină, Stomac, Plămâni, Inimă, Rinichi); afectarea Stomacului (Insuficiență, Exces, stagnarea Qi, pervertirea fluxului Qi etc.); ptoze viscerale (reglează circulația Qi, ascendează Qi); Insuficiența Xue (armonizează Qi și Xue); Umiditate; Flegmă; Frig, Vânt-Frig Extern; tulburări ale Qi nutritiv și defensiv.

Localizarea

regio cruralis anterior, la 3 cun sub E35 Dubi, un lat de deget lateral de crista tibiei, în mușchiul gambier anterior.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.tibialis anterior • m.extensor digitorum longus • membrana interossea cruris.

Inervația • Vascularizația

pielea – n.cutaneus surae lateralis (L5, S1,2), ramură a n.peroneus communis (plexus sacralis); mușchii – n.peroneus profundus (L4,5, S1) • a.recurrentis tibialis anterior, vv.tibiales anteriores.

Tehnica

se înțeapă vertical (1–1,5 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului spre articulația tibiotarsiană. Tehnica de sângerare (gastralgi, vomă; maladia hipertonică, cefalee; febră). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în sus, spre genunchi și în jos, spre articulația tibiotarsiană.

E37 Shangjuxu

- punct de "proiecție periferică" a Intestinului Gros;
- punct ce controlează transformarea Energiei Yang în Energie Yin (depozitarea Energiei sub formă de rezervă); împreună cu punctele V11 Dazhu și E39 Xiajuxu formează "marea meridianelor".

Indicații

- dizenterie (E37 + E25 + GI11), diaree cronică, constipație (E37 + TR6 + RP14); paralizia membrelor inferioare (E37 + VB30 + RP6);
- punct antialgic: centura scapulară, umăr; regiunea lombară; abdomen;
- punct sindromal: Umiditate-Căldură a Intestinului; Insuficiența Xue (anemie: E37 + E39 + V11).

Localizarea

regio cruralis anterior, la 6 cun sub E35 Dubi, la un lat de deget de la crista tibiei, în spațiul între tibie și fibulă.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.tibialis anterior • m.extensor digitorum longus • membrana interossea cruris.

Inervația • Vascularizația

pielea – n.cutaneus surae lateralis (L5, S1,2); mușchii – n.peroneus profundus (L5, S1) • a. et vv.tibiales anteriores.

Tehnica

se punctează vertical (1–1,5 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului în jos, spre articulația tibiotarsiană. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în jos, spre laba piciorului.

E38 Tiaokou

Indicații

- periartrită scapulo-humerală;
- punct antialgic: blocarea umărului (manipularea acului se efectuează pe partea afectată concomitent cu mișcările umărului afectat); articulația genunchiului, membrele inferioare (dureri și slăbiciuni); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – membrul superior, articulația scapulo-humerală.

Localizarea

regio cruralis anterior, la 8 cun mai jos de punctul E35 Dubi, în spațiul dintre tibia și fibulă. La mijlocul distanței între punctele E35 Dubi și E41 Jiexi, la un lat al indexului de la crista tibiei.




Fig.37

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.tibialis anterior • m.extensor digitorum longus • membrana interossea cruris.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus surae lateralis* (L5, S1,2), ramură a *n.peroneus communis* de la *plexus sacralis*; mușchii – *n.peroneus profundus* (L4,5, S1) • *a. et vv.tibiales anteriores*.

Tehnica

se punctează vertical (1–1,5 cun); se înțeapă spre punctul V57 Chengshan (algii în regiunea articulației scapulo-humeroale; vomă, diaree; atrofie a membrelor inferioare). Moxibustie 5–20 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

în jos, spre laba piciorului.

E39 Xiajuxu

- punct de "proiecție periferică" a Intestinului Subțire;
- punct cu control de transformare a Energiei Yin (depozitată) în Energie Yang (circulantă); împreună cu punctele E37 Shangjuxu și V11 Dazhu formează "marea meridianelor".

Indicații

- anorexie; punct cu efect dehidratant în edeme ale membrelor inferioare; paralizie și atrofie musculară a membrelor inferioare; depresie sau agitație, șoc psihic;
- punct antialgic: abdomenul inferior; membrele inferioare (miozită, dureri fantome); articulația genunchiului; nervii intercostali; cefa-

- lee; lombalgie; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – glande mamare.
- punct sindromal: Umiditate-Căldură în Intestine (diaree, dizenterie).

Localizarea

regio cruralis anterior, la 9 cun mai jos de punctul E35 Dubi, în spațiul dintre tibie și fibulă, la un lat al indexului de la crista tibiei.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.tibialis anterior • m.extensor digitorum longus • membrana interossea cruris.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus surae lateralis* (L5, S1,2); mușchii – *n.peroneus profundus* (L4,5, S1) • *a. et vv. tibiales anteriores.*




Fig.38

Tehnica

se punctează vertical (1–1,5 cun); se înțeapă spre punctul E36 Zusanli (slăbiciune musculară a membrelor inferioare). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

În jos, spre laba piciorului.

E40 Fenglong

- punct Lo al meridianului E.

Indicații

- laringită, afonie; hepatită; constipație; edem al membrelor inferioare (E40 + R7); astm bronșic cu acumulare abundentă de spută; salivă abundentă; hiperlipemie; alternanță de excitație cu inhibiție, râs și plâns, isterie, extravaganță, halucinații, insomnie cu distensie în abdomen (E40 + VB20 + C7); epilepsie;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (cap – psihicul; stomac; inimă – ritm);
- punct antialgic: facies (nevralgii); inimă (stenocardie, dureri lancinante); abdomen; cefalee acută;
- punct sindromal: Umiditate-Flegmă în Focarul Superior, Mediu și Inferior; Căldură sau Foc al Stomacului.

Localizarea

regio cruralis anterior, la un lat de deget lateral de punctul E38 Tiaokou.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.extensor digitorum longus • m.extensor hallucis longus.

Inervația • Vascularizația

pielea – n.cutaneus surae lateralis (L5, S1,2); mușchii – n.peroneus profundus (L5, S1), n.peroneus superficialis (L5, S1) • a. et vv.tibiales anteriores, a. peronea.

Tehnica

se înțeapă vertical (1-1,5 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în adâncime și în sus, obținând senzații de distensie iradiate în sus, până la baza coapsei (indicat în dureri abdominale, cefalee); se înțeapă spre punctul RP7 Lougu (indicat în astm bronșic cu spută abundentă). Tehnica de sângereare (astm bronșic, tonzilită, expectorații abundente; cefalee; hipertonie; dureri în regiunea umărului; afecțiunile stomacului, pancreatită). Moxibustie 5-20 minute.

Senzația

în jos, spre laba piciorului și degete sau în sus (uneori până la nivelul cutiei toracice).

E41 Jiexi

- punct antic Jing-prox. (elementul Foc);
- punct de tonifiere al meridianului E;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular E;
- punct sezonier al viscerului Fu Stomac (punct de tonifiere pentru al 5-lea sezon și de dispersie pentru perioada de primăvară).

Indicații

- precordialgii, palpații; balonări abdominale; vertij (E41 + VB8); depresie anxioasă, emotivitate cu plâns, anxietate;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (gât);
- punct antialgic: regiunea sprâncenelor și genelor, globii oculari (glaucom); dinți (dureri la fierbinte), limbă (durere cauzată de mușcarea limbii, glosalgie); punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: gleznă (E41) – pumn (GI5);
- punct sindromal: Căldură sau Foc al Stomacului (vomă, constipație).

Localizarea

regio cruralis anterior, în unghiul pliului de flexie al gâtului piciorului, chiar sub tibie, între tendoanele extensorului propriu al halucelui și ale extensorului comun al degetelor.




Fig.39

Proiecția

cutis • tela subcutanea • retinaculum musculorum extensorum inferius • tendo m.extensor hallucis longus • m.extensor digitorum longus.

Inervația • Vascularizația

pielea – n.cutaneus dorsalis medialis (L4,5, S1), ramură a n. peroneus superficialis de la plexus sacralis; mușchii – n.peroneus profundus (L5, S1) • a. et vv.tibiales anteriores.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5-0,8 cun). După apariția senzației de acupunctură, vârful acului va fi orientat inițial spre maleola externă, apoi spre maleola internă; se înțeapă spre punctul F4 Zhongfeng (indicat în atrofia a membrelor inferioare, membre reci; algii în organele genitale externe). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în jos, spre degete.

E42 Chongyang

- punct antic Yuan;
- punct sursă al meridianului E;
- punct de ieșire din meridianul E.

Indicații

- hemiplegie; carie dentară, gingivită; afectivitate, epilepsie;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (stomac);
- punct antialgic: laba piciorului (artralgii); dinți; stomac; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – mână;
- punct sindromal: Frig al articulațiilor (E42 + TR4).

Localizarea

dorsum pedis, la 1/4 distanței între punctele E41 Jiexi și E44 Neiting, pe artera pedioasă, unde se simt pulsațiile arteriale, la 1,5 cun mai jos de E41 Jiexi.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia dorsalis pedis • tendo m.extensor hallucis longus • tendo m.extensor digitorum longus • m.extensor hallucis brevis.

Inervația • Vascularizația

pielea – n.cutaneus dorsalis intermedius (L4,5, S1), ramură a n. peroneus superficialis de la plexus sacralis; mușchii – n.peroneus profundus (L4,5, S1) • a.arcuata (a.dorsalis pedis), arcus venosus dorsalis pedis.

Tehnica

se punctează vertical – 0,3–0,5 cun (vor fi folosite ace subțiri, evitând lezarea arterei pedioase); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre centrul labei piciorului. Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jos, spre degete.

E43 Xiangu

- punct antic Shu (elementul Lemn);
- punct sezonier al viscerului Fu Stomac (punct de tonifiere pentru perioada de vară și de dispersie pentru perioada de iarnă).

Indicații

- ascită; stări febrile cu transpirații nocturne excesive; edem al feței;
- punct antialgic: abdomen; degetele piciorului, talalgie;
- punct sindromal: Vânt și Căldură a articulațiilor.

Localizarea

dorsum pedis, în porțiunea distală, între cel de-al doilea și cel de-al treilea metatarsian, în foșeta care se simte sub deget.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia dorsalis pedis • tendines mm. extensoris digitorum longi et brevis • m. interossei dorsales II.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n. cutaneus dorsalis intermedius (L4,5, S1)*, ramură a *n. peroneus superficialis* de la *plexus sacralis*; mușchii – *n. plantaris lateralis (S1,2,3) • a. metatarsalis dorsalis, vv. metatarsae dorsales pedis*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,3–0,5 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului spre centrul labei piciorului. Moxibustie 2–7 minute.

Senzația

în jos, spre degetul II.

E44 Neiting

- punct antic Ying (elementul Apă);
- punct sezonier al viscerului Fu Stomac (punct de tonifiere pentru perioada de primăvară și de dispersie pentru perioada de toamnă).

Indicații

- inapetență, anorexie; afecțiuni cutanate (E44 + GI11 + VG10); diferite hemoragii (epistaxis – E44 + VG23; hemoragii intestinale și gastrice – E44 + RP1; hematurie – E44 + C5 + VC3); insomnie (E44 + C7), coșmaruri, extravaganță, anxietate, isterie, manie, depresie;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (facies, gură: E44 + GI4);
- punct antialgic: suprafața dorsală a labei piciorului; piele (dureri și prurit); dinți (dureri la fierbinte); intestin (colică), apendicită acută; cefalee (migrenă); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/

- miezul nopții) – membre superioare;
- punct sindromal: Vânt cu afectarea feței; Foc al Stomacului (afte bucale, stomatită, gingivită); perversiunea fluxului Qi a Stomacului (grețuri, vomă, sughiț).

Localizarea

dorsum pedis, la punctul de unire al degetelor II și III, înaintea articulației metatarsofalangiene, la granița pielii Yin-Yang.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia dorsalis pedis • tendo m.extensor digitorum brevis II-III et m.extensor digitorum longus II-III • m. interosseus dorsalis II.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.digitales dorsales pedis*, ramuri ale *n.cutaneus dorsalis intermedius* (L4,5, S1) de la *n.peroneus superficialis* (plexus sacralis); mușchii – *n.plantaris lateralis* (S1,2,3) • *aa. et vv.digitales dorsales*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,3-0,5 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului în sus. Tehnica de sângerare (gastralgi; odontalgie; febră; epistaxis; astm bronșic, tonzilită). Moxibustie 5-7 minute.

Senzația

în jos, spre degetul I și II.

E45 Lidui

- punct antic Jing-dist.(elementul Metal);
- punct de dispersie al meridianului E;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular E;
- punct sezonier al viscerului Fu Stomac (punct de tonifiere pentru perioada de iarnă și de dispersie pentru al 5-lea sezon).




Fig.40

Indicații

- inapetență sau bulemie; gingivită; hepatită; frigiditate; insomnie sau hipersomnie, frică, coșmaruri, neurastenii, manie, isterie, extravaganță;
- punct Gen din perechea Gen-Jie*: E45 – facies;
- punct Ben din perechea Biao-Ben: E45 – E9;
- punct antialgic: glandele parotide (dureri cu hiposecreție salivară);

* Perechea de puncte Gen-Jie reiese din teoria meridianelor și colateralelor și reflectă poziția lor pe suprafața corpului uman. În cazul dat punctul E45 este indicat în patologia localizată în regiunea facială.

- dinți, gât; stomac;
- punct sindromal: Foc al Stomacului; perversiunea fluxului Qi a Stomacului; Foc al Inimii; stagnarea Qi a meridianului Stomac (picioare reci).

Localizarea

dorsum pedis, la 0,1 cun în urma și în afara unghiului unghial extern al degetului II.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *phalanx digitalis distalis II*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.digitalis plantaris proprius*, ramură a *n.tibialis (plexus sacralis)* • *aa. et vv.digitales plantares propriae, aa. et vv.digitales dorsales*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,1 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului în sus, spre articulația tibiotarsiană. Tehnica de sângerare (facies tumefiat, odontalgie; febră; epistaxis, obstrucție nazală; gastrită cronică; tonzilită; mastită). Moxibustie 3 minute.

Senzația

locală.

I.4. Meridianul Splină-Pancreas (RP)

Meridianul Splină-Pancreas este de natură Yin, centripet, pereche, conține 21 puncte (fig.41–49).

Relațiile energetice:

1. În cadrul marii circulații energetice este precedat de meridianul Stomac și urmat de meridianul Inimă (E-RP-C).
2. În cuplu cu meridianul Stomac realizează loja energetică Pământ (E-RP). În cadrul ciclului celor 5 elemente este stimulat de C și inhibat de F.
3. În cuplu cu meridianul Plămân formează axul energetic Tai Yin (RP-P).
4. După regula "miezul zilei/miezul nopții" este cuplat cu meridianul Trei Focare (RP-TR).
5. După regula "soț/soție" este cuplat cu meridianul Ficat (RP-F).

Funcțiile energetice:

1. Controlează digestia și absorbția alimentelor, travaliul lor prin intestin.
2. Exerciță o funcție importantă în metabolismul hidric – elimină surplusul de apă și nu admite Umiditatea; influențează următoarele lichide din organism: 1) suc digestiv din stomac și intestine;




Fig.41. Punctele meridianului Splină-Pancreas (RP).

- 2) saliva; 3) lichidul interstițial; 4) secreția produsă de mucoasa aparatelor respirator, digestiv, genital; 5) secreția glandelor endocrine (insulină, glucagon, somatostatin); 6) limfa și sângele.
3. Controlează ascendența Qi. Dacă Qi descendează, apar simptome de ptoză a organelor interne, prolaps rectal etc.
4. Controlează Sângele (asigură substratul material pentru formarea Sângelui, susține circulația sangvină, împiedică ieșirea Sângelui din patul vascular, participă la procesul hematopoietic).
5. Dirijează mușchii. Tonusul și puterea mușchilor depind de starea energetică a Splinei (starea lor depinde de asigurarea cu substanțe nutritive).
6. Joacă un rol important în reglarea funcției imune, de apărare a organismului, în controlul troficității pielii.
7. Splina "se deschide în gură" și se manifestă prin buze. Senzațiile gustative ale mâncării indică starea Splinei. Buzele palide și uscate sunt caracteristice stării de Vid al Splinei.
8. Menține rațiunea, cunoștințele, memoria și gândirea (Energia Yi).

Acțiunea sindromal-energetică:

- dinamizarea Qi și Xue (punctul RP4 este important în tratamentul sindroamelor de stagnare Qi și Xue: regiunea membrelor inferioare – RP1 + RP4 + RP6 + E31 + VC6; regiunea abdomenului – RP4 + RP8 + E28 + TR6 + VC6; regiunea cutiei toracice – RP4 + RP21 + VC6; uter – RP4 + RP6 + VC4);
- transformarea Umidității – RP6 + RP9 + RP15;
- transformarea Umidității și dispersia Căldurii – RP6 + RP9 + E40 + V20;
- transformarea Umidității și încălzirea Frigului – RP1 + RP3 + E36 + E40 + V20 + VC12;
- reglarea digestiei – RP3 + RP6 + E36 + RP15 + VC12;
- reglarea apetitului (punctul PR1 Yinbai este inclus în formulele terapeutice la bolnavii cu tulburări ale apetitului în asociere cu simptome de îngrijorare și depresie psihică);
- dispersia Căldurii în Sânge – RP1 + RP2 + RP6 + RP10;
- reținerea Sângelui în patul vascular – RP1 + RP6 + RP10 + VG20;
- fortificarea Qi și Xue – RP3 + RP6 + E36 + V17 + V20;
- fortificarea Yang-Qi a Splinei – RP2 + RP3 + E36 + VC4;
- fortificarea Yin-Qi – RP6 + E36;
- ascendența Qi (prolaps al organelor interne – RP3 + RP6 + VG20);
- descendența Qi (pervertirea fluxului Qi – RP4 + MC6 + VC12 + VC4);
- reglarea meridianului extraordinar Chong Mai – RP4 + MC6;
- armonizarea proceselor psihice (insecuritate psihologică – RP3 + RP6 + E36 + V49 + Yintang; stagnarea Qi și Xue – RP1 + RP4 + RP21 + V49 + MC6).

Afectarea organului și traectului intern al meridianului:

dureri epigastrice, constipație sau diaree, scaune cu mâncare nedigerată, grețuri, vărsături, inapetență, polifalgie, distensie sau senzație de greutate în epigastru și abdomen, balonare abdominală (senzație de ușurare după scaun sau după emisie gazoasă), dureri și greutate în hipocondru.

Afectarea traectului extern al meridianului:

durere, tulburări de sensibilitate, tumefiere, tulburări distrofice și alte simptome de afectare de-a lungul traectului meridianului; senzație de greutate a capului și trunchiului, slăbiciune a extremităților, dureri în tot corpul, slăbiciune și pareză a membrilor inferioare, convulsii nocturne ale mușchilor gastrocnemieni, redoarea halucelui; stază venoasă în picioare; perete abdominal tensionat sau flasc.

Afectarea conexiunilor energetice ale meridianului:

tulburări cardiovasculare (edeme, pseudoangor de origine digestivă, eretism cardiac, extrasistole postprandiale etc.); tulburări cutanate; afectarea organelor urogenitale (impotență, frigiditate, disurie etc.); obsesii (idei fixe), lene mintală, plictiseală, melancolie, depresie, insomnie din cauza grijilor, excitație psihică.

RP1 Yinbai

- punct antic Jing-dist. (elementul Lemn);
- punct de intrare în meridianul RP;
- punct de "rădăcină" al meridianului mare (axului energetic) Tai Yin;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular RP;
- punct sezonier al organului Zang Splină (punct de tonifiere pentru perioada de vară și de dispersie pentru perioada de iarnă).




Fig.42

Indicații

- tulburările metabolismului proteic (în special punctul din partea dreaptă); punct cu efect de reglare a apetitului (bulimie, obezitate); diferite hemoragii (epistaxis, hemoragii intestinale, metroragii); comă; menstrre prelungite sau neregulate; timiditate la copii, frică, fobii (punct empiric în terori nocturne la copii), convulsii infantile, depresie, somnolență sau insomnie, coșmaruri;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (buzes);
- punct Gen din perechea Gen-Jie: RP1 – stomac;
- punct antialgic: cutia toracică, regiunea inghinală, suprafața medială a labei piciorului și haluce; inimă; splină, stomac (dureri cu insomnie); hemoroizi; ciclul menstrual;
- punct sindromal: stagnarea Xue a uterului; stagnarea Qi în Focarul Superior, Mediu și Inferior; Căldură și Vânt Intern (convulsii); stagnarea Qi în meridianul Splină (dureri în cutia toracică,

epigastriu, picioare reci etc.).

Localizarea

dorsum pedis, 0,1 cun în urmă și medial de unghiul unghial intern al halucelui.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *phalanx digitalis distalis I*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.digitalis plantaris proprius*, ramură a *n.plantaris medialis* (L4,5, S1) de la *n.tibialis (plexus sacralis)* • *aa. et vv.digitales plantares propriae, aa. et vv.digitales dorsales*.

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,1 cun (stimularea punctului la gravide este contraindicată); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului este orientat în sus. Tehnica de sângerare (diaree, vomă; febră cu epistaxis; cardialgii; hipermenoree, menstruație tardivă; pancreatită cronică, gastrită). Moxibustie 5–20 minute (indicat în diferite hemoragii; în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

locală.

RP2 Dadu

- punct antic Ying (elementul Foc);
- punct de tonifiere al meridianului RP;
- punct sezonier al organului Zang Splină (punct de tonifiere pentru al 5-lea sezon și de dispersie pentru perioada de primăvară).

Indicații

- astenie; anemie; diminuarea reactivității imunologice; ascaridoză; panariții și furuncule; psoriazis, hipohidroză; egoism, gelozie, angoasă, depresie, melancolie, lipsă de concentrație, pierderea controlului emoțional, paranoidă;
- punct antialgic: partea medială a labeli piciorului și haluce, regiunea inghinală; inimă (dureri precordiale); stomac; testicule (inflamație); lombalgie cronică (în asociere cu algii abdominale); articulații și oase; furuncule și panariții; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – suprafața anterioară a centurii scapulare;
- punct sindromal: stagnarea Qi în meridianul Splină; stagnarea Qi în Focarul Superior, Mediu și Inferior; Căldură sau Căldură-Umiditate al Stomacului (vomă, dureri epigastrice); Insuficiența Yang-Qi a Splinei.

Localizarea

margo medialis pedis, fața internă a halucelui, antero-inferior de articulația metatarsofalangiană, la granița pielii albe (Yin) și roșii (Yang).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia dorsalis pedis • tendo m.abductor hallucis.

Inervația • Vascularizația

pielea – n.digitalis plantaris proprius (L4,5, S1), n.digitalis dorsalis pedis, ramură a n.cutaneus dorsalis medialis (L4,5, S1); mușchii – n.plantaris medialis (L5, S1) • a.digitalis plantaris propriae, a.digitalis dorsalis, a.plantaris medialis, vv.digitales dorsales pedis.

Tehnica

se punctează vertical – 0,3–0,5 cun (se va evita stimularea punctului la gravide). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

spre degetul mare.

RP3 Taibai

- punct antic Shu-Yuan (elementul Pământ);
- punct sursă al meridianului RP;
- punct sezonier al organului Zang Splină (punct de tonifiere pentru perioada de toamnă și de dispersie pentru perioada de vară).

Indicații

- hemoragii intestinale, hemoroizi, dizenterie, constipație, ascaridoză; patologia gastrică (grețuri, inapetență, balonare); punct specific pentru metabolismul glucidic; egoism, depresie cu senzație de greutate în corp, tulburări ale atenției și procesului de memorare, obsesii;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (gură);
- punct antialgic: peretele abdominal (spasm muscular); inimă (dureri asociate bradicardiei); ciclul menstrual; cap (cefalee în asociație cu senzație de greutate sau constipație); dureri de diversă etiologie și localizare în asociere cu contracturi și spasme; sciatică cu crampe; oase și articulații; lombalgie cu agravare în anteflexie; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – zona occipitală;
- punct sindromal: Insuficiența Qi și Yang-Qi a Splinei; ptoze viscerale (posedă efect de ascendență Qi); Umiditate în Focarul Superior, Mediu și Inferior; Flegmă a Plămânilor; Insuficiența Xue.

Localizarea

margo medialis pedis, postero-inferior de capul metatarsianului I, la granița pielii roșii (Yang) și albe (Yin).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia dorsalis pedis • m.abductor hallucis • m.flexor hallucis brevis.

Inervația • Vascularizația

pielea – n.plantaris medialis (L4,5, S1), ramură a n.tibialis (plexus sacralis), ramuri ale n.saphenus (L3,4); mușchii – n.plantaris

medialis (L5, S1) • a.metatarsea dorsalis, a.digitalis plantaris propriae, a.plantaris medialis, arcus venosus dorsalis pedis.

Tehnica

se punctează vertical – 0,3–0,5 cun. Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

spre degetul mare.

RP4 Gongsun

- punct Lo al meridianului RP;
- punct de comandă al meridianului extraordinar Chong Mai.

Indicații

- punct specific în tulburările metabolismului lipidic; punct de reglare a menstrelor; punctul "calmului cerebral", anxietate, crize de agitație, tulburări de somn în asociere cu dereglări digestive (aerocolie și aerofagie);
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (stomac);
- punct antialgic: inimă (dureri acute); abdomen (RP4 + MC6); testicule (leziune traumatică);
- punct sindromal: stagnarea Qi și Xue în membrele inferioare (tulburări circulatorii); stagnarea Qi și Xue în Focarul Inferior; stagnarea Qi și Xue în Intestine; stagnarea Qi și Xue în uter (dismenoree, menstrre neregulate); Insuficiența Qi sau Yang-Qi a Rinichilor cu stagnarea Xue; stagnarea Qi și Xue a Stomacului; perversiunea fluxului Qi a Stomacului, Insuficiența Qi a Stomacului și Splinei; stagnarea Qi și Xue în cutia toracică sau Inimă; diferite sindroame de stagnare Xue în asociere cu Insuficiența Xue (RP4 + RP10).

Localizarea

margo medialis pedis, în depresiunea din fața articulației metatarsianului I cu cuneiformul I.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia dorsalis pedis • m.abductor hallucis • m.flexor hallucis brevis • tendo m.flexor hallucis longus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.saphenus (L3,4)*, ramură a *n.femoralis (plexus lumbalis)*, *n.plantaris medialis (L4,5, S1)*; mușchii – *n.plantaris medialis (L5, S1) • a.metatarsea dorsalis, a.digitalis plantaris propriae, a.plantaris medialis, arcus venosus dorsalis pedis.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun); se înțeapă spre punctul R1 Yongquan (indicat în diaree cu alimente nedigerate). Moxibustie 3–5 minute.

Senzația

în sus și în jos de-a lungul meridianului.

RP5 Shangqiu

- punct antic Jing-prox. (elementul Metal);
- punct de dispersie al meridianului RP;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular RP;
- punct sezonier al organului Zang Splină (punct de tonifiere pentru perioada de iarnă și de dispersie pentru al 5-lea sezon).

Indicații

- punct specific în afecțiunile venelor (flebită, periflebită, varice) și oaselor (osteoporoză, periostită); leucocitoză; sterilitate; comă hipoglicemică; punct al "somnului calm", coșmaruri, somn agitat sau somnolență, tristețe, halucinații, schizofrenie, obsesii;
- punct antialgic: oase, articulații (poliartrite), gambă (cu senzație de greutate, spasm al mușchiului gastrocnemian); limbă; hemoroizi (dureri cu hemoragie), anus (fisuri); punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: gleznă (RP5) – pumn (P9);
- punct sindromal: Umiditate în urma Insuficienței Qi a Splinei (afectarea articulațiilor membrelor inferioare; gastrită, enterită).

Localizarea

dorsum pedis, în fosa situată sub și înaintea maleolei interne, la mijlocul distanței între tuberozitatea osului navicular și vârful maleolei interne.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia dorsalis pedis • pars tibionavicularis lig.mediale.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.saphenus* (L3,4), ramură a *n.femoralis* (*plexus lumbalis*), *n.cutaneus dorsalis medialis* (L4,5, S1), ramură a *n.peroneus superficialis* (*plexus sacralis*) • *a.malleolaris anterior medialis*, *aa. tarseae mediales*, *v.saphena magna*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,3–0,5 cun); se înțeapă spre punctul E41 Jiexi (indicat în dureri abdominale), Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

spre degetul mare.

RP6 Sanyinjiao

- punct Lo de grupă (RP, F, R).

Indicații

- punct specific în diaree; incontinență și retenție urinară, enurezis; edeme (RP6 + VC9 + E40); tulburări de imunitate; punct important în tulburări ale circulației arteriale și venoase în membrele inferioare;



Fig.43

punct cu acțiune de normalizare a funcțiilor organelor digestive (gastrită, constipație, diaree etc.) și ale sistemului reproductiv; anorexie nervoasă cu insomnie, neurastenii, timiditate la copii, frică, iritabilitate, hipersensibilitate;

- punct distal cu acțiune locoregională proximală (abdomenul inferior);
- punct Ben din perechea Biao-Ben: RP6–V20; RP6–VC23;
- punct antialgic: regiunea paraombilicală (dureri acute); articulația genunchiului, sciatică, dorsalgii (Th5–Th7); uter, organele genitale, ovare, vagin (dureri și tumefiere), vezica urinară, rinichi (colică, diateză urică cu hemoragie); ciclul menstrual (dismenoree, dureri în prima zi a menstruelor), naștere, migrenă;
- punct sindromal: Insuficiența Qi a Splinei; Insuficiența Qi și Xue; Insuficiența Yin-Qi a organelor Zang; stagnarea Qi și Xue; ptoze viscerale, hemoroizi (efect de ascendență Qi a Focarului Mediu și Inferior); hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului (hipersensibilitate emoțională, iritabilitate); Umiditate în asocieri cu Căldură sau Frig (în special al Focarului Inferior); afecțiuni cutanate (Căldură Xue, Umiditate, Umiditate-Căldură, stagnarea Qi și Xue, Uscăciune).

Localizarea

regio cruralis posterior, la 3 cun deasupra vârfului maleolei interne, pe marginea postero-internă a tibiei.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m. soleus • m. flexor digitorum longus • m. tibialis posterior • m. flexor hallucis longus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr. cutanei cruris mediales n. sapheni (L3,4)*, ramuri ale *n. femoralis (plexus lumbalis)*; mușchii – *n. tibialis – L4,5, S1,2,3* • *a. et vv. tibiales posteriores, v. saphena magna.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun); se punctează de-a lungul marginii posterioare a tibiei, orientând vârful acului spre punctul VB39 Xuanzhong (indicat în grețuri, curbatură și greutate în tot corpul); se punctează sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului în sus (indicat în balonarea abdomenului, inapetență, diaree) sau în jos (indicat în dureri ale organelor genitale externe, disurie). Tehnica de sângerare (hipermenoree; insomnie; pancreatită cronică; mastită). Moxibustie 10–30 minute.

Senzația

în sus, de-a lungul meridianului sau în jos, spre gleznă și degetul mare.

RP7 Lougu

Indicații

- spermatooree; parestezii în regiunea gambei și labei piciorului;

- punct antialgic: regiunea omoplaților, regiunea articulației genunchiului (dureri și tumefiere);
- punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – zona occipitală;
- punct sindromal: Umiditate cu afectarea membrelor inferioare.

Localizarea

regio cruralis posterior, la 6 cun deasupra vârfului maleolei interne, pe marginea postero-internă a tibiei, pe linia ce unește vârful maleolei interne și RP9 Yinlingquan.




Fig.44

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m. soleus • m. flexor digitorum longus • m. tibialis posterior.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr. cutanei cruris mediales n. sapheni (L3,4)*; mușchii – *n. tibialis (L4,5, S1,2,3) • a. et vv. tibiales posteriores, v. saphena magna.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun). Moxibustie 5–10 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

în jos, spre gleznă.

RP8 Dijī

- punct Xi al meridianului RP.

Indicații

- impotență, oligospermie; disurie, anurie, incontinență urinară; ascită;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (abdomenul inferior, uter);
- punct antialgic: regiunea rinichilor; organele bazinului mic, ciclul menstrual; intestin; lumbago;
- punct sindromal: stagnarea Qi și Xue în Focarul Inferior și membrele inferioare (dismenoree, menstrre neregulate; edeme etc.).

Localizarea

regio cruralis posterior, la 3 cun sub RP9 Yinlingquan, pe marginea postero-internă a tibiei, pe linia ce unește vârful maleolei interne și RP9 Yinlingquan.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m. gastrocnemius • m. soleus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.cutanei cruris mediales n.sapheni (L3, 4)*; mușchii – *n.tibialis (L4,5, S1,2)* • *a. et vv.tibiales posteriores, v.saphena magna*.

Tehnica

se întăpă vertical (0,5–1 cun). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

În sus, spre genunchi și în jos, pe suprafața internă a gambei.

RP9 Yinlingquan

- punct antic He (elementul Apă);
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular RP;
- punct sezonier al organului Zang Splină (punct de tonifiere pentru perioada de primăvară și de dispersie pentru perioada de toamnă).

Indicații

- retenție urinară, disurie, enurezis, edeme; diaree, dizenterie; hipertenzie portală, icter, ascită; patologia mușchilor (RP9 + VB34);
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (hipocondrul stâng; sistemul urinar);
- punct antialgic: articulația șoldului, lumbago; dureri circulare (la nivelul ombilicului); articulația genunchiului; esofag, intestin (dureri cu diaree abundentă), ficat și vezicula biliară (dureri ce ascendează în torace); rinichi (litiază renală); organele genitale, ovare; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – suprafața dorsală a mâinii, membrele superioare; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: genunchi (RP9) – cot (P5);
- punct sindromal: afecțiuni cutanate, patologia organelor digestive, sistemului reproductiv și uroexcretor provocate de Umiditate, Umiditate-Căldură, Umiditate-Frig.




Fig.45

Localizarea

regio cruralis posterior, în fosea, în unghiul dintre tuberozitatea internă a tibiei și marginea sa posterioară, la 2 cun sub marginea inferioară a rotulei, la nivelul lui VB34 Yanglingquan.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.gastrocnemius • m.soleus • m.popliteus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.cutanei cruris mediales n.sapheni (L3,4)*; mușchii – *n.tibialis (L4,5, S1,2)* • *a. et vv.tibiales posteriores, a.genus inferior medialis, v.saphena magna*.

Tehnica

se înțeapă vertical (1–1,5 cun); se înțeapă spre punctul VB34 Yanglingquan (periartrită scapulo-humerală, colecistită). Tehnica de sângerare (lombalgii; dereglări de somn; sterilitate). Moxibustie 3–5 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

spre genunchi și în jos, pe suprafața internă a gambei.

RP10 Xuehai

Indicații

- diverse hemoragii; patologia venelor pelviene și a membrilor inferioare; inflamarea ganglionilor limfatici inghinali;
- punct antialgic: piele (prurit – RP10 + GI11 + RP6); prostată; ciclul menstrual (dismenoree, menstruație tardivă sau oligomenoree);
- punct sindromal: stagnarea Xue în uter (dismenoree, menstrue neregulate, amenoree); stagnarea Xue în membrele inferioare (traume; psoriazis); Insuficiența Xue (RP10 + V17 + V20); Căldură Xue (urticarie, eczemă).




Fig.46

Localizarea

regio femoralis anterior, la 2 cun deasupra marginii superioare a rotulei și deasupra unghiului supero-intern al tibiei (la vârful policelui, când mâna cuprinde genunchiul bolnavului).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia lata • m.sartorius • m.vastus medialis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.cutanei anteriores n.femoralis (L2,3)*; mușchii – *n.femoralis (Th12, L1-4)* • *a.genus descendens (a.femoralis), v.saphena magna*.

Tehnica

se înțeapă vertical sau puțin oblic în sus – 1–1,2 cun (în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

În jos, spre genunchi și în sus, de-a lungul meridianului.

RP11 Jimen

Indicații

- inflamația ganglionilor limfatici inghinali; insuficiența sfincterului vezicii urinare;
- punct antialgic: algii și edeme în regiunea inghinală (RP11 + F12 + E31) și flancuri; uretră (disurie).

Localizarea

regio femoralis anterior, 6 cun deasupra lui RP10 Xuehai, înaintea mușchiului croitor, pe linia ce unește RP10 Xuehai cu RP12 Chongmen.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia lata • m.sartorius • m.gracilis • m.adductor magnus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.cutanei anteriores n.femoralis (L2,3), r.cutaneus nn.obturatorii (L2,3,4)* de la *plexus lumbalis*; mușchii – *n.femoralis (Th12, L1,2,3), n.obturatorius (L1-4) • a.femoralis, v.saphena magna, v.femoralis.*

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,5–1 cun (în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 3–10 minute.

Senzația

În sus și în jos de-a lungul meridianului.




Fig.47

RP12 Chongmen

- punct de inserție al meridianului tendino-muscular RP;
- punct de încrucișare a meridianelor RP, F.

Indicații

- hipogalactie; colită, constipații, prolaps rectal; retenție urinară; afectarea testiculelor;
- punct antialgic: stomac; cordonul spermatic (nevralgie), testicule (inflamație); uter; vezica urinară; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – glande mamare; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: șold (RP12) – umăr (P2);
- punct sindromal: Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor.

Localizarea

regio femoralis anterior, puțin deasupra pliului inghinal, la 3,5 cun lateral de VC2 Qugu, pe partea externă a arterei femurale.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia lata • m.iliopsoas.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.femoralis n.genitofemoralis (L1,2)* de la *plexus lumbalis*; mușchii – *rr.musculares plexus lumbalis (Th11,12, L1,2,3) • a.femoralis, a. et v.circumflexa ilium superficialis, a. et v.epigastrica superficialis.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun), evitând înțeparea arterei femurale. Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

locală.

RP13 Fushe

- punct de încrucișare a meridianelor RP, F, Yin Wei Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yin Wei Mai.

Indicații

- hernie; constipație (pareză intestinală);
- punct antialgic: abdomen (dureri ascendente spre inimă); fese și regiunea inghinală; apendicită.

Localizarea

regio inguinalis, la 4 cun lateral de la linia mediană, la 0,7 cun laterosuperior de RP12 Chongmen.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • aponeurosis m. obliqui externi abdominis • m.obliquus internus abdominis • m.transversus abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior n.iliohypogastrici (Th12, L1)* de la *plexus lumbalis*; mușchii – *nn.intercostales (Th7-12), n.lumbalis (L1) • a.femoralis, a. et v.circumflexa ilium superficialis, a. et v.epigastrica superficialis.*

Tehnica

se punctează vertical – 0,5–1 cun, evitând înțeparea arterei (stimularea punctului la gravide este contraindicată). Moxibustie 10–30 minute.

Senzația

în jos, spre coapsă.

RP14 Fujie

Indicații

- diaree acută, constipație (RP14 + RP13 + E37);
- punct antialgic: apendicită acută (dureri în regiunea periombilicală), intestin (colică);
- punct sindromal: Frig al cavității abdominale.

Localizarea

regio abdominalis lateralis, la 1,3 cun sub RP15 Daheng, 4 cun lateral de la linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.obliquus externus abdominis • m.obliquus internus abdominis • m.transversus abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis (abdominalis) n.intercostalis XI*; mușchii – *nn.intercostales (Th7-12), n. lumbalis (L1) • a. et v.epigastrica superficialis, a. et v.epigastrica inferior, r.cutaneus lateralis (a.intercostalis posterior XI), v.intercostalis XI.*

Tehnica

se înțeapă vertical – 1–1,2 cun (stimularea punctului la gravide este contraindicată). Moxibustie 10–30 minute.

Senzația

în jos, spre abdomenul inferior.

RP15 Daheng

- punct de încrucișare a meridianelor RP, Yin Wei Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yin Wei Mai.

Indicații

- gripă; ascaridoză intestinală (RP15 + E25 + Baichongwo), dizenterie, pareză intestinală, splenomegalie; tulburările metabolice (în special în perioada de reconvalescență);
- punct antialgic: intestin (colică); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – membrele superioare;
- punct sindromal: stagnarea Qi în abdomen (distensie abdominală, durere, constipație); stagnarea Qi a Ficatului; Insuficiența Qi în Intestine (constipație, indigestie); Umiditate, Umiditate-Căldură, Umiditate-Frig în Intestine (indigestie, diaree, distensie abdominală); Insuficiența Qi și Yang-Qi a Splinei.

Localizarea

regio abdominalis lateralis, 4 cun lateral de ombilic, pe marginea laterală a mușchiului drept abdominal.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.obliquus externus abdominis • m.obliquus internus abdominis • m.transversus abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis (abdominalis) n.intercostalis X*; mușchii – *nn.intercostales (Th5-12), n.lumbalis (L1) • a. et v.epigastrica superficialis, a. et v.epigastrica superior et inferior, r.cutaneus lateralis (a.intercostalis posterior X), v.intercostalis X.*

Tehnica

se înțeapă vertical – 1–1,2 cun (în ultimele luni de sarcină punctul nu se va stimula). Moxibustie 10–30 minute.

Senzația

în jos, spre abdomenul inferior.

RP16 Fuai

- punct de încrucișare a meridianelor RP, Yin Wei Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yin Wei Mai.

Indicații

- dispepsie, constipație;
- punct sindromal: Căldură-Umiditate a Intestinelor (dizenterie).

Localizarea

regio abdominalis lateralis, la 3 cun deasupra ombilicului, la nivelul VC11 Jianli, 4 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.obliquus externus abdominis • m.obliquus internus abdominis • m.transversus abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis (abdominalis) n.intercostalis IX*; mușchii – *nn.intercostales (Th5-12), n.lumbalis (L1) • a. et v.epigastrica superior, r.cutaneus lateralis (a.intercostalis posterior VIII), v.intercostalis VIII.*

Tehnica

se punctează vertical – 0,5–1 cun; se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în jos, spre membrele inferioare (punctarea cu orientarea vârfului acului în sus este contraindicată din cauza pericolului de a leza ficatul sau splina). Moxibustie 10–20 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

locală.

RP17 Shidou

Indicații

- pneumonie, pleurezie;
- punct antialgic: diafragmă; nervii intercostali; ficat; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – vârfurile degetelor; ureche.




Fig.48




Fig.49

Localizarea

regio pectoralis, la 6 cun lateral de linia mediană, în spațiul V intercostal.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.serratus anterior • fascia thoracica • m.intercostalis externus • m.intercostalis internus • fascia endo-thoracica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis (pectoralis) n. intercostalis V*; mușchii – *n.thoracicus longus (C5-8), n.intercostalis V • a. et v.thoracica lateralis, r.cutaneus lateralis (a.intercostalis posterior V), v.thoracoepigastrica, v.intercostalis V.*

Tehnica

se punctează sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), orientând vârful acului de-a lungul spațiului intercostal spre linia axilară (acul va fi introdus mai aproape de marginea superioară a coastei plasate mai inferior). Punctarea profundă este contraindicată din cauza pericolului de a leza plămânul. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

locală sau în spațiile intercostale.

RP18 Tianxi

Indicații

- bronșită acută și cronică, dispnee; ulcer gastric (grețuri); hipogalactie;
- punct antialgic: nervii intercostali; glandele mamare;
- punct sindromal: perversiunea fluxului Qi a Plămânului (tuse).

Localizarea

regio pectoralis, în spațiul IV intercostal, la 6 cun lateral de linia

mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • m.pectoralis major • m. serratus anterior • fascia thoracica • m.intercostalis externus • m. intercostalis internus • fascia endothoracica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis (pectoralis) n. intercostalis IV*; mușchii – *nn.pectorales mediales et laterales (C5-8, Th1), n.thoracicus longus (C5-8), n.intercostalis IV • a. et v.thoracica lateralis, r.cutaneus lateralis (a.intercostalis posterior IV), v.thoracoepigastrica, v.intercostalis IV.*

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit – 0,5–0,8 cun, vârful acului va fi orientat de-a lungul spațiului intercostal, spre linia axilară (acul va fi introdus mai aproape de marginea superioară a coastei plasate mai inferior). Punctarea profundă este contraindicată. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

În interiorul pieptului sau spațiile intercostale.

RP19 Xiongxiang

Indicații

- hipersalivație; disfagie;
- punct antialgic: nervii intercostali; stomac și diafragmă (durere spasmodice); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – spate.

Localizarea

regio pectoralis, în spațiul III intercostal, la 6 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • m.pectoralis major • m. serratus anterior • fascia thoracica • m.intercostalis externus • m. intercostalis internus • fascia endothoracica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (pectoralis) n. intercostalis II, r.cutaneus lateralis (pectoralis) n. intercostalis III*; mușchii – *nn.pectorales mediales et laterales (C5-8, Th1), n.thoracicus longus (C5-8), n.intercostalis III • a. et v.thoracica lateralis, r.cutaneus lateralis (a.intercostalis posterior III), v.intercostalis III.*

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), orientând vârful acului de-a lungul spațiului intercostal, spre linia axilară (acul va fi introdus mai aproape de marginea superioară a coastei plasate mai inferior). Punctarea profundă este contraindicată. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

În cutia toracică sau spațiile intercostale.

RP20 Zhouong

Indicații

- punct specific în sete (RP20 + P3); hiperestezie cutanată în regiunea toracelui și hipocondrului; tuse cu expectorații purulente; hemoroizi, prolaps rectal; excitație sexuală, agresivitate;
- punct antialgic: regiunea centurii scapulare (dureri ce iradiază în fosa axilară); nervii intercostali; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – gât, ochi.

Localizarea

regio pectoralis, în spațiul II intercostal, la 6 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • m.pectoralis major • fascia clavipectoralis • m.pectoralis minor • fascia thoracica • m.intercostalis externus • m.intercostalis internus • fascia endothoracica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.supraclaviculares intermedii (C3,4)* de la *plexus cervicalis*; mușchii – *nn. pectorales mediales et laterales (C5-8, Th1)*, *n.intercostalis II • a.intercostalis posterior secunda, rr.intercostales anteriores (a.thoracica interna), a. et v.intercostalis suprema, v.thoracica lateralis.*

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), orientând vârful acului de-a lungul spațiului intercostal spre linia axilară (acul va fi introdus mai aproape de marginea superioară a coastei plasate mai inferior). Punctarea profundă este contraindicată. Moxibustie 5–20 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

locală sau spațiile intercostale.

RP21 Dabao

- punct de ieșire din meridianul RP;
- punct Lo al meridianului Lo-longitudinal Splină-Pancreas.

Indicații

- tulburările metabolismului hidric; afecțiunile ficatului (punctul din partea dreaptă); slăbiciune în toate articulațiile; dispnee; edeme renale;
- punct antialgic: fosa axilară; nervii intercostali; inimă (dureri precordiale cu dispnee); dureri hemitip; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ochi;

- punct sindromal: stagnarea Qi și Xue.

Localizarea

regio axillaris, pe linia medioaxilară, la 3 cun sub VB22 Yuanye (la 6 cun sub vârful axilei).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia axilaris • m.serratus anterior • fascia thoracica • m.intercostalis externus • m.intercostalis internus • fascia endothoracica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis (pectoralis) n. intercostalis VI*; mușchii – *n.thoracicus longus (C5-8), n.intercostalis VI • a. et v.thoracica lateralis, r.cutaneus lateralis (a.intercostalis posterior VII), v. intercostalis VII.*

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), orientând vârful acului de-a lungul spațiului intercostal spre linia axilară (acul va fi introdus mai aproape de marginea superioară a coastei plasate mai inferior). Punctarea profundă este interzisă. Moxibustie 10-20 minute.

Senzația

locală sau spațiile intercostale.

I.5. Meridianul Inimă (C)

Meridianul Inimă este de natură Yin, centrifug, pereche, conține 9 puncte (*fig.50–55*).

Relațiile energetice:

1. În cadrul marii circulații energetice este precedat de meridianul Splină-Pancreas și urmat de meridianul Intestin Subțire (RP-C-IG).
2. În cuplu cu meridianul Intestin Subțire realizează loja energetică Foc (C-IG). În cadrul ciclului celor 5 elemente este stimulat de F și inhibat de R.
3. În cuplu cu meridianul Rinichi formează axul energetic Shao Yin (C-R).
4. După regula "miezul zilei/miezul nopții" este cuplat cu meridianul Veziculă Biliară (C-VB).
5. După regula "soț/soție" este cuplat cu meridianul Plămân (C-P).

Funcțiile energetice:

1. Dirijează aparatul cardiovascular și circulația sangvină.
2. Inima împreună cu Intestinul Subțire formează loja energetică Foc, care emană Energia numită Shen (corespunde inteligenței, logicii, rațiunii, moralității, emoțiilor).




Fig.50. Punctele meridianului Inimă (C).

3. Controlează într-o oarecare măsură homeostazia termică și capacitatea de adaptare a organismului la variațiile unor parametri fizici ai mediului. Sudoarea este Lichidul Inimii (Insuficiența Qi a Inimii provoacă hiperhidroză spontană; Insuficiența Yang-Qi – hiperhidroză profuză).
4. Inima "se deschide în limbă" și se manifestă prin față. Dacă starea funcțională a Inimii este bună, limba e de culoare roz, umedă, dinamică. Schimbarea culorii feței (roșie, palidă) indică starea energetică (Qi) a Inimii.

Acțiunea sindromal-energetică:

- dispersia Focului în Inimă – C5 + C8 + MC8 + R2 + VC14;
- dispersia Focului Inimii, care descendează în Focarul Inferior – C5 + C8 + IG5 + VC3 + RP6;
- reducerea Focului și a Flegmei – C5 + C8 + E40 + VB13;
- dinamizarea Qi și Xue – C6 + MC4 + VC14 + VC17;
- fortificarea Qi a Inimii – C7 + VC4 + VC17 + E36 + V15;
- fortificarea Yang-Qi a Inimii – C8 + VC6 + VG20;
- fortificarea Yin-Qi a Inimii – C7 + C3 + VC14 + R3; C6 + R6 + RP6;
- fortificarea Xue – C7 + RP6 + RP10 + VC4 + E36;
- reglarea procesului de articulare a vorbirii – C5 + VC23 + VG15;
- armonizarea proceselor psihice (punctul C7 Shenmen fortifică Qi și Xue, fiind indicat în asociere cu punctele Shu-post. și punctele Shu psiho-dorsale; C6 Yinxi dinamizează Qi; C3 Shaohai și C8 Shaofu dispersează Focul în Inimă).

Afectarea organului și traectului intern al meridianului:

dureri precordiale, senzație de plenitudine în torace, aritmie, palpitații; cefalee și vertij legate de insuficiența circulatorie; nevroză cardiacă.

Afectarea traectului extern al meridianului:

durere, tulburări de sensibilitate și distrofice de-a lungul meridianului; nevralgie intercostală.

Afectarea conexiunilor energetice ale meridianului:

tulburări psihice (fobii, melancolie, euforie, hiperexcitare, delir, logoree, râs și plâns nepotrivite, depresie, amnezie, reducere a intelectului etc.), epilepsie; tulburări digestive (sete, gât uscat, inapetență, tulburări hepatice); tulburarea funcției glandei tiroide.

C1 Jiquan

- punct de intrare în meridianul C.

Indicații:

- hipogalactie; depresie, regret;
- punct antialgic: regiunea umărului (dureri ce iradiază în fosa axilară); nervii intercostali; inimă (precordialgii în tulburări emoționale); punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor; umăr (C1) – șold (R11);
- punct sindromal: Insuficiența Yin-Qi a Inimii (insomnie; gură și gât uscate, transpirații nocturne); Insuficiență-Foc a Inimii.

Localizarea

regio brachialis anterior, în centrul axilei, pe fața medială a arterei axilare.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • fascia brachii • m. pectoralis major • caput breve m. bicipitis brachii • m. coracobrachialis

- *tendo m.latissimus dorsi*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus brachii medialis* (C8, Th1) de la *plexus brachialis*; mușchii – *nn. pectorales medialis et lateralis* (C5-8, Th1), *n.musculocutaneus* (C5-8) • *a. et v.axillaris*.

Tehnica

se punctează vertical – 0,3–0,5 cun (pentru a evita traumatizarea pachetului neurovascular rotirea acului va fi efectuată cu precauție). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jos, spre mână (uneori până la degetul mic).

C2 Qingling

Indicații

- tulburări motorii și de sensibilitate a membrului superior;
- punct antialgic; nervii intercostali; hipocondru; biceps.

Localizarea

regio brachialis anterior, pe marginea internă a bicepsului, la 3 cun deasupra pliului cotului, pe linia ce unește C1 Jiguan cu C3 Shaohai.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia brachii • m.brachialis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus brachii medialis* (C8, Th1) de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.musculocutaneus* (C5,6,7) • *a.collateralis ulnaris superior* (*a.brachialis*), *v.basilica*.

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,5–0,8 cun (poate fi lezat pachetul neurovascular; în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jos, spre degetul mic.

C3 Shaohai

- punct antic He (elementul Apă);
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular C;
- punct sezonier al organului Zang Inimă (punct de tonifiere pentru perioada de primăvară și de dispersie pentru perioada de toamnă).

Indicații

- gingivită; parestezie în regiunea cotului; tremor al mâinilor (C3 + GI4 + IG3); depresie, ciclotimie;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (piept);
- punct antialgic: umăr (dureri ce iradiază în fosa axilară), laba mîi-



Fig.51




Fig.52

nii (dureri cu senzație de rece); nervul trigemen; nervii intercostali; inimă (precordialgii cu tremurături ale mâinilor); cap (cefalee surdă și difuză); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – urechi, ceafă, suprafața antero-laterală a membrilor inferioare; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: cot (C3) – genunchi (R10);

- punct sindromal: Excesul Focului în Inimă (agitație cu insomnie); Insuficiență Yin-Qi a Inimii (anxietate, palpitații, transpirații nocturne); Insuficiență-Foc a Inimii (insomnie); stagnarea Qi în meridianul Inimii (dureri în membrele superioare și cutia toracică).

Localizarea

regio cubitalis anterior, la 1/2 distanței între epicondiliul medial al humerusului și extremitatea internă a pliului cotului.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *fascia antebrachii* • *m.pronator teres* • *m. brachialis*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii medialis* (C8, Th1) de la *plexus brachialis*; mușchii – *n. medianus* (C6,7) • *a.collateralis ulnaris inferior* (*a.brachialis*), *a.recurrentis ulnaris*, *v.basilica*.

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,5–0,8 cun; se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre mijlocul articulației cotului. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

spre degetul mic.

C4 Lingdao

- punct antic Jing-prox. (elementul Metal);

- punct sezonier al organului Zang Inimă (punct de tonifiere pentru perioada de iarnă și de dispersie pentru al 5-lea sezon).

Indicații

- palpitații; senzație de rece în oase; anxietate, teamă, insomnie, isterie, depresie, convulsii;
- punct antialgic: antebraț, articulația cotului, nervul cubital; nervii intercostali; inimă (stenocardie); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – o jumătate de corp;
- punct sindromal: stagnarea Qi a meridianului Inimă și Intestin Subțire (durere, neuralgie, spasme musculare).

Localizarea

regio antebrachialis anterior, la 1,5 cun deasupra pliului pumnului (C7 Shenmen), pe marginea internă a arterei cubitale, pe partea radială a tendonului *m.flexor carpi ulnaris*.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • tendo m.flexor carpi ulnaris • tendo m.flexor digitorum superficialis • m.flexor digitorum profundus • m.pronator quadratus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii medialis* (C8, Th1) de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.ulnaris* (C7,8, Th1), *n.medianus* (C6,7,8, Th1) • *a.ulnaris*, *v.basilica*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,3–0,5 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului în sus spre articulația cotului; se înțeapă spre punctul C7 Shenmen (algii precordiale, afonie acută). Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

în jos, spre degetul mic sau în sus, spre cot.

C5 Tongli

- punct Lo al meridianului C.

Indicații

- hipotensiune arterială; parodontoză; menoragie; afecțiunile faringelui, limbii, glandei tiroide și în atonia intestinului; punct important în tahicardie; somnolență (C5 + R4) sau insomnie, depresie, astenie, bălbăiala prin frică, emotivitate (punctul tracului), punct specific pentru armonizarea psihică (în special în agravări provocate de emoții), crize de mutism isteric (C5 + VC23);
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (limbă);
- punct antialgic: regiunea omoplatului, articulația cotului (dureri pe suprafața medială ce iradiază în umăr), nervul cubital; inimă (stenocardie cu iradiere în mezin, precordialgii în tulburări emoționale); căile biliare (dureri în colicistită); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – suprafața antero-laterală a

- gambei, genunchiului, suprafața posterioară a centurii scapulare;
- punct sindromal: Insuficiența Qi a Inimii; Foc al Inimii (insomnie; sete, ulceratii ale mucoasei bucale și ale limbii; hematurie, senzație de arsură la urinare); perversiunea fluxului Qi a Inimii (palpitații; gust amar; anxietate).

Localizarea

regio antebrachialis anterior, 1 cun deasupra pliului proximal al pumnului, pe marginea radială a tendonului *m.flexor carpi ulnaris*.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • tendo m.flexor carpi ulnaris • tendo m.flexor digitorum superficialis • m.flexor digitorum profundus • m.pronator quadratus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii medialis* (C8, Th1) de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.ulnaris* (C7,8, Th1), *n.medianus* (C6,7,8, Th1) • *a.ulnaris, v.basilica*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,3–0,5 cun). Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

în jos, spre degetul mic.

C6 Yinxi

- punct Xi al meridianului C.

Indicații

- hemoragii digestive; palpitații; punct specific în hiperhidroză; epistaxis; anxietate, crize astenice și de excitație, fobie, afonie isterică;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (gât);
- punct antialgic: inimă; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ochi, obraji, gât, suprafața dorsală a labeli piciorului, suprafața antero-laterală a gambei; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: pumn (C6) – gleznă (R5);
- punct sindromal: stagnarea Qi și Xue în meridianul Inimă (durere în membrele superioare și cutia toracică); stagnarea Flegmei; Insuficiența Yin-Qi a Inimii (transpirații nocturne, gură și gât uscate; insomnie); Foc al Inimii; Insuficiență-Foc a Inimii.

Localizarea

regio antebrachialis anterior, la 0,5 cun deasupra pliului proximal al pumnului, pe marginea radială a tendonului *m.flexor carpi ulnaris*.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • retinaculum flexorum • tendo m.flexor carpi ulnaris • m.flexordigitorum profundus • m.pronator quadratus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii medialis* (C8, Th1) de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.ulnaris* (C7,8, Th1), *n.medianus* (C6,7,8, Th1) • *a.ulnaris*, *v.basilica*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,3–0,5 cun); se înțeapă spre punctul IG5 Yanggu (epistaxis). Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

În jos, spre degetul mic.

C7 Shenmen

- punct antic Shu-Yuan (elementul Pământ);
- punct de dispersie al meridianului C;
- punct sursă al meridianului C;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular C;
- punct sezonier al organului Zang Inimă (punct de tonifiere pentru perioada de toamnă și de dispersie pentru perioada de vară).

Indicații

- tulburări ale ritmului cardiac, hipertensiune sau hipotensiune arterială; distonie neurovegetativă; incontinență urinară; punct important cu efect antistres; insomnie cu trezire repetată în cursul nopții (C7 + RP6 + Anmian), fobii, iritabilitate, veselie excesivă, încordare psihoemoțională, amnezie, schizofrenie, obsesii;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (cap – psihismul);
- punct Ben din perechea Biao-Ben: C7 – V15;
- punct antialgic: inimă (precordialgii cu tahicardie, cardialgii cu senzație de căldură în regiunea inimii și palpații); uter; piele (prurit); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – maleola laterală, suprafața anterolaterală a gambel;
- punct sindromal: Insuficiența Qi a Inimii (emoții labile, palpații); Insuficiența Qi și Xue a Inimii (insomnie, diminuarea memoriei); Insuficiența Yang-Qi a Inimii (membre reci; depresie psihică); Insuficiența Yin-Qi a Inimii (epuizare, labilitate emoțională, insomnie, palpații); Insuficiență-Foc a Inimii; stagnarea Qi și Xue a meridianului Inimă.

Localizarea

regio carpalis anterior, pe pliul proximal al pumnului, la marginea radială a ligamentului *m.flexor carpi ulnaris*.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • retinaculum flexorum • m.flexor carpi ulnaris • vagina synovialis communis mm.flexorum • tendines mm. flexoris digitorum superficialis et profundis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.palmaris n.ulnaris* (C8, Th1) de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.medianus et n.ulnaris* (C6,7,8, Th1) • *a.ulnaris*, *v.ba-*




Fig.53



Fig.54

silica.

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,3–0,5 cun; se punctează oblic, sub ligamentul *m.flexor carpi ulnaris*. Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

în jos, spre degetul mic.

C8 Shaofu

- punct antic Ying (elementul Foc);
- punct sezonier al organului Zang Inimă (punct de tonifiere pentru al 5-lea sezon și de dispersie pentru perioada de primăvară).

Indicații

- retenția sau incontinența urinară; vaginism, ptoza uterului;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (limbă; cap-sihismul);
- punct antialgic: nervii intercostali; organele genitale externe (prurit – C8 + F5 + RP9); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/ miezul nopții) – spații intercostale;
- punct sindromal: Insuficiența Yin-Qi a Inimii (senzație de căldură în "cinci inimi"; aritmie); Insuficiență-Foc a Inimii; Excesul Focului în Inimă (hipertensiune arterială, cefalee; hipertiroidism); Flegmă-Foc a Inimii (confuzie mentală, psihoză, iritabilitate); Insuficiența Yang-Qi a Inimii (membre reci; hipersomnie; apatie, depresie psihică); perversiunea fluxului Qi a Inimii (palpitații, anxietate).

Localizarea

palma manus, între metacarpianul IV și V, în locul unde auricularul atinge palma când se închide pumnul.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • aponeurosis palmaris • m.lumbricalis IV • mm.interossei dorsalis et palmaris .

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.superficialis n.ulnaris* (C8, Th1) de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.ulnaris* (C8, Th1) • *a.digitalis communis, vv.digitales*

palmares.

Tehnica

se punctează vertical (0,3–0,5 cun). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

În jos, spre degetul mic.

C9 Shaochong

- punct antic Jing-dist. (elementul Lemn);
- punct de tonifiere al meridianului C;
- punct de ieșire din meridianul C;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular C;
- punct sezonier al organului Zang Inimă (punct de tonifiere pentru perioada de vară și de dispersie pentru perioada de iarnă).

Indicații

- înapetență; bradicardie; apoplexie; astenie psihică, frică, tristețe, emotivitate cu tremor, palpitații nevrotice, insomnie cu fobii; anxietate și depresie psihică;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (cap – psihismul);
- punct antialgic: nervii intercostali; gât; inimă (stenocardie cu palpitații); anus și vagin (dureri și prurit); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – urechi, ochi, spații intercostale;
- punct sindromal: Excesul Focului în Inimă (hipertensiune arterială, cefalee); Căldura Xue; Insuficiența Yang-Qi a Inimii (depresie psihică; membre reci); Vânt Intern (delir).

Localizarea

dorsum manus, la 0,1 cun înapoia și în afara unghiului unghial al auricularului, pe partea radială a acestuia.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • phalanx digitalis distalis V.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n. digitalis dorsalis (C8, Th1)*, ramură a *n. ulnaris* de la *plexus brachialis* • *aa. digitales palmares propriae*, *vv. digitales palmares*, *rete venosum dorsale manus*.

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,1 cun (în operele antice punctarea acestui punct este interzisă); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în sus, spre articulația radiocarpiană. Tehnica de sângerare (cardialgii; febră cu pierderea cunoștinței; varice hemoroidale; prostatită; prurit vulvar). Moxibustie 10 minute.




Fig.55

I.6. Meridianul Intestin Subțire (IG)

Meridianul Intestin Subțire este de natură Yang, centripet, pereche, conține 19 puncte (*fig.56-65*).

Relațiile energetice:

1. În cadrul marii circulații energetice este precedat de meridianul Inimă și urmat de meridianul Vezică (C-IG-V).
2. În cuplu cu meridianul Inimă realizează loja energetică Foc (IG-C). În cadrul ciclului celor 5 elemente este stimulat de VB și inhibat de V.
3. În cuplu cu meridianul Rinichi formează axul energetic Tai Yang (IG-V).
4. După regula "miezul zilei/miezul nopții" este cuplat cu meridianul Ficat (IG-F).
5. După regula "soț/soție" este cuplat cu meridianul Intestin Gros (IG-GI).

Funcțiile energetice:

1. În asociere cu Stomacul, Splina și Intestinul Gros reglează digestia, asigurând asimilarea substanțelor nutritive și a lichidelor.
2. Separă Energia "pură" de Energia "impură" și le repartizează în organism. Energia "pură" curge în Splină și de acolo în alte organe, iar Energia "impură" – în deșeuri tari (Intestinul Gros) și se elimină cu urina (Vezica Urinară).
3. Intestinul Subțire împreună cu Inima formează loja energetică Foc, care emană Energia numită Shen (corespunde inteligenței, logicii, rațiunii, moralității, emoțiilor).

Acțiunea sindromal-energetică:

- reglarea meridianului extraordinar Du Mai – IG3 + V62;
- dispersia Focului în Inimă – IG5 + C8;
- dispersia Focului Inimii, care coboară în Focarul Inferior – IG2 + IG5 + C5 + C8 + VC3;
- dispersia Căldurii în Vezică – IG2 + C8 + VC3;
- armonizarea proceselor psihice (Foc al Inimii – IG3 + IG5).

Afectarea organului și traiectului intern al meridianului:

dureri periombilicale, distensie dureroasă a abdomenului inferior cu iradiere în testicule, diaree sau constipație, retenție a gazelor și a materiilor fecale.

Afectarea traiectului extern al meridianului:

durere, spasme musculare, tulburări de sensibilitate și distrofie de-a lungul meridianului; adenopatii cervicale și submandibulare; acufene, surditate; lăcrimare excesivă, paralizii de nervi oculari,




Fig.56. Punctele meridianului Intestin Subțire (IG).

strabism, dureri oculare; redoare cervicală, torticolis.

Afectarea conexiunilor energetice ale meridianului:

tulburări neurologice și psihice (euforie, depresie, agresivitate, epuizare, convulsii etc.); poliurie.

IG1 Shaoze

- punct antic Jing-dist. (elementul Metal);
- punct de intrare în meridianul IG;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular IG;
- punct sezonier al viscerului Fu Intestin Subțire (punct de tonifiere pentru perioada de iarnă și de dispersie pentru al 5-lea sezon).

Indicații

- punct specific în afecțiunile mucoaselor; apoplexie; epistaxis recidivant; patologia glandelor mamare (mastită, insuficiența lactației);
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (urechi);
- punct antialgic: glandele mamare (dureri cu tumefiere); cefalee (asistența de urgență);
- punct sindromal: Căldură și Vânt-Căldură (tonzilită; conjunctivită).

Localizarea

dorsum manus, la 0,1 cun înapoia unghiului unghial al auriculărilor, pe partea cubitală a acestuia.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • phalanx digitalis distalis V.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.digitalis dorsalis* (C8, Th1), ramură a *n.ulnaris* de la *plexus brachialis* • *aa.digitales palmares propriae*, *vv.digitales palmares*, *rete venosum dorsale manus*.

Tehnica

se punctează vertical – 0,1 cun; se punctează sub unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre articulația radiocarpiană. Tehnica de sângerare (febră; intoxicație alimentară; mastită; tonzilită; cefalee, zgomote în urechi; dureri în regiunea occipitală; sughiț; obstrucție nazală). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

locală.

IG2 Qiangu

- punct antic Ying (elementul Apă);
- punct sezonier al viscerului Fu Intestin Subțire (punct de tonifiere pentru perioada de primăvară și de dispersie pentru perioada de toamnă).

Indicații

- epistaxis; acufene; punct specific în scăderea acuității vizuale, miopie;
- punct antialgic: suprafața posterioară a gâtului (mai sus de nivelul vertebrei VII cervicale); gât (dureri și uscăciune); rect; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – suprafața medială a coapsei, cutia toracică;
- punct sindromal: Căldură și Vânt-Căldură în meridianul Intestin Subțire (cefalee, artrită); Căldură în Vezică (hematurie, cistită); Căldură Internă a Intestinului Subțire.




Fig.57

Localizarea

dorsum manus, pe marginea cubitală a auricularului, în fosetă, înaintea articulației metacarpofalangiene, la marginea pliului, când se închide pumnul; la granița pielii roșii și albe.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *phalanx proximalis (basis phalangis V)*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.digitalis dorsalis (C8, Th1)*, ramură a *n.ulnaris* de la *plexus brachialis* • *aa.digitales palmares propriae*, *vv.digitales palmares*, *rete venosum dorsale manus*.

Tehnica

se punctează vertical (0,3–0,5 cun), vârful acului va fi orientat de la fața cubitală spre cea radială a mâinii; se punctează sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului în sus, spre articulația radiocarpiană. Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jurul articulației, în jos, spre degetul mic.

IG3 Houxi

- punct antic Shu (elementul Lemn);
- punct de tonifiere al meridianului IG;
- punct de comandă al meridianului extraordinar Du Mai;
- punct sezonier al viscerului Fu Intestin Subțire (punct de tonifiere pentru perioada de vară și de dispersie pentru perioada de iarnă).




Fig. 58

Indicații

- punct specific în afecțiunile mucoaselor; afecțiunile urechilor (IG3 + TR10 + TR21) și ochilor; punct cu acțiune spasmolitică asupra mușchilor netezi și striati (IG3 + F2); tulburări de ritm cardiac; epistaxis; hiperhidroză; surmenaj, astenie, șoc psihic, tremurături ale mâinilor;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (gât, occipit);
- punct antialgic: regiunea facială și occipitală, regiunea gâtului (mai sus de nivelul vertebrei VII cervicale – IG3 + TR5); regiunea antebrăului; cap (cefalee; torticolis); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – gât, facies, suprafața medială a piciorului și articulației tibiotarsiene;
- punct sindromal: Căldură, Vânt-Căldură și Vânt-Frig în meridianul Intestin Subțire (conjunctivită; epistaxis; artrită); Vânt Intern (epilepsie, tremor, convulsii; cefalee); Umiditate a Veziculei Biliare.

Localizarea

dorsum manus, pe marginea cubitală a mâinii, înapoia articulației metacarpofalangiene a auricularului, în depresiunea formată când

se închide pumnul, la granița pielii roșii (Yang) și albe (Yin).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.abductor digiti minimi • m.flexor digiti minimi brevis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.digitalis dorsalis (C8, Th1)*, ramură a *n.ulnaris* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.ulnaris (C8, Th1) • aa.digitales palmares propriae (a. ulnaris), aa. et vv.metacarpeae dorsales.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–1 cun), acul fiind orientat de la marginea cubitală a mâinii spre cea radială (spre punctul MC8 Laogong în paralizie facială; spre punctul GI4 Hegu în caz de mialgie lombară); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului fiind orientat spre baza metacarpianului V. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în jos, spre degetul mic.

IG4 Wangu

- punct antic Yuan;
- punct sursă al meridianului IG.

Indicații

- tuse, astm bronșic; afectarea articulațiilor; surmenaj, neliniște, teamă;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (scapula);
- punct antialgic: vezicula biliară (colecistită cu icter); lombalgie; cap (cefalee legată de menstr – IG4 + R6); regiunea carpiană; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – facies, suprafața laterală a gâtului, articulațiile membrelor inferioare, suprafața medială a coapsei;
- punct sindromal: Căldură și Vânt-Căldură în meridianul Intestin Subțire; Umiditate-Căldură a Veziculei Biliare (colecistită).

Localizarea

regio carpalis posterior, pe marginea cubitală a mâinii, în depresiunea dintre extremitatea proximală a metacarpianului V și osul cu cârlig, la granița pielii roșii (Yang) și albe (Yin).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.abductor digiti minimi • lig.pisometacarpeum.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.dorsalis n.ulnaris (C8, Th1)* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n. ulnaris (C8, Th1) • r.carpeus dorsalis a.ulnaris, rete venosum dorsale manus.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,3–0,5 cun), vârful acului va fi orientat de la partea cubitală spre cea radială a mâinii; se înțeapă sub un unghi




Fig.59




Fig.60

ascuțit, vârful acului va fi orientat spre baza metacarpianului V. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

În jurul articulației.

IG5 Yanggu

- punct antic Jing-prox. (elementul Foc);
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular IG;
- punct sezonier al viscerului Fu Intestin Subțire (punct de tonifiere pentru al 5-lea sezon și de dispersie pentru perioada de primă-vară).

Indicații

- surditate; punct specific în caria dentară și procese inflamatorii localizate în maxilare; răs nervos, dezorientare în scopurile vieții;
- punct antialgic: dinți, obraji (mușcarea obrazului); nervul cubital; nervii intercostali; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/ miezul nopții) – suprafața laterală a gâtului, maxilar, bărbie, dinți; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: pumn (IG5) – gleznă (V60);
- punct sindromal: Căldură și Vânt-Căldură în meridianul Intestin Subțire.

Localizarea

regio carpalis posterior, pe marginea cubitală a articulației mâinii, în fosa situată între apofiza stiloidă cubitală și osul pisiform, pe pliu.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • tendo m.extensor carpi ulnaris • lig.collaterale carpi ulnare.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.dorsalis n.ulnaris (C8, Th1)* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n. radialis (C6,7,8) • r.carpeus dorsalis a.ulnaris, rete venosum dorsale manus.*

Tehnica

se punctează vertical (0,3–0,5 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre centrul palmei; se punctea-

ză spre punctul IG4 Wangu (tulburări psihice; tinitus; odontalgie).
Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în jurul articulației.

IG6 Yanglao

- punct Xi al meridianului IG.

Indicații

- afectarea nervului ulnar;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (ochi);
- punct Ben din perechea Biao-Ben: IG6 -V2;
- punct antialgic: lombalgie; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ochi, articulațiile membrelor inferioare.

Localizarea

regio antebrachialis posterior, la 1 cun deasupra IG5 Yanggu, în șanțul format de partea radială a apofizei stiloide cubitale, când palma este flectată pe antebraț.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • tendo m.extensor carpi ulnaris • tendo m.extensor digiti minimi.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii posterior (C5-8)*, ramură a *n.radialis* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.radialis (C6,7,8)* • *rete carpi dorsale (a.interossea posterior)*, *rete venosum dorsale manus*.

Tehnica

se punctează vertical (0,5 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre MC6 Neiguan; se punctează oblic, subcutanat, acul va fi introdus de-a lungul cubitusului, în imediata apropiere de suprafața lui; se punctează oblic, spre punctul C5 Tongli (isterie; palpitații; menstrare neregulate). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în sus, de-a lungul osului ulnar și în jos, spre articulație.

IG7 Zhizheng

- punct Lo al meridianului IG.

Indicații

- ateroscleroză cerebrală; punct specific în afecțiunile nervilor periferici ai mâinii; surmenaj, emotivitate excesivă, depresie, anxietate, regret;
- punct antialgic: antebraț, braț; ochi; dinți (pioree alveo-dentară); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/ miezul nopții) – maxilar, bărbie;
- punct sindromal: Căldură Externă; punct important în tratamentul

tiroiditei (Flegmă) – IG7 + GI6.

Localizarea

regio antebrachialis posterior, pe marginea cubitală a antebrațului, la 5 cun deasupra IG5 Yanggu, pe linia ce unește IG5 Yanggu cu IG8 Xiaohai.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • m.flexor carpi ulnaris • m. extensor carpi ulnaris • m.flexor digitorum profundus • membrana interossea antebrachii.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii medialis* (C8, Th1) de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.radialis* (C6,7,8) • *a.interossea posterior*, v. *basilica*.

Tehnica

se punctează vertical (0,5–0,8 cun). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în sus și în jos de-a lungul meridianului.




Fig.61

IG8 Xiaohai

- punct antic He (elementul Pământ);
- punct de dispersie al meridianului IG;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular IG;
- punct sezonier al viscerului Fu Intestin Subțire (punct de tonifiere pentru perioada de toamnă și de dispersie pentru perioada de vară).

Indicații

- surditate; hemiplegie; punct specific în edem pulmonar; inflamația ganglionilor cervicali și axilari; epilepsie, iritabilitate, agitații;
- punct antialgic: degetul mic al mâinii; nervul cubital; dinți; intestin (dureri spasmodice); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ochi; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: cot (IG8) – genunchi (V40);
- punct sindromal: Umiditate-Căldură sau Vânt în regiunea gâtului (parotidită; limfadenită cervicală).

Localizarea

regio cubitalis posterior, în șanțul cubital, între olecran și epicondilul humeral intern, cotul fiind flectat la 90 grade.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia brachii • sulcus nervi ulnaris.



Fig. 62




Fig. 63

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus brachii medialis* (C8, Th1) de la *plexus brachialis* • *a.ulnaris*, *r.a.brachialis*, *vv.ulnare* *vv.brachiales*.

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,3–0,5 cun (acul va fi manipulat cu precauție, pentru a evita lezarea nervului); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre umăr. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

locală, în jurul cotului.

IG9 Jianzhen

Indicații

- surditate, acufene; punct specific în patologia mușchilor mâinii;
- punct antialgic: regiunea mandibulei (nevralgii); regiunea omoplatului, braț (durere la rotația internă); cap (cefalee în meningencefalite).

Localizarea

regio brachialis posterior, la 1 cun deasupra extremității pliului axilar posterior, posterior și inferior de articulația scapulo-humerală.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *fascia deltoidea* • *m.deltoideus* • *m.teres major* • *m.triceps brachii* (*caput longum*) • *tendo m.latissimus dorsi*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus brachii medialis* (C8, Th1) de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.axillaris* (C5,6), *n.subscapularis* (C6,7) • *a.circumflexa humeri posterior*, *a. et vv.circumflexae scapulae*, *vv.brachiales*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–1 cun). Moxibustie 5–20 minute (în operele

antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

locală și spre umăr.

IG10 Naoshu

- punct de inserție al meridianului tendino-muscular IG;
- punct de încrucișare a meridianelor IG, Yang Wei Mai, Yang Qiao Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Wei Mai, Yang Qiao Mai.

Indicații

- hipertensiune arterială;
- punct antialgic: regiunea cervico-mandibulară și scapulo-brahială, braț și antebraț (dureri cu parestezii), articulația cotului (dureri cu senzație de "furnicături"), blocul umărului – IG10 + E38; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – suprafața laterală a gâtului; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: umăr (IG10) – șold (V36).




Fig.64

Localizarea

regio deltoidea, în fosa de sub spina omoplatului, deasupra punctului IG9 Jianzhen, pe verticala liniei axilare posterioare.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia deltoidea • m.deltoideus • m.infraspinatus.

Inervația • Vascularizația

pielea – nn.supraclaviculares laterales (posteriores) (C3,4) de la plexus cervicalis; n.cutaneus brachii lateralis superior (C5,6), ramură a n.axillaris de la plexus brachialis; mușchii – n.axillaris (C5,6), n.suprascapularis (C4,5,6) • a. et vv.circumflexae humeri posteriores, a. et vv.circumflexae scapulae, a. et vv.suprascapulares.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–1 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în jos, spre membrele inferioare. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

locală.

IG11 Tianzong

Indicații

- limitarea mișcărilor brațului (contractură);
- punct antialgic: nervii intercostali;

- punct sindromal: stagnarea Qi în cutia toracică.

Localizarea

regio scapularis, în fosa subspinoasă, la nivelul apofizei spinoase Th4, sub punctul IG12 Bingfeng, la o distanță egală de IG10 Naoshu și IG9 Jianzhen, formând cu ele un triunghi.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • fascia infraspinata • m.infraspinatus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r.dorsalis n. thoracici V*; mușchii – *n.suprascapularis (C4,5,6) • a. et vv.suprascapulares, a. et vv.circumflexae scapulae.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–1 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului inițial într-o parte, apoi în a doua, a treia și a patra, după fiecare inserție retrăgându-l fără a-l scoate din piele. Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

în sus și în jos, pe marginea scapulei.

IG12 Bingfeng

- punct de încrucișare a meridianelor IG, VB, TR, E, GI.

Indicații

- limitarea mișcărilor de abducție a brațului;
- punct antialgic: articulația umărului; nervul cubital; nervii intercostali.

Localizarea

regio scapularis, în fosa supraspinoasă, la mijlocul marginii superioare a spinei omoplatului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • m.supraspinatus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.supraclaviculares laterales (posteriores) (C3,4)* de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n.accessorius, nn.cervicales (C2,3,4), n.suprascapularis (C4,5,6) • a. et vv. suprascapulares.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–0,8 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre articulația umărului. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

spre regiunea cervicală și umăr.

IG13 Quyuan

Indicații

- paralizia membrelor superioare;
- punct antialgic: suprafața posterioară a centurii scapulare și occipit; nervul cubital.

Localizarea

regio scapularis, pe partea internă a fosei supraspinoase, la 1/2 distanței între IG10 Naoshu și apofiza spinoasă a vertebrei toracale II.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • m.supraspinatus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.supraclaviculares laterales (posteriores)* (C3,4) de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n.accessorius*, *nn.cervicales* (C2,3,4), *n.suprascapularis* (C4,5,6) • *a. et vv.transversae colli*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–0,8 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului spre coloana vertebrală. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

spre regiunea cervicală.

IG14 Jianwaishu

Indicații

- senzație de rece în regiunea omoplatului; torticolis;
- punct antialgic: suprafața posterioară a umărului și a centurii scapulare;
- punct sindromal: Frig (regiunea umărului și centurii scapulare).

Localizarea

regio scapularis, la 3 cun lateral de marginea inferioară a apofizei spinoase a vertebrei toracale I, pe linia ce trece prin marginea internă a omoplatului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • m.levator scapulae • m.rhomboideus • m.serratus posterior superior • fascia thoracolumbalis • m.iliocostalis cervicis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.medialis r.dorsalis n.thoracici I*; mușchii – *n.accessorius*, *nn.cervicales* (C2,3,4), *n.dorsalis scapulae* (C4-7), *nn.spinales* (Th1-6) • *a. et vv.transversae colli*.

Tehnica

se punctează vertical (0,5–0,8 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, orientând acul spre articulația umărului. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

spre regiunea superioară a spatelui și spre umăr.

IG15 Jianzhongshu

Indicații

- hemoptizie; bronșită, astm bronșic;
- punct antialgic: regiunea cervico-occipitală și scapulară; cap (cefalee cu amețeli cauzată de creșterea tensiunii arteriale și intracraniene);
- punct sindromal: Căldură în Plămâni.

Localizarea

regio scapularis, la 2 cun lateral de apofiza spinoasă C7, pe marginea trapezului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • m.rhomboideus • m.levator scapulae • m.serratus posterior superior • m.longissimus cervicis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.lateralis r.dorsalis n.cervicalis VI*; mușchii – *n.accessorius, nn.cervicales (C2,3,4), n.dorsalis scapulae (C4-7), nn.spinales (Th1-4), nn.spinales (C2-8) • a. et vv.transversae colli.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–0,8 cun); se înțeapă spre punctul V11 Dazhu (torticolis). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

lateral, spre partea superioară a umărului.

IG16 Tianchuang

- punct de reunire centrală a meridianelor distincte C/IG;
- punct "fereastra cerului".

Indicații

- surditate, acufene; afonie acută, punct specific în inflamarea gâtului; torticolis;
- punct antialgic: regiunea auriculară și occipitală; suprafața posterioară a centurii scapulare și regiunea superioară a omoplatului; nervii intercostali;
- punct sindromal: Umiditate-Căldură a gâtului.

Localizarea

regio sternocleidomastoidea, pe marginea posterioară a mușchiului sternocleidomastoidian, înapola GI18 Futu cu 0,5 cun, la nivelul mărunții lui Adam.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.platysma • m.sternocleidomastoideus • m.levator scapulae • m.splenius cervicis • m.splenius capitis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.supraclaviculares* (C3,4) de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n.facialis*, *n.dorsalis scapulae* (C4-7) • *a.cervicalis ascendens*, *a.carotis*, *v.jugularis externa*, *a. et vv.transversae colli*.

Tehnica

se punctează vertical (0,5–0,8 cun). Punctarea se va efectua în poziția culcat pe spate a bolnavului, capul va fi întors pe o parte, evitând lezarea arterei carotide. Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

de-a lungul gâtului și spre umăr.

IG17 Tianrong

- punct "fereastra cerului";
- punct de încrucișare a meridianelor IG, TR.

Indicații

- disfagie; punct specific în trismus;
- punct antialgic: regiunea cervico-occipitală, gât (mialgii); urechi; dinți (incisivi);
- punct sindromal: Umiditate-Căldură a gâtului (tonzilită, faringită).




Fig.65

Localizarea

regio sternocleidomastoidea, posterior de unghiul mandibulei, pe marginea anterioară a mușchiului sternocleidomastoidian, la nivelul E6 Jiache.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *lamina superficialis fasciae colli* • *m.sternocleidomastoideus* • *venter posterior m.digastrici* • *m.stylohyoideus*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.auricularis magnus* (C3) de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n.accessorius*, *nn.cervicales* (C2,3), *n.facialis* • *a.carotis interna*, *v.jugularis externa*, *a. et vv.auriculares posteriores*.

Tehnica

se punctează vertical (0,5–0,8 cun), perpendicular pe fața anterioară a mușchiului sternocleidomastoidian (atenție – artera carotidă). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

de-a lungul gâtului și spre ureche.

IG18 Quanliao

- punct de ieșire din meridianul IG;
- punct de reunire a meridianelor tendino-musculare Yang ale membrilor inferioare;

- punct de încrucișare a meridianelor IG, TR.

Indicații

- afecțiunile feței; punct specific în trismus;
- punct antialgic: nervul trigemen, dinți (caninii superiori); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – haluce, articulația tibiotarsiană;
- punct sindromal: Vânt, Frig sau Căldură în regiunea feței (paralizie facială, neuralgie de trigemen).

Localizarea

regio parotideomasseterica, în fosetă, la marginea inferioară a osului malar, pe verticala ce trece prin comisura palpebrală laterală.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.zigomaticus major • fascia masseterica • m.masseter.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.zygomaticofacialis n.zygomatici*, ramuri ale *n.infraorbitalis (n.trigeminus)*; mușchii – *n.facialis, n.trigeminus • a.transversa faciei, plexus pterygoideus.*

Tehnica

se punctează vertical (0,3–0,5 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în jos; se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre punctul GI20 Yingxiang. Moxibustie 3 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

locală, spre nas și gură.

IG19 Tinggong

- punct de încrucișare a meridianelor IG, VB, TR.

Indicații

- punct specific în afecțiunile urechii (surditate, acufene); paralizie facială; trismus; halucinații auditive;
- punct antialgic: membrele superioare, suprafața posterioară a centurii scapulare; dinți (caninii superiori);
- punct sindromal: Căldură și Vânt-Căldură în regiunea urechii (IG19 + IG3).

Localizarea

regio parotideomasseterica, între marginea anterioară a tragusului și marginea posterioară a articulației temporomandibulare, în foseta formată la deschiderea gurii.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia parotidea • glandula parotis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.auricularis magnus* (C3) de la *plexus cervicalis* • *a. et vv.temporales superficiales*.

Tehnica

se înțeapă vertical (1–1,2 cun). Moxibustie 5 minute.

Senzația

când se punctează profund, senzațiile iradiază în urechea internă; apariția unei dureri acute indică înțeparea osului, fiind necesară o ușoară retragere a acului.

I.7. Meridianul Vezică Urinară (V)

Meridianul Vezică Urinară este de natură Yang, centrifug, pereche, conține 67 puncte (*fig.66–80*).

Relațiile energetice:

1. În cadrul marii circulații energetice este precedat de meridianul Intestin Subțire și urmat de meridianul Rinichi (IG-V-R).
2. În cuplu cu meridianul Rinichi realizează loja energetică Apă (V-R). În cadrul ciclului celor 5 elemente este stimulat de GI și inhibat de E.
3. În cuplu cu meridianul Intestin Subțire formează axul energetic Tai Yang (V-IG).
4. După regula "miezul zilei/miezul nopții" este cuplat cu meridianul Plămân (V-P).
5. După regula "soț/soție" este cuplat cu meridianul Trei Focare (V-TR).

Funcțiile energetice:

1. Acumularea și eliminarea reziduurilor lichide.
2. Repartizarea lichidelor în cadrul organismului (umectarea pielii, oaselor, tendoanelor, creierului etc.).
3. Prin intermediul punctelor Shu, amplasate pe Meridianul Vezică, influențează activitatea tuturor organelor interne.
4. Exerciță o influență importantă asupra activității psihice. Împreună cu Rinichii formează loja energetică Apă, care emană Energia numită Zhi (corespunde voinței, spiritului de decizie).

Acțiunea sindromal-energetică:

- reglarea organelor interne Zang-Fu (sunt indicate punctele Shu-post. în asociere cu alte puncte în funcție de organul afectat și sindromul energetic);
- armonizarea sistemului nervos (această influență este posibilă datorită conexiunilor energetice prin intermediul Vezică – Rinichi – Vas Guvernator; sunt indicate punctele localizate în regiunea cefalică în asociere cu punctele distale – V60 Kunlun, V62 Shenmai, V67 Zhiyin);




Fig.66. Punctele meridianului Vezică Urinară (V).

- reglarea meridianului extraordinar Yang Qiao Mai – V62 + IG3;
- dispersia Vântului Intern (sunt indicate asocierile de puncte localizate în regiunea cefalică cu cele distale – V7 + V60 etc);
- eliminarea Vântului Extern – V2 + V10 + V12 + VG23 + P7 + GI4;
- dispersia Căldurii în Sânge – V40 + GI11 + MC9;
- dispersia Căldurii în Vezică – V32 + V60 + V66 + C8 + C3;
- reducerea Umidității și Flegmei – V20 + V21 + V49 + V50 + RP3 + E40;
- diminuarea Umidității în Vezică – V28 + RP6 + RP9 + VC3; V28 + V32 + V57;
- dinamizarea Qi (Focarul Superior – V67 + V13 + V15; Focarul Mediu – V67 + V18 + V20 + V21; Focarul Inferior – V67 + V31 + V34 + V57);
- dinamizarea Xue – V17 + V20 + RP4 + RP1;
- fortificarea Xue – V17 + V20 + V43 + E36;
- fortificarea Yin-Qi – V23 + R3 + R6 + R10; V23 + VC4 + R3;
- fortificarea Yang-Qi – V23 + R3 + R7 + VG4; V64 + VG4;
- fortificarea Jing – V23 + V20 + V18 + R6;
- reglarea metabolismului hidric – V22 + V23 + V39;
- armonizarea proceselor psihice (în tulburările psihice sunt indicate punctele Shu-post., punctele Shu psiho-dorsale în asociere cu punctele meridianelor extraordinare Ren Mai, Du Mai și punctele Yuan; punctele meridianului Vezică V1 Jingming, V62 Shenmai etc. sunt efective în tulburările somnului).

Afectarea organului și traiectului intern al meridianului:

spasme în organele urogenitale, disurie, hematurie, piurie, poliurie, urină tulbure; edemațiarea organelor urogenitale, incontinență sau retenție urinară, anurie, enurezis, cistită.

Afectarea traiectului extern al meridianului:

durere, tulburări de sensibilitate, tumefiere, tulburări distrofice și alte semne patologice de-a lungul traiectului meridianului; tulburări oftalmologice (uscăciune conjunctivală, lăcrimare, bleforospasm etc.); tulburări ORL (rinoree, epistaxis, edem, obstrucție nazală); cefalee fronto-occipitală, redoare de ceafă, crampe musculare; lombalgie, sciatică; astenie.

Afectarea conexiunilor energetice ale meridianului:

tulburări ale organelor cutiei toracice, abdomenului, bazinului mic, hemoroizi; parazitoză intestinală; tulburări psihice (iritabilitate, neliniște, insomnie, teamă, indecizie, lipsă de vigoare sexuală etc.).

V1 Jingming

- punct de intrare în meridianul Vezica Urinară;
- punct de reunire centrală a meridianelor distincte C/IG și RP/E;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular V;
- punct "nod" al axului energetic Tai Yang;

- punct de încrucișare a meridianelor V, IG, E;
- punct de ieșire al meridianului extraordinar Yin Qiao Mai;
- punct al meridianului extraordinar Chong Mai, Yang Qiao Mai și Yin Qiao Mai.

Indicații

- afectarea ochilor (miopie, retinită etc.); halucinații vizuale (schizofrenie);
- punct Biao din perechea Biao-Ben: V1-V59;
- punct antialgic: comisura palpebrală medială, globii oculari;
- punct sindromal: patologia ochilor (Vânt Extern, Vânt-Căldură, Foc al Ficatului).

Localizarea

regio orbitalis, pe marginea internă a fosei orbitale, la 2 mm deasupra unghiului intern al ochiului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • commisura palpebrarum medialis • m. orbicularis oculi.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n. infratrochlearis*, ramură a *n. ophthalmicus (n. trigeminus)*
• *a. et v. angularis, a. dorsalis nasi.*

Tehnica

se va apăsa cu vârful degetului unghiul intern al ochiului și se va puncta vertical (0,3–1 cun) cu maximă atenție (vor fi utilizate ace subțiri). În operele antice moxibustia acestui punct este interzisă.

Senzația

în jurul globului ocular.

V2 Zanzhu

Indicații

- albuminurie la gravide; staza venoasă cerebrală; afectarea ochilor; rinită și sinusită; coșmaruri, insomnie, halucinații, depresie;
- punct Biao din perechea Biao-Ben: V2-IG6;
- punct antialgic: nervul trigemen (ramura I); globii oculari; cap (cefalee cu senzație de bufeuri);
- punct sindromal: Vânt în regiunea feței (nevralgie; patologia ochilor; paralizie facială, tic facial).




Fig. 67

Localizarea

regio orbitalis, pe verticala lui V1 Jingming, la extremitatea internă a sprâncenei.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m. orbicularis oculi • m. corrugator supercilii • m. frontalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.supratrochlearis*, ramură a *n.opthalmicus* (*n.trigeminus*); mușchii – *n.facialis* • *a. et vv.supratrochleares*.

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,3–0,5 cun), orientând vârful acului spre V1 Jingming; se înțeapă sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului spre incizura supraorbitală; se înțeapă sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului de-a lungul sprâncenei. Moxibustie 1–3 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

în jurul globului ocular, locală.

V3 Meichong

Indicații

- sinusite; epilepsie;
- punct antialgic: nervul trigemen (ramura I), cap (cefalee în partea anterioară a capului);
- punct sindromal: Vânt în regiunea feței.

Localizarea

regio frontalis, pe verticala lui V1 Jingming și V2 Zanzhu, la 0,5 cun deasupra liniei anterioare de inserție a părului.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *m.frontalis*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.medialis n.supraorbitalis*, ramură a *n.opthalmicus* (*n.trigeminus*); mușchii – *n.facialis* • *a. et vv.supraorbitales*, *a. et vv.supratrochleares*.

Tehnica

se înțeapă subcutanat (0,3–0,5 cun), vârful acului va fi orientat în sus. Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jos, spre regiunea frontală.

V4 Quchai

Indicații

- epistaxis; tulburările circulației lichiorului; ambliopie;
- punct antialgic: vertex, occipit; fruntea; nervul trigemen;
- punct sindromal: Căldură în regiunea frontală a capului.

Localizarea

regio frontalis, la 1,5 cun lateral de VG24 Shenting și 0,5 cun mai sus de linia anterioară de inserție normală a părului.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *m.frontalis*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.medialis n.supraorbitalis*, ramură a *n.opthalmicus (n. trigeminus)*; mușchii – *n.facialis • a. et vv.supraorbitales, a. et vv. supratrochleares*.

Tehnica

se înțeapă subcutanat (0,3–0,5 cun), vârful acului va fi orientat în sus; se înțeapă sub unghi ascuțit, spre punctul VB15 Linqi (epistaxis; afectarea ochilor). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în jos, spre regiunea frontală.

V5 Wuchu

Indicații

- rinită; crize convulsive;
- punct antialgic: regiunea spatelui, vertebrele cervicale și toracale superioare; regiunea anală; dinți (afectarea incisivilor și caninilor superiori);
- punct sindromal: Vânt Intern (epilepsie); Vânt-Căldură.

Localizarea

regio frontalis, la 0,5 cun posterior de V4 Quchai, la 1 cun de inserția normală a părului și 1,5 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.frontalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.medialis n.supraorbitalis*, ramură a *n.opthalmicus (n. trigeminus)*; mușchii – *n. facialis • a. et vv.supraorbitales, a. et vv. supratrochleares*.

Tehnica

se punctează aproape orizontal (0,3–0,5 cun), orientând vârful acului în jos ori în sus; se înțeapă spre punctul VB8 Shuaigu (indicat în cefalee, epilepsie). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în jos, spre regiunea frontală.

V6 Chengguang

Indicații

- rinită, anosmie; cheratită, cataractă; vertij, șoc; stres, depresie;
- punct antialgic: cap (cefalee cauzată de o stare de șoc); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – centura scapulară, cutia toracică;
- punct sindromal: Căldură în regiunea cefalică.

Localizarea

regio frontalis, la 2,5 cun posterior de linia anterioară de inserție a părului și 1,5 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • galea aponeurotica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.medialis n.supraorbitalis*, ramură a *n.opthalmicus (n. trigeminus)*, *n.occipitalis major (C2)*; mușchii – *n.facialis • a. et vv. temporalis superficiales*.

Tehnica

se punctează aproape orizontal (0,3–0,5 cun), orientând vârful acului în sus ori în jos (anterior ori posterior). Moxibustie 2–5 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

în jos, spre regiunea frontală.

V7 Tongtian

Indicații

- rinită, sinusită; hemiplegie; cefalee cu vertij (hipertensiune arterială); epistaxis;
- punct antialgic: nervul trigemen; cap (cefalee cu senzație de greutate); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – centura scapulară, cutia toracică;
- punct sindromal: Vânt (Intern și Extern); Vânt-Căldură, Vânt-Frig (cefalee; paralizie facială); hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului (convulsii; cefalee în regiunea vertexului).

Localizarea

regio parietalis, la 4 cun posterior de linia anterioară de inserție a părului și 1,5 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • galea aponeurotica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis major (C2)*; mușchii – *n.facialis • a. et vv. temporalis superficiales, a. et vv.occipitales*.

Tehnica

se punctează subcutanat (0,3–0,5 cun) spre V8 Luoque. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în jos, spre regiunea frontală.

V8 Luoque

Indicații

- rinită, epistaxis; bronșită cronică; tinitus, vertij; depresie;
- punct antialgic: mușchiul trapez și occipital; cefalee (vârful capului);
- punct sindromal: Vânt și Căldură în regiunea cefalică.

Localizarea

regio parietalis, la 5,5 cun posterior de linia anterioară de inserție a părului și 1,5 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • galea aponeurotica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis major (C2)*; mușchii – *n.facialis • a. et vv. occipitales.*

Tehnica

se punctează oblic subcutanat (0,3–0,5) spre V9 Yuzhen (manipularea intensivă poate provoca lipotimie; în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jos, spre regiunea posterioară a capului.

V9 Yuzhen

Indicații

- miopie;
- punct antialgic: regiunea vertexului și occipitului; nervul trigemen; ochi; cefalee (în hipertonie);
- punct sindromal: Vânt în regiunea cefalică.

Localizarea

regio occipitalis, lateral de marginea superioară a protuberanței occipitale externe, la 1,3 cun lateral de linia mediană (VG17 Naohu).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • galea aponeurotica • m.semispinalis capitis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis major (C2)*; mușchii – *nn.cervicales (C2-8) • a. et vv.occipitales.*

Tehnica

se punctează subcutanat (0,3–0,5 cun) spre V10 Tianzhu (în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în sus, spre regiunea posterioară a capului și în jos, spre regiunea de inserție a părului.

V10 Tianzhu

- punct de reunire centrală a meridianelor distincte R/V;
- punct "fereastra cerului";
- punct de inserție al meridianelor tendino-musculare V și R;
- punct "marea Energiei" (împreună cu punctele VC17 Shanzhong

și E9 Renying).

Indicații

- convulsii; vertij; hipertensiune arterială; aritmie; sughiț; spasme digestive, vomă; punct specific vagotonic (tonifierea punctului tonifică vagusul); depresie, dezorientare, isterie, insomnie;
- punct antialgic: esofag; inimă (precordialgii cu tahicardie); simpatalgii, troncule; cefalee (occipit, vertex); algii psihogene;
- punct sindromal: Vânt Extern (afectarea ochilor și a gâtului), Vânt-Frig în regiunea cefalică; Insuficiența Qi a Rinichilor (diminuarea memoriei și procesului de concentrare).




Fig.68

Localizarea

regio cervicalis, la 1,3 cun lateral de linia mediană posterioară, pe linia de inserție a părului, pe partea externă a mușchiului trapez.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • m.splenius capitis • m.semispinalis capitis • m.obliquus capitis inferior.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis major (C3)*; mușchii – *n.accessorius, nn.cervicales (C2,3,4), rr.dorsales nn.cervicales (C2-7), n.suboccipitalis (C1) • a. et vv.occipitales.*

Tehnica

se înțeapă oblic (0,5–1 cun), vârful acului va fi orientat spre orbita oculară de pe partea contralaterală; se înțeapă spre punctul VG15 Yamen (cefalee). Moxibustie 5–15 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

În sus, spre regiunea posterioară a capului și regiunea temporală; în jos, spre gât.

V11 Dazhu

- punct de încrucișare a meridianelor V, IG;
- împreună cu punctele E37 Shangjuxu și E39 Xiajuxu formează "marea meridianelor".

Indicații

- afecțiuni bronho-pulmonare; punct specific pentru sistemul osos și în afecțiuni ale sângelui; controlează metabolismul hidroelectrolitic, acidobazic și mineral; hipertermie; scăderea forțelor de apărare ale organismului; depresie, obnubilare, hipersomnolență, dorință de sinucidere, logoree;
- punct antialgic: regiunea occipitală și spate (dureri, ticuri, contrac-turi); articulația genunchiului (artrite cu limitarea flexiei și exten-

siei); algiile cauzate de afecțiunile osoase; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – articulațiile membrelor superioare;

- punct sindromal: Vânt Extern, Vânt Frig, Vânt-Căldură; Insuficiența Qi a Plămânilor (astm bronșic, bronșită); Insuficiența Yin-Qi a Plămânilor; acumularea Flegmei-Frig sau Flegmei-Căldură în Plămâni; stagnarea Qi a Plămânilor (dispnee, senzație de tensiune în cutia toracică).

Localizarea

regio vertebralis, la 1,5 cun lateral de apofiza spinoasă Th1.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • m.rhomboideus minor • m.serratus posterior superior • fascia thoracolumbalis • m.splenius cervicis • m.longissimus thoracis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r.dorsalis n.thoracici I*; mușchii – *n.accessorius, nn.cervicales (C2,3,4), n.dorsalis scapulae (C4,5), nn.intercostales (Th1-4), rr.dorsales nn.thoracici (Th1-12) • r.dorsalis a.intercostalis posterior I, a. et vv.intercostales suprema, vv.intercostales posteriores.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–0,8 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre V12 Fengmen. Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

în sus, spre regiunea cervicală și spre umăr.

V12 Fengmen

- punct de încrucișare a meridianelor V, VG;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular V.

Indicații

- acnee și abcese localizate în regiunea spatelui; hipertermie;
- punct antialgic: regiunea cervico-occipitală; gât (dureri și tumefiere); nervii intercostali; spate (dureri cu senzație de căldură); abdomen (dureri cu balonare);
- punct sindromal: fazele inițiale de invazie a Vântului-Frig și Vântului-Căldură (cefalee; rinită).

Localizarea

regio vertebralis, la 1,5 cun lateral de apofiza spinoasă Th2 (în spațiul intercostal II).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • m.rhomboideus major • m.serratus posterior superior • fascia thoracolumbalis • m.splenius cervicis • m.longissimus thoracis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r.dorsalis n.thoracici II*; mușchii – *n.accessorius, nn.cervicales (C2,3,4), n.dorsalis scapulae (C4,5), nn.intercostales (Th1-4), rr.dorsales nn.cervicales (C2-5), rr.dorsales nn.thoracici (Th1-12) • r.dorsalis a.intercostalis posterior II, vv.intercostales posteriores, a. et vv.transversae colli.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre V13 Feishu. Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

În sus, spre regiunea cervicală și spre umăr.

V13 Feishu

- punct de asentiment al meridianului P.

Indicații

- afecțiuni ale organelor respiratorii; punct specific vagotonic (pentru regiunea toracică);
- punct antialgic; centura scapulară, dureri de-a lungul coloanei vertebrale; piele (dureri și prurit); nervii intercostali; inimă (precordialgii cauzate de tuse), plămâni, pleură, bronhii; coaste (dureri cu iradiere în coloana vertebrală);
- punct sindromal: Vânt-Căldură, Vânt-Uscăciune și Vânt-Frig al Plămânilor; Căldură a Plămânilor (bronșită, pneumonie); Insuficiența Qi a Plămânilor; stagnarea Qi a Plămânilor; Insuficiența Yin-Qi a Plămânilor.

Localizarea

regio vertebralis, la 1,5 cun lateral de apofiza spinoasă Th3 (în spațiul III intercostal).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • m.rhomboideus major • m.serratus posterior superior • fascia thoracolumbalis • m.longissimus thoracis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis posterior n. thoracici III*; mușchii – *n.accessorius, nn.cervicales (C2,3,4), n.dorsalis scapulae (C4,5), nn.intercostales (Th1-4), rr.dorsales nn.thoracici (Th9-12) • r.spinalis, r.dorsalis et r.cutaneus medialis aa.intercostales posteriores III, vv.intercostales posteriores III.*

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat spre V14 Jueyinshu sau spre coloana vertebrală. Tehnica de sângerare (afecțiuni ale organelor respiratorii; dureri în spate și în regiunea lombară; prurit). Moxibustie 10–15 minute.

Senzația

spre umăr și cutia toracică.

V14 Jueyinshu

- punct de asentiment al meridianului MC.

Indicații

- epistaxis; rău de mare (de avion); patologia inimii (aritmie); insomnie, depresie, neurastenii;
- punct antialgic: nervii intercostali; inimă (dureri asociate aritmiei); dinți (molari); cefalee (vârful capului).

Localizarea

regio vertebralis, la 1,5 cun lateral de apofiza spinoasă Th4 (în spațiul IV intercostal).

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *m.trapezius* • *m.rhomboideus major* • *fascia thoracolumbalis* • *m.longissimus thoracis*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r.dorsalis n. thoracici IV*; mușchii – *n.accessorius*, *nn.cervicales (C2,3,4)*, *n.dorsalis scapulae (C4,5)*, *rr.dorsales nn. thoracici (Th1-12)* • *r.spinalis*, *r.dorsalis et r.cutaneus medialis aa.intercostales posteriores IV*, *vv.intercostales posteriores IV*.

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat spre V15 Xinshu sau spre coloana vertebrală. Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

locală sau în părțile laterale.

V15 Xinshu

- punct de asentiment al meridianului C.

Indicații

- afecțiuni ale inimii; esofagospasm; epistaxis; vomă ("marele punct al vărsăturilor"); inhibiție la copii, neurastenii, memorie slabă, isterie, delir;
- punct Biao din perechea Biao Ben: V15 – C7;
- punct antialgic: dinți (incisivi); nervii intercostali; inimă; anus;
- punct sindromal: Insuficiența Qi a Inimii, Insuficiența Yang-Qi a Inimii, Insuficiența Yin-Qi a Inimii, Insuficiența Xue a Inimii; Foc și Flegmă a Inimii (confuzie mentală, delir, depresie); stagnarea Qi și Xue a Inimii (depresie psihică; cardialgie).

Localizarea

regio vertebralis, la 1,5 cun lateral de apofiza spinoasă Th5 (în spațiul V intercostal).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • m.rhomboideus major • fascia thoracolumbalis • m.longissimus thoracis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r.dorsalis n.thoracici V*; mușchii – *n.accessorius, nn.cervicales (C2,3,4), n.dorsalis scapulae (C4,5), rr.dorsales nn.thoracici (Th1-12) • r.spinalis et r.dorsalis aa.intercostales posteriores V, vv. intercostales posteriores V.*

Tehnica

se punctează sub un unghi ascuțit (0,5-0,8 cun), vârful acului va fi orientat spre V16 Dushu sau spre coloana vertebrală. Moxibustie 3 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

locală, în părțile laterale și puțin în jos; în interiorul cutiei toracice.

V16 Dushu

- punct de asentiment general al Vezicii Urinare.

Indicații

- colită; alopecie; prurit;
- punct antialgic: coaste; esofag, inimă, abdomen; lombalgie;
- punct sindromal: stagnarea Xue în Inimă (cardialgie).

Localizarea

regio vertebralis, la 1,5 cun lateral de apofiza spinoasă Th6 (în spațiul VI intercostal).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • fascia thoracolumbalis • m.longissimus thoracis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r.dorsalis n.thoracici VI*; mușchii – *n.accessorius, nn.cervicales (C2,3,4), rr.dorsales nn.thoracici (Th1-12) • r.spinalis et r.dorsalis aa.intercostales posteriores VI, vv. intercostales posteriores VI.*

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat spre V17 Geshu ori spre coloana vertebrală. Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

locală, în părțile laterale, în interiorul cutiei toracice.

V17 Geshu

- punct de asentiment al diafragmei;
- punct de centro-reunire generală (reunirea Yin și Xue).

Indicații

- punct specific pentru hemopoleză; afecțiunile inimii (stenocardie); afectarea pielii (psoriazis, eczemă, urticarie – V17 + RP10 + GI11); somnolență;
- punct antialgic: esofag (dureri spasmodice), intestin; inimă (stenocardie); oase;
- punct sindromal: Insuficiența Xue (Inimă, Ficat, Splina etc.); stagnarea Xue; stagnarea Qi în cutia toracică și regiunea diafragmei; Căldura Xue (diferite hemoragii); perversiunea fluxului Qi al Stomacului (sughit, regurgitații, greață, vomă).

Localizarea

regio vertebralis, la 1,5 cun lateral de apofiza spinoasă Th7 (în spațiul VII intercostal).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • m.latissimus dorsi • fascia thoracolumbalis • m.longissimus thoracis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r.dorsalis n.thoracici VII*; mușchii – *n.accessorius, nn.cervicales (C2,3,4), n.thoracodorsalis (C6,7,8), rr.dorsales nn.thoracici (Th1-12) • r.spinalis et r.dorsalis aa.intercostales posteriores VII, vv.intercostales posteriores VII.*

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat spre V18 Ganshu ori spre coloana vertebrală (punctarea profundă poate provoca lipotimie). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

în spate, în părțile laterale, în interiorul cutiei toracice.

V18 Ganshu

- punct de asentiment al meridianului F.

Indicații

- hepatită, ciroză hepatică; anemie (V18 + RP10 + RP9); atrofie optică (V18 + V23 + VB20); profilaxia gripei; emotivitate, depresie, isterie, insomnie, coșmaruri;
- punct Biao din perechea Biao-Ben: V18–F4;
- punct antialgic: suprafața laterală a toracelui (dureri cauzate de tuse); cap, nas; nervii intercostali; stomac (dilatarea), ficat (colică); hemoroizi (dureri cu hemoragie); cefalee (în special în afecțiuni alergice);
- punct sindromal: Insuficiența Qi sau Xue a Ficatului; stagnarea Qi a Ficatului; Umiditate-Căldură a Veziculei Biliare și Ficatului (otită medie; colecistită; eczemă); Vânt Intern.

Localizarea

regio vertebralis, la 1,5 cun lateral de apofiza spinoasă Th9 (în spațiul intercostal IX).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • m.latissimus dorsi • fascia thoracolumbalis • m.longissimus thoracis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r.dorsalis n.thoracici VIII*; mușchii – *n.accessorius, nn. cervicales (C2,3,4), n.thoracodorsalis (C6,7,8), rr.dorsales nn.thoracici (Th1-12) • r.spinalis et r.dorsalis aa.intercostales posteriores IX, vv.intercostales posteriores IX.*

Tehnica

se punctează sub un unghi ascuțit (0,5-0,8 cun), vârful acului va fi orientat spre V19 Danshu sau spre coloana vertebrală. Moxibustie 20-30 minute.

Senzația

în spate, în părțile laterale, în interiorul cutiei toracice.

V19 Danshu

- punct de asentiment al meridianului VB.

Indicații

- afectarea căilor biliare, ascaridoză biliară (V19 + E2 + VB34), hepatite; tumefierea și inflamația ganglionilor limfatici axilari; punct cu efect de relaxare a diafragmei (sughiț);
- punct antialgic: nervii intercostali; ficat (colică), căile biliare (V19 + TR6);
- punct sindromal: Foc al Veziculei Biliare; Umiditate-Căldură a Veziculei Biliare și Ficatului; Insuficiența Qi a Veziculei Biliare; pervertirea fluxului Qi a Stomacului (greață, vomă, regurgitații).

Localizarea

regio vertebralis, la 1,5 cun lateral de apofiza spinoasă Th10.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.latissimus dorsi • fascia thoracolumbalis • m.longissimus thoracis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis r.dorsalis n.thoracici IX*; mușchii – *nn. cervicales (C6, 7,8), rr.dorsales nn.thoracici (Th1-12) • r.spinalis et r.dorsalis aa.intercostales posteriores X, vv.intercostales posteriores X.*

Tehnica

se punctează sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat spre V20 Pishu sau spre coloana vertebrală. Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

în spate, în părțile laterale, în interiorul cutiei toracice.

V20 Pishu

- punct de asentiment al meridianului RP.

Indicații

- afecțiuni ale splinei și pancreasului, diabet; anemie; hemeralopie; punct specific cu acțiune antireflux (greață, vomă);
- punct Biao din perechea Biao-Ben: V20-RP6;
- punct antialgic: esofag; trahee; oase; lombalgie; ciclul menstrual (menstre neregulate);
- punct sindromal: Insuficiența Qi a Splinei, Insuficiența Yang-Qi a Splinei, Insuficiența Xue a Splinei; Umiditate-Flegmă (obezitate; edeme; confuzie mentală; senzație de greutate); stagnarea Qi în Focarul Mediu (distensie abdominală, durere); punct cu efect pronunțat de ascendență Qi a Splinei.

Localizarea

regio vertebralis, la 1,5 cun lateral de apofiza spinoasă Th11.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *m.latissimus dorsi* • *m.serratus posterior inferior* • *fascia thoracolumbalis* • *m.erector spinae* • *m.longissimus thoracis*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis r.dorsalis n.thoracici IX*; mușchii – *n.thoracodorsalis (C6,7,8)*, *nn.intercostales (Th10,11,12)*, *rr.dorsales nn.thoracici (Th1-12)* • *r.spinalis et r.dorsalis aa.intercostales posteriores XI*, *vv.intercostales posteriores XI*.

Tehnica

se punctează sub un unghi ascuțit (0,5-0,8 cun), vârful acului va fi orientat spre V21 Weishu sau spre coloana vertebrală. Moxibustie 20-30 minute.

Senzația

În spate, în părțile laterale.

V21 Weishu

- punct de asentiment al meridianului E.

Indicații

- afecțiuni ale stomacului, diaree cronică; hemeralopie; miros fetid al corpului; anorexie nervoasă;
- punct antialgic: suprafața posterioară a toracelui; stomac; lombalgie;
- punct sindromal: stagnarea Qi și a hranei în Stomac; pervertirea fluxului Qi a Stomacului (sughit, greață, vomă); Insuficiența Qi a Stomacului și Splinei; Flegmă în rezultatul Insuficienței Qi a Splinei.

Localizarea

regio vertebralis, la 1,5 cun lateral de apofiza spinoasă Th12.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.serratus posterior inferior • fascia thoracolumbalis • m. erector spinae • m. longissimus thoracis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis r.dorsalis n.thoracici X*; mușchii – *nn. intercostales (Th10,11,12), rr. dorsales nn.thoracici (Th1-12) • r. spinalis et r.dorsalis aa.subcostales, vv.subcostales.*

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,5-0,8 cun), orientând vârful acului spre V22 Sanjiaoshu sau spre coloana vertebrală. Moxibustie 20-30 minute.

Senzația

în spate, în părțile laterale.

V22 Sanjiaoshu

- punct de asentiment al meridianului TR.

Indicații

- afecțiuni cronice ale organelor interne; neurastenii, insomnie;
- punct antialgic: stomac; rinichi (dureri cronice în diateza urică); ficat și vezicula biliară;
- punct sindromal: Umiditate a Focarului Inferior (edem, disurie, retenție urinară).

Localizarea

regio vertebralis, la 1,5 cun lateral de apofiza spinoasă L1.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.serratus posterior inferior • fascia thoracolumbalis • m. erector spinae • m. longissimus thoracis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis r.dorsalis n.thoracici X*; mușchii – *nn. intercostales (Th10,11,12), nn.lumbales (L1-5) • r.dorsalis a.lumbalis I, vv. lumbales I.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre V23 Shenshu. Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

în spate, în părțile laterale.

V23 Shenshu

- punct de asentiment al meridianului R.

Indicații

- afecțiunile rinichilor; edeme (V23 + E28 + RP9); spermatooree; hemoroizi; dismenoree, leucoree; diaree cronică; patologia oaselor și articulațiilor; afectarea urechii externe și interne; astenie,




Fig. 69




Fig. 70

depresie; impotență;

- punct Biao din perechea Biao-Ben: V23–R8; V23–R7; V23–R6; V23–R2;
- punct antialgic: rinichi (colică); intestin (dureri asociate scaunelor lichide cotidiene); ovare, vagin (algii, prurit); hemoroizi; ciclul menstrual; penis; lombalgie (efect mai pronunțat la aplicarea moxibustiei);
- punct sindromal: Insuficiența Qi și Yang-Qi a Rinichilor; stagnarea Qi a Rinichilor; Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor; Insuficiența Jing a Rinichilor; Insuficiența Xue (V23 + V20); Umiditate-Căldură în Focarul Inferior sau Vezică (cistită).

Localizarea

regio vertebralis, la 1,5 cun lateral de apofiza spinoasă L2.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia thoracolumbalis • m.erector spinae • m.iliolumbalis lumborum • m.longissimus thoracis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis r.dorsalis n.thoracici XI*; mușchii – *nn.lumbales (L1-5) • r.dorsalis a.lumbalis II, vv.lumbales II.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre V24 Qihaishu. Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

în spate, în părțile laterale.

V24 Qihaishu

Indicații

- hemoroizi; hipertensiune arterială; metroragii funcționale;
- punct antialgic: regiunea lombo-sacrală; vezica urinară (dureri cu hematurie);

- punct sindromal: stagnarea Qi și Xue în Focarul Inferior (menstre neregulate).

Localizarea

regio vertebralis, la 1,5 cun lateral de apofiza spinoasă L3.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia thoracolumbalis • m.erector spinae.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis r.dorsalis n.thoracici XI*; mușchii – *nn.lumbales (L1-5) • r.dorsalis a.lumbalis III, vv.lumbales III.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre V25 Dachangshu. Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

în regiunea lombară, spre regiunea fesieră.

V25 Dachangshu

- punct de asentiment al meridianului GI.

Indicații

- obezitate; tulburările tonusului intestinului subțire;
- punct antialgic: regiunea lombo-sacrală, vertebrele lombare; abdomen (dureri cu hemoragii intestinale); anus (dureri cu senzație de greutate); vezicula biliară (colecistită cu balonare); apendicita acută; hemoroizi; sciatică;
- punct sindromal: Insuficiența și stagnarea Qi a Splinei și Intestinului Gros (distensie și durere abdominală, constipație); Insuficiența Yang-Qi a Splinei și Intestinului Gros (hemoroizi, prolaps rectal, diaree); Umiditate-Căldură în Intestine (diaree, hemoroizi, hemoragii intestinale).

Localizarea

regio vertebralis, la 1,5 cun lateral de apofiza spinoasă L4.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia thoracolumbalis • m.erector spinae.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.medialis r.dorsalis n.lumbalis IV*; mușchii – *nn.lumbales (L1-5) • r.dorsalis a.lumbalis IV, vv.lumbales IV.*

Tehnica

se punctează vertical (1–1,2 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre fața laterală a fesei; se punctează subcutanat, vârful acului va fi orientat spre V27 Xiaochangshu. Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

în regiunea lombară.

V26 Guanyuanshu

- punct "barieră".

Indicații

- astenie postgripală; afecțiunile organelor bazinului mic la femei; afecțiunile urinare (V26 + V23); constipație și diaree; hiperexcitare sexuală;
- punct antialgic: linia mediană a abdomenului (inferior de ombilic); sciatică.

Localizarea

regio lumbalis, la 1,5 cun lateral de apofiza spinoasă L5.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia thoracolumbalis • m.erector spinae.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.medialis r.dorsalis n.lumbalis V*; mușchii – *nn.lumbales (L1-5) • a.lumbalis ima, a.sacralis media, vv.lumbales.*

Tehnica

se punctează vertical (1–1,2 cun). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jos, spre regiunea fesieră.

V27 Xiaochangshu

- punct de asentiment al meridianului IG.

Indicații

- hematurie, tulburări de micțiune; diaree, spasme sau atonie intestinală; oligurie, edeme;
- punct antialgic: intestin; sciatică;
- punct sindromal: Insuficiența Qi a Intestinului Subțire; Frig al Intestinului Subțire (diaree și dureri); stagnarea Qi a Intestinului Subțire (dureri cu distensie abdominală, constipație); Căldură sau Umiditate-Căldură în Intestine și Focarul Inferior (enterite, dizenterie).

Localizarea

regio sacralis, la 1,5 cun lateral de linia mediană posterioară, la nivelul hiatului sacral posterior I, în fosa dintre marginea internă a spinei iliace posterosuperioare și osul sacral.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia thoracolumbalis • m.ilicostalis lumborum • m.gluteus maximus • m.multifidus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.clunium medii (S1,2,3)*; mușchii – *n.gluteus inferior*

(L5, S1,2), rr.dorsales nn.sacrales (S1,2) • aa. et vv.sacrales laterales.

Tehnica

se punctează vertical (1–1,2 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în jos. Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

în regiunea lombară, părțile laterale.

V28 Pangguangshu

- punct de asentiment al meridianului V.

Indicații

- cistită, enurezis, retenție urinară, punct de intesificare a diurezei (V28 + V20); calculi renali (V28 + V23 + RP9); afectarea ovarelor;
- punct antialgic: plexul sacral (nevralgie); vezica urinară, abdomenul inferior, ovare; rectum, hemoroizi;
- punct sindromal: Insuficiența Qi a Splinei, Rînichilor și Vezicii; Căldură și Umiditate-Căldură în Focarul Inferior sau Vezică.

Localizarea

regio sacralis, la nivelul hiatului sacral posterior II, la 1,5 cun lateral de linia mediană posterioară, în fosa dintre partea inferioară a marginii interne a spinei iliace posterosuperioare și osul sacral.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia thoracolumbalis • m.iliocostalis lumborum • m.gluteus maximus • m.multifidus.

Inervația • Vascularizația

pleea – nn.*clunium medii* (S1,2,3); mușchii – nn.*sacrales* (S1,2), n.*gluteus inferior* (L5, S1,2), rr.*dorsales nn.sacrales* (S1,2) • aa. et vv.*sacrales laterales*.

Tehnica

se punctează vertical (1–1,2 cun). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

în jos, spre regiunea fesieră și coapsă.

V29 Zhonglushu

Indicații

- enterite, dizenterie; convulsii tonice; insuficiență renală;
- punct antialgic: dureri de-a lungul coloanei vertebrale, fese (leziunea mușchilor), sciatică.

Localizarea

regio sacralis, la nivelul hiatului sacral posterior III, la 1,5 cun lateral de linia mediană posterioară.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia thoracolumbalis • m.iliocostalis lumborum • m.gluteus maximus • lig.sacrotuberales.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.clunium medii* (S1,2,3); mușchii – *nn.sacrales* (S1,2), *n.gluteus inferior* (L5, S1,2) • *aa. et vv.sacrales laterales*, *a.glutea inferior*, *vv. gluteae inferiores*.

Tehnica

se punctează vertical (1–1,2 cun). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

în jos, spre regiunea fesieră.

V30 Baihuanshu

- punct de asentiment al sfincterului;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular V.

Indicații

- constipație; patologia sfincterului vezical și anal; spermatooree; leucoree;
- punct antialgic: anus; sciatică, lombalgie (durerea iradiază în fese);

Localizarea

regio sacralis, la nivelul hiatului sacral posterior IV, la 1,5 cun lateral de linia mediană posterioară.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *m.gluteus maximus* • *lig.sacrotuberale* • *m.piriformis*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.clunium medii* (S1,2,3); mușchii – *n.gluteus inferior* (L5, S1,2) • *a.glutea inferior*, *vv.gluteae inferiores*.

Tehnica

se punctează vertical (1–1,2 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre linia mediană. Moxibustie 5–10 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

în jos, spre anus, organele genitale și coapsă.

V31 Shangliao

- punct de încrucișare a meridianelor V, VB.

Indicații

- constipație; punct specific pentru aparatul urogenital, oase și în agravările ce apar în timpul menopauzei;
- punct antialgic: glandele mamare (dureri în timpul ovulației); prostată (dureri cu senzație de greutate în perineu); vezica urinară (dureri ce iradiază în rectum); naștere; lombalgie, sciatică;
- punct sindromal: Umiditate-Căldură în Focarul Inferior, Umiditate-Căldură în organele genitale (sterilitate, leucoree, prolaps uterin;




Fig.71




Fig.72

orhită, prostatită), Umiditate-Căldură a Vezicii; stagnarea Qi și Xue în uter (dismenoree); Insuficiența Jing a Rinichilor (impotență; depresie; prostatită).

Localizarea

regio sacralis, pe primul hiat sacral posterior, la 1 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *fascia thoracolumbalis* • *m. iliocostalis lumborum* • *m. multifidus*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r. medialis r. dorsalis n. sacralis*; mușchii – *nn. sacrales (S1,2)* • *a. sacralis lateralis, v. sacralis lateralis*.

Tehnica

se înțeapă vertical (1–1,2 cun). Tehnica de sângerare (dismenoree; dureri în regiunea lombară și membrele inferioare, sciatică; varice hemoroidale). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

în jos, spre șold și suprafața laterală a coapsei.

V32 Ciliao

Indicații

- punct specific pentru aparatul urogenital (prolaps uterin, menoragie, leucoree etc.);
- punct antialgic: rinichi (dureri ce iriază în organele genitale); ciclul menstrual (dismenoree cu dureri în regiunea lombară); naștere; hemoroizi; lombalgie, sciatică;
- punct sindromal: identic cu punctul V31 Shangliao.

Localizarea

regio sacralis, la nivelul hiatului sacral posterior II, la 1 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia thoracolumbalis • m.iliocostalis lumborum • m.multifidus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.medialis r.dorsalis n.sacralis II*; mușchii – *nn.sacrales (S1,2) • a.sacralis lateralis, v.sacralis lateralis.*

Tehnica

se punctează vertical (1–1,2 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat oblic și puțin anterior (în sus) prin hiatul sacral II. Tehnica de sângerare (dismenoree; dureri în regiunea lombară și membrele inferioare, sciatică; varice hemoroidale). Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

spre regiunea fesieră.

V33 Zhongliao

Indicații

- punct specific pentru aparatul urogenital; constipație; hipotonia vezicii urinare;
- punct antialgic: sciatică (afectarea S1);
- punct sindromal: identic cu punctul V31 Shangliao.

Localizarea

regio sacralis, la nivelul hiatului sacral posterior III, la 1 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia thoracolumbalis • m.iliocostalis lumborum • m.multifidus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.medialis r.dorsalis n.sacralis III*; mușchii – *r.dorsalis n.sacralis III, n.sacralis (S3) • a.sacralis lateralis, v.sacralis lateralis.*

Tehnica

se punctează vertical (1–1,2 cun). Tehnica de sângerare (dismenoree; dureri în regiunea lombară și membrele inferioare, sciatică; varice hemoroidale). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

spre anus, organele genitale, coapsă.

V34 Xialiao

Indicații

- punct specific pentru aparatul urogenital; constipații;
- punct antialgic: organele genitale; hemoroizi; lombalgie;
- punct sindromal: identic cu punctul V31 Shangliao.

Localizarea

regio sacralis, la nivelul hiatului sacral posterior IV, mai jos și

medial de V33 Zhongliao.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.gluteus maximus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.dorsalis n.sacralis IV*; mușchii – *n.gluteus inferior (L5, S1,2) • a.sacralis lateralis, v.sacralis lateralis, a.glutea inferior, vv. gluteae inferiores.*

Tehnica

se punctează vertical (1–1,2 cun). Tehnica de sângerare (dismenoree; dureri în regiunea lombară și membrele inferioare, sciatică; varice hemoroidale). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

spre anus, organele genitale, coapsă.

V35 Huiyang

Indicații

- punct specific în prurit al organelor genitale; impotență; prostatită cronică (V35 + V23); hemiplegie, paraplegie;
- punct antialgic: regiunea anală și perineu (dureri sau prurit); sciatică, coccigodinie;
- punct sindromal: Umiditate-Căldură în Focarul Inferior.

Localizarea

regio sacralis, la 0,5 cun lateral de vârful coccisului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.gluteus maximus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.coccygeus*; mușchii – *n.gluteus inferior (L5, S1,2) • a. glutea inferior, a.pudenda interna, vv.gluteae inferiores.*

Tehnica

se punctează vertical (1–1,2 cun). Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

spre anus și regiunea fesieră.

V36 Chengfu

Indicații

- constipații;
- punct antialgic: toate formele de sciatică; rinichi; hemoroizi; lombalgie; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: șold (V36) – umăr (IG10).

Localizarea

regio glutealis, în mijlocul pliului, la marginea inferioară a mușchiului fesierului mare.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.gluteus maximus • fascia lata • m.

biceps femoris • m.semitendinosus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.clunium inferiores (S1,2,3)*, ramuri ale *n.cutaneus femoris posterior (plexus sacralis)*; mușchii – *n.gluteus inferior (L5, S1,2)*, *n.ischiadicus (L5, S1,2)* • *a.comitans n.ischiadici*, *vv.gluteae inferiores*.

Tehnica

se punctează vertical (1–2,5 cun) cu apariția senzației de distensie iradiată în membrul inferior (nevralgia nervului sciatic); se punctează sub un unghi de 45 grade, vârful acului va fi orientat spre interior, cu iradierea senzațiilor în organele genitale și perineu (dureri în organele genitale); se punctează sub un unghi de 45 grade, vârful acului va fi orientat spre interior și în jos cu senzație de distensie în regiunea anusului (dureri în rect); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre exterior și în sus (dureri în regiunea fesieră). Tehnica de sângerare (lombalgie, sciatică; constipații). Moxibustie 5–10 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

În jos, spre picior; spre organele genitale, perineu și anus.

V37 Yinmen

Indicații

- inflamații în regiunea inghinală;
- punct antialgic: sciatică (durere pe suprafața posterioară a coapsei cu tumefiere – V37 + V60 + V25), lombalgie, regiunea sacrală.

Localizarea

regio femoralis posterior, la 6 cun sub V36 Chengfu, la mijlocul feței posterioare a coapsei, pe linia ce unește V36 Chengfu, și V40 Weizhong.




Fig.73

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia lata • m.semitendinosus • m.biceps femoris.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus femoris posterior (S1,2,3)* de la *plexus sacralis*; mușchii – *n.ischiadicus (L5, S1,2)* • *a. et vv.perforantes*.

Tehnica

se punctează vertical (1–2 cun). Moxibustie 5–10 minute (în operele antice moxibustia și punctarea acestui punct este interzisă).

Senzația

În jos, spre picior.

V38 Fuxi

Indicații

- constipație spasmodică; cistită, disurie;
- punct antialgic: lombalgie, nervul peronier comun (nevralgie).

Localizarea

regio genus posterior, pe partea externă a fosei poplitee, la 1 cun deasupra punctului V39 Weiyang.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *fascia lata* • *m.biceps femoris*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus femoris posterior* (S1,2,3) de la *plexus sacralis*; mușchii – *n.ischiadicus* (L5, S1,2) • *a. et vv.genus superiores laterales*, *a. et vv.perforantes*, *a. et v.poplitea*.

Tehnica

se punctează vertical (1–1,2 cun). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jos, spre gambă.




Fig.74

V39 Weiyang

- punct de inserție al meridianului tendino-muscular V;
- punct de proiecție periferică a Trei Focare.

Indicații

- adenopatii axilare;
- punct antialgic: regiunea retroauriculară, regiunea spatelui, fosa axilară, fosa poplitee; abdomenul inferior; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – centura scapulară, suprafața laterală a brațului;
- punct sindromal: Umiditate-Căldură a Focarului Inferior (cistită, edeme, retenție urinară, enurezis).

Localizarea

regio genus posterior, pe partea externă a fosei poplitee, pe orizontala care trece prin mijlocul ei, la marginea internă a tendonului bicepsului crural.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *fascia lata* • *tendo m.bicipitis femoris* • *caput laterale m.gastrocnemii* • *m.plantaris* • *m.popliteus*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus femoris posterior* (S1,2,3) de la *plexus sacralis*; mușchii – *n.ischiadicus* (L5, S1,2), *n.tibialis* (L4,5, S1,2) • *a. et*

vv.genus superiores laterales, a. et vv.perforantes, a. et v.poplitea.

Tehnica

se înțeapă vertical (1–1,2 cun). Tehnica de sângerare (traumatizarea vertebrelor cervicale, lombalgie, sciatică; hipertonie; epistaxis; furunculoză; cefalee). Moxibustie 3–5 minute.

Senzația

în jos, spre picior.

V40 Weizhong

- punct antic He (elementul Pământ);
- punct de proiecție periferică a Vezicii Urinare;
- punct de reunire periferică a meridianelor distincte R/V;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular V;
- punct sezonier al viscerului Fu Vezica Urinară (punct de tonifiere pentru perioada de toamnă și de dispersie pentru perioada de vară).




Fig.75

Indicații

- punct specific pentru hemoroizi, prostată, piele;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (partea inferioară a spatelui);
- punct antialgic: coaste (dureri ce iriază în abdomenul inferior); genunchi; rinichi; prostată; piele (prurit – V40 + V13 + V60); hemoroizi; lombalgie, sciatică; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: genunchi (V40) – cot (IG8);
- punct sindromal: Umiditate-Căldură în Vezică (disurie, cistită); Umiditate-Căldură și Căldura Xue; stagnarea Xue (durere în membrele inferioare).

Localizarea

regio genus posterior, în mijlocul fosei poplitee.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia lata.

Inervația • Vascularizația

pielea – n.cutaneus femoris posterior (S1,2,3) de la plexus sacralis; fascia lata (n.tibialis – L4,5, S1,2,3) • a. et v.poplitea.

Tehnica

se înțeapă vertical (1–1,2 cun), ocolind lateral artera. Tehnica de sângerare (gastralgie, vomă, diaree; hipertonie, epistaxis; furunculoză; febră, insolație; sciatică; cefalee). Moxibustie 5 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

În jos, spre picior; în sus, spre regiunea lombară sau spre patelă.

V41 Fufen

- punct de încrucișare a meridianelor V, IG.

Indicații

- torticolis;
- punct antialgic: centura scapulară și regiunea occipitală (nevralgii), suprafața anterioară a gâtului mai sus de nivelul vertebrei VII cervicale; nervii intercostali.

Localizarea

regio scapularis, la 3 cun lateral de apofiza spinoasă Th2, în spațiul II intercostal.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • m.rhomboideus minor • m.serratus posterior superior • fascia thoracolumbalis • m.illocostalis thoracis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r.dorsalis n.thoracici II*; mușchii – *n.accessorius, nn.cervicales (C2,3,4), n.dorsalis scapulae (C4,5), nn.intercostales (Th1-4), rr.dorsales nn.thoracici (Th1-12) • a. et vv.transversae colli, a.scapularis descendens, r.dorsalis a.intercostalis posterior II, vv.intercostales posteriores.*

Tehnica

se înțeapă oblic (0,5-0,8 cun), spre omoplat, de-a lungul spațiului intercostal (punctarea profundă este contraindicată). Moxibustie 10-20 minute.

Senzația

În sus, spre umăr și regiunea cervicală.

V42 Pohu

- punct Shu psiho-dorsal al Plămânilor.

Indicații

- pneumonie, bronșită; tulburări psihice apărute în afectarea Plămânilor;
- punct antialgic: regiunea occipitală; partea superioară a spatelui (dureri și contracturi);
- punct sindromal: ascendența Qi a Plămânilor (acces de astm bronșic, tuse).

Localizarea

regio scapularis, la 3 cun lateral de apofiza spinoasă Th3, în spațiul III intercostal.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • m.rhomboideus major • m.

serratus posterior superior • fascia thoracolumbalis • m. iliocostalis thoracis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r.dorsalis n.thoracici III*; mușchii – *n.accessorius, nn.cervicales (C2,3,4), n.dorsalis scapulae (C4,5), nn.intercostales (Th1-4), rr.dorsales nn.thoracici (Th1-12) • a. et vv.transversae colli, a.scapularis descendens, r.dorsalis a.intercostalis posterior III, vv.intercostales posteriores III.*

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat spre marginea laterală a omoplatului. Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

în sus, spre umăr și regiunea cervicală.

V43 Gaohuangshu

Indicații

- punct specific pentru hemopoieză și în astenie (punct pentru "100 maladii", punctul vitalității); epuizare psihică, diminuarea memoriei, neurastenie;
- punct antialgic: regiunea scapulară; ciclul menstrual (dureri post-menstruale);
- punct sindromal: Insuficiența Qi și Xue (maladii cronice epuizante – V43 + V20 + V17); Insuficiența Esenței Rinichilor.

Localizarea

regio scapularis, la 3 cun lateral de apofiza spinoasă Th4, în spațiul IV intercostal.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • m.rhomboideus major • fascia thoracolumbalis • m.iliocostalis thoracis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r.dorsalis n.thoracici IV*; mușchii – *n.accessorius, nn.cervicales (C2,3,4), n.dorsalis scapulae (C4,5), r.lateralis nn.thoracici (Th1-12) • a. et vv.transversae colli, a.scapularis descendens, r.dorsalis a.intercostalis posterior IV, vv.intercostales posteriores IV.*

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat spre marginea laterală a omoplatului (punctarea profundă poate provoca lipotimie; în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 20–50 minute.

Senzația

în sus, spre regiunea cervicală și umăr.

V44 Shentang

- punct Shu psiho-dorsal al Inimii.

Indicații

- sughiț; dispnee; afectarea inimii; tulburări psihice apărute în afectarea Inimii;
- punct antialgic: spate și regiunea scapulară.

Localizarea

regio scapularis, la 3 cun lateral de apofiza spinoasă Th5, în spațiul V intercostal.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • m.rhomboideus major • fascia thoracolumbalis • m.iliocostalis thoracis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r.dorsalis n.thoracici V*; mușchii – *n.accessorius, nn.cervicales (C2,3,4), n.dorsalis scapulae (C4,5), rr.dorsales nn.thoracici (Th1-12) • a. et v.transversae colli, a.scapularis descendens, r.dorsalis a.intercostalis posterior V, vv.intercostales posteriores V.*

Tehnica

se înțepă oblic (0,5–0,8 cun). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în sus, spre umăr și în jos.

V45 Yixi

Indicații

- vertij; epistaxis; greață, vomă; hipertermie;
- punct antialgic: regiunea spatelui, marginea medială a omoplatului și fosa axilară; ochi; inimă (precordialgii în tuse).

Localizarea

regio scapularis, la 3 cun lateral de apofiza spinoasă Th6, în spațiul VI intercostal.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • m.latissimus dorsi • m.rhomboideus major • fascia thoracolumbalis • m.iliocostalis thoracis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r.dorsalis n.thoracici VI*; mușchii – *n.accessorius, nn.cervicales (C2,3,4), n.thoracodorsalis (C6,7,8), n.dorsalis scapulae (C4,5), rr.dorsales nn.thoracici (Th1-12) • r.dorsalis a.intercostalis posterior VI, vv.intercostales posteriores VI.*

Tehnica

se punctează sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat spre marginea laterală a omoplatului. Moxibustie 10–30 minute.

Senzația

În jos, spre regiunea lombară.

V46 Geguan

- punct "barieră".

Indicații

- hematemeză; icter; diaree; punct specific în sughiț, esofago-spasm;
- punct antialgic: spate (dureri cu senzație de rece); nervii intercostali.

Localizarea

regio scapularis, la 3 cun lateral de apofiza spinoasă Th7, în spațiul VII intercostal.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.latissimus dorsi • m.iliocostalis thoracis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r.dorsalis n.thoracici VII*; mușchii – *n.thoracodorsalis (C6,7,8)*, *rr.dorsales nn.thoracici (Th1-12)* • *r.dorsalis a.intercostalis posterior VII*, *vv.intercostales posteriores VII*.

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat spre marginea laterală a omoplatului. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

În jos, spre regiunea lombară.

V47 Hunmen

- punct Shu psiho-dorsal al Ficatului.

Indicații

- afecțiunile hepato-biliare, diaree, disfagie; tulburări psihice apărute în afectarea Ficatului;
- punct antialgic: inimă; stomac; dureri reumatice; mușchi (mialgii).

Localizarea

regio infrascapularis, la 3 cun lateral de apofiza spinoasă Th9, în spațiul IX intercostal.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.latissimus dorsi • fascia thoracolumbalis • m.iliocostalis thoracis • m.serratus posterior inferior.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis r.dorsalis n.thoracici VIII*; mușchii – *n.thoracodorsalis (C6,7,8)*, *rr.dorsales nn.thoracici (Th1-12)* • *r.dorsalis a.intercostalis posterior IX*, *vv.intercostales posteriores IX*.

Tehnica

se punctează oblic – 0,5–0,8 cun (atenție – e posibilă pierderea cunoștinței; în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

locală și în părțile laterale ale spatelui.

V48 Yanggang

Indicații

- diabet; punct specific în icter și hipertermie;
- punct antialgic: abdomen (helminți), stomac; dureri reumatice.

Localizarea

regio infrascapularis, la 3 cun lateral de apofiza spinoasă Th10, în spațiul X intercostal.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.latissimus dorsi • fascia thoracolumbalis • m.iliocostalis thoracis • m.serratus posterior inferior.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis r.dorsalis n.thoracici IX*; mușchii – *n.thoracodorsalis (C6,7,8), rr.dorsales nn.thoracici (Th1-12) • r.dorsalis a.intercostalis posterior X, vv.intercostales posteriores X.*

Tehnica

se punctează oblic (0,5–0,8 cun). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

locală și în părțile laterale ale spatelui.

V49 Yishe

- punct Shu psiho-dorsal al Splinei.

Indicații

- inapetență, atonie a stomacului; diabet; tulburări psihice apărute în afectarea Splinei;
- punct antialgic: pleură; nervii intercostali; organele genitale externe (dureri și tumefiere); dureri reumatice;
- punct sindromal: Insuficiența Qi a Splinei.

Localizarea

regio infrascapularis, la 3 cun lateral de apofiza spinoasă Th11, în spațiul XI intercostal.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.latissimus dorsi • fascia thoracolumbalis • m.iliocostalis thoracis • m.serratus posterior inferior.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis r.dorsalis n.thoracici IX*; mușchii – *n.thoracodorsalis (C6,7,8), rr.dorsales nn.thoracici (Th1-12) • r.dorsalis a.intercostalis posterior XI, vv.intercostales posteriores XI.*

Tehnica

se punctează oblic (0,5–0,8 cun). Moxibustie 5–30 minute.

Senzația

locală și în părțile laterale ale spatelui.

V50 Weicang

Indicații

- edem localizat în regiunea spatelui; punct specific în atonia stomacului, intestinului subțire și gros;
- punct antialgic: pleură; stomac; lombalgie.

Localizarea

regio lumbalis, la 3 cun lateral de apofiza spinoasă Th12, sub coasta XII.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.latissimus dorsi • fascia thoracolumbalis • m.iliocostalis lumborum • m.serratus posterior inferior • m. quadratus lumborum.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis r.dorsalis n. thoracici X*; mușchii – *n. thoracodorsalis (C6,7,8), rr.dorsales nn.lumbales (L1-5) • r.dorsalis a.subcostalis, vv.subcostalis.*

Tehnica

se punctează oblic (0,5–0,8 cun). Moxibustie 10–30 minute.

Senzația

în jos și în părțile laterale ale regiunii lombare.

V51 Huangmen

Indicații

- punct specific în spasme ale stomacului, intestinului gros și subțire, splenomegalie, hepatomegalie;
- punct antialgic: glandele mamare (indurația țesutului); inimă (pre-cordialgii); stomac (dureri spasmodice).

Localizarea

regio lumbalis, la 3 cun lateral de apofiza spinoasă L1.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.latissimus dorsi • fascia thoracolumbalis • m.iliocostalis lumborum • m.serratus posterior inferior • m. quadratus lumborum.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis r.dorsalis n. thoracici X*; mușchii – *n. thoracodorsalis (C6,7,8), rr.dorsales nn.lumbales (L1-5) • r.dorsalis a.lumbalis I, vv.lumbales I.*

Tehnica

se înțeapă oblic (0,5–0,8 cun). Moxibustie 10–30 minute.




Fig.76




Fig.77

Senzația

în jos, spre regiunea fesieră.

V52 Zhishi

- punct Shu psiho-dorsal al Rinichilor.

Indicații

- punct specific în afectarea organelor genitale; tulburări psihice apărute în afectarea Rinichilor;
- punct antialgic: rinichi (dureri în diateză urică ce iradiază în gambă, colică renală); organele genitale (carbunculi); lombalgie;
- punct sindromal: Insuficiența Qi a Rinichilor (V52 + V23).

Localizarea

regio lumbalis, la 3 cun lateral de apofiza spinoasă L2.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.latissimus dorsi • fascia thoracolumbalis • m.ilicostalis lumborum • m.quadratus lumborum.

Inervația • Vascularizația

pielea – r.cutaneus lateralis r.dorsalis n.thoracici XI; mușchii – n.thoracodorsalis (C6,7,8), rr.dorsales nn.lumbales (L1-5) • r.dorsalis a.lumbalis II, vv.lumbales II.

Tehnica

se înțeapă vertical (1–1,2 cun); se punctează subcutanat, vârful acului va fi orientat spre V23 Shenshu sau spre VG4 Mingmen (diaree; impotență). Moxibustie 10–30 minute.

Senzația

în jos, spre regiunea fesieră sau spre partea anterioară a abdomenului.

V53 Baohuang

Indicații

- punct specific în poliomielită la copii; artrită sacro-iliacă; punct important cu efect de reglare a eliminării lichidelor din organism

(indicat în retenția de urină);

- punct antialgic: abdomenul inferior; suprafața posterioară a piciorului; lombalgie.

Localizarea

regio glutealis, la 3 cun lateral de linia mediană, la nivelul hiatului sacral posterior II.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.gluteus maximus • m.gluteus medius.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.clunium superiores (L1,2,3), rr.dorsales nn.lumbales*; mușchii – *n.gluteus inferior (L5, S1,2), n.gluteus superior (L4,5; S1) • a.glutea superior, vv.gluteae superiores.*

Tehnica

se înțeapă vertical (1–1,2 cun). Moxibustie 10–30 minute.

Senzația

în jos, spre șold.

V54 Zhibian

Indicații

- punct specific în cistită și hemoroizi; prolaps rectal (V54 + VG20 + VG1);
- punct antialgic: fese, organele genitale, sciatică.

Localizarea

regio glutealis, la 3 cun lateral de linia mediană, la nivelul hiatului sacral posterior IV.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.gluteus maximus • m.gluteus medius • m.piriformis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.clunium superiores (L1,2,3), rr. dorsales nn.lumbales (L1-3)*; mușchii – *n.gluteus inferior (L5, S1,2), rr.musculares ple-xus sacralis (L5, S1,2) • a.glutea inferior, vv.gluteae inferiores.*

Tehnica

se înțeapă vertical (1–2 cun). Moxibustie 20–50 minute.

Senzația

în jos, spre suprafața posterioară a coapsei.

V55 Heyang

Indicații

- hernie inghinală; sigmoidită; orhită; metroragie, leucoree;
- punct antialgic: mușchii gambei (crampe); rinichi (dureri ce iradiază în abdomen); abdomen; organele genitale; hemoroizi; lombalgie, sciatică.

Localizarea

regio cruralis posterior, la 2 cun sub V40 Weizhong, pe linia ce unește acest punct cu V57 Chengshan.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.gastrocnemius • m.popliteus • m. plantaris.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus femoris posterior* (S1,2,3) de la *plexus sacralis*; mușchii – *n.tibialis* (L4,5, S1,2,3) • *aa.surales*, *a. et v.poplitea*, *v.saphena parva*.

Tehnica

se înțeapă vertical (1–1,5 cun). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jos, spre laba piciorului.

V56 Chengjin

Indicații

- diaree, constipație, hemoroizi;
- punct antialgic: occipit, spate; fosa poplitee, suprafața posterioară a gambei (crampe), tendonul Achile; lombalgie.

Localizarea

regio cruralis posterior, la jumătatea distanței între V55 Heyang și V57 Chengshan.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.gastrocnemius • m.soleus • m.tibialis posterior.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus femoris posterior* (S1,2,3), *rr.cutanei cruris mediales n.sapheni* (L3,4), *n.cutaneus surae lateralis* (L4,5, S1), ramură a *n.peroneus communis* (*plexus sacralis*); mușchii – *n.tibialis* (L4,5, S1,2) • *a. et vv.tibiales posteriores*, *v.saphena parva*.

Tehnica

se înțeapă vertical – 1–1,5 cun (în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în jos, spre călcâi.

V57 Chengshan

- punct de inserție al meridianului tendino-muscular V.




Fig.78

Indicații

- hemoroizi, prurit anal, colită, prolaps rectal; crampe musculare;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (anus);
- punct antialgic: centura scapulară, articulația genunchiului, suprafața laterală și posterioară a gambei (dureri cu crampe), degetele piciorului; intestine (dureri cu scaune sangvinolente), anus (dureri și prurit), hemoroizi (dureri cu hemoragie); sciatică (crampe), lombalgie;
- punct sindromal: stagnarea Qi și Xue a meridianului Vezică; Umiditate-Căldură în Focarul Inferior.




Fig.79

Localizarea

regio cruralis posterior, la jumătatea distanței între mijlocul fosei poplitee și marginea superioară a maleolei interne, în vârful unghiului format de cele două capete ale mușchiului gastrocnemian.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.gastrocnemius • m.soleus • m.tibialis posterior.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.suralis* (L5, S1,2), ramură a *n.tibialis* (plexus sacralis); mușchii – *n.tibialis* (L4,5, S1,2) • *a. et vv.tibiales posteriores*, *v. saphena parva*.

Tehnica

se înțeapă vertical (1–1,5 cun). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în jos, spre laba piciorului.

V58 Feiyang

- punct Lo al meridianului V.

Indicații

- claudicație intermitentă; patologia articulațiilor membrelor inferioare; hemiplegie; isterie, depresie, epuizare cu tremurături;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (anus);
- punct antialgic: occipit; laba piciorului (dureri cu contractură), degetele piciorului (la flexie și anteflexie); piele (prurit, în special pe picioare); ochi; hemoroizi; lombalgie, sciatică, talalgie; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – partea superioară a spatelui;
- punct sindromal: Umiditate-Căldură în Vezică și invazia Vântului Extern (obstrucție nazală; cefalee); Insuficiența Qi a Rinichilor.

Localizarea

regio cruralis posterior, la 7 cun deasupra punctului V60 Kunlun, în locul de trecere a gastrocnemianului lateral în tendonul Achile.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.gastrocnemius • m.soleus • m.flexor hallucis longus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus surae lateralis* (L4,5, S1), ramură a *n.peroneus communis* (plexus sacralis); mușchii – *n.tibialis* (L4,5, S1,2, 3) • *a. et vv.tibiales posteriores, v.saphena parva, a.peronea.*

Tehnica

se înțepă vertical (1–1,5 cun). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în jos, spre laba piciorului.

V59 Fuyang

- punct Xi al meridianului extraordinar Yang Qiao Mai;
- punct de încrucișare a meridianelor V, Yang Wei Mai, Yang Qiao Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Qiao Mai.




Fig.80

Indicații

- hipotensiune ortostatică; punct specific în lombalgie cu edematarea picioarelor (V59 + V61 ori V62); prostatită (V59 + R4);
- punct Ben din perechea Biao-Ben: V59–V1;
- punct antialgic: regiunea occipitală; nervul trigemen; sciatică; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – membrele superioare.

Localizarea

regio cruralis posterior, la 3 cun deasupra punctului V60 Kunlun, la marginea laterală a tendonului Achile.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.soleus • m.flexor hallucis longus • m.peroneus brevis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.suralis* (L5, S1,2), ramură a *n.tibialis* (plexus sacralis); mușchii – *n.tibialis* (L4,5, S1,2,3) • *a.peronea, v.saphena parva.*

Tehnica

se înțepă vertical (0,5–1 cun). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în jos, spre degetul mic.

V60 Kunlun

- punct antic Jing-prox. (elementul Foc);
- punct sezonier al viscerului Fu Vezica Urinară (punct de tonifiere pentru al 5-lea sezon și de dispersie pentru perioada de primăvară).

Indicații

- punct specific în agravare la mișcare, panariții și furuncule, afecțiunile organelor bazinului mic; convulsii; prurit; crampe și contracturi în diferite regiuni; insomnie cu algii psihogene, apatie, nervozitate;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (partea superioară a spatelui);
- punct antialgic: globii oculari; dinți, facies (nevralgii); inimă (cardialgii, precordialgii cu iradiere în spate); rinichi (colică); cap (cefalee cu amețeli sau fotofobie); tuse; ciclul menstrual; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: gleznă (V60) – pumn (IG5);
- punct sindromal: Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor (lombalgie); Căldură a Vezicii (disurie, hematurie, cistită); stagnarea Xue în uter (dismenoree); Vânt (Intern sau Extern) localizat în partea superioară a corpului.

Localizarea

regio talocruralis posterior, în foseta dintre maleola externă și tendonul Achile, puțin deasupra marginii superioare a calcaneului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • retinaculum musculorum peroneorum superius • vagina synovialis mm.peroneorum communis • m.peroneus brevis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.suralis* (L5, S1,2), ramură a *n.tibialis (plexus sacralis)*; mușchii – *n.peroneus superficialis* (L5, S1) • *a.peronea, rete malleolare laterale, v. saphena parva.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre V59 Fuyang; se punctează până la punctul R3 Taixi. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în jos, spre laba piciorului și degetul mic.

V61 Pushen

- punct de încrucișare a meridianelor V, Yang Wei Mai, Yang Qiao Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Qiao Mai;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular V.

Indicații

- spasme locale; paralizia mușchiului gastrocnemian; logoree, idei fixe, halucinații, delir;
- punct antialgic: sciatică (cu furnicături), talalgie; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – suprafața laterală a brațului.

Localizarea

regio calcanea, la 1,5 cun sub V60 Kunlun, la granița pielii roșii (Yang) și albe (Yin).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • calcaneus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.suralis* (L5, S1,2), ramură a *n.tibialis (plexus sacralis)* • *rete calcaneum*, *rr.calcanei* (a.*peronea*), *v.saphena parva*.

Tehnica

se punctează vertical (0,3–0,5 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre maleola internă. Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

în regiunea călcâiului.

V62 Shenmai

- punct de comandă al meridianului extraordinar Yang Qiao Mai;
- punct de încrucișare a meridianelor V, Yang Wei Mai, Yang Qiao Mai;
- punct de intrare al meridianului extraordinar Yang Qiao Mai.

Indicații

- vertij; hemiplegie; obsesii, delir febril, punct specific în tulburări de somn (V62 + R6);
- punct antialgic: dinți (molarii), gât (dureri cu abces); intestine; vezica urinară; nervul occipital; sciatică; furuncule; sindrom algic cu hipertermie; cefalee (dureri surde și difuze, dureri acute în hipertonie); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – mână, articulații;
- punct sindromal: stagnarea Qi și Xue în meridianul Vezică; Vânt-Frig (cefalee; rinoree); Vânt Intern (hemiplegie); Insuficiența Qi și Yin-Qi a Vezicii și Rinichilor.

Localizarea

regio talocruralis anterior, în fosa de sub maleola externă.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • retinaculum musculorum peroneorum inferius • m.extensor digitorum brevis • tendo m.peroneus longus • tendo m.peroneus brevis • lig.talocalcaneum laterale.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.suralis* (L5, S1,2), ramură a *n.tibialis* (*plexus sacralis*); mușchii – *n.peroneus profundus* (L4,5, S1) • *rete malleolare laterale*, *rr.malleolares laterales* (*a.peronea*), *v.saphena parva*.

Tehnica

se punctează vertical (0,3–0,5 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre haluce. Moxibustie 3–5 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

spre degetul mic și în interiorul articulației talocrurale.

V63 Jinmen

- punct Xi al meridianului V;
- punct de încrucișare a meridianelor V, Yang Wei Mai, Yang Qiao Mai;
- punct de intrare al meridianului extraordinar Yang Wei Mai.

Indicații

- punct specific în epilepsie;
- punct antialgic: lumbago, sciatică;
- punct sindromal: Căldură a Vezicii.

Localizarea

margo lateralis pedis, în depresiune, înapoia bazei metatarsianului V.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *fascia dorsalis pedis* • *tendo m.peroneus brevis* • *m.abductor digiti minimi* • *tendo m.peronei longi*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus dorsalis lateralis* (L5, S1,2), ramură a *n.suralis* (*plexus sacralis*); mușchii – *n.peroneus superficialis* (L5, S1), *n.plantar lateral* (S1,2) • *rete venosum dorsale pedis*, *a.plantar lateral*, *v.saphena parva*.

Tehnica

se punctează vertical (0,3–0,5 cun) sau spre călcâi. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

locală și spre degete.

V64 Jinggu

- punct antic Yuan;
- punct sursă al meridianului V.

Indicații

- enurezis; sinusită;
- punct antialgic: occipit, regiunea coloanei vertebrale, lombalgie, sciatică, articulația coxofemurală (limitarea flexiei); comisura pal-

- pebrală medială; obraji; cap (cefalee severă);
- punct sindromal: Insuficiența Qi a Rinichilor și Vezicii; Căldură a Vezicii; Vânt Intern (epilepsie).

Localizarea

margo lateralis pedis, la limita feței plantare și dorsale a piciorului, antero-inferior de baza metatarsianului V.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia dorsalis pedis • m.abductor digiti minimi.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus dorsalis lateralis* (L5, S1,2), ramură a *n.suralis* (plexus sacralis); mușchii – *n.plantaris lateralis* (S1,2) • *a.et vv.matatarseae plantares, a.metatarsea dorsalis, a.plantaris lateralis.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,3–0,5 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în jos și medial. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

locală și spre degetul mic.

V65 Shugu

- punct antic Shu (elementul Lemn);
- punct de dispersie al meridianului V;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular V;
- punct sezonier al viscerului Fu Vezica Urinară (punct de tonifiere pentru perioada de vară și de dispersie pentru perioada de iarnă).

Indicații

- punct specific în acnee, abcese în regiunea lombară și a spatelui; urolitiază; torticolis; dacriocistită;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (occipit);
- punct antialgic: articulația coxofemurală (limitarea flexiei); dinți (incisivi); hemoroizi; cefalee (occipit, vertex);
- punct sindromal: Căldură a Vezicii (cistită); Vânt Intern (epilepsie) și Vânt Extern (cefalee).

Localizarea

margo lateralis pedis, la limita feței plantare și dorsale a piciorului, înapoia articulației metatarsofalangiene V.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia dorsalis pedis • m.abductor digiti minimi • m.flexor digiti minimi brevis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus dorsalis lateralis* (L5, S1,2), ramură a *n.suralis* (plexus sacralis); mușchii – *n.plantaris lateralis* (S1,2) • *a.*

et vv.matatarseae plantares, a.plantaris lateralis, a.digitalis plantaris propria.

Tehnica

se punctează vertical (0,3–0,5 cun). Moxibustie 3–5 minute.

Senzația

locală și spre degetul mic.

V66 Tonggu

- punct antic Ying (elementul Apă);
- punct sezonier al viscerului Fu Vezica Urinară (punct de tonifiere pentru perioada de primăvară și de dispersie pentru perioada de toamnă).

Indicații

- incontinență anală; epistaxis; punct specific în anemie cerebrală, vertij; emotivitate cu tremurături, anxietate;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (ochi; vertex);
- punct antialgic: occipit, cefalee (cu senzație de greutate);
- punct sindromal: Căldură a Vezicii (disurie, hematurie, cistită); Vânt Extern și Intern; Căldură Externă și Internă.

Localizarea

margo lateralis pedis, antero-inferior de articulația metatarso-falangiană (în poziția flectată a degetului V, punctul se află la extremitatea pliului).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia dorsalis pedis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus dorsalis lateralis* (L5, S1,2), ramură a *n.suralis* (*plexus sacralis*) • *a.digitalis dorsalis*, *aa.digitales plantares propriae et vv. digitales plantares.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,3–0,5 cun). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

locală.

V67 Zhiyin

- punct antic Jing-dist. (elementul Metal);
- punct de tonifiere al meridianului V;
- punct de ieșire din meridianul V;
- punct "rădăcină" al meridianului mare (axului energetic) Tai Yang;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular V;
- punct sezonier al viscerului Fu Vezica Urinară (punct de tonifiere pentru perioada de iarnă și de dispersie pentru al 5-lea sezon).

Indicații

- hipertensiune sau hipotensiune arterială; punct specific pentru

- corecția malpoziției fetale; depresie;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (ochi);
- punct antialgic: occipit, spate; comisura palpebrală medială, ochi; lombalgie (cu iradiere circulară); cefalee (regiunea frontală); dureri în tot corpul; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – nas;
- punct sindromal: stagnarea Qi în meridianul Vezicii; Vânt Intern și Extern.

Localizarea

margo lateralis pedis, la 0,1 cun înapoia și în afara unghiului unghial extern al degetului mic.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • phalanx digitalis distalis V.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus dorsalis lateralis (L5, S1,2)*, ramură a *n. suralis (plexus sacralis)* • *a.digitalis dorsalis et a.digitalis plantaris propria*, *vv.digitales plantares*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,1 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre articulația tibiotarsiană (punctarea este contraindicată în timpul sarcinii). Tehnica de sângerare (cefalee; obstrucție nazală; menstruație tardivă). Moxibustie 3–5 minute.

Senzația

locală.

I.8. Meridianul Rinichi (R)

Meridianul Rinichi este de natură Yin, centripet, pereche, conține 27 puncte (fig. 81–89).

Relațiile energetice:

1. În cadrul marii circulații energetice este precedat de meridianul Vezică și urmat de meridianul Pericard (V-R-MC).
2. În cuplu cu meridianul Vezică realizează loja energetică Apă (R-V). În cadrul ciclului celor 5 elemente este stimulat de P și inhibat de RP.
3. În cuplu cu meridianul Inimă formează axul energetic Shao Yin (R-C).
4. După regula "miezul zilei/miezul nopții" este cuplat cu meridianul Intestin Gros (R-GI).
5. După regula "soț/soție" este cuplat cu meridianul Pericard (R-MC).




Fig.81. Punctele meridianului Rinichi (R).

Funcțiile energetice:

1. Protejarea "Esenței", dirijarea creșterii și dezvoltării organismului. Epuizarea "Esenței" Rinichilor este cauza principală a îmbătrânirii și decesului.
2. În cuplu cu meridianul Vezică reglează eliminarea reziduurilor din organism, controlează cantitatea filtratului glomerular.
3. Reglează nivelul tensiunii arteriale (balanța lichidelor, influența suprarenalelor).
4. Împreună cu meridianul Pericard controlează procesul de reproducere.
5. Reglează procesul de consumare Qi; împreună cu Plămânii participă la descendența Qi.
6. Rinichii controlează oasele, dinții și producerea măduvei osoase. Starea părului (în special a regiunii cefalice), de asemenea, este un indiciu al potențialului Qi al Rinichilor.
7. Rinichii "se deschid în ureche" și dirijează "orificiile corpului". În cadrul epuizării Qi a Rinichilor apar manifestări de tipul: tinitus, hipoacuzie. Diminuarea Qi a Rinichiului cauzează tulburarea "închiderii și deschiderii orificiilor corpului" – micțiuni frecvente, incontinență de urină, poluții, diaree, prolaps rectal etc.
8. Saliva este Lichidul Rinichilor (scuiparea excesivă a salivei diminuează Qi a Rinichilor, iar înghițirea salivei duce la fortificarea Qi).
9. Influențează formarea tipului constituțional și temperamental al omului, domină și protejează emoțiile și voința (Zhi).

Acțiunea sindromal-energetică:

- reglarea Jing (tulburări ale funcției reproductive, afecțiuni ale oaselor, senilitate precoce etc; este indicată asocierea punctelor meridianului Rinichi cu punctele cheie ale meridianelor extraordinare corespunzătoare și cu punctele meridianelor Du Mai și Ren Mai);
- reglarea meridianului extraordinar Yin Qiao Mai – R6 + P7;
- ameliorarea funcției de recepție Qi pulmonar – R3 + R25 + VC4 + P7 + E36;
- dinamizarea Qi a Rinichilor – R6 + R1 + R13 + VC6;
- fortificarea Qi a Rinichilor – R3 + V23 + E36;
- fortificarea Yang-Qi a Rinichilor – R2 + R7 + VC4 + VC6 + E36 + V23;
- fortificarea Yin-Qi a Rinichilor – R3 + R6 + R10 + VC4 + RP6;
- reglarea metabolismului hidric (edem – R7 + P7 + E28 + VC9 + RP9);
- reglarea orificiilor inferioare (incontinență de urină – R7 + RP6 + VC4 + E36; enurezis – R3 + VG20 + C7; spermatooree – R7 + R10 + VG4 + VG20; diaree – R3 + E25 + V23 + VC4);
- armonizarea proceselor psihice (Rinichii joacă un rol important în reglarea voinței – R3 + R7 + VG20 + VC4 + E36; punctele

meridianului Rinichi sunt indicate în armonizarea proceselor psihice frică-voință care reprezintă balanța Yin-Yang – R3 + C7 + VC4 + VC14; punctul R1 Yongquan este inclus în formulele terapeutice indicate în tulburări psihice la bolnavii cu sindromul Vânt Intern, hiperactivitatea Yang-Qi etc.; în general, armonizarea Rinichilor joacă un rol foarte important în normalizarea proceselor psihice la bolnavii cu cele mai diferite tulburări, în special în dezarmonia Rinichi-Inimă).

Afectarea organului și traiectului intern al meridianului:

micțiuni rare, retenție de urină, incontinență urinară, poliurie, anurie, nefrită, pielonefrită; edeme; dureri lombare, impotență, frigiditate; astenie.

Afectarea traiectului extern al meridianului:

durere, tulburări de sensibilitate, tumefiere, tulburări distrofice și alte semne patologice de-a lungul traiectului meridianului; lombalgii, sacralgii, dureri pe suprafața internă a coapselor; slăbiciune în membrele inferioare, slăbiciune a coloanei vertebrale.

Afectarea conexiunilor energetice ale meridianului:

afectarea organelor bazinului mic, organelor cutiei toracice; anghină, glosită, gură uscată; dispnee; cefalee; diminuarea auzului; blefarospasm, edeme suboculare; tulburări psihice (depresie, astenie, anxietate, fobii, iritabilitate, visuri erotice, insomnie).

R1 Yongquan

- punct antic Jing-dist. (elementul Lemn);
- punct de dispersie al meridianului R;
- punct de intrare în meridianul R;
- punct sezonier al organului Zang Rinichi (punct de tonifiere pentru perioada de vară și de dispersie pentru perioada de iarnă).

Indicații

- hipertermie (R1 + V40); punct specific pentru sistemul vascular (diminuează preponderent tensiunea arterială diastolică); tinitus, surditate; letargie; timiditate, depresie, fobii, isterie;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (limbă);
- punct Jen din perechea Gen-Jie: R1 – gât;
- punct antialgic: degetele piciorului; cap (cefalee insuportabilă); rinichi, uretră (dizurie); uter (ptoza); abdomen (dureri circulare la nivelul ombilicului); nervul tarsian; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – gât;
- punct sindromal: hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului, Focul Ficatului (migrenă; agresiune, iritabilitate); Focul Inimii (insomnie, anxietate); Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor (insomnie; gât uscat); dezarmonia Inimă-Rinichi; perversiunea fluxului Qi a Rinichilor (astm; retenție urinară); Vânt Intern (epilepsie); Vânt al Ficatului.

Localizarea

regio plantaris, la unirea 1/3 anterioare și 2/3 posterioare a

plantei, în fosa formată prin flectarea degetelor.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • aponeurosis plantaris • m.flexor digitorum brevis • m.flexor digitorum longus • m.lumbricalis • caput obliquum m.adductoris hallucis brevis • mm.interossei plantares • mm.interossei dorsales.

Inervația • Vascularizația

pielea – n.plantaris medialis (L5, S1,2), ramură a n.tibialis (plexus sacralis); mușchii – n.tibialis (S1,2,3), n.plantaris medialis (L5, S1,2), n.plantaris lateralis (S1,2) • arcus plantaris, arcus venosus plantaris, aa. et vv.metatarsae plantares.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5– 0,8 cun). Moxibustie 5– 15 minute.

Senzația

spre degete.

R2 Rangu

- punct antic Ying (elementul Foc);
- punct de dispersie al meridianului R;
- punct al meridianului extraordinar Yin Qiao Mai;
- punct sezonier al organului Zang Rinichi (punct de tonifiere pentru al 5-lea sezon și de dispersie pentru perioada de primăvară).




Fig.82

Indicații

- astenie; retenție hidrică; prurit vulvar; prolaps uterin; hipertensiune arterială (diminuează preponderent tensiunea arterială sistolică); neliniște, indecizie, melancolie, slăbiciune, fobii, logoree, anxietate;
- punct Ben din perechea Biao-Ben: R2– V23; R2– VC23;
- punct antialgic: gât; inimă (stenocardie cu senzație de rece în membrele superioare; precordialgii); rinichi (dureri cronice în diateza urică), uretră; uter, organele genitale externe la femei (dureri și prurit), ciclul menstrual (dismenoree cu dureri în regiunea lombară); cefalee (occipit);
- punct sindromal: Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor (impotență, frigiditate, astenie); Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor (insomnie, cistită); Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor și Plămânilor (piele uscată; hemoptizie); Insuficiența Yin-Qi a Inimii și Rinichilor (insomnie, labilitate emoțională); Insuficiență-Căldură a Rinichilor.

Localizarea

margo medialis pedis, sub tuberozitatea scafoidului, la granița pielii roșii (Yang) și albe (Yin).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia dorsalis pedis • m.abductor hallucis • tendo m.tibialis posterior • tendo m.flexor hallucis longus • tendo m.flexor digitorum longus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.saphenus (L3,4)*, ramură a *n.femoralis (plexus lumbalis)*; mușchii – *n.plantaris medialis (L5, S1)*, *n.tibialis (L4,5, S1,2,3)* • *r.superficialis a.plantaris medialis*, *aa.tarseae mediales*, *rete venosum dorsale pedis*, *arcus venosus dorsalis pedis*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5– 1 cun). Tehnica de sângerare (prurit vulvar; cardialgii). Moxibustie 5– 10 minute.

Senzația

spre degetul mare.

R3 Taixi

- punct antic Shu-Yuan (elementul Pământ);
- punct sursă al meridianului R;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular R;
- punct sezonier al organului Zang Rinichi (punct de tonifiere pentru perioada de toamnă și de dispersie pentru perioada de vară).

Indicații

- spermatoree; prurit genital; punct cu efect de reglare a uterului (menstre neregulate, amenoree);
- punct antialgic: globii oculari; dinți; inimă (precordialgii); rinichi (dureri cronice în diateza urică); talalgie; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – gură, gât;
- punct sindromal: Insuficiența Esenței Rinichilor; Insuficiența Qi a Rinichilor; Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor (astenie; membre reci; edeme; impotență; incontinență urinară); Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor (insomnie; tinitus; cistită etc.).

Localizarea

regio talocruralis posterior, în fosa dintre maleola internă și tendonul Achile.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • retinaculum musculorum flexorum • vagina synovialis m.flexoris hallucis longi • tendo m.flexor digitorum longus • tendo m.tibialis posterior.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.saphenus (L3,4)*, ramură a *n.femoralis (plexus lumbalis)*; mușchii – *n.tibialis (S1,2,3)* • *a. et vv.tibiales posteriores*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5– 0,8 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre marginea anterioară a maleolei laterale (se admite inserția până la punctul V60 Kunlun). Moxibus-

tie 5–10 minute.

Senzația

prin călcâi spre talpă.

R4 Dazhong

- punct Lo al meridianului R.

Indicații

- punct specific genital; complex de inferioritate, melancolie, anxietate, somnolență, neurastenie, frică, teamă de viitor;
- punct antialgic: dinți (maxilarul superior); centura scapulară; esofag (dureri spasmodice cu vomitare); vezicula biliară (dureri cu vomitări), ficat (colică); rinichi (colică), vezica urinară, uretră; lom-balgie (durerea iradiază în fese și suprafața medială a coapselor), talalgie; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – gura, limba, gingiile;
- punct sindromal: Insuficiența Qi, Yang-Qi sau Yin-Qi a Rinichilor.

Localizarea

regio calcanea, la 0,5 cun postero-inferior de R3 Taixi, în unghiul dintre tendonul Achile și calcaneu.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • tendo calcaneus (Achillis).

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.saphenus (L3,4)*, ramură a *n.femoralis (plexus lumbalis)* • *rr.calcanei a.tibialis posterior, r.malleolaris medialis a.tibialis posterior, vv.comitantes.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,3–0,5 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre marginea laterală a calcaneului. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

În jos, spre suprafața medială a călcâiului.

R5 Shuiquan

- punct Xi al meridianului R.

Indicații

- prolaps uterin; miopie; punct specific în retenție urinară; tulburări psihice în perioada premenstruală (depresie, iritabilitate, nervozitate, agresivitate);
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (regiunea ombilicală);
- punct antialgic: gât (abcès); inimă (dureri sau slăbiciune în regiunea inimii în timpul menstruelor); abdomen; talalgie; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – gât, gură; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: gleznă (R5) – pumn (C6);

- punct sindromal: Insuficiența Rinichilor (amenoree).

Localizarea

regio talocruralis posterior, la 1 cun sub R3 Taixi, în depresiunea pe marginea internă a tuberozității calcaneului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • retinaculum musculorum flexorum • calcaneus (suprafața internă).

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.saphenus (L3,4)*, ramură a *n.femoralis (plexus lumbalis)*; mușchii – *n.tibialis (L4,5) • rete malleolare mediale, rr.malleolaris medialis a.tibialis posterior, vv.comitantes.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,3–0,5 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre călcâi; se înțeapă spre punctul R6 Zhaohai (menstre neregulate). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

În regiunea călcâiului.

R6 Zhaohai

- punct de încrucișare a meridianelor R, Yin Qiao Mai;
- punct de intrare și punct de comandă al meridianului extraordinar Yin Qiao Mai.

Indicații

- sughiț; tonzilită; afectarea rinichilor, vezicii și organelor genitale (cu predominarea atoniei); leucoree; depresie, neurastenii, insomnie (R6 + V62);
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (ochi; gât);
- punct Ben din perechea Biao-Ben: R6–V23; R6–VC23;
- punct antialgic: cap (cefalee premenstruală, în timpul ciclului menstrual, dureri cu vertij și cefalee cu acutizare în timpul nopții: R6 – tonifiere și V62 – dispersie); glande mamare (indurația tesutului); vezica urinară, abdomenul inferior; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – gingiile;
- punct sindromal: Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor (anxietate, insomnie; gât uscat; amenoree); Căldură Xue (afecțiuni cutanate).

Localizarea

margo medialis pedis, în fosetă, la 0,5 cun sub marginea inferioară a maleolei interne.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia dorsalis pedis • m.abductor hallucis • vagina m.tibialis posterior.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.saphenus (L3,4)*, ramură a *n.femoralis (plexus lumbalis)*; mușchii – *n.plantar medialis (L5, S1), n.tibialis (L4,5) • rr.*




Fig.83




Fig.84

malleolaris medialis a. tibialis posterior, vv. tibiales posteriores.

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în interiorul articulației talocrurale.

R7 Fuliu

- punct antic Jing-prox. (elementul Metal);
- punct de tonifiere al meridianului R;
- punct sezonier al organului Zang Rinichi (punct de tonifiere pentru perioada de iarnă și de dispersie pentru al 5-lea sezon).

Indicații

- punct specific cu acțiune diuretică pronunțată; constipații; orhită, uretrită, prostatită, impotență (R7 + VC3); hiperhidroză; logoree, iritabilitate, complex de superioritate, paranoică;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (piept);
- punct Ben din perechea Biao-Ben: R7–V23; R7–VC23;
- punct antialgic: dinți; rinichi; testicule; hemoroizi (dureri cu hemoragie), anus (dureri și prurit); lombalgie; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – dinți, centura scapulară;
- punct sindromal: Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor (membre reci; edeme; depresie psihică); Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor (transpirații – R7 + C6); perversiunea fluxului Qi a Rinichilor (astm; retenție urinară); Vânt-Frig (R7 + GI4); Umiditate-Căldură a Focarului Inferior (infecția tractului urinar; leucoree).

Localizarea

regio cruralis posterior, la 2 cun deasupra lui R3 Taixi, pe

marginea anterioară a tendonului Achile.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.flexor hallucis longus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.cutanei cruris mediales n.sapheni (L3, 4)*, ramuri ale *n.femoralis (plexus lumbalis)*; mușchii – *n.tibialis (S1,2,3) • a. et vv. tibiales posteriores, r.venosus anastomoticus, v.saphena magna.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun); se înțeapă spre punctul V59 Fuyang (edeme la bolnavii cu Insuficiența Yang-Qi a Splinei și Rinichilor; lombalgie). Moxibustie 5–8 minute.

Senzația

spre baza călcâiului.

R8 Jiaoxin

- punct Xi al meridianului extraordinar Yin Qiao Mai;
- punct de încrucișare a meridianelor R, Yin Qiao Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yin Qiao Mai.

Indicații

- oligurie; hipertensiune arterială; edeme; prolaps uterin, metroragii, punct important în reglarea ciclului menstrual;
- punct antialgic: abdomen; suprafața medială a coapsei și regiunea inghinală; rinichi; testicule; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – dinți, braț, antebraț;
- punct sindromal: stagnarea Qi și Xue la femei (menstre neregulate, fibromiom uterin; edeme).

Localizarea

regio cruralis posterior, la 2 cun deasupra R3 Taixi și la 0,5 cun înaintea R7 Fuliu, pe marginea posterioară a tibiei.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.flexor digitorum longus • m.tibialis posterior.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.cutanei cruris mediales n.sapheni (L3, 4)*, ramuri ale *n.femoralis (plexus lumbalis)*; mușchii – *n.tibialis (S1,2,3) • a. et vv. tibiales posteriores, r.venosus anastomoticus, v.saphena magna.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

prin călcâi spre degetul mare.

R9 Zhubin

- punct Xi al meridianului extraordinar Yin Wei Mai;
- punct de încrucișare a meridianelor R, Yin Wei Mai;

- punct de intrare al meridianului extraordinar Yin Wei Mai.

Indicații

- posedă acțiune antispastică pronunțată (spasme vezicale și ale organelor genitale; crampe ale mușchiului gastrocnemian);
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (piept);
- punct antialgic: cap (cefalee în afecțiuni alergice); vezica urinară;
- punct sindromal: Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor (anxietate, insomnie; palpitații); dezarmonie Inimă-Rinichi.

Localizarea

regio cruralis posterior, la 5 cun deasupra lui R3 Taixi, pe marginea posterioară a tibiei, sub mușchiul gastrocnemian, pe linia ce unește R3 Taixi și R10 Yingu.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m. soleus • m. flexor digitorum longus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr. cutanei cruris mediales n. sapheni (L3, 4)*, ramuri ale *n. femoralis (plexus lumbalis)*; mușchii – *n. tibialis (L4,5, S1,2,3)* • *a. et vv. tibiales posteriores, r. venosus anastomoticus, v. saphena magna.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–1 cun). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în regiunea gambei și spre laba piciorului.

R10 Yingu

- punct antic He (elementul Apă);
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular R;
- punct sezonier al organului Zang Rinichi (punct de tonifiere pentru perioada de primăvară și de dispersie pentru perioada de toamnă).




Fig.85

Indicații

- disurie (R10 + V28 + RP6), oligurie, impotență (R10 + V23 + VG4);
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (sistemul urinar);
- punct antialgic: coapsă (dureri cu contractură pe suprafața medială), articulația coxofemurală (dureri ce iradiază spre suprafața medială a coapsei), articulația genunchiului (cu limitarea flexiei); gât (spondilopatia cervicală); cavitatea bucală (dureri cu hipersalivație), abdomen (dureri ce iradiază în ombilic); organele genitale externe (dureri la urinare); punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: genunchi (R10) – cot (C3).

- punct sindromal: Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor (vaginită; gură și gât uscate, piele uscată, sete); dezarmonie Inimă-Rinichi; Umiditate a Focarului Inferior (edeme; leucoree; disurie; senzație de greutate în abdomenul inferior).

Localizarea

regio genus posterior, la extremitatea medială a pliului de flexie popliteu, între tendonul mușchiului semitendinos și cel al mușchiului semimembranos.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia lata • tendines mm.semitendinosi et semimembranosi • caput mediale m.gastrocnemii.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.saphenus (L3,4)*, ramură a *n.femoralis (plexus lumbalis)*, *n.cutaneus femoris posterior (S1,2,3)* de la *plexus sacralis*; mușchii – *n.tibialis (L4,5, S1,2) • a. et vv.tibiales posteriores, a. genus superior medialis, v.saphena magna, a. et v.popliteae.*

Tehnica

se înțeapă vertical (1–1,2 cun). Moxibustie 3–5 minute.

Senzația

în jos, spre laba piciorului.

R11 Henggu

- punct de încrucișare a meridianelor R, Chong Mai;
- punct de intrare al meridianului extraordinar Chong Mai.

Indicații

- azoospermie; astenie; punct specific în simptomele legate de deplasarea laterală a uterului; punct important în patologia organelor genitale externe (R11 + VC2 + E30);
- punct antialgic: abdomen (dureri în abdomenul inferior și flancuri); rinichi; organele genitale externe; lumbago; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – limbă, comisura palpebrală medială; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: șold (R11) – umăr (C1).

Localizarea

regio pubica, pe marginea superioară a pubisului, la 0,5 cun lateral de linia mediană (la nivelul punctului VC2 Qugu).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdominis • m.pyramidalis • m.rectus abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior n.iliohypogastrici (Th12, L1)*, ramuri ale *n.ilioinguinalis (L1)* de la *plexus lumbalis*; mușchii – *n.subcostalis (Th12)*, *n.iliohypogastricus (Th12, L1) • a. et vv.epigastricae inferiores, a. et vv.epigastricae superficiales, aa.pudendae externae, v.pudenda externa.*

Tehnica

se înțeapă vertical – 1-1,2 cun (înainte de ședință bolnavul va urina; punctarea în timpul sarcinii este contraindicată; în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 10–30 minute.

Senzația

în jos, spre scrot și în regiunea pubisului.

R12 Dahe

- punct de încrucișare a meridianelor R, Chong Mai;
- punct al meridianului extraordinar Chong Mai.

Indicații

- metroragie, punct important în tulburările ciclului menstrual (R12 + VC3 + E29); spermatooree, azoospermie;
- punct antialgic: vezica urinară; ovare; penis, scrot; ciclul menstrual (dismenoree); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ochi.

Localizarea

regio pubica, la 4 cun sub ombilic și la 0,5 cun lateral de linia mediană (la nivelul punctului VC3 Zhongji).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdominis • m.pyramidalis • m.rectus abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.subcostalis (Th12), r.cutaneus anterior n.iliohypogastrici (Th12, L1)* de la *plexus lumbalis*; mușchii – *nn.intercostales (Th5-12) • a. et vv.epigastricae superficiales, a. et vv.epigastricae inferiores.*

Tehnica

se punctează vertical – 1–1,2 cun (în timpul sarcinii punctarea este contraindicată; înainte de ședință bolnavul va urina). Moxibustie 10–30 minute.

Senzația

locală.

R13 Qixue

- punct de încrucișare a meridianelor R, Chong Mai;
- punct al meridianului extraordinar Chong Mai.

Indicații

- sterilitate, punct specific în afectarea ovarelor; orhită, prostatită; edeme periarticulare;
- punct antialgic: penis; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ochi;
- punct sindromal: Insuficiența Esenței Rinichilor.




Fig.86




Fig.87

Localizarea

regio pubica, la 3 cun sub ombilic și la 0,5 cun lateral de linia mediană (la nivelul punctului VC4 Guanyuan).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdomini • m.rectus abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.subcostalis (Th12)*;
mușchii – *nn.intercostales (Th5-12) • a. et vv.epigastricae superficiales, a. et vv.epigastricae inferiores.*

Tehnica

se punctează vertical – 1–1,2 cun (punctarea este contraindicată în timpul sarcinii; în cazul retenției urinare punctarea profundă este contraindicată). Moxibustie 10–30 minute.

Senzația

locală.

R14 Siman

- punct de încrucișare a meridianelor R, Chong Mai;
- punct al meridianului extraordinar Chong Mai.

Indicații

- nefrită; sterilitate; punct specific în hipersensibilitate a organelor sexuale; hernie;
- punct antialgic: ochi; abdomenul inferior, intestine (dureri spasmodice); uter, ciclul menstrual (dismenoree).

Localizarea

regio umbilicalis, la 2 cun sub ombilic, la 0,5 cun lateral de linia mediană (la nivelul punctului VC5 Shimen).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdomini • m.rectus abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis XI*; mușchii – *nn.intercostales (Th5-12) • a. et vv.epigastricae superficiales, a. et vv.epigastricae inferiores.*

Tehnica

se punctează vertical – 1–1,2 cun (punctarea este contraindicată în timpul sarcinii; în cazul retenției urinare este contraindicată înțeparea profundă). Moxibustie 10–30 minute.

Senzația

locală.

R15 Zhongzhu

- punct de încrucișare a meridianelor R, Chong Mai;
- punct al meridianului extraordinar Chong Mai.

Indicații

- orhită; tulburări de peristaltism (constipație); afectarea organelor bazinului mic;
- punct antialgic: ochi; abdomenul inferior; cordonul spermatic; cefalee (în formă de casă); lombalgie; talalgie; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – articulațiile degetelor de la mână.

Localizarea

regio umbilicalis, la 1 cun sub ombilic, la 0,5 cun lateral de linia mediană (la nivelul punctului VC7 Yinjiao).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdomini • m.rectus abdominis • lamina posterior vaginae m.recti abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis X*; mușchii – *nn.intercostales (Th5-12) • a. et vv.epigastricae superficiales, a. et vv.epigastricae inferiores.*

Tehnica

se înțeapă vertical – 1–1,2 cun (punctarea este contraindicată la gravide; în cazul retenției urinare este contraindicată înțeparea profundă). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

locală.

R16 Huangshu

- punct de încrucișare a meridianelor R, Chong Mai;
- punct al meridianului extraordinar Chong Mai.

Indicații

- icter; atrofii musculare; constipații cu scaune uscate;

- punct antialgic: ochi; inimă (precordialgii); abdomen, stomac, intestine (dureri spasmodice); vezica urinară (dureri spasmodice); vagin; cefalee (în formă de cască); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ochi; urechi;
- punct sindromal: Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor; dezarmonia Inimă-Rinichi.

Localizarea

regio umbilicalis, la 0,5 cun lateral de ombilic.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdomini • m.rectus abdominis • lamina posterior vaginae m.recti abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis X*; mușchii – *nn.intercostales (Th5-12) • a. et vv.epigastricae superficiales, a. et vv.epigastricae inferiores.*

Tehnica

se punctează vertical – 1–1,2 cun (nu se punctează în ultimele luni de sarcină). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

locală.

R17 Shangqu

- punct de încrucișare a meridianelor R, Chong Mai;
- punct al meridianului extraordinar Chong Mai.

Indicații

- spasme ale tractului digestiv și organelor genitale feminine; sughiț; anorexie; carie dentară; cheratită;
- punct antialgic: ochi; abdomen, stomac, intestine; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – urechi (prurit), comisura bucală, obraji, nas.

Localizarea

regio umbilicalis, la 2 cun deasupra ombilicului, la 0,5 cun lateral de linia mediană (la nivelul punctului VC10 Xiawan).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdomini • m.rectus abdominis • lamina posterior vaginae m.recti abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis IX*; mușchii – *nn. intercostales (Th5-12) • a. et vv.epigastricae superiores.*

Tehnica

se înțeapă vertical – 1–1,2 cun (nu se punctează în ultimele luni de sarcină). Moxibustie 20–30 minute.




Fig.88




Fig.89

Senzația
locală.

R18 Shiguan

- punct "barieră";
- punct de încrucișare a meridianelor R, Chong Mai;
- punct al meridianului extraordinar Chong Mai.

Indicații

- hipersalivație; sughiț; hipersensibilitate auditivă; fotofobie; sterilitate;
- punct antialgic: ochi; stomac și intestine (dureri spasmodice); ciclul menstrual; prostată; cap (migrenă periodică).

Localizarea

regio epigastrica, la 3 cun deasupra ombilicului, 0,5 cun lateral de linia mediană (la nivelul punctului VC11 Jianli).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdomini • m.rectus abdominis • lamina posterior vaginae m.recti abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis VIII*; mușchii – *nn. intercostales (Th5-12) • a. et vv.epigastricae superiores.*

Tehnica

se punctează vertical – 1–1,2 cun (nu se va înțepa în ultimele săptămâni de sarcină). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația
locală.

R19 Yindu

- punct de încrucișare a meridianelor R, Chong Mai;
- punct al meridianului extraordinar Chong Mai.

Indicații

- balonare postprandială; dispnee; hipersialoree; cheratită;
- punct antialgic: cutia toracică (dureri în emfizem); stomac, intestine (dureri spasmodice); uter.

Localizarea

regio epigastrica, la 4 cun deasupra ombilicului, la 0,5 cun lateral de linia mediană (la nivelul punctului VC12 Zhongwan).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdomini • m.rectus abdominis • lamina posterior vaginae m.recti abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis VIII*;
mușchii – *nn. intercostales (Th5-12) • a. et vv.epigastricae superiores.*

Tehnica

se înțeapă vertical – 1–1,2 cun (nu se va înțeapa în ultimele săptămâni de sarcină). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

locală.

R20 Tonggu

- punct de încrucișare a meridianelor R, Chong Mai;
- punct al meridianului extraordinar Chong Mai.

Indicații

- punct specific în vărsătură la gravide (R20 + V43);
- punct antialgic: coaste; ochi; stomac (dilatarea stomacului).

Localizarea

regio epigastrica, la 5 cun deasupra ombilicului, 0,5 cun lateral de linia mediană (la nivelul punctului VC13 Shangwan).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdomini • m.rectus abdominis • lamina posterior vaginae m.recti abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis VIII*;
mușchii – *nn.intercostales (Th5-12) • a. et vv.epigastricae superiores.*

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,5–1 cun (nu se va înțeapa în ultimele săptămâni de sarcină). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația
locală.

R21 Youmen

- punct de încrucișare a meridianelor R, Chong Mai;
- punct de ieșire al meridianului extraordinar Chong Mai.

Indicații

- tumefierea și durerea sânelui; spasme ale tractului digestiv superior, greață, vomă; insomnie, diminuarea memoriei, tulburări ale caracterului;
- punct antialgic: ochi; nervii intercostali; inimă (dureri cu vărsături); stomac; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – amigdale.

Localizarea

regio epigastrica, la 6 cun deasupra ombilicului, 0,5 cun lateral de linia mediană (la nivelul punctului VC14 Juque).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina anterior vaginae m.recti abdomini • m.rectus abdominis • lamina posterior vaginae m.recti abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis VII*; mușchii – *nn. intercostales (Th5-12) • a. et vv.epigastricae superiores.*

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,5–0,8 cun (nu se va puncta profund, pentru a evita lezarea ficatului). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația
locală.

R22 Bulang

Indicații

- astm bronșic, dispnee; supurații cutanate;
- punct antialgic: nervii intercostali; esofag, stomac și intestine (dureri spasmodice).

Localizarea

regio pectoralis, în spațiul V intercostal, la 2 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • m.pectoralis major • fascia thoracica • membrana intercostalis externa • m.intercostalis internus • fascia endothoracica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (pectoralis) n. intercostalis V*; mușchii – *nn.pectorales medialis et lateralis (C5-8, Th1), n.intercostalis*

(Th5) • *rr.intercostales anteriores a.thoracicae internae, rr.perforantes a. et vv.thoracicae internae, r.cutaneus lateralis a.intercostalis V.*

Tehnica

se înțeapă vertical sau oblic – 0,5–0,8 cun (punctarea profundă va fi evitată, există pericolul lezării plămânului sau a inimii).
Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

locală și în spațiile intercostale.

R23 Shenfeng

Indicații

- edem pulmonar;
- punct antialgic: nervii intercostali; inimă (stenocardie); piept (mastită).

Localizarea

regio pectoralis, în spațiul IV intercostal, la 2 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • m.pectoralis major • fascia thoracica • membrana intercostalis externa • m.intercostalis internus • fascia endothoracica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (pectoralis) n. intercostalis IV*; mușchii – *nn.pectorales medialis et lateralis (C5-8, Th1), n.intercostalis (Th4) • rr.intercostales anteriores a.thoracicae internae, rr.perforantes a. et vv.thoracicae internae, r.cutaneus lateralis a.intercostalis IV.*

Tehnica

se înțeapă vertical sau oblic – 0,5–0,8 cun (punctarea profundă nu se va face, pentru a evita lezarea inimii și a plămânului).
Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

locală și în spațiile intercostale.

R24 Lingxu

Indicații

- dispnee, astm bronșic, bronșită; anxietate, insomnie afectivă;
- punct antialgic: nervii intercostali; inimă (cardialgie).

Localizarea

regio pectoralis, în spațiul III intercostal, la 2 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • m.pectoralis major •

fascia thoracica • membrana intercostalis externa • m.intercostalis internus • fascia endothoracica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (pectoralis) n. intercostalis III*; mușchii – *nn.pectorales medialis et lateralis (C5-8, Th1), n.intercostalis (Th3) • rr.intercostales anteriores a.thoracicae internae, rr.perforantes a. et vv.thoracicae internae, r.cutaneus lateralis a.intercostalis III.*

Tehnica

se înțeapă vertical sau oblic – 0,5–0,8 cun (punctarea profundă nu se recomandă, pentru a evita lezarea inimii și a plămânilor; în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

locală și în spațiile intercostale.

R25 Shencang

Indicații

- dispnee, tuse; hipoacuzie; insomnie, anorexie nervoasă;
- punct antialgic: nervii intercostali; inimă (senzație de greutate, stenocardie); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – suprafața dorsală a mâinii, maxilare.

Localizarea

regio pectoralis, în spațiul II intercostal, la 2 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.platysma • fascia pectoralis • m.pectoralis major • fascia thoracica • membrana intercostalis externa • m.intercostalis internus • fascia endothoracica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (pectoralis) n.intercostalis II, nn.supraclaviculares mediales (C3,4) de la plexus cervicalis*; mușchii – *n.facialis, nn.pectorales medialis et lateralis (C5-8, Th1), n.intercostalis (Th2) • rr.intercostales anteriores a.thoracicae internae, a. et vv.intercostales supremae, a. et vv.thoracoacromiales.*

Tehnica

se înțeapă vertical sau oblic – 0,5–0,8 cun (se evită punctarea profundă). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

locală și în spațiile intercostale.

R26 Yuzhong

Indicații

- hipersialoree; palpitații; dispnee, astm bronșic; punct specific în afectarea coardelor vocale;

- punct antialgic: nervii intercostali; splină; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – index, centura scapulară (partea superioară).

Localizarea

regio pectoralis, la 2 cun în afara liniei mediane, în spațiul I intercostal.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.platysma • fascia pectoralis • m.pectoralis major • fascia thoracica • membrana intercostalis externa • m.intercostalis internus • fascia endothoracica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.supraclaviculares mediales (C3,4)* de la *plexus cervicalis*, *rr.cutanei anteriores (pectorales) n. intercostalis I*; mușchii – *n.facialis*, *nn.pectorales medialis et lateralis (C5-8, Th1)*, *n. intercostalis (Th1) • rr.intercostales anteriores a.thoracicae internae, a. et vv.intercostales supremae, a. et vv.thoracoacromiales.*

Tehnica

se înțeapă vertical sau oblic – 0,5–0,8 cun (se evită punctarea profundă). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

locală și în spațiile intercostale.

R27 Shufu

Indicații

- astm bronșic; afte bucale, glosită; insuficiența mușchiului ciliar; iritabilitate, agitație, insomnie;
- punct antialgic: limbă; nervii intercostali; cefalee (cauzată de un efort psihoemoțional excesiv); ciclul menstrual (dureri premenstruale); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ochi, nas extern;
- punct sindromal: Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor.

Localizarea

regio pectoralis, la 2 cun în afara liniei mediane, în fosa subclaviculară.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.platysma • fascia pectoralis • m.pectoralis major • m.subclavius.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.supraclaviculares mediales (C3,4)* de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n.facialis*, *nn.pectorales medialis et lateralis (C6,7,8, Th1)*, *n.subclavius (C5) • rr.intercostales anteriores a.thoracicae internae, a. et vv.intercostales supremae, a. et vv.thoracoacromiales.*

Tehnica

se înțeapă vertical sau oblic – 0,5–0,8 cun (se evită punctarea

profundă). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

locală și în sus, spre claviculă.

I.9. Meridianul Pericard (MC)

Meridianul Pericard este de natură Yin, centrifug, pereche, conține 9 puncte (fig. 90–96).

Relațiile energetice:

1. În cadrul marii circulații energetice este precedat de meridianul Rinichi și urmat de meridianul Trei Focare (R-MC-TR).
2. În cuplu cu meridianul Trei Focare realizează loja energetică Foc (MC-TR). În cadrul ciclului celor 5 elemente este stimulat de loja energetică Lemn (VB-F) și inhibat de loja energetică Apă (V-R).
3. În cuplu cu meridianul Ficat formează axul energetic Jue Yin (MC-F).
4. După regula "miezul zilei/miezul nopții" este cuplat cu meridianul Stomac (MC-E).
5. După regula "soț/soție" este cuplat cu meridianul Rinichi (MC-R).

Funcțiile energetice:

1. Funcția principală constă în protejarea Inimii (este "Palatul Inimii"), Pericardul fiind prima barieră în calea factorilor patogeni.
2. Una din funcțiile de bază constă în dominarea sexualității și a ciclului menstrual la femei.
3. Una din funcțiile importante constă în acțiunea asupra circulației sângelui și a activității psihice.
4. Reglează reacțiile psihice în condiții de atac al Căldurii patologice (psihoză, delir, comă etc.)

Acțiunea sindromal-energetică:

- dispersia Focului (Inimă – MC8 + C8; Ficat – MC8 + F2; Stomac – MC8 + E44 etc.);
- dinamizarea Qi și a Sângelui Inimii (cardialgie – MC6 + RP4 + RP21);
- reducerea Flegmei (Inimă – MC5 + C5; Plămâni – MC6 + P6 + E40; Stomac – MC6 + E40 etc.);
- descendența Qi (pervertirea Fluxului Qi al Plămânilor – MC6 + VC22; pervertirea Fluxului Qi al Stomacului – MC6 + VC13 + E21 + E36 etc.);
- reglarea meridianului extraordinar Yin Wei Mai – MC6 + RP4;
- armonizarea proceselor psihice (punctul principal este MC6 Neiguan); tulburări psihice cu stagnarea Qi a Ficatului – MC6 + F3 + F14 + VC17; stagnarea Qi a Inimii – MC6 + VC17 + RP4; sindromul Foc – MC6 + MC3 + C3; Flegmă – MC6 + E40 + VG20; Insuficiența Yin-Qi a Inimii – MC6 + RP4 + VC14 + C7 + VC17.




Fig.90. Punctele meridianului Pericard (MC).

Afectarea traiectului intern al meridianului:

dureri precordiale, cordialgii, pericardită, endocardită, miocardită, palpitații neurogene, plenitudine toracică.

Afectarea traiectului extern al meridianului:

durere și tulburări distrofice de-a lungul traiectului meridianului; spasme ale mâinilor, senzație de cald sau rece în palme; nevralgie intercostală.

Afectarea conexiunilor energetice ale meridianului:

afectarea stomacului, plămânilor; hiper- sau hipotensiune arterială, cefalee, vertij; oligurie sau poliurie, tumefiere sau congestie a

organelor genitale, frigiditate, impotență; tulburări psihice (sensibilitate sporită, logoree, delir, bucurie, nimfomanie, excitabilitate sexuală crescută sau scăzută, depresie, fobii nocturne).

MC1 Tianchi

- punct de intrare în meridianul MC;
- punct de înțrucișare al meridianelor MC, VB.

Indicații

- jenă respiratorie; inflamarea ganglionilor limfatici axilari;
- punct Biao din perechea Biao-Ben: MC1 – MC6;
- punct antialgic: coaste, regiunea diafragmei, nervii intercostali; glandele mamare; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ochi, gât, cutia toracică, suprafața antero-laterală a membrului inferior;
- punct sindromal: stagnarea Qi și Xue (Inimă, Plămâni, Ficat, cutia toracică) – MC1 + MC6 + RP21.

Localizarea

regio pectoralis, în spațiul IV intercostal, la 1 cun lateral de mamelon, la 5 cun lateral de linia mediană anterioară.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • m.pectoralis major • fascia clavipectoralis • m.pectoralis minor • fascia thoracica • m.intercostalis externus • m.intercostalis internus • fascia endothoracica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis n.intercostalis IV*; mușchii – *nn. pectorales mediales et laterales (C5-8, Th1), n.intercostalis (Th4) • rr.intercostales anteriores a.thoracicae internae, r.cutaneus lateralis a.intercostalis IV, a.thoracica lateralis (a.axillaris), a. et vv. intercostales posteriores, vv.intercostales anteriores.*

Tehnica

punctarea se va efectua în două etape: inițial perpendicular subcutanat, apoi aproape orizontal de-a lungul spațiului intercostal, mai aproape de marginea superioară a coastei V (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat lateral spre fosa axilară (punctarea profundă este interzisă). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

spre partea superioară a cutiei toracice și regiunea axilară.

MC2 Tianquan

Indicații

- tuse;
- punct antialgic: nervii intercostali; inimă; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ochi; mușchiul mare pectoral; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor;




Fig.91




Fig.92

umăr (MC2) – șold (F11).

Localizarea

regio brachialis anterior, la 2 cun sub extremitatea superioară a pliului axilar anterior, pe marginea internă a bicepsului brahial, puțin deasupra orizontalei ce trece prin mamelon.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia brachii • m.biceps brachii • m. brachialis • m.coracobrachialis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus brachii medialis* (C8, Th1) de la *plexus brachialis*; mușchii – *n. musculocutaneus* (C5,6,7) • *a. et vv. brachiales*.

Tehnica

se va înțepa vertical – 0,5-1 cun (atenție – plexul brahial).
Moxibustie 5-10 minute.

Senzația

În jos, spre articulația cotului.

MC3 Quze

- punct antic He (elementul Apă);
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular MC;
- punct sezonier al Pericardului (punct de tonifiere pentru perioada de primăvară și de dispersie pentru perioada de toamnă).

Indicații

- palpitații; tremurături ale mâinilor; nevroză astenică cu plâns ușor, emotivitate, crize nervoase, anxietate;

- punct antialgic: inimă; stomac; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – coccis, gambă, picior; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: cot (MC3) – genunchi (F8);
- punct sindromal: Foc al Inimii (manie, depresie; hipertensiune arterială, cefalee); Căldura Xue (eczemă; iritabilitate); Căldură a Intestinului; perversitatea fluxului Qi a Stomacului (greață, vomă); Căldură a Pericardului (stări febrile, comă).

Localizarea

regio cubitalis anterior, pe pliul cotului, pe marginea internă a tendonului bicepsului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia brachii • aponeurosis m.bicipitis brachii • m.brachialis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii medialis* (C8, Th1) de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.musculocutaneus* (C5,6,7) • *a. et vv. brachiales, v.intermedia cubiti.*

Tehnica

se va înțepa vertical (0,8–1 cun). Tehnica de sângerare (insolație; vomă; tuse; dureri în regiunea umărului). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în jos, spre degetele mâinii.

MC4 Ximen

- punct Xi al meridianului MC.

Indicații

- mastită; epistaxis; hemoragii hemoroidale, hemoragii gastrice; sentiment de insecuritate, emotivitate, fobii, anxietate, complex de superioritate (elemente paranoide), egoism;
- punct antialgic: inimă (aritmie); durere și contractură în membrele superioare, police, index și medius;
- punct sindromal: stagnarea Qi și Xue în Inimă (cardialgie, miocardită); Căldura Xue (afecțiuni cutanate); perversitatea Fluxului Qi a Stomacului și Plămânilor (tuse, sughiț, dispnee).

Localizarea

regio antebrachialis anterior, la 5 cun deasupra MC7 Daling, pe linia ce unește acest punct cu MC3 Quze.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • m.palmaris longus • m.flexor carpi radialis • m.flexor digitorum superficialis • m.flexor digitorum profundus • membrana interossea antebrachii anterior,

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii medialis* (C8, Th1) de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.medianus* (C6,7,8, Th1) • *a. et vv.inter-*

ossee anteriores, v. intermedia antebrachii.

Tehnica

se va înțepa vertical (0,5–1 cun); se înțeapă spre punctul TR8 Sanyangluo (algii precordiale; afonie acută; insomnie). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în sus, spre cot și în jos, spre palma.

MC5 Jianshi

- punct antic Jing-prox. (elementul Metal);
- punct Lo de grupă (C, MC, P);
- punct sezonier al Pericardului (punct de tonifiere pentru perioada de iarnă și de dispersie pentru al 5-lea sezon).

Indicații

- punct specific în afonie; timiditate, emotivitate, hiperchinezie infantilă, sensibilitate morală, insomnie cu anxietate, epilepsie (MC5 + IG3 + VG20), halucinații, schizofrenie, isterie;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (inimă);
- punct antialgic: inimă; prurit vulvar; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – coccis, fibulă.
- punct sindromal: Flegmă a Inimii (convulsii; apoplexie, afazie; depresii); Foc al Inimii (tonzilită cu febră; insomnie, agitație; hipertiroidism; limbă ulcerată); stagnarea Qi și Xue în cutia toracică; perversiunea fluxului Qi a Stomacului (greață, vomă).

Localizarea

regio antebrachialis anterior, la 3 cun deasupra MC7 Daling, pe linia ce unește acest punct cu MC3 Quze.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • tendo m.palmaris longus • tendo m.flexor carpi radialis • m.flexor digitorum superficialis • m.flexor digitorum profundus • m.pronator quadratus • membrana interossea antebrachii.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii medialis* (C8, Th1), ramuri ale *n.cutaneus antebrachii lateralis* (C5,6); mușchii – *n.medianus* et *n.ulnaris* (C6,7,8, Th1) • *a. et vv.interossee anteriores, v.mediana.*

Tehnica

se va înțepa vertical (0,5–1 cun); se înțeapă spre punctul TR6 Zhigou (spută profuză; dureri precordiale; senzație de distensie în hipocondru). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în sus, spre cot și în jos, spre degete.

MC6 Neiguan

- punct Lo al meridianului MC;




Fig.93




Fig.94

- punct Lo general;
- punct "barieră";
- punct de comandă al meridianului extraordinar Yin Wei Mai.

Indicații

- hipertensiune arterială; afecțiuni cutanate; șoc toxic (MC6 + R1 + E36); punct specific în patologia arterelor; vomă; isterie, insomnie, tulburări ale tonusului sexual;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (cap – psihismul, inimă, piept);
- punct Ben din perechea Biao-Ben: MC6– MC1;
- punct antialgic: inimă (stenocardie); stomac, ficat (colică); uretră (disurie); hemoroizi; cap (cefalee în hipertensiune intracraniană și hipertensiune arterială);
- punct sindromal: stagnarea Qi a Inimii (depresie; cardialgie); a Plămânilor (tuse cu senzație de opresiune în cutia toracică); a Stomacului (durere epigastrică, disconfort în stomac, distensie epigastrică); a Ficatului și Veziculei Biliare (dureri în hipocondru, colecistită; depresie; sindrom premenstrual); stagnarea Xue în Inimă (cardialgie); Flegmă a Inimii (confuzie mentală; hipertensiune arterială) sau a Plămânilor (bronșită, astmă); pervertirea fluxului Qi a Plămânilor (tuse, dispnee) și a Stomacului (greață, sughiț, regurgitații).

Localizarea

regio antebrachialis anterior, la 2 cun deasupra MC7 Daling, pe linia ce unește acest punct cu MC3 Quze.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • tendo m.palmaris longus • tendo m.flexor carpi radialis • tendo m.flexor pollicis longus • tendo m.flexor digitorum profundus • m.pronator quadratus • membrana interossea antebrachii.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii lateralis* (C5,6), ramură a *n.musculocutaneus* și *n.cutaneus antebrachii medialis* (C8, Th1) de la *plexus brachialis*; mușchii – *n. medianus et n.ulnaris* (C6,7,8, Th1) • *a. et vv.interossee anteriores, v.mediana*.

Tehnica

se va puncta vertical (0,5–1 cun); se va înțepa vertical, penetrând până la TR5 Waiguan (mialgie lombară acută; tulburări ale stomacului și splinei; algii precordiale; tulburări psihice); se va puncta sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în sus, spre punctul MC5 Jianshi (tahicardie supraventriculară). Tehnica de sângerare (cardialgii, tahicardie; gastralgii, vomă; febră). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în sus, spre cot (uneori până la cutia toracică) și în jos, spre degete.

MC7 Daling

- punct antic Yuan (elementul Pământ);
- punct de dispersie al meridianului MC;
- punct sursă al meridianului MC;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular MC;
- punct sezonier al Pericardului (punct de tonifiere pentru perioada de toamnă și de dispersie pentru perioada de vară).



Indicații

- hipertensiune arterială; inflamarea ganglionilor limfatici axilari; punctul "calmului sexual", emotivitate, extravagantă, nervozitate, gemete, răs nervos, insomnie, depresie sau veselie excesivă, isterie, anxietate;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (cap – psihismul);
- punct antialgic: suprafața anterioară a cutiei toracice, index, medius; dinți; nervii intercostali, nervul median; inimă; vezicula biliară (colecistită cu icter); cefalee (hipertensiune arterială); sciatică cu contractura mușchilor lombari; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – coccis, facies, obraji, dinți; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: pumn (MC7) – gleznă (F4);
- punct sindromal: Foc al Inimii; afectarea cutanată (Umiditate-Căldură, Căldură Xue).

Localizarea

regio carpalis anterior, la mijlocul pliului proximal al pumnului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • tendo m.palmaris lon-

gus • retinaculum flexorum • tendo m.flexor carpi radialis • tendo m.flexor pollicis longus • tendo m.flexor digitorum profundus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.palmaris n.mediani (C6,7,8)* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.medianus et n.ulnaris (C6,7,8, Th1)* • *r.carpeus palmaris (a.radialis et a.ulnaris)*, *rete venosum (vv.radiales et ulnares)*.

Tehnica

se va înțepa vertical (0,3–0,5 cun); se va înțepa sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre centrul palmei. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

În jos, spre degete.

MC8 Laogong

- punct antic Ying (elementul Foc);
- punct de ieșire din meridianul MC;
- punct sezonier al Pericardului (punct de tonifiere pentru al 5-lea sezon și de dispersie pentru perioada de primăvară).

Indicații

- fragilitate capilară (hemoragii); punct specific în depresie psihică, fobii, anxietate, ciclotimie, isterie (MC8 + VG26 + GI4);
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (limbă, gât);
- punct antialgic: laba mâinii (dureri în mușchi și articulații), police, index, medius, palmă; inimă (precordialgii cu vărsături); vezicula biliară (colecistită cu icter); cap (cefalee cu grețuri); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – gură, gât;
- punct sindromal: Foc al Inimii și Ficatului (MC8 + F2), Foc al Stomacului (gastrită).

Localizarea

palma manus, în centrul feței palmare, între metacarpienele II-III.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • aponeurosis palmaris • m.lumbricalis • mm.interossei palmaris et dorsalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.palmaris n.mediani (C6,7,8)* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.ulnaris (C8, Th1)* • *arcus palmaris superficialis, a.metacarpea palmaris, aa.digitales palmares communes, arcus venosus palmaris superficialis, vv.digitales palmares.*

Tehnica

se va puncta vertical, (0,3–0,5 cun). Moxibustie 5–15 minute (la pacienții cu polipi nazali moxibustia acestui punct este contraindicată, deoarece poate provoca creșterea polipilor).

Senzația

în jos, spre degetul mijlociu și inelar.

MC9 Zhongchong

- punct antic Jing-dist. (elementul Lemn);
- punct de tonifiere al meridianului MC;
- punct sezonier al Pericardului (punct de tonifiere pentru perioada de vară și de dispersie pentru perioada de iarnă).

Indicații

- hemeralopie; acufene; punct specific în spasmofilie (hipoparatiroidism); patologia arterelor; șoc, colaps; patologia cutanată; coșmaruri, plâns nocturn, anxietate, depresie, frică în întuneric, tulburări ale tonusului sexual;
- punct antialgic: regiunea membrelor superioare, fosa axilară; inimă; cefalee; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – limbă, obraji, ochi;
- punct sindromal: Căldură (febră, delir); Vânt Intern, Vânt al Ficatului.




Fig.96

Localizarea

palma manus, la vârful degetului III.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • phalanx digitalis distalis III.

Inervația • Vascularizația

pielea – nn.digitales palmares propriae (C6,7,8), ramuri ale n. medianus de la plexus brachialis • aa.digitales palmares propriae, vv.digitales palmares, rete venosum dorsale manus.

Tehnica

se va puncta vertical (0,1 cun); se va puncta sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre articulația radiocarpiană. Tehnica de sângerare (insolație, febră; vomitare cu diaree; criză hipertonică; acufene; cardialgii; astenie). Moxibustie 2 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

locală.

I.10. Meridianul Trei Focare (TR)

Meridianul Trei Focare este de natură Yang, centripet, pereche, conține 23 de puncte (fig.97–108).




Fig.97. Punctele meridianului Trei Focare (TR).

Relațiile energetice:

1. În cadrul marii circulații energetice este precedat de meridianul Pericard și urmat de meridianul Veziculă Biliară (MC-TR-VB).
2. În cuplu cu meridianul Pericard realizează loja energetică Foc (MC-TR). În cadrul ciclului celor 5 elemente este stimulat de loja energetică Lemn (VB-F).
3. În cuplu cu meridianul Veziculă Biliară formează axul energetic Shao Yang (TR-VB).
4. După regula "miezul zilei/miezul nopții" este cuplat cu meridianul Splină-Pancreas (TR-RP).
5. După regula "soț/soție" este cuplat cu meridianul Vezică (TR-V).

Funcțiile energetice:

1. Principala funcție constă în dirijarea diferitelor forme ale Qi. Activitatea meridianului Trei Focare este legată de activitatea tuturor meridianelor principale.
2. Reglează și integrează funcțiile la diferite niveluri: Focarul Superior (funcțiile cardiorespiratorii); Focarul Mediu (funcțiile digestive și metabolice); Focarul Inferior (funcțiile urogenitale).
3. Reglează homeostazia termică.

Acțiunea sindromal-energetică:

- dispersia Vântului și a Căldurii – TR5 + GI4 + VB20 + VG14;
- dispersia Umidității și a Căldurii – TR5 + RP6;
- calmarea hiperactivității Yang-Qi a Ficatului – TR6 + VB34 + VB40 + VB14;
- reglarea funcțiilor digestive – TR4 + VC12 + E36;
- reglarea funcțiilor urogenitale – TR4 + R6 + RP6;
- reglarea metabolismului hidric (edem – TR4 + VC4 + V64; TR6 + E40 + VC9 + VC6);
- dinamizarea Qi (stagnarea Qi în Focarul Superior – TR6 + TR3 + VB21; Focarul Mediu – TR6 + VB34 + VC12 + E21; Focarul Inferior – TR6 + VB34 + GI10 + VC6);
- reglarea meridianului extraordinar Yang Wei Mai – TR5 + VB41;
- fortificarea Wei Qi – TR4 + R3 + E36;
- armonizarea Funcțiilor cutanate – TR10 + TR6 + P7 + VB31;
- armonizarea proceselor psihice (tulburările psihice în mare măsură sunt în funcție de afectarea meridianului extraordinar Yang Wei Mai).

Afectarea traiectului intern al meridianului:

tulburări ale termoreglării, senzație de frig sau căldură în torace; dispepsie, senzație de plenitudine abdominală, balonare; disurie, edeme; sete.

Afectarea traiectului extern al meridianului:

durere sau tulburări distrofice de-a lungul meridianului; cefalee, vertij; tinitus, otită, surditate, mastoidită; tulburări oftalmologice (boli oculare, conjunctivită, lăcrimare etc.).

Afectarea conexiunilor energetice ale meridianului:

convulsii, epilepsie, iritabilitate, agresivitate, euforie, melancolie, obsesii, astenie, somnolență.

TR1 Guanchong

- punct antic Jing-dist. (elementul Metal);
- punct "barieră";
- punct de intrare în meridianul TR;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular TR;
- punct sezonier Trei Focare (punct de tonifiere pentru perioada de iarnă și de dispersie pentru al 5-lea sezon).

Indicații

- boli febrile; conjunctivite;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (articulația scapulo-humerală);
- punct antialgic: suprafața laterală a gâtului, centura scapulară, membrele superioare (dureri ce se intensifică la îmbrăcare), nervii intercostali; urechi, gât (dureri cu uscăciune); inimă (dureri ce iradiază în mezin); cefalee; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – gambă, genunchi, picior;
- punct sindromal: Căldură și Vânt-Căldură; stagnarea Qi și Xue.

Localizarea

dorsum manus, la 0,1 cun înapoia unghiului ungheal, pe fața cubitală a inelarului.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *phalanx digitalis distalis IV*.

Inervația • *Vascularizația*

pielea – *n.digitalis palmaris proprius* (C8, Th1), ramură a *n.ulnaris* de la *plexus brachialis* • *aa.digitales palmares propriae*, *vv.digitales palmares*, *rete venosum dorsale manus*.

Tehnica

se punctează vertical (0,1 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în sus, spre articulația radiocarpiană. Tehnica de sângerare (cefalee; conjunctivită; zgomote în urechi; tonzilită; nevralgie intercostală). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

locală.




Fig.98

TR2 Yemen

- punct antic Ying (elementul Apă);
- punct sezonier Trei Focare (punct de tonifiere pentru perioada de primăvară și de dispersie pentru perioada de toamnă).

Indicații

- surditate, acufene; depresie, fobii, delir;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (urechi);
- punct antialgic: suprafața posterioară a gâtului (mai sus de nivelul vertebrei VII cervicale); dinți; cap (cefalee în anemii); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – laba piciorului;
- punct sindromal: Căldură și Vânt-Căldură (cefalee, vertij; conjunctivită; artrite – TR2 + VB41); Foc al Ficatului (TR2 + VB41); Umiditate-Căldură cu afectarea urechilor; punct cu acțiune de umectare a Uscăciunii (gât, gură).

Localizarea

dorsum manus, între metacarpienele IV–V, înaintea articulației metacarpofalangiene, la 0,5 cun proximal de marginea pliului interfalangian, la granița pielii roșii (Yang) și albe (Yin).

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *mm.lumbricales* • *mm.interossei dorsales*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.digitalis palmaris proprius* (C8, Th1), ramură a *n.ulnaris* de la *plexus brachialis* • *aa.digitales dorsales*, *vv.intercapitales*, *rete venosum dorsale manus*.

Tehnica

se punctează vertical (0,3–0,5 cun). Tehnica de sângerare (cefalee; conjunctivită; zgomote în urechi; tonzilită, febră; odontalgie). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

În jos, spre degetul inelar și cel mic.

TR3 Zhongzhu

- punct antic Shu (elementul Lemn);
- punct de tonifiere al meridianului TR;
- punct sezonier Trei Focare (punct de tonifiere pentru perioada de vară și de dispersie pentru perioada de iarnă).

Indicații

- surditate, acufene; punct specific în simpaticotonie; inflamația ganglionilor limfatici; patologia urechilor și ochilor;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (cap-tâmples);
- punct Ben din perechea Biao-Ben: TR3–TR23;
- punct antialgic: urechi; cefalee (regiunea temporală); dureri în coloana vertebrală (TR3 + IG3); dureri în degetele mâinii la anteflexie; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – gambă, picior, suprafața medială a membrelor inferioare;
- punct sindromal: Căldură, Vânt-Căldură; Umiditate-Căldură în Ficat și Vezicula Biliară cu afectarea urechilor și ochilor; stagnarea Qi a Ficatului; hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului

(afectarea ochilor; cefalee; tinitus; depresie psihică).

Localizarea

dorsum manus, în unghiul format prin unirea metacarpienelor IV–V, în foseta înapoia capului metacarpianului IV.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *fascia dorsalis manus* • *m.interosseus dorsalis IV*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.digitalis dorsalis* (C8, Th1), ramură a *n.ulnaris* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.ulnaris* (C8, Th1) • *a. et vv.metacarpeae dorsales, rete venosum dorsale manus*.

Tehnica

se punctează vertical (0,5–0,8 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în sus, spre articulația radio-carpiană. Tehnica de sângerare (cefalee; conjunctivită; zgomote în urechi; tonzilită, febră; odontalgie). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

În sus, spre articulație și în jos, spre degetul inelar și mic.

TR4 Yangchi

- punct antic Yuan;
- punct sursă al meridianului TR;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular TR.

Indicații

- aritmie; punct important în tratamentul diabetului zaharat (TR4 + IG4);
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (uter);
- punct antialgic: dureri în degetele mâinii; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – suprafața medială a membrilor inferioare, laba piciorului; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: pumn (TR4) – gleznă (VB40);
- punct sindromal: Căldură și Vânt-Căldură; stagnarea Qi a meridianului TR; Insuficiența Qi și Yin-Qi a Rinichilor (tinitus, surditate); Umiditate a Focarului Inferior.

Localizarea

regio carpalis posterior, pe pliul posterior al pumnului, la marginea cubitală a tendonului extensorului comun al degetelor.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *retinaculum extensorum* • *tendo m.extensor digiti minimi* • *tendo m.extensor digitorum*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii posterior* (C5-8), ramură a *n.radialis* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.radialis* (C6,7,8) • *rete carpi dorsale, rete venosum dorsale manus*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,3–0,5 cun); se înțeapă spre punctul MC7 Daling (diabet zaharat; iritabilitate). Moxibustie 5–15 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

în sus, spre antebraț și în jos, spre degetele mijlociu, inelar și mic.

TR5 Waiguan

- punct Lo al meridianului TR;
- punct "barieră";
- punct de comandă al meridianului extraordinar Yang Wei Mai;
- punct Lo general.

Indicații

- surditate; punct specific în patologia articulațiilor (TR5 + V40; TR5 + VB39); reacții meteopatice; halucinații auditive, schizofrenie, insomnie cu excitabilitate crescută;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (cap – tâmples – TR5 + VB39);
- punct antialgic: cap (regiunea temporală); antebraț, articulații; dinți; glandele parotide, cavitatea bucală și limba; globii oculari; cap (cefalee la schimbarea timpului sau în caz de insolăție); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – suprafața medială a membrelor inferioare;
- punct sindromal: Căldură și Vânt-Căldură Externă (TR5 + VB39); stagnarea Qi a Ficatului și Veziculei Biliare; hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului (migrenă; hipertensiune arterială); Umiditate-Căldură în Ficat și Veziculă Biliară (otită medie; conjunctivită; colecistită); Foc al Ficatului (tinitus, surditate).




Fig.99

Localizarea

regio antebrachialis posterior, la 2 cun deasupra pliului posterior al pumnului, între cubitus și radius.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • m.extensor digiti minimi • m.extensor digitorum • m.extensor indicis • membrana interossea antebrachii.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii posterior (C5-8)*, ramură a *n. radialis de la plexus brachialis*; mușchii – *n. radialis (C6,7,8, Th1)*
• *a. et vv.interossee posteriores.*

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,5–1 cun (la înțepare profundă, manipularea acului nu se efectuează, pentru a evita lezarea nervului median);




Fig.100




Fig.101

se înțeapă sub un unghi ascuțit, acul fiind orientat în sus, spre punctul TR8 Sanyangluo (mialgie lombară acută). Tehnica de sângerare (dureri în regiunea umărului; febră; cefalee; parotită; otită, nevrita nervului acusticovestibular, acufene; conjunctivită). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în jos, spre degete.

TR6 Zhigou

- punct antic Jing-prox. (elementul Foc);
- punct sezonier Trei Focare (punct de tonifiere pentru al 5-lea sezon și de dispersie pentru perioada de primăvară).

Indicații

- surditate; punct specific în constipații (TR6 + E25); edem; tremor nervos, tic nervos, depresie, delir;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (partea laterală a trunchiului);
- punct antialgic: regiunea spatelui, lombalgie; hipocondru; plexul brahial, nervii intercostali (TR6 + VB34), inimă; hemoroizi; cefalee (la frig); mialgie (TR6 + VB34); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – suprafața medială a gambei și genunchiului, laba piciorului;
- punct sindromal: Căldură și Vânt-Căldură; stagnarea Qi în Trei Focare: Focarul Superior (pleurită; cardialgie – TR6 + VB21), Focarul Mediu (dureri în hipocondru – TR6 + VB34), Focarul Inferior (distensie abdominală); afectarea cutanată (Vânt-Căldură, Căldură Xue, stagnarea Qi).

Localizarea

regio antebrachialis posterior, 3 cun deasupra pliului posterior al pumnului, între cubitus și radius.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • m.extensor digiti minimi • m.extensor digitorum • m.extensor indicis • m.extensor pollicis longus • membrana interossea antebrachii.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii posterior (C5-8)*, ramură a *n. radialis* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n. radialis (C6,7,8, Th1)* • *a. et vv. interossee posteriores*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–1 cun). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în jos, spre degete.

TR7 Huizong

- punct Xi al meridianului TR.

Indicații

- epilepsie; tremurături ale mâinilor; dezechilibru psihic;
- punct antialgic: piele (dermatoză pruriginoasă); ureche; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – suprafața medială a gambei și genunchiului;
- punct sindromal: Căldură și Vânt-Căldură.

Localizarea

regio antebrachialis posterior, pe aceeași orizontală cu TR6 Zhigou, pe marginea radială a cubitusului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • m.extensor carpi ulnaris • m.extensor digiti minimi • m.extensor indicis • membrana interossea antebrachii.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii posterior (C5-8)*, ramuri ale *n. cutaneus antebrachii medialis (C8, Th1)* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.radialis (C6,7,8, Th1)* • *a. et vv.interossee posteriores*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–1 cun). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în jos, spre degete.

TR8 Sanyangluo

- punct Lo de grupă (TR, IG, GI).

Indicații

- somnolență; tremurături ale mâinilor; punct specific în afonie;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (articulația scapulo-humerală; gât);
- punct antialgic: dinți (mandibulă); lombalgie; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – o jumătate de corp;
- punct sindromal: Căldură și Vânt-Căldură.

Localizarea

regio antebrachialis posterior, la 4 cun deasupra pliului posterior al pumnului, între cubitus și radius.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • m.extensor digiti minimi • m.extensor digitorum • m.abductor pollicis longus • m.extensor pollicis longus • m.extensor pollicis brevis • membrana interossea antebrachii.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii posterior (C5-8)*, ramură a *n. radialis* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.radialis (C6,7,8) • a. et vv.interossee posteriores, v.basilica.*

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,5–1 cun; se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre MC4 Ximen (în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

În jos, spre laba mâinii.

TR9 Sidu

Indicații

- surditate; vertij (TR9 + TR20); stomatită;
- punct antialgic: dinți, gingia maxilarului inferior (dureri cu gingivoragie); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – suprafața medială a genunchiului;
- punct sindromal: Căldură și Vânt-Căldură.

Localizarea

regio antebrachialis posterior, la 5 cun sub pliul cotului (olecran), între cubitus și radius.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia antebrachii • m.extensor carpi ulnaris • m.extensor digitorum • m.extensor digiti minimi • m.abductor pollicis longus • membrana interossea antebrachii.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus antebrachii posterior (C5-8)*, ramură a *n.radialis* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.radialis (C6,7,8) • a. et vv.interossee posteriores, v.basilica.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jos, spre articulație.

TR10 Tianjing

- punct antic He (elementul Pământ);
- punct de dispersie al meridianului TR;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular TR;
- punct sezonier Trei Focare (punct de tonifiere pentru perioada de toamnă și de dispersie pentru perioada de vară).

Indicații

- afecțiunile urechilor (TR10 + TR21 + TR18); spasmofilie (hipoparatiroidism); torticolis; punctul relaxării musculare; insomnie sau somnolență, șoc psihic, depresie, obsesii, agitație, emotivitate, agresivitate, gelozie; la stimularea punctului se manifestă efectul de diminuare a tensiunii arteriale sistolice la bolnavii cu stres emoțional și nervozitate;
- punct antialgic: regiunea membrelor superioare, suprafața posterioară a centurii scapulare; globii oculari; cutia toracică (dureri difuze în afecțiunile plămânilor și bronhiilor); inimă; lombalgie (ameliorare la anteflexie); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – regiunea lombară; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: cot (TR10) – genunchi (VB34);
- punct sindromal: patologia cutanată (Umiditate, Căldură-Umiditate, Flegmă); Căldură și Vânt-Căldură Externă; stagnarea Qi a Ficatului (depresie); limfadenită cervicală, tonsilită (Umiditate, Umiditate-Căldură, Vânt-Frig).

Localizarea

regio brachialis posterior, la 1 cun deasupra olecranului, în fosa formată la flectarea cotului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia brachii • tendo m. triceps brachii.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n. cutaneus brachii posterior* (C5-8), ramură a *n. radialis* și *n. cutaneus brachii medialis* (C8, Th1) de la *plexus brachialis*; mușchii – *n. radialis* (C6,7,8, Th1) • *rete articulare cubiti*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–1 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului spre GI14 Binao (edem facial; dureri în gât). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în zona cotului, în sus, spre antebraț și umăr.




Fig. 102




Fig. 103

TR11 Qinglengyuan

Indicații

- paralizii (braț, centura scapulară);
- punct antialgic: ochi; nervul radial, dureri în centura scapulară (se intensifică în timpul îmbrăcării).

Localizarea

regio brachialis posterior, la 1 cun deasupra TR10 Tianjing, 2 cun deasupra olecranului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia brachii • m. triceps brachii.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n. cutaneus brachii posterior* (C5-8), ramură a *n. radialis*, ramuri ale *n. cutaneus brachii medialis* (C8, Th1) de la *plexus brachialis*; mușchii – *n. radialis* (C6, 7, 8, Th1) • *a. et vv. collaterales mediae, vv. brachiales.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

puțin în sus și în jos de la punct.

TR12 Xiaoluo

Indicații

- epilepsie; punct specific în hipertensiune intracraniană;
- punct antialgic: nervul occipital (nevralgie).

Localizarea

regio brachialis posterior, la mijlocul distanței dintre TR11

Qinglengyuan și TR13 Naohui, în centrul tricepsului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia brachii • m.triceps brachii.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus brachii posterior (C5-8)*, ramură a *n.radialis* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.radialis (C6,7,8, Th1)* • *a. et vv.collaterales mediae, vv.brachiales.*

Tehnica

se înțeapă vertical (1–1,2 cun). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

locală.

TR13 Naohui

- punct de încrucișare a meridianelor TR, GI.

Indicații

- adenopatie cervicală; torticolis;
- punct antialgic: articulația cotului.

Localizarea

regio brachialis posterior, la 3 cun sub TR14 Jianliao, pe linia ce unește acest punct cu olecranul, pe marginea posterioară a deltoidului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia brachii • m.triceps brachii.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus brachii posterior (C5-8)*, ramură a *n.radialis*, *n.cutaneus brachii lateralis superior (C5,6)*, ramură a *n.axillaris* de la *plexus brachialis*; mușchii – *n.radialis (C6,7,8, Th1)* • *a. et vv.collaterales mediae, vv.brachiales, a.circumflexa posterior humeri.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1,2 cun); se înțeapă spre punctul GI14 Binao (dureri în gât). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în jos, spre cot.

TR14 Jianliao

Indicații

- hiperhidroza fosei axilare (TR14 + IG9 + C6); urticarie în părțile superioare ale corpului (TR14 + TR6 + TR10);
- punct antialgic: nervii intercostali; articulația umărului; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: umăr (TR14) – șold (VB30);
- punct sindromal: dispersează Vântul (paralizia membrelor superioare).

Localizarea

regio deltoidea, în poziția orizontală a brațului, în fosă, la marginea postero-inferioară a acromionului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia deltoidea • m.deltoideus • m.infraspinatus • m.teres minor.

Inervația • Vascularizația

pielea – n.cutaneus brachii lateralis superior (C5,6), ramură a n.axillaris de la plexus brachialis, nn.supraclaviculares laterales (posteriores)(C3,4) de la plexus cervicalis; mușchii – n.axillaris (C5,6), n.suprascapularis (C4,5,6) • a.circumflexa posterior humeri, a.circumflexa scapulae, a. et vv.suprascapulares, vv.circumflexae humeri.

Tehnica

se punctează vertical (1–1,5 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului fiind orientat spre C1 Jiquan. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

locală și puțin în jos.

TR15 Tianliao

- punct al meridianului extraordinar Yang Wei Mai;
- punct de încrucișare a meridianelor TR, Yang Wei Mai.

Indicații

torticolis; punct specific în afecțiunile articulației umărului.

Localizarea

regio scapularis, la mijlocul distanței dintre VB21 Jianjing și IG13 Quyuan.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • m.supraspinatus.

Inervația • Vascularizația

pielea – nn.supraclaviculares laterales (posteriores)(C3,4) de la plexus cervicalis; mușchii – n.accessorius, nn.cervicales (C2,3,4), n.suprascapularis (C4,5,6) • a. et vv.suprascapulares, a. et vv.transversae colli, v.scapularis dorsalis.

Tehnica

se punctează vertical (0,5–0,8 cun). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în sus, spre regiunea cervicală și în jos, spre umăr.




Fig.104




Fig. 105



Fig. 106

TR16 Tianyou

- punct de reunire centrală a meridianelor distincte MC/TR.

Indicații

- spasme oculare; punct specific în agravări cauzate de schimbarea factorilor meteorologici (tinitus, surditate);
- punct antialgic: ochi.

Localizarea

regio cervicalis posterior, posterior de unghiul mandibulei, pe marginea posterioară a sternocleidomastoidianului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia nuchae • m.sternocleidomastoideus • m. splenius capitis • m. longus capitis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis minor (C2,3)* de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n.occipitalis major (C2)*, *nn.cervicales (C1-4)* • *a. et vv.occipitales, a. et vv.auriculares posteriores.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun). Moxibustie 5–10 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă din cauza posibilității de apariție a edemației feței).

Senzația

În sus, spre regiunea temporală și în jos, spre partea posterioară a regiunii cervicale.

TR17 Yifeng

- punct "fereastra cerului";
- punct de încrucișare a meridianelor TR, VB.

Indicații

- paralizie facială, trismus; parotidită; afonie; afectarea urechii (otită, tinitus); torticolis; artrita articulației temporo-mandibulare; halucinații auditive, schizofrenie;
- punct antialgic: nervul maxilar și mandibular; urechi (dureri cu

- eliminări); dinți (dureri cu carie sau pioree alveo-dentară);
- punct sindromal: Vânt-Căldură; hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului; Focul Ficatului cu afectarea feței, urechilor.

Localizarea

regio cervicalis posterior, în fosa între mastoidă și mandibulă, posterior de lobul urechii.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • glandula parotis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.auricularis magnus (C3)* de la *plexus cervicalis • a. et vv.auriculares posteriores, a. et vv.temporales superficiales.*

Tehnica

se punctează vertical sau oblic spre orbita de partea opusă (0,8–1,2 cun). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

spre urechea internă și în jos, spre gât.

TR18 Qimai

Indicații

paralizie facială; punct specific în tinitus și surditate.

Localizarea

regio temporalis, în spatele pavilionului urechii, la unirea 1/3 inferioare cu 2/3 superioare ale liniei dintre TR17 Yifeng și TR20 Jiaosun.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.auricularis posterior.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.auricularis magnus (C3)* de la *plexus cervicalis • a. et vv.auriculares posteriores.*

Tehnica

se înțeapă oblic (0,3–0,5 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în jos (se va provoca o sângerare neînsemnată). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

suprafața retroauriculară și occipitală.

TR19 Luxi

Indicații

- convulsii; conjunctivită purulentă; punct specific în surditate provocată de șoc;
- punct antialgic: cefalee (în meningită).

Localizarea

regio temporalis, pe aceeași curbă ca și TR18 Qimai, la unirea 1/3 superioare cu 2/3 inferioare, aproximativ la 1 cun deasupra TR18




Fig. 107




Fig. 108

Qimai,

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.auricularis posterior.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis minor (C3)* de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n.facialis • a. et vv.auriculares posteriores.*

Tehnica

se înțeapă oblic – 0,3–0,5 cun (atenție – punctarea poate provoca lipotimie; în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

locală și spre regiunea occipitală.

TR20 Jiaosun

- punct de încrucișare a meridianelor TR, VB, GI.

Indicații

- stomatită; trismus; punct specific în tulburări ale circulației sanguine a creierului; hiperfuncția glandei tiroide;
- punct antialgic: dinți.

Localizarea

regio temporalis, la marginea superioară a pavilionului auricular, pe inserția părului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.auricularis superior.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis minor (C2,3)* de la *plexus cervicalis*, *n. auriculotemporalis*, ramură a *n.mandibularis (n.trigeminus)*; mușchii – *n.facialis • a. et vv.temporales superficiales.*

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,3–0,5 cun), vârful acului va fi orientat postero-inferior (în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în sus, spre regiunea temporală sau spre regiunea occipitală.

TR21 Ermen

Indicații

- punct specific în patologia urechii;
- punct antialgic: urechi; dinți (dureri în dinții maxilarului superior ce iradiază în ureche);
- punct sindromal: hiperactivitatea Yang Qi a Ficatului și Veziculei Biliare (cefalee); Vânt (patologia în regiunea feței și a urechii).

Localizarea

regio parotideomasseterica, anterior de incizura supratragică, în fosa formată prin deschiderea gurii.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • glandula parotis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.auriculotemporalis*, ramură a *n.mandibularis* (*n.trigeminus*) • *a. et vv.temporales superficiales*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–1 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre IG19 Tinggong (tinitus, surditate). Moxibustie 5–10 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

distensie și tensiune iradiate în interiorul urechii.

TR22 Heliao

- punct de încrucișare a meridianelor TR, VB, IG,

Indicații

- tinitus; paralizie facială, trismus; procese inflamatorii în regiunea gâtului; sinusită;
- punct antialgic: cap (cefalee cu senzație de greutate).

Localizarea

regio temporalis, pe marginea superioară a arcadei zigomatice, posterior de artera temporală, mai sus și puțin anterior de TR21 Ermen.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.auricularis anterior • fascia temporalis • m.temporalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.auriculotemporalis*, ramură a *n.mandibularis* (*n.trigeminus*); mușchii – *n.facialis*, *n.mandibularis* de la *n. trigeminus* • *a. et vv.temporales superficiales*, *a. et vv.temporales mediae*.

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,3–0,5 cun), vârful acului va fi orientat de la partea antero-laterală spre cea postero-medială (atenție – artera). Moxibustie 3–5 minute.

Senzația

în sus, spre regiunea temporo-parietală.

TR23 Sizhukong

- punct de ieșire din meridianul TR;
- punct de încrucișare a meridianelor TR, VB.

Indicații

- paralizie facială; strabism, miopie, conjunctivită;
- punct Biao din perechea Biao-Ben: TR23–TR3;
- punct antialgic: cap (regiunea temporală), facies (nevralgii); ochi: cap (regiunea temporală, migrenă insuportabilă);
- punct sindromal: hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului (cefalee, migrenă; nevralgie de trigemen); Vânt cu afectarea feței și ochilor.

Localizarea

regio temporalis, în fosetă, la extremitatea externă a sprâncenei.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.orbicularis oculi.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.zygomaticotemporalis n.zygomatici*, ramură a *n.maxillaris (n.trigeminus)*; mușchii – *n.facialis • r.frontalis a.temporalis superficialis, v.temporalis superficialis.*

Tehnica

se punctează aproape orizontal (0,5–1 cun), vârful acului va fi orientat de-a lungul sprâncenei; se punctează oblic, spre punctul VB8 Shuaigu (migrenă). În operele antice moxibustia acestui punct este interzisă.

Senzația

spre regiunea temporo-parietală.

I.11. Meridianul Veziculă Biliară (VB)

Meridianul Veziculă Biliară este de natură Yang, centrifug, pereche, conține 44 puncte (fig. 109–121).

Relațiile energetice:

1. În cadrul marii circulații energetice este precedat de meridianul Trei Focare și urmat de meridianul Ficat (TR-VB-F).
2. În cuplu cu meridianul Ficat realizează loja energetică Lemn (VB-F). În cadrul ciclului celor 5 elemente este stimulat de V și inhibat de Gl.




Fig.109. Punctele meridianului Veziculă Biliară (VB).

3. În cuplu cu meridianul Trei Focare formează axul energetic Shao Yang (VB-TR).
4. După regula "miezul zilei/miezul nopții" este cuplat cu meridianul Inimă (VB-C).
5. După regula "soț/soție" este cuplat cu meridianul Stomac (VB-E).

Funcțiile energetice:

1. Funcția principală constă în păstrarea bilei și eliminarea ei periodică în intestin.
2. "Guvernează" menținerea purității interne, are funcția de filtru pentru celelalte meridiane principale.
3. Are o influență importantă în mecanismele de constituire a durerii. Tulburarea meridianului Veziculă Biliară, alături de cea a Intestinului Gros, determină apariția unor sindroame algice.
4. "Guvernează" funcțiile somatoviscerale și psihice (digestia, excitabilitatea emoțională etc.). Împreună cu Ficatul formează loja energetică Lemn, care emană Energia numită Hun (corespunde imaginației, dorinței de a acționa, entuziasmului).

Acțiunea sindromal-energetică:

- calmarea hiperactivității Yang-Qi a Ficatului – VB20 + VB34 + VB21;
- dinamizarea Qi a Ficatului (punctele meridianului Veziculă Biliară sunt efective în cazul stagnării Qi în regiunile locale, în special în mușchi – VB34 + VB21 + VB24 + F3 + F14 + puncte locale; punctele VB34 Yanglingquan și VB30 Huantiao în asociere cu punctul TR6 Zhigou posedă efecte generalizate la bolnavii cu stagnarea Qi a Ficatului; includerea punctului VB25 Jingmen în formulele terapeutice sporește eficacitatea corecției stagnării Qi a Ficatului, Veziculei Biliare și Intestinului);
- diminuarea Umidității și a Căldurii în Ficat și Vezicula Biliară (regiunea cefalică – VB41 + VB34 + TR17 + VB14; Focarul Mediu – VB34 + VB24 + VB26 + TR3; Focarul Inferior – VB41 + VB26 + F5 + VC6);
- diminuarea Vântului Intern – VB20 + VB39 + F3;
- fortificarea Qi a Veziculei Biliare – VB40 + TR4 + VC4 + R3 + V47 + V52;
- fortificarea Jing al Rinichilor și a măduvei osoase (senilitate precoce – VB39 + VB34 + R6 + VG4);
- reglarea meridianului extraordinar Dai Mai – VB41 + TR5;
- reglarea tonusului muscular – VB21 + VB34 + VB40;
- armonizarea proceselor psihice (punctul VB13 Benshen este punctul cheie în diferite formule terapeutice: Focul Inimii și Veziculei Biliare – VB13 + VB38 + VB40 + C5; hiperactivitatea Yang-Qi a Inimii și Ficatului – VB13 + VB40 + VB34 + VG24; în tulburările psiho-vegetative este indicat punctul VB20 Fengchi; Vânt al Ficatului – VB20 + VB34 + F3 + VG16; la bolnavii cu diferite tulburări psihice este efectivă stimularea punctului VB34

Yanglingquan: hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului – VB34 + VB20 + VB13; Umiditate-Căldură în Ficat și Vezicula Biliară – VB34 + VB41 + VC12; stagnarea Qi a Ficatului – VB34 + F3 + VB13; Insuficiența Qi a Veziculei Biliare – VB34 + VB40; în tulburările psihice provocate de Focul Veziculei Biliare este efectivă aplicarea punctului VB38 Yangfu: Foc-Exces – VB38 + VB34 + VB40 + VB21; Foc-Insuficiență – VB38 + VC4 + Yintang; la bolnavii cu timiditate patologică în urma Insuficienței Qi a Veziculei Biliare este indicată formula VB40 + R7 + V48 + V52 + VG24).

Afectarea organului și traiectului intern al meridianului:

dureri în hipocondru, dureri costale, greață, vomă, gust amar, colecistită.

Afectarea traiectului extern al meridianului:

dureri în șold, genunchi și pe fața externă a membrului inferior, durere și tumefiere a articulațiilor membrului inferior, tulburări trofice de-a lungul meridianului; cefalee (temporoparietală); oftalmalgie; surditate, tinitus; inflamație în regiunea axială, adenopatie submaxilară.

Afectarea conexiunilor energetice ale meridianului:

tuse, dispnee, astm bronșic, pleurită; dureri în bazinul mic; tulburări neuro-psihice, epilepsie.

VB1 Tongziliao

- punct de intrare în meridianul VB;
- punct de reunire centrală a meridianelor distincte F/VB;
- punct de inserție al meridianelor tendino-musculare TR și VB;
- punct de încrucișare a meridianelor VB, IG, TR.

Indicații

- paralizie facială; atrofie optică;
- punct antialgic: nervul trigemen (nevralgie); urechi; ochi; gingiile maxilarului superior; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ochi;
- punct sindromal: afectarea ochilor (Vânt-Căldură – conjunctivită; Foc al Ficatului și Veziculei Biliare – hiperemie a conjunctivei; hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului – fotofobie; Insuficiența Yin-Qi a Ficatului și Rinichilor – conjunctivită uscată, prurit; Insuficiența Xue a Ficatului – tulburări ale vederii); cefalee (Focul Ficatului, hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului).

Localizarea

regio orbitalis, în fosetă, la 0,5 cun lateral de unghiul extern al orbitei.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.orbicularis oculi • fascia temporalis • m.temporalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.zygomaticofacialis n.zygomatici*, ramură a *n.maxillaris (n.trigeminus)*; mușchii – *n.facialis*, *n.mandibularis n. trigemini* • *r. frontalis a.temporalis superficialis*, *a.zigomaticoorbitalis*, *a. et vv. temporales profundae*, *v.temporalis superficialis*.

Tehnica

se punctează subcutanat, aproape orizontal (0,3–0,5 cun), vârful acului va fi orientat lateral; se punctează spre ochi; se punctează spre regiunea temporală. Moxibustie 5–15 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

locală, în regiunea ochilor și temporală.

VB2 Tinghui

- punct de încrucișare a meridianelor VB, TR.

Indicații

- artrita temporo-mandibulară; paralizie facială; halucinații auditive, schizofrenie;
- punct Biao din perechea Biao-Ben: VB2–VB44;
- punct antialgic: urechi; globii oculari; dinți (dureri cu mobilitate a dinților, dureri la rece și la masticatie);
- punct sindromal: Vânt-Frig Extern, Vânt-Căldură Externă cu afectarea feței și a ochilor; Umiditate-Căldură a Ficatului și Veziculei Biliare (otită medie); hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului, Focul Ficatului (tinitus).

Localizarea

regio parotideomasseterica, în foșeta formată prin deschiderea gurii, înapoia condilului mandibular, pe inserția antero-inferioară a lobului urechii.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia parotidea • glandula parotidea.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.auriculotemporalis*, ramură a *n.mandibularis (n.trigeminus)* • *a. et vv.temporales superficiales*.

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun), gura fiind deschisă. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

spre urechea internă, regiunea feței și maxilarului.

VB3 Shangguan

- punct "barieră";
- punct de încrucișare a meridianelor VB, TR, E.

Indicații

- tinitus, surditate; paralizie facială; epilepsie;
- punct antialgic: nervul trigemen (nevralgie); ochi; urechi; dinți; migrene.

Localizarea

regio temporalis, anterior de ureche, pe marginea superioară a arcadei zigomatice, la intersecția ei cu linia de inserție a părului, imediat deasupra lui E7 Xiaguan.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia temporalis • m.temporalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.zygomaticotemporalis n.zygomatici*, ramură a *n.maxillaris (n.trigeminus)*; mușchii – *n.mandibularis n.trigemini • a.zygomaticoorbitalis, a. et vv.temporales superficiales, a. et vv.temporales profundae.*

Tehnica

se punctează vertical – 0,5–1 cun (atenție – artera; după vechii autori, punctarea profundă în acest punct poate provoca surditatea); se punctează retrozigomatic, orientând vârful acului spre E7 Xiaguan. Moxibustie 3–5 minute.

Senzația

în sus, spre regiunea temporală.

VB4 Hanyan

- punct de inserție al meridianului tendino-muscular VB;
- punct de încrucișare a meridianelor VB, TR, E.

Indicații

- convulsii;
- punct antialgic: ochi; dinți; migrenă oftalmică.

Localizarea

regio temporalis, la nivelul joncțiunii 1/4 superioare și 3/4 inferioare a distanței dintre E8 Touwei și VB7 Qubin.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.auricularis superior • fascia temporalis • m.temporalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.auriculotemporalis*, ramură a *n.mandibularis (n.trigeminus)*; mușchii – *n.mandibularis n.trigemini • r.frontalis a.temporalis superficialis, vv.temporales superficiales.*

Tehnica

se punctează oblic (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat în jos, spre punctul VB5 Xuanlu și VB6 Xuanli (după vechii autori, punctarea profundă în acest punct poate provoca surditatea). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

regiunea temporală și spre regiunea frontală.

VB5 Xuanlu

Indicații

- edem al feței; punct specific în ictus cerebral;
- punct antialgic: regiunea vertexului; nas; dinți; migrene;
- punct sindromal: Vânt-Frig și Vânt-Căldură în regiunea cefalică (migrenă; tinitus; tulburări ale vorbirii); hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului; Focul Ficatului (migrenă; tinitus, surditate; epilepsie, neurastenii).

Localizarea

regio temporalis, la mijlocul distanței dintre E8 Touwei și VB7 Qubin, la 0,5 cun posterior de linia de inserție a părului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.auricularis superior • fascia temporalis • m.temporalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.auriculotemporalis*, ramură a *n.mandibularis* (*n.trigeminus*); mușchii – *n.facialis*, *n.mandibularis* *n. trigemini • a. et vv. temporales superficiales* (*r. frontalis a. temporalis superficialis*).

Tehnica

se punctează oblic (0,5–0,8 cun), vârful acului fiind orientat în jos, spre punctul VB6 Xuanli (după vechii autori, punctarea profundă în acest punct poate provoca surditatea). Moxibustie 3 minute.

Senzația

regiunea temporală.

VB6 Xuanli

- punct de încrucișare a meridianelor VB, V, TR.

Indicații

- edem al feței;
- punct antialgic: nervul trigemen; dinți (premolarii); migrenă; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – degetul auricular;
- punct sindromal: Vânt-Frig și Vânt-Căldură în regiunea cefalică; hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului; Focul Ficatului (migrenă; tinitus, surditate; epilepsie, neurastenii).

Localizarea

regio temporalis, la nivelul joncțiunii 3/4 superioare și 1/4 inferioare a distanței dintre E8 Touwei și VB7 Qubin.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.auricularis superior • fascia temporalis • m.temporalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.auriculotemporalis*, ramură a *n.mandibularis* (*n.trigeminus*); mușchii – *n.facialis*, *n.mandibularis* *n.trigemini* • *a. et vv. temporales superficiales*.

Tehnica

se punctează aproape orizontal (0,5–0,8 cun), vârful acului fiind orientat în jos. Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

regiunea temporală și suprafața laterală a capului.

VB7 Qubin

- punct de încrucișare a meridianelor VB, V.

Indicații

- spasm al mușchiului temporal;
- punct antialgic: regiunea frontoparietală și temporală; cefalee (tabagism); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – gât, amigdale, degetele IV și V ale mâinii;
- punct sindromal: Vânt-Frig și Vânt-Căldură în regiunea cefalică; hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului; Focul Ficatului (migrenă; tinitus, surditate; epilepsie).

Localizarea

regio temporalis, la nivelul vârfului urechii, la 1 cun anterior de TR20 Jiaosun.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *m.auricularis superior* • *fascia temporalis* • *m.temporalis*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.auriculotemporalis*, ramură a *n.mandibularis* (*n.trigeminus*); mușchii – *n.facialis*, *n.mandibularis* *n.trigemini* • *a. et vv. temporales superficiales*.

Tehnica

se înțeapă subcutanat, sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat postero-medial; se înțeapă spre punctul VB2 Tinghui (paralizie facială). Moxibustie 3–5 minute.

Senzația

regiunea temporală și suprafața laterală a capului.

VB8 Shuaigu

- punct de încrucișare a meridianelor VB, V.

Indicații

- tulburări legate de intoxicație (alcool, nicotină, cafea etc.);
- punct antialgic: regiunea parietală; cefalee (tabagism sau surmenaj intelectual, afecțiuni intestinale); migrenă (VB8 + TR23 + VB41);

- punct sindromal: Vânt-Frig și Vânt-Căldură în regiunea cefalică; hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului; Focul Ficatului (cefalee; tinitus, surditate; epilepsie).

Localizarea

regio temporalis, la 1,5 cun deasupra vârfului pavilionului auricular, la nivelul suturii parietotemporale.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.auricularis superior • fascia temporalis • m.temporalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.auriculotemporalis*, ramură a *n.mandibularis* (*n.trigeminus*); mușchii – *n.facialis*, *n.mandibularis* *n. trigemini* • *a. et vv.temporales superficiales* (*r.parietalis a.temporalis superficialis*).

Tehnica

se înțeapă subcutanat, sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat anterior sau posterior; se înțeapă oblic, vârful acului va fi orientat spre punctul VB7 Qubin (tinitus, sindromul Meniere). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

regiunea temporală și în interiorul capului.

VB9 Tianchong

- punct de încrucișare a meridianelor VB, V.

Indicații

- epilepsie;
- punct antialgic: dinți; migrenă; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – braț, mână;
- punct sindromal: Vânt-Frig și Vânt-Căldură în regiunea cefalică; patologii locale legate de ascendența Yang a Ficatului; Focul Ficatului; Vânt al Ficatului (cefalee, migrenă; agitație); Vânt Intern (convulsii, spasme în regiunea cefalică, tulburări de locomoție).

Localizarea

regio temporalis, la 0,5 cun posterior și superior de VB8 Shuaigu, pe verticala marginii posterioare a mastoidei.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.auricularis superior • fascia temporalis • m.temporalis • m.auricularis posterior.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis minor* (C2,3) de la *plexus cervicalis* • *a. et vv.auriculares posteriores*.

Tehnica

se înțeapă subcutanat, oblic (0,5–0,8 cun), vârful acului fiind orientat anterior sau posterior. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

spre ureche și suprafața laterală a capului.

VB10 Fubai

- punct de încrucișare a meridianelor VB, V.

Indicații

- rinofaringită;
- punct antialgic: dinți; migrenă;
- punct sindromal: Vânt-Frig și Vânt-Căldură în regiunea cefalică; hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului; Focul Ficatului (migrenă; tinitus, surditate; epilepsie).

Localizarea

regio parietalis, la nivelul joncțiunii 1/3 medii și superioare a distanței dintre VB9 Tianchong și VB12 Wangu.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • venter occipitalis m.epicranii.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis minor (C2,3)* de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n. facialis • a. et vv.auriculares posteriores.*

Tehnica

se înțeapă subcutanat, aproape orizontal (0,5-0,8 cun), vârful acului va fi orientat în jos, postero-medial. Moxibustie 5-15 minute.

Senzația

spre suprafața laterală a capului și retroauricular.

VB11 Qiaoyin

- punct de încrucișare a meridianelor VB, V.

Indicații

- gust amar (dimineața);
- punct antialgic: nervul trigemen (nevralgie); dureri locale (cap, facies, ochi, gât); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/ miezul nopții) – limbă, facies, axilă, centura scapulară;
- punct sindromal: Vânt-Frig și Vânt-Căldură în regiunea cefalică; hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului; Focul Ficatului (migrenă; tinitus, surditate; epilepsie).

Localizarea

regio parietalis, la nivelul joncțiunii 1/3 medii și inferioare a distanței dintre VB9 Tianchong și VB12 Wangu.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.auricularis posterior.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis minor (C2,3)* de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n. facialis • a. et vv.auriculares posteriores.*

Tehnica

se înțeapă subcutanat, aproape orizontal (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat postero-medial, spre linia mediană a capului sau în jos. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

regiunea temporală și occipitală.

VB12 Wangu

- punct de inserție al meridianului tendino-muscular V și VB;
- punct de încrucișare a meridianelor VB, V.

Indicații

- trismus; paralizie facială; punct specific în staza venoasă în encefal; torticolis;
- punct antialgic: suprafața posterioară a gâtului (mai sus de nivelul vertebrei VII cervicale); urechi; dinți; migrene; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – orbită, limbă, faies, mușchiul mare pectoral, membrele superioare;
- punct sindromal: Vânt-Frig și Vânt-Căldură în regiunea cefalică; Vânt Extern (otită medie) și Vânt Intern (epilepsie); patologii locale legate de hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului și Vânt al Ficatului.

Localizarea

regio sternocleidomastoidea, la mijlocul marginii posterioare a mastoidei, pe verticala VB20 Fengchi.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina superficialis fasciae colli • m. sternocleidomastoideus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis minor* (C2,3) de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n.accessorius, nn.cervicales* (C2,3) • *a. et vv.auriculares posteriores.*

Tehnica

se punctează subcutanat, sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat spre orbita de partea opusă. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în jos, spre regiunea cervicală și în sus, spre regiunea temporală.

VB13 Benshen

- punct de reunire a meridianelor Yang ale membrilor superioare;
- punct de încrucișare a meridianelor VB, Yang Wei Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Wei Mai.

Indicații

- fobii, anxietate (VB13 + VG24);

- punct antialgic: cefalee (cu vertij); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – mușchiul mare pectoral.
- punct sindromal: Foc al Inimii și Veziculei Biliare (schizofrenie); hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului (confuzie mentală, halucinații); Insuficiența Qi a Rinichilor (suspiciune, fobii – VB13 + VC4); Vânt Intern (epilepsie); hemiplegie.

Localizarea

regio frontalis, la 3 cun lateral de VG24 Shenting și la 0,5 cun de linia de inserție a părului, pe verticala trasată de la unghiul extern al ochiului în sus.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • venter frontalis m. occipitofrontalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.auriculotemporalis*, ramură a *n.mandibularis* (*n.trigeminus*) • *a. et vv.temporales superficiales* (*r.frontalis a.temporalis superficialis*), *a. et vv.supraorbitales*.

Tehnica

se înțeapă subcutanat, aproape orizontal (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat anterior sau postero-medial, spre linia medială a capului. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

regiunea temporală.

VB14 Yangbai

- punct de încrucișare a meridianelor VB, Yang Wei Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Wei Mai.

Indicații

- tremurături ale pleoapelor; sinuzită frontală; fobii, anxietate, insomnie;
- punct antialgic: regiunea frontală; ochi (glaucom), nervul oftalmic (nevralgie); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ochi, membrele superioare;
- punct sindromal: Vânt Extern, Vânt-Frig în regiunea cefalică (cefalee frontală; paralizie facială; afectarea ochilor).

Localizarea

regio frontalis, pe verticala pupilei, la 1 cun deasupra sprâncenei.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • venter frontalis m. occipitofrontalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.supraorbitalis*, ramură a *n.frontalis* de la *n.opthalmicus* (*n.trigeminus*); mușchii – *n.facialis* • *a. et vv.temporales superficiales* (*r.frontalis a.temporalis superficialis*), *a. et vv.supraorbitales*.

Tehnica

se punctează sub un unghi ascuțit (0,5-0,8 cun), vârful acului va fi

orientat în jos, spre punctul Yuyao (Extra). Moxibustie 3-5 minute.

Senzația

locală și spre vertex.

VB15 Linqi

- punct de încrucișare a meridianelor VB, V, Yang Wei Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Wei Mai.

Indicații

- rinită, sinuzită frontală; torticolis; emoții instabile;
- punct antialgic: ochi (glaucom); cefalee (aflux de sânge la cap, afecțiuni oculare).

Localizarea

regio frontalis, pe verticala pupilei, la mijlocul distanței dintre VG24 Shenting și E8 Touwei.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • venter frontalis m. occipitofrontalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.supraorbitalis*, ramură a *n.frontalis* de la *n.opthalmicus* (*n.trigeminus*); mușchii – *n.facialis • a. et vv.temporales superficiales* (*r.frontalis a.temporalis superficialis*), *a. et v.supraorbitales*.

Tehnica

se punctează aproape orizontal (0,5–0,8 cun), acul va fi orientat posterior ori anterior. Moxibustie 2–5 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

regiunea frontală.

VB16 Muchuang

- punct de încrucișare a meridianelor VB, Yang Wei Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Wei Mai.

Indicații

- sinuzită frontală;
- punct antialgic: ochi; dinți (molarii, incisivii); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – mușchiul mare pectoral, glandele mamare.

Localizarea

regio frontalis, la 1,5 cun înapoia liniei de inserție a părului și 2,25 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • galea aponeurotica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.supraorbitalis*, ramură a *n.frontalis* de la *n.opthalmicus* (*n.trigeminus*) • *a. et vv.temporales superficiales*.

Tehnica

se punctează aproape orizontal (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat posterior. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

regiunea frontală.

VB17 Zhengying

- punct de încrucișare a meridianelor VB, Yang Wei Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Wei Mai.

Indicații

- gingivită;
- punct antialgic: dinți (dinții maxilarului superior, supurația gingiilor); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – mușchiul mare pectoral, mușchiul deltoid, laba mâinii.

Localizarea

regio parietalis, la 2,5 cun înapoia liniei de inserție a părului și 2,25 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • galea aponeurotica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis major (C2) • a. et vv.temporales superficiales (r.parietalis), a. et vv.occipitales.*

Tehnica

se punctează oblic (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat posterior. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

suprafața laterală a capului.

VB18 Chengling

- punct de încrucișare a meridianelor VB, Yang Wei Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Wei Mai.

Indicații

- epistaxis; sinuzită frontală; obsesii, demență;
- punct antialgic: cefalee (encefalită).

Localizarea

regio parietalis, la 4 cun înapoia liniei de inserție a părului și 2,25 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • galea aponeurotica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis major (C2) • a. et vv.temporales superficiales (r.parietalis), a. et vv.occipitales.*

Tehnica

se înțeapă oblic (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat posterior ori spre orbită (în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

locală.

VB19 Naokong

- punct de încrucișare a meridianelor VB, Yang Wei Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Wei Mai.

Indicații

- epistaxis; torticolis; somnolență cu vertij;
- punct antialgic: ochi; cap (cefalee occipitală cu senzație de greutate în meningoencefalite); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – comisura bucală, obraji, dinți.

Localizarea

regio occipitalis, direct deasupra VB20 Fengchi, la nivelul VG17 Naohu, în afara protuberanței occipitale externe, la 2,25 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • venter occipitalis m.occipitofrontalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis major (C2)*; mușchii – *n.facialis • a. et vv. occipitales.*

Tehnica

se înțeapă oblic (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat în jos. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

regiunea occipitală.

VB20 Fengchi

- punct de încrucișare a meridianelor VB, Yang Wei Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Wei Mai și Yang Qiao Mai;
- punct de ieșire al meridianului extraordinar Yang Qiao Mai.




Fig.110

Indicații

- epistaxis; punct specific simpaticotonic (tonifierea punctului tonifică simpaticusul); torticolis; glaucom (VB20 + V60);
- punct antialgic: regiunea posterioară a gâtului (mai sus de nivelul vertebrei VII cervicale), regiunea centurii scapulare (dureri ce iradiază în occipit); globii oculari; inimă (precordialgii cu tahicardie); esofag; sindrom algic în afecțiunile sistemului nervos vegetativ; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) –

- ochi;
- punct sindromal: Vânt-Frig (VB20 + P7), Vânt-Căldură (VB20 + TR5), Vânt Extern și Intern (hemiplegie; vertij); hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului; Foc al Ficatului (hipertensiune arterială, cefalee, vertij; afectarea ochilor; tinitus; hipertiroidism); Vânt al Ficatului (convulsii, spasme musculare, tremor; vertij; confuzie mentală; hemiplegie).

Localizarea

regio cervicalis posterior, sub occipit, la nivelul punctului VG16 Fengfu, în fosa dintre inserția mușchilor trapez și sternocleidomastoidian, cu 1 cun mai sus de linia de inserție a părului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • m.sternocleidomastoideus • fascia nuchae • m.splenius capitis • m.semispinalis capitis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis minor (C2,3)* de la *plexus cervicalis*; mușchii – *nn.cervicales (C2-5) • a. et vv.occipitales.*

Tehnica

se înțeapă oblic (0,8–1 cun), vârful acului va fi orientat spre orbita contralaterală (la o înțepare profundă e posibilă lezarea bulbului rahidian); se înțeapă spre punctul VG16 Fengfu (hemiplegie; algii occipitale); se înțeapă spre VB20 Fengchi contralateral (hemiplegie; afectarea ochilor; cefalee). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

regiunea temporală și spre partea inferioară a gâtului.

VB21 Jianjing

- punct de încrucișare a meridianelor VB, TR, Yang Wei Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Wei Mai.

Indicații

- punct specific în mastită, mastopatie; spasme musculare, torticollis; punct indicat în obstetrică și ginecologie (insuficiența lactației; retenția placentei; hemoragii uterine); impotență funcțională;
- punct antialgic: globii oculari; articulația umărului; gât;
- punct sindromal: hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului; stagnarea Qi a Ficatului (hipertensiune arterială, cefalee); Vânt Intern.

Localizarea

regio scapularis, la mijlocul distanței dintre GI15 Jianyu și VG14 Dazhui.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.trapezius • m.levator scapulae • m.supraspinatus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.supraclaviculares laterales (posteriores) (C3,4)* de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n.accessorius, nn.cervicales (C2,3,4),*




Fig.111

n.suprascapularis (C4,5,6) • a. et vv.transversae colli.

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,5–0,8 cun (la pacienții cu patologie cardiacă nu se aplică înțeparea profundă; acupunctura este interzisă la gravide; punctarea poate provoca lipotimie); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre glanda mamară afectată (mastită). Moxibustie 10–30 minute.

Senzația

în sus, spre regiunea temporală și în jos, spre umăr sau spre coasta X.

VB22 Yuanye

- punct de reunire periferică a meridianelor distincte C/IG;
- punct de reunire a meridianelor tendino-musculare Yin ale membrului superior.

Indicații

- pleurite; adenite axilare;
- punct antialgic: nervii intercostali.

Localizarea

regio axillaris, la 3 cun sub vârful axilei, pe linia axilară medie, la mijlocul distanței dintre punctele C1 Jiquan și RP21 Dabao (când mâna e ridicată).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia axillaris • m.serratus anterior • fascia thoracica • m.intercostalis externus • m.intercostalis internus • fascia endothoracica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis (pectoralis) n.intercostalis IV*; mușchii – *n.thoracicus longus (C5-8), n.intercostalis IV • rr.intercostales*

anteriores a.thoracicae internae, r.cutaneus lateralis a.intercostalis V, vv. intercostales anteriores.

Tehnica

se punctează sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat postero-inferior. Moxibustie 5–10 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă, deoarece poate cauza formarea unui carbuncul, erupția căruia în interior este foarte periculoasă).

Senzația

suprafața laterală a cutiei toracice.

VB23 Zhejin

Indicații

- sialoree; regurgitații acide;
- punct antialgic: nervii intercostali; ficat (colică); dureri la deglutiție.

Localizarea

regio axillaris, la 1 cun anterior de VB22 Yuanye, pe linia ce unește acest punct cu centrul mamelonului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • m.serratus anterior • fascia thoracica • m.intercostalis externus • m.intercostalis internus • fascia endothoracica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis (pectoralis) n.intercostalis IV*; mușchii – *n.thoracicus longus (C5-8), n.intercostalis IV • rr.intercostales anteriores a.thoracicae internae, r.cutaneus lateralis a.intercostalis V, vv. intercostales anteriores.*

Tehnica

se punctează sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat latero-inferior. Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

În sus, spre fosa axilară.




Fig.112

VB24 Riyue

- punct de alarmă al meridianului VB;
- punct al meridianului extraordinar Yang Wei Mai;
- punct de încrucișare a meridianelor VB, RP.

Indicații

- dischinezie biliară; neurastenii, depresie, agitație, ciclotimie,

- insomnie cu irascibilitate la copii, comportament isteric;
- punct antialgic: coaste; stomac, vezicula biliară (colecistită cu vărsături și gust amar); uter;
- punct sindromal: Umiditate-Căldură a Ficatului și Veziculei Biliare (colecistită, hepatită); stagnarea Qi a Ficatului (dureri în hipocondru); dezarmonia Ficat-Stomac (ulcer gastric și duodenal).

Localizarea

regio abdominalis lateralis, la 1,5 cun sub F14 Qimen, pe marginea inferioară a coastei VII, 4 cun lateral de linia mediană anterioară.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.obliquus externus abdominis • m.obliquus internus abdominis • m. transversus abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (pectoralis) n.intercostalis VIII*; mușchii – *nn.intercostales (Th5-12), n.lumbalis (L1) • r.cutaneus lateralis a.intercostalis VII, vv.intercostales anteriores.*

Tehnica

se punctează sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat lateral. Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

în sus, spre cutia toracică.

VB25 Jingmen

- punct de alarmă al meridianului R.

Indicații

- glomerulonefrite;
- punct antialgic: nervii intercostali; rinichi (colică – VB25 + V60 + R4); lombalgie;
- punct sindromal: stagnarea Qi a Intestinului (dureri în abdomenul inferior); a Ficatului și Veziculei Biliare (dureri în hipocondru); a Rinichilor (dureri lombare, calculi renali); Insuficiența Qi sau Yang a Rinichilor; Frig și Umiditate în regiunea spatelui și sistemului urinar.

Localizarea

regio abdominalis lateralis, antero-inferior de extremitatea coastei XII, la 1,8 cun posterior de F13 Zhangmen.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.obliquus externus abdominis • m.obliquus internus abdominis • m.transversus abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis (abdominalis) n.intercostalis XI*; mușchii – *nn.intercostales (Th5-12), n.lumbalis (L1) • r.cutaneus*

lateralis a.intercostalis XI, vv.intercostales anteriores.

Tehnica

se punctează oblic (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat medial (spre coloana vertebrală). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

regiunea inferioară a abdomenului.

VB26 Daimai

- punct de încrucișare a meridianelor VB, Dai Mai;
- punct de intrare al meridianului extraordinar Dai Mai.

Indicații

- ascită; afectarea articulațiilor; punct specific în tulburări sexuale;
- punct antialgic: regiunea lombară (mialgii); abdomenul inferior, organele urogenitale (spasme); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – pleoapele;
- punct sindromal: stagnarea Qi și Xue în uter (menstre neregulate, dismenoree), în abdomenul inferior și picioare (durere și senzație de rece); Umiditate-Căldură în Focarul Inferior (leucoree – VB26 + VC3 + V32; cistită; diaree).

Localizarea

regio abdominalis lateralis, pe orizontala ombilicului, sub vârful coastei XI.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.obliquus externus abdominis • m.obliquus internus abdominis • m.transversus abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.subcostalis* (Th12); mușchii – *nn.intercostales* (Th5-12), *n.lumbalis* (L1) • *a. et vv.subcostales*.

Tehnica

se punctează vertical – 0,5-1 cun (punctarea profundă este contraindicată – există pericolul de a leza colonul ascendent, din dreapta, și descendent, din stânga). Moxibustie 10-30 minute.

Senzația

regiunea inferioară și laterală a abdomenului, în interiorul bazinului mic.

VB27 Wushu

- punct de încrucișare a meridianelor VB, Dai Mai;
- punct al meridianului extraordinar Dai Mai.

Indicații

- orhită; prolaps uterin; hernie inghinală;
- punct antialgic: stomac, intestine (colică); uter, organele genitale (spasme); dureri în poliartrite; lombalgie; punct cu acțiune contra-

- laterală (miezul zilei/miezul nopții) – axilă, centura scapulară;
- punct sindromal: Umiditate-Căldură în Focarul Inferior; stagnarea Qi și Xue în uter și abdomenul inferior.

Localizarea

regio inguinalis, la 3 cun antero-inferior de VB26 Daimai, pe orizontala lui VC4 Guanyuan, anterior de spina iliacă antero-superioară.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.obliquus externus abdominis • m.obliquus internus abdominis • m.transversus abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.iliohypogastricus* (Th12, L1) de la *plexus lumbalis*; mușchii – *nn. intercostales* (Th5-12), *n.lumbalis* (L1) • *a. et vv.circumflexae ilium superficiales*, *a. et vv. circumflexae ilium profundae*.

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun). Moxibustie 10–30 minute.

Senzația

regiunea inghinală și regiunea inferioară a abdomenului.

VB28 Weidao

- punct de încrucișare a meridianelor VB, Dai Mai;
- punct de ieșire al meridianului extraordinar Dai Mai.

Indicații

- edeme; constipație cronică; prolaps uterin; hernie inghinală;
- punct antialgic: abdomenul inferior; lombalgie, sciatică;
- punct sindromal: Umiditate-Căldură în Focarul Inferior; stagnarea Qi și Xue în uter și abdomenul inferior.

Localizarea

regio inguinalis, la 0,5 cun antero-inferior de VB27 Wushu.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.obliquus externus abdominis • m.obliquus internus abdominis • m.transversus abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.iliohypogastricus* (Th12, L1) de la *plexus lumbalis*; mușchii – *nn.intercostales* (Th7-12), *n.lumbalis* (L1) • *a. et vv.circumflexae ilium superficiales*, *a. et vv.circumflexae ilium profundae*.

Tehnica

se înțeapă vertical sau oblic (1–1,5 cun), vârful acului va fi orientat spre regiunea inghinală. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

regiunea inghinală și regiunea inferioară a abdomenului.



Fig.113




Fig.114

VB29 Juliao

- punct al meridianului extraordinar Yang Qiao Mai;
- punct de încrucișare a meridianelor VB, Yang Qiao Mai.

Indicații

- endometrită; paralizia membrelor inferioare (VB29 + VB31 + VB34);
- punct antialgic: regiunea articulației coxofemorale (VB29 + VB30); rinichi (dureri ce iradiază în abdomenul inferior), vezica urinară; ciclul menstrual (dismenoree); lombalgie.

Localizarea

regio femoralis anterior, la mijlocul distanței dintre spina iliacă antero-superioară și marele trohanter.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.gluteus medius • fascia lata • m.tensor fasciae latae • m.rectus femoris.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis n.iliohypogastrici* (Th12, L1) de la *plexus lumbalis*; mușchii – *n.gluteus superior* (L4,5), *n. femoralis* (L2,3,4) • *a. et vv.circumflexae ilium superficiales*, *a. et vv.circumflexae ilium profundae*, *a. et vv. circumflexae femoris laterales*.

Tehnica

se înțeapă vertical (1–1,5 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre articulația șoldului. Moxibustie 10–30 minute.

Serizația

în jos, spre mijlocul coapsei.

VB30 Huantiao

- punct de inserție al meridianului tendino-muscular E;
- punct de încrucișare a meridianelor VB, V.

Indicații

- atrofie musculară a membrelor inferioare; hemiplegie;
- punct antialgic: regiunea pieptului și a fosei axilare, regiunea

articulației coxofemorale, suprafața laterală și posterioară a coapsei; rinichi (dureri ce iriază în abdomenul inferior); osteoalgie; lombalgii, sciatică; prurit generalizat;

- punct sindromal: stagnarea Qi și Xue în meridianele Veziculă Biliară și Vezică; Vânt Extern, Frig și Umiditate; Insuficiența Qi a Veziculei Biliare; Umiditate-Căldură în Ficat și Vezicula Biliară; hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului cu spasme musculare (VB30 + VB34); stagnarea Qi în membrele inferioare (VB30 + VB31); Umiditate-Căldură în Focarul Inferior (prurit anal; uretrită); afectarea cutanată (Vânt-Căldură) în partea inferioară a corpului.

Localizarea

regio glutealis, la întâlnirea 1/3 medii cu cea laterală a liniei dintre marele trohanter și deschiderea inferioară a canalului sacral.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.gluteus maximus • m.gluteus medius • m.periformis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis n.iliohypogastrici (Th12, L1)* de la *plexus lumbalis*; mușchii – *n. gluteus inferior (L5, S1,2)*, *n.gluteus superior (L4,5, S1)*, *rr.musculares plexus sacralis (L5, S1,2)* • *a. et vv.gluteae inferiores, a. et vv.gluteae superiores*.

Tehnica

se înțeapă vertical (2–3 cun); se înțeapă vertical, apoi se va continua introducerea acului sub un unghi ascuțit, orientând vârful acului spre stânga, apoi spre dreapta. Moxibustie 20–50 minute.

Senzația

în jos, spre coapsă.

VB31 Fengshi

Indicații

- atrofii musculare a membrelor inferioare; hemiplegie;
- punct antialgic: articulația genunchiului, suprafața laterală a coapsei; sciatică, mialgii; prurit generalizat (VB31 + RP10 + GI11);
- punct sindromal: Vânt-Căldură, Umiditate-Căldură cu afectarea pielii (urticarie, herpes zoster).

Localizarea

regio femoralis anterior, la 7 cun deasupra marginii superioare a rotulei, pe marginea laterală a mușchiului vast al coapsei, acolo unde pacientul, fiind în picioare, atinge coapsa cu vârful mediusului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia lata • tractus iliotibialis • m.vastus lateralis • caput breve m.bicipitis femoris.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus femoris lateralis (L2,3)* de la *plexus lumbalis*;




Fig. 115




Fig. 116

mușchii – *n.femoralis* (L2,3,4), *n.peroneus communis* (L5, S1,2) • *r.descendens a.circumflexae femoris lateralis*, *vv.circumflexae femoris laterales*.

Tehnica

se înțeapă vertical (1–2 cun). Tehnica de sângerare (dureri în regiunea lombară și picioare). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în jos, spre genunchi.

VB32 Zhongdu

Indicații

- paralizie și parestezii ale membrelor inferioare, hemiplegie;
- punct antialgic: suprafața laterală a coapsei, articulații (dureri apărute după un mers îndelungat); dureri spasmodice în mușchiul gastrocnemian, lumbago, sciatică.

Localizarea

regio femoralis anterior, la 2 cun sub VB31 Fengshi.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *fascia lata* • *tractus iliotibialis* • *m.vastus lateralis* • *caput breve m.bicipitis femoris*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus femoris lateralis* (L2,3) de la *plexus lumbalis*;
mușchii – *n.femoralis* (L2,3,4), *n.peroneus communis* (L5, S1,2) • *r.descendens a.circumflexae femoris lateralis*, *vv.circumflexae femoris laterales*, *a.profunda femoris*.

Tehnica

se înțeapă vertical (1–1,5 cun). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în jos, spre genunchi.

VB33 Xiyangguan

- punct "barieră".

Indicații

- paretezii și pareze ale membrelor inferioare;
- punct antialgic: suprafața laterală a coapsei, sciatică, articulația genunchiului (mișcări de rotație); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – mână, cot, axilă, centură scapulară;
- punct sindromal: stagnarea Qi și Xue în meridianul Veziculă Biliară (traume ale membrelor inferioare); afectarea articulației genunchiului (Umiditate, Umiditate-Căldură, Vânt, Frig).

Localizarea

regio genus anterior, la 3 cun deasupra lui VB34 Yanglingquan, în fosa situată deasupra condilului femural extern.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia lata • caput breve m.bicipitis femoris • m.gastrocnemius (caput laterale).

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus surae lateralis (L5, S1,2)*, ramură a *n.peroneus communis* de la *plexus sacralis*; mușchii – *n.peroneus communis (L5, S1,2) • rete articulare genus, r.a. et v.popliteae*.

Tehnica

se înțeapă vertical (0,8–1 cun); se înțeapă spre punctul F8 Ququan (artroză a genunchiului; atrofie a membrelor inferioare). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în sus, spre coapsă și în jos, spre gambă.

VB34 Yanglingquan

- punct antic He (elementul Pământ);
- punct de "proiecție periferică" a Veziculei Biliare;
- punct de inserție al meridianelor tendino-musculare V și VB;
- punct sezonier al viscerului Fu Vezicula Biliară (punct de tonifiere pentru perioada de toamnă și de dispersie pentru perioada de vară).

Indicații

- punct specific în atrofii musculare, lezarea mușchilor și tendoanelor (VB34 + RP9); constipație cronică (VB34 + GI10 + TR6); anxietate, insomnie cu spasme musculare;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (articulația scapu-

- lo-humerală; hipocondru);
- punct antialgic: sacrum, coccis, suprafața laterală a articulației coxofemorale și a coapsei, genunchi (dureri în timpul mersului), gambă; rinichi; nervii intercostali (VB34 + TR6); lombalgii (agravare la mișcare), sciatică (VB34 + V60 + VB30); mialgii; osteoalgii; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: genunchi (VB34) – cot (TR10);
- punct sindromal: stagnarea Qi a Ficatului și Veziculei Biliare (depresie, frustrație; durere în hipocondru); hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului; Vânt al Ficatului (cefalee, tinitus; tremor); Umiditate-Căldură a Veziculei Biliare (colecistită, hepatită, indigestie); pervertirea fluxului Qi a Stomacului (greață, vomă); dezarmonia Ficat-Stomac.

Localizarea

regio cruralis anterior, în depresiunea aflată antero-inferior de capul peroneului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.peroneus longus • m. extensor digitorum longus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus surae lateralis* (L4,5, S1,2), ramură a *n. peroneus communis* de la *plexus sacralis*; mușchii – *n.peroneus profundus* (L5, S1) • *rete articulare genus, r.a. et v.popliteae.*

Tehnica

se punctează vertical (1–1,5 cun); se punctează penetrant până la RP9 Yinlingquan (distensie abdominală; dificultate la urinare); se punctează oblic, vârful acului va fi orientat în sus sau în jos. Tehnica de sângerare (gust amar, vomă; hipermenoree; bronșită; afecțiuni ale ficatului și veziculei biliare). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

În sus, spre genunchi și în jos, spre laba piciorului.

VB35 Yangjiao

- punct de încrucișare a meridianelor VB, Yang Wei Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Wei Mai;
- punct Xi al meridianului extraordinar Yang Wei Mai.

Indicații

- tulburări trofice ale membrelor inferioare (picioare reci); dispnee;
- punct antialgic: regiunea coccisului, regiunea ilionului, suprafața laterală a piciorului (nervul peronier comun), sciatică; ciclul menstrual (dismenoree cu vertij); algii migrante fără localizare precisă.

Localizarea

regio cruralis posterior, la 7 cun deasupra maleolei externe, pe

marginea posterioară a peroneului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.peroneus longus • m. peroneus brevis • m.flexor hallucis longus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus surae lateralis* (L4,5, S1,2), ramură a *n. peroneus communis* de la *plexus sacralis*; mușchii – *n.peroneus superficialis* (L4,5, S1), *n.tibialis* (S1,2,3) • *a. et vv.tibiales anteriores*.

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun); se înțeapă spre punctul V57 Chengshan (rigiditate a gâtului). Tehnica de sângerare (facies tumefiat; afecțiuni ale ficatului și veziculei biliare; afecțiuni cutanate). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în jos, spre laba piciorului.

VB36 Waiqiu

– punct Xi al meridianului VB.

Indicații

- paralizii ale membrelor inferioare;
- punct antialgic: epiderm; coaste; sciatică, nervul peronier comun.

Localizarea

regio cruralis anterior, la 7 cun deasupra maleolei externe, pe marginea anterioară a peroneului, la 1 cun anterior de VB35 Yangjiao.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.extensor digitorum longus • m.peroneus longus • m.peroneus brevis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus surae lateralis* (L4,5, S1,2), ramură a *n. peroneus communis* de la *plexus sacralis*; mușchii – *n.peroneus profundus* (L5, S1), *n.peroneus superficialis* (L5, S1) • *a. et vv. tibiales anteriores*.

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în jos, spre gleznă.




Fig.117

VB37 Guangming

– punct Lo al meridianului VB.




Fig.118




Fig.119

Indicații

- punct specific în afecțiuni oftalmologice; patologia venelor membrelor inferioare; delir febril;
- punct antialgic: fața externă a gambei; ochi (dureri cu prurit); obraji (mușcarea părții interne a obrazului); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ochi;
- punct sindromal: Vânt Intern în regiunea ochilor; Foc al Ficatului (afectarea ochilor).

Localizarea

regio cruralis anterior, la 5 cun deasupra maleolei externe, pe marginea anterioară a peroneului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.extensor digitorum longus • m.peroneus brevis • m.extensor hallucis longus • m.tibialis posterior.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus surae lateralis* (L4,5, S1,2), ramură a *n.peroneus communis* de la *plexus sacralis*; mușchii – *n.peroneus profundus* (L5, S1), *n.peroneus superficialis* (L5, S1) • *a. et vv. tibiales anteriores.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în jos, spre degete.

VB38 Yangfu

- punct antic Jing-prox. (elementul Foc);
- punct de dispersie al meridianului VB;
- punct sezonier al viscerului Fu Vezicula Biliară (punct de tonifiere pentru al 5-lea sezon și de dispersie pentru perioada de primăvară).

Indicații

- paretezii ale membrelor inferioare; afecțiuni alergice; constipații; punct specific în hemoroizi; afecțiuni ale venelor; angoasă, iritabilitate, gelozie;
- punct antialgic: epiderm; ochi (dureri cu prurit); facies (nevralgii); inimă (precordialgii); vezicula biliară (dureri și constipații în colecistite); hemoroizi; lombalgie, sciatică; astenizare cu dureri difuze; distorsiune, poliartrită; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – articulațiile membrelor superioare, axilă;
- punct sindromal: stagnarea Qi a meridianului Veziculă Biliară; Umiditate-Căldură a Veziculei Biliare; Foc al Ficatului (migrenă; conjunctivită; iritabilitate); ascendența Yang-Qi a Ficatului (cefalee, migrenă).

Localizarea

regio cruralis anterior, la 4 cun deasupra maleolei externe, pe marginea anterioară a peroneului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.peroneus brevis • m. extensor digitorum longus • m.tibialis posterior.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus surae lateralis (L4,5, S1,2)*, *n.peroneus superficialis (L4,5, S1)*; mușchii – *n.peroneus profundus (L5, S1)*, *n.peroneus superficialis (L5, S1) • a. et vv.tibiales anteriores.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în jos, spre degete.

VB39 Xuanzhong

- punct Lo de grupă (V, VB, E).

Indicații

- punct cu efect de reglare a mușchilor și tendoanelor; punct specific în patologia măduvei osoase (în această patologie se evită asocierea punctului VB39 Xuanzhong cu punctele V43 Gaohuangshu și VG17 Naohu din cauza unor particularități negative ale acțiunii asupra hematopoezei); afecțiunea mucoaselor (căile respiratorii și digestive); afecțiuni alergice; torticolis; afecțiunile urechilor (tinitus, diminuarea auzului); furie, depresie, emotivitate cu indignare, iritabilitate; punct important pentru profilaxia ictusului cerebral, hemiplegie (VB39 + VB34 + VB30); hipertensiune arterială (VB39 + GI11 + E36);
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (gât);



Fig.120

- punct antialgic: regiunea nasului și sinusurilor paranazale; gât; inimă (dureri în timpul tusei); organele genitale (dureri spasmodice); membrele inferioare (nevralgii), genunchi (dureri ce iradiază în regiunea lombară); osteoalgii; lombalgii, sciatică; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – partea superioară a spatelui;
- punct sindromal: Insuficiența Esenței Rinichilor; Vânt Intern; Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor.

Localizarea

regio cruralis anterior, la 3 cun deasupra maleolei externe, pe marginea anterioară a peroneului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.extensor digitorum longus • m.peroneus brevis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus surae lateralis* (L4,5, S1,2), *n.peroneus superficialis* (L4,5, S1), ramură a *n.peroneus communis* de la *plexus sacralis*; mușchii – *n.peroneus profundus* (L5, S1), *n.peroneus superficialis* (L5, S1) • *r.perforans a.peroneae*, vv. *tibiales posteriores*.

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun); se punctează oblic, vârful acului va fi orientat puțin în sus (dureri în gât și regiunea spatelui); se înțeapă oblic, vârful acului va fi orientat în jos, obținând senzația de distensie locală și iradiere în jos, până la călcâi (dureri în gambă și epistaxis); se punctează penetrant până la RP6 Sanyinjiao, obținând senzația de distensie cu iradiere în sus și în jos (osteoalgii; senzație de căldură în regiunea capului, migrenă; epistaxis; hipertensiune arterială; inapetență). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în jos, spre maleola laterală și degete.

VB40 Qiuxu

- punct antic Yuan;
- punct sursă al meridianului VB;
- punct de inserție al meridianelor tendino-musculare V și VB.

Indicații

- punct antispastic; colica nefretică; punct important coleretic și colagog;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (ochi, cap, tâmplă);
- punct antialgic: inimă (cardialgii); sciatică; dureri difuze; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – fațes, axilă; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor;

- gleznă (VB40) – pumn (TR4);
- punct sindromal: Insuficiența și stagnarea Qi a meridianului Vezicula Biliară și Ficat (slăbiciune și durere în membrele inferioare; dureri în hipocondru).

Localizarea

dorsum pedis, în fosa antero-inferioară a maleolei externe.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • retinaculum musculorum extensorum inferius • tendo m.peronei tertii • m.extensor digitorum brevis • lig. talofibulare anterius.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus dorsalis intermedius (L4,5, S1)*, ramură a *n.peroneus superficialis* de la *plexus sacralis*; mușchii – *n.peroneus profundus (L4, 5, S1) • rr.malleolares laterales et vv. comitantes, a.malleolaris anterior lateralis.*

Tehnica

se punctează vertical (0,5–0,8 cun); se punctează oblic, vârful acului va fi orientat spre fisura articulară, spre marginea posterioară a maleolei mediale; se înțeapă spre punctul R6 Zhaohai (durere în cutia toracică la bolnavii cu pleurezie; dureri în hipocondru; globus hystericus); se înțeapă spre punctul V62 Shenmai (paralizii; dureri în abdomen). Moxibustie 5–25 minute.

Senzația

în jos, spre degetul mic.

VB41 Zulinqi

- punct antic Shu (elementul Lemn);
- punct de ieșire din meridianul VB;
- punct de comandă al meridianului extraordinar Dai Mai;
- punct sezonier al viscerului Fu Vezicula Biliară (punct de tonifiere pentru perioada de vară și de dispersie pentru perioada de iarnă).

Indicații

- punct important în afectarea căilor și ganglionilor limfatici; tulburările ciclului menstrual (sindrom premenstrual, menstrre neregulate, depresie psihică); afectarea glandelor mamare (mastită, abcese, durere sau tensionare premenstruală);
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (organe genitale; glande mamare);
- punct antialgic: cap (dureri în regiunea procesului mastoidian); centura scapulară, umăr (dureri cu amortire noaptea); ochi; dinți; cutia toracică (în pleurite și pneumonie); glandele mamare; inimă, ciclul menstrual (reținerea menstrelor); algii fără localizare precisă, migratoare; cefalee temporo-occipitală, migrenă – VB41 + TR2; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții)
- membre superioare, ochi, glande mamare, gât;

- punct sindromal: stagnarea Qi a Ficatului (dureri în hipocondru – VB41 + TR2); hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului; Focul Ficatului; Umiditate-Căldură în Focarul Inferior (eczemă în regiunea organelor genitale, prurit vaginal; leucoree; cistită).

Localizarea

dorsum pedis, la 1,5 cun posterior de VB43 Xiāxi, la joncțiunea dintre metatarsienele IV și V, partea laterală a tendonului extensorului degetului V (distanța de la VB43 Xiāxi până la marginea inferioară a maleolei laterale este de 5 cun).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia dorsalis pedis • tendines mm. extensoris digitorum longus et brevis digiti IV • m.interosseus dorsalis IV.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus dorsalis intermedius (L4,5, S1)*, ramură a *n.peroneus superficialis* de la *plexus sacralis*; mușchii – *n.peroneus profundus (L4,5, S1)*, *n.plantaris lateralis (S1,2,3)* • *a. et vv.metatarsee dorsales IV.*

Tehnica

se punctează vertical (0,3–0,5 cun); se punctează oblic, vârful acului va fi orientat spre călcâi. Moxibustie 3–5 minute.

Senzația

în jos, spre degete.

VB42 Diwuhui

Indicații

- acufene; patologia veziculei biliare și a căilor biliare;
- punct antialgic: centura scapulară (dureri ce iradiază în fosa axilară și umăr), fosa axilară, articulația cotului (dureri ce blochează articulația); ochi; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – glande mamare, axilă.

Localizarea

dorsum pedis, între metatarsienele IV și V, la 0,5 cun anterior de VB41 Zulinqi, în locul cel mai larg al spațiului metatarsian.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia dorsalis pedis • m.interosseus dorsalis IV.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.cutaneus dorsalis intermedius (L4,5, S1)*, ramură a *n.peroneus superficialis* de la *plexus sacralis*; mușchii – *n.plantaris lateralis (S1, 2, 3)* • *a. et vv.metatarsee dorsales IV.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,3–0,5 cun). Moxibustie 5–10 minute (în operele antice moxibustia este interzisă).

Senzația
În jos, spre degete.

VB43 Xiashi

- punct antic Ying (elementul Apă);
- punct de tonifiere al meridianului VB;
- punct sezonier al viscerului Fu Vezicula Biliară (punct de tonifiere pentru perioada de primăvară și de dispersie pentru perioada de toamnă).

Indicații

- surditate, acufene; migrenă (VB43 + IG5);
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (urechi, cap – tâmpile);
- punct antialgic: globii oculari (dureri cu hiperemie); nervii intercostali; inimă (precordialgii); ficat (colică); hemoroizi (dureri lancinante); algii difuze; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – cutie toracică, gât, ochi;
- punct sindromal: hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului (cefalee în regiunea temporală, tinitus); Foc al Ficatului (VB43 + TR3); Umiditate-Căldură (cefalee; otită medie); Vânt-Foc (odontalgie – VB43 + IG5).




Fig.121

Localizarea

dorsum pedis, la comisura degetelor IV și V, pe pliu, la granița pielii roșii (Yang) și albe (Yin).

Proiecția

cutis • tela subcutanea.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.digitales dorsales pedis* de la *n.cutaneus dorsalis intermedius* (L4,5, S1), ramură a *n.peroneus superficialis* (*plexus sacralis*) • *aa. et vv.digitales dorsales IV-V.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,3–0,5 cun). Moxibustie 3–5 minute.

Senzația

În jos, spre degete.

VB44 Zuqiaoyin

- punct antic Jing-dist. (elementul Metal);
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular VB;
- punct sezonier al viscerului Fu Vezicula Biliară (punct de tonifiere pentru perioada de iarnă și de dispersie pentru al 5-lea sezon).

Indicații

- pleurită, astm bronșic; faringită;

- punct distal cu acțiune locoregională proximală (ochi);
- punct Gen din perechea Gen-Jie: VB44 – urechi;
- punct Ben din perechea Biao-Ben: VB44-VB2;
- punct antialgic: ochi; coaste; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ochi, glande mamare, membrele superioare, cot, axilă;
- punct sindromal: hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului; Foc al Ficatului (afectarea ochilor; insomnie, coșmaruri, nervozitate; hipertensiune arterială, migrenă).

Localizarea

dorsum pedis, la 0,1 cun postero-lateral de unghiul unghiei extern al degetului IV.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • phalanx digitalis distalis IV.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.digitalis dorsalis pedis* de la *n.cutaneus dorsalis intermedius* (L4,5, S1), ramură a *n.peroneus superficialis* (plexus *sacralis*) • *aa. et vv.digitales dorsales IV-V.*

Tehnica

se înțeapă vertical sau oblic (0,1 cun); vârful acului va fi orientat în sus. Tehnica de sângerare (cefalee; hipertonie; conjunctivită; otită, acufene; febră; afecțiuni ale ficatului; dureri în articulația coxofemurală). Moxibustie 3–5 minute.

Senzația

locală.

I.12. Meridianul Ficat (F)

Meridianul Ficat este de natură Yin, centripet, pereche, conține 14 puncte (fig. 122–128).

Relațiile energetice:

1. În cadrul marii circulații energetice este precedat de meridianul Veziculă Biliară și urmat de meridianul Plămân (VB-F-P).
2. În cuplu cu meridianul Veziculă Biliară realizează loja energetică Lemn (F-VB). În cadrul ciclului celor 5 elemente este stimulat de R și inhibat de P.
3. În cuplu cu meridianul Pericard formează axul energetic Jue Yin (F-MC).
4. După regula "miezul zilei/miezul nopții" este cuplat cu meridianul Intestin Subțire (F-IG).
5. După regula "soț/soție" este cuplat cu meridianul Splină-Pancreas (F-RP).




Fig.122. Punctele meridianului Ficat (F).

Funcțiile energetice:

1. Controlează o mare parte a funcțiilor metabolismului și digestiei, reglează și coordonează activitatea altor organe (funcția de "conducător", responsabil de strategie).
2. Susține circulația liberă (fluentă) și armonioasă a Energiei în organele Zang și Fu. Această funcție se manifestă în trei aspecte: dirijarea activității emoționale, participarea la digestie și influența asupra circulației Qi și Xue (deși rolul principal în ultima funcție le revine Inimii și Plămânilor).
3. Exerciță o influență importantă asupra funcționării sistemului nervos.
4. Participă la funcția de coagulare a sângelui; în caz de afectare sunt posibile hemoragiile.
5. Reglează forțele defensive ale organismului în lupta cu toxinele, influențează imunitatea.
6. Exerciță una din influențele dominante asupra patologiei organelor bazinului mic și ale sistemului urogenital.
7. Împreună cu meridianele Pericard, Splină-Pancreas și Rinichi participă la reglarea sexualității omului.
8. Controlează aparatul locomotor (tonusul mușchilor și al ligamentelor, apariția spasmelor, convulsiilor, rigidității).
9. Depozitează sângele și reglează cantitatea de sânge circulant.
10. Ficatul se "deschide" în ochi; Lichidul Ficatului sunt lacrimile, care au funcția de a umecta ochii.
11. În analogie cu Plămânii (filtru pentru Sânge și Limfă), de asemenea, este filtru pentru Sângele primit din tractul digestiv.
12. Împreună cu Vezicula Biliară formează loja energetică Lemn, care emană Energia numită Hun (corespunde imaginației, dorinței de acțiune, entuziasmului).

Acțiunea sindromal-energetică:

- dinamizarea Qi și Xue (în patologiile legate de stagnarea Qi și Xue este efectivă asocierea punctelor meridianelor Ficat, Pericard și Vas Concepție – F3 + F14 + MC6 + VC7; în funcție de localizarea stăgnării sunt indicate diferite asocieri de puncte: regiunea cefalică – F3 + VG20; cutia toracică – F3 + MC1; glande mamare – F3 + VC17; gât – F3 + VC22; hipocondru – F3 + VB24; mușchi – F3 + VB21 + VB34);
- calmarea hiperactivității Yang-Qi a Ficatului (formula de bază este F3 + VB34 + VB20; la această formulă se asociază alte puncte în funcție de sindromul predominant: Focul Ficatului – F2 + R1; stagnarea Qi a Ficatului – F14 + MC6; Insuficiența Xue – F8 + RP6 + RP10; Insuficiența Yin-Qi – RP6 + R6);
- dispersia Focului în Ficat (Foc-Exces – F2 + MC8; Foc-Insuficiență – F2 + F3 + VB40 + VB38 + VC6);
- dispersia Focului în Sânge (hemorajii uterine – F1 + RP1 + RP10

- + VC6);
- calmarea Vântului Ficatului – F3 + VB20 + VG16 + GI4;
- diminuarea Umidității și a Căldurii în Ficat și Vezicula Biliară (Focarul Mediu – F3 + F14 + VB34 + RP6 + VB24 + TR6); Focarul Inferior – F5 + F8 + VB34 + RP6 + VB24 + VB41 + VC3; uter – F3 + E29; organe genitale – F3 + VC3);
- fortificarea Xue a Ficatului – F8 + E36 + RP6 + V17 + V18 + V20;
- reglarea tonusului muscular – F3 + VB21; F3 + VB34 + VB40; la stimularea punctului F1 Dadun este posibilă diminuarea sau fortificarea tonusului muscular (ca exemplu poate fi prolapsul uterin – F1 + F8 + E29 + VC4 + VG20);
- încălzirea Frigului meridianului Ficat – F1 + F5 + F11 + E30 + VC3;
- armonizarea proceselor psihice (tratamentul se realizează individual, în funcție de sindromul evidențiat; se aplică punctele Shu-post, în asociere cu punctele Shu psiho-dorsale și punctele Yuan; în tulburările psihice cu predominare a iritabilității și tensionării emoționale este indicată formula F1 + F3 + F14).

Afectarea organului și traiectului intern al meridianului:

senzație de plenitudine și durere în regiunea toracică inferioară și hipocondru, dureri și disfuncții abdominale, greață, vomă, diaree, disfagie, anorexie, constipație, icter; impotență, frigiditate; enurezis.

Afectarea traiectului extern al meridianului:

tulburări distrofice ori dureroase de-a lungul meridianului (suprafața internă a membrelor inferioare); nevralgie intercostală; spasme musculare; disurie, durere sau prurit în organele genitale, hernii inghinale; prolaps uterin, congestie pelvină; tulburări de erecție, incontinență urinară.

Afectarea conexiunilor energetice ale meridianului:

cefalee, vertij; iritabilitate, teamă, fobii; dermatoze; tulburări respiratorii (dispnee); afectarea ochilor (fotofobie).

F1 Dadun

- punct antic Jing-dist.(elementul Lemn);
- punct de intrare în meridianul F;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular F;
- punct sezonier al organului Zang Ficat (punct de tonifiere pentru perioada de vară și de dispersie pentru perioada de iarnă).

Indicații

- punct important în hemoragii (hematurie, hemoragii intestinale, metroragie); punct de reglare a tonusului muscular (incontinență urinară, enurezis; prolaps uterin; atonie a mușchilor peretelui abdominal); hernie dureroasă;
- punct Gen din perechea Gen-Jie: F1 – torace;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (sistemul urinar;




Fig. 123




Fig. 124

- ochi);
- punct antialgic: inimă; intestine (dureri spasmodice); uretră, penis, scrot; uter, ovare (dureri în poziția verticală a corpului);
 - punct sindromal: stagnarea Qi a Ficatului (depresie; cefalee; dureri în hipocondru); Foc al Ficatului (hipertensiune arterială; frustrație, iritabilitate); Umiditate-Căldură a Focarului Inferior (cistită; leucoree, prurit vaginal); stagnarea Qi și Xue a Focarului Inferior (disurie; dismenoree); perversiunea fluxului Qi a Ficatului (cefalee, tinitus; iritabilitate; gust amar; oftat, distensie și dureri epigastrice).

Localizarea

dorsum pedis, la 0,1 cun înapoia unghiului unghiei externe al halucelui.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • phalanx digitalis distalis I.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.digitalis dorsalis pedis* (L4,5, S1), ramură a *n.cutaneus dorsalis intermedius n.peronei superficialis* (plexus sacralis) • *a. digitalis dorsalis, vv.digitales dorsales pedis.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,1 cun) sau oblic, vârful acului va fi orientat spre baza degetului (spre F2 Xingjian). Tehnica de sângerare (cardialgii; colecistită cronică; hiperhidroză). Moxibustie 5–7 minute.

Senzația

locală.

F2 Xingjian

- punct antic Ying (elementul Foc);

- punct de dispersie al meridianului F;
- punct sezonier al organului Zang Ficat (punct de tonifiere pentru al 5-lea sezon și de dispersie pentru perioada de primăvară).

Indicații

- diaree cronică, constipație; convulsii, crampe, spasme;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (ochi, tâmples);
- punct antialgic: ochi (dureri spasmodice); dinții maxilarului inferior; gât, esofag (dureri spasmodice); nervii intercostali; căile biliare (dureri în colecistite), ficat (colică); rinichi; intestine; vezica urinară, penis; anus (dureri și prurit); vagin; degetele piciorului; cap (vertex); lombalgie; diferite algii, indiferent de localizare, în asociere cu contracturi și spasme; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ochi, dinți, gingii, articulațiile mâinii;
- punct sindromal: Focul Ficatului și Vântul Ficatului (hipertensiune arterială, vertij; epilepsie); Focul Ficatului și al Inimii (hipertensiune arterială; insomnie, anxietate); Focul Ficatului și al Plămânilor (tuse, bronșite, gât uscat); Focul Ficatului și al Stomacului (gingivită, odontalgie, gastrită); Focul Ficatului și Căldura Xue (epistaxis, metroragie, hematurie, melenă); perversiunea fluxului Qi a Ficatului (cefalee, tinitus; iritabilitate; gust amar); Umiditate-Căldură (leucoree; cistită).

Localizarea

dorsum pedis, pe pliu, între capetele metatarsienelor I și II, la granița pielii roșii (Yang) și albe (Yin).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • tendo m.interosseus dorsalis I.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.digitalis dorsalis pedis* (L4,5, S1), ramuri ale *n.peroneus profundus* (plexus sacralis) • *a.digitalis dorsalis*, *vv.digitales dorsales pedis*, *a. et vv.metatarsae dorsales pedis I.*

Tehnica

se înțeapă vertical sau oblic (0,5–0,8 cun). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

spre degetul mare.

F3 Taichong

- punct antic Shu-Yuan (elementul Pământ);
- punct sursă al meridianului F;
- punct sezonier al organului Zang Ficat (punct de tonifiere pentru perioada de toamnă și de dispersie pentru perioada de vară).

Indicații

- punct specific antispastic (mușchii); insuficiență hepatică, icter; punct important în afectarea glandelor mamare (mastită, hipogalactie, tensiune premenstruală); afecțiuni alergice; epistaxis;

- hipertensiune arterială (F3 + GI11 + E36);
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (vertex; gât; hipocondru);
- punct antialgic: cap (vertex – F3 + VG20); nas (dureri cu eliminări purulente); limbă (fisuri cu dureri severe); nervii intercostali; stomac (dureri cu balonarea abdomenului și aerofagie); intestine (dureri cu balonarea abdomenului); ficat; inimă; uretră; ovare, abdomenul inferior, naștere; cefalee (vertex); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – ochi, urechi, gât, articulația umărului, degetele mâinii;
- punct sindromal: stagnarea Qi și Xue; stagnarea Qi a Ficatului și Inimii (depresie psihică; dureri în hipocondru și cutia toracică); stagnarea Xue a Ficatului și Inimii (depresie; parestezii în membre; cardialgie; cefalee); stagnarea Qi a Ficatului și Plămânilor (depresie, frustrație; durere și senzație de distensie în cutia toracică); stagnarea Qi a Ficatului și Veziculei Biliare (indigestie, colecistită; depresie); stagnarea Qi și Xue în Focarul Inferior (durere în abdomenul inferior; dismenoree, menstre neregulate; disurie); dezarmonia Ficat-Stomac, Ficat-Splină și Ficat-Intestine (dureri epigastrice, grețuri, constipație); hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului (hipertensiune arterială, migrenă, tinitus; spasme musculare); Vânt al Ficatului (convulsii, tremor, spasme musculare; hemiplegie); pervertirea fluxului Qi a Ficatului (cefalee, tinitus; iritabilitate; gust amar; oftat; distensie și durere epigastrică); Vânt Intern (crampe musculare, ticuri, paralizii faciale); Umiditate-Căldură a Veziculei Biliare (colecistită; eczemă; leucoree); Insuficiența Xue a Ficatului (insomnie; amenoree; slăbiciune musculară); Frig al meridianului Ficat (dureri în organele genitale, orhită, vaginită; hernie).

Localizarea

dorsum pedis, în unghiul dintre metatarsienele I și II, în cel mai îngust loc.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia dorsalis pedis • tendo m. extensoris hallucis longus • m. interosseus dorsalis I.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n. peroneus profundus* (L4,5), ramură a *n. peroneus communis* (*plexus sacralis*); mușchii – *n. peroneus profundus* (L5, S1), *n. plantaris* (S1,2,3) • *a. et vv. metatarsae dorsales pedis I.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–1 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre R1 Yongquan (tinitus; algi în abdomenul inferior). Moxibustie 3–7 minute.

Senzația

în sus, spre gleznă și în jos, spre degetul mare.

F4 Zhongfeng

- punct antic Jing-prox. (elementul Metal);
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular F;
- punct sezonier al organului Zang Ficat (punct de tonifiere pentru perioada de iarnă și de dispersie pentru al 5-lea sezon).

Indicații

- hepatite, icter; spermatooree, prostatită, orhită, uretrită;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (abdomen inferior);
- punct Ben din perechea Biao-Ben: F4-V18;
- punct antialgic: gât; abdomenul inferior (dureri și balonare); vagin; penis; lombalgie; dureri în regiunea ombilicală; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: gleznă (F4) – pumn (MC7);
- punct sindromal: patologia urogenitală provocată de stagnarea Qi a Ficatului;

Localizarea

dorsum pedis, în fosetă, la 1 cun anterior de maleola internă, pe linia ce unește RP5 Shangqiu cu E41 Jiexi, între tendoanele gambierului anterior și extensorului propriu al halucelui.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • retinaculum musculorum extensorum inferius • tendo m.tibialis anterioris.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.cutanei mediales n.sapheni (L3,4)*, ramuri ale *n.femoralis (plexus lumbalis)*; mușchii – *n.peroneus profundus (L4,5) • rete malleolare mediale, rete venosum dorsale pedis.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,5–0,8 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat spre călcâi. Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în jos, spre degete.

F5 Ligou

- punct Lo al meridianului F.

Indicații

- punct specific în tulburări de circulație sangvină în membrele inferioare; tulburări sexuale (impotență, frigiditate, sterilitate);
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (sistemul urinar);
- punct antialgic: piele (dureri și prurit); vulvă (prurit – F5 + F8 + RP10); ficat și căile biliare, intestin; ovare, uter, ciclul menstrual (algomenoree cu slăbiciune); scrot, organele bazinului mic;
- punct sindromal: Umiditate-Căldură a Focarului Inferior (prurit vaginal, leucoree); stagnarea Qi a Focarului Inferior (dureri în abdomenul inferior; disurie; endometrită); stagnarea Qi a Ficatului

(depresie, agresivitate).

Localizarea

regio cruralis posterior, pe marginea medială a tibiei, la 5 cun deasupra maleolei interne.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.flexor digitorum longus • m.tibialis posterior.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.cutanei cruris mediales n.sapheni (L3, 4)*, ramuri ale *n.femoralis (plexus lumbalis)*; mușchii – *n.tibialis (L4,5, S1,2,3) • a.tibialis posterior, v.saphena magna.*

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat în sus, de-a lungul marginii posterioare a tibiei. Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în sus, spre genunchi și în jos, spre gleznă.

F6 Zhongdu

– punct Xi al meridianului F.

Indicații

- menoragie; constipație, dizenterie; tulburări psihice la femei în perioada după naștere;
- punct specific în tulburările metabolismului;
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (sistemul urinar);
- punct antialgic: membrele inferioare (nevralgii), articulația genunchiului (slăbiciune); gât; abdomenul inferior; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – facies, urechi, ochi;
- punct sindromal: Umiditate-Căldură a Focarului Inferior și stagnarea Qi a Ficatului (cistită; durere cu senzație de distensie).

Localizarea

regio cruralis posterior, pe marginea medială a tibiei, la 7 cun deasupra maleolei interne.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • m.soleus • m.flexor digitorum longus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.cutanei cruris mediales n.sapheni (L4, 5)*, ramuri ale *n.femoralis (plexus lumbalis)*; mușchii – *n.tibialis (L4,5, S1,2,3) • a.tibialis posterior, v.saphena magna.*

Tehnica

se punctează sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat în sus, de-a lungul marginii posterioare a tibiei. Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în sus sau în jos de la punct.

F7 Xiguan

- punct "barieră".

Indicații

- afectarea articulației genunchiului;
- punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – degetele mâinii, regiunea carpo-metacarpiană, gâtul, lobul urechii, maxilarul.

Localizarea

regio cruralis posterior, postero-inferior de condilul tibial medial, la 1 cun posterior de RP9 Yinlingquan, între solear și gastrocnemian.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia cruris • caput mediale m.gastrocnemii • m. popliteus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.cutanei cruris mediales n.sapheni (L3, 4)*, ramuri ale *n.femoralis (plexus lumbalis)*; mușchii – *n.tibialis (L4,5, S1,2)* • *a.tibialis posterior, v.saphena magna.*

Tehnica

se punctează vertical (0,8–1 cun). Moxibustie 5 minute.

Senzația

spre partea internă a gambei.

F8 Ququan

- punct antic He (elementul Apă);
- punct de tonifiere al meridianului F;
- punct de inserție al meridianului tendino-muscular F;
- punct sezonier al organului Zang Ficat (punct de tonifiere pentru perioada de primăvară și de dispersie pentru perioada de toamnă).



Fig.125

Indicații

- afecțiuni alergice; afecțiuni cronice ale organelor respiratorii; ejaculare precoce, impotență, spermatooree; afecțiuni cutanate; crampe musculare; punct specific în afecțiunile articulațiilor (F8 + TR5);
- punct distal cu acțiune locoregională proximală (regiunea hipogastrică);
- punct antialgic: piele; genunchi (dureri cu limitarea flexiei sau contractură); vezicula biliară; organele bazinului mic, abdomenul inferior (dureri ce urcă până la gât); organele genitale externe;

anus; punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – triceps; punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: genunchi (F8) – cot (MC3);

- punct sindromal: Umiditate-Frig sau Umiditate-Căldură în Focarul Inferior (vaginită; disurie); Insuficiența Xue a Ficatului (amenoree); Insuficiența Yin-Qi și Foc al Ficatului (piele uscată, gât și conjunctivă uscate); stagnarea Qi a Focarului Inferior, stagnarea Qi a Ficatului (iritabilitate).

Localizarea

regio genus posterior, în fosetă, la extremitatea internă a pliului de flexie (genunchi flectat).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia lata • tendo m.semimembranosus • caput mediale m.gastrocnemii.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.cutanei cruris mediales n.sapheni (L3, 4)*, ramuri ale *n.femoralis (plexus lumbalis)*; mușchii – *n.tibialis (L5, S1,2) • rete articulare genus, v.saphena magna.*

Tehnica

se punctează vertical (0,8–1 cun). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

spre partea internă a genunchiului și în sus, spre coapsă.

F9 Yinbao

Indicații

- dismenoree; polachiurie, oligurie, enurezis, retenție urinară;
- punct antialgic: sacru, coccis, fese, lombalgie, articulația coxofemurală (dureri la rotația piciorului); abdomenul inferior.

Localizarea

regio femoralis anterior, la 4 cun deasupra marginii superioare a rotulei, pe marginea anterioară a mușchiului semimembranos.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia lata • m.gracilis • m.sartorius • m.adductor magnus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus r.anterioris n.obturatorii (L2,3,4)*, *rr.cutanei anteriores n.femoralis (L2,3)* de la *plexus lumbalis*; mușchii – *n.femoralis (Th12, L1,2,3)*, *n.obturatorius (L1,2,3,4) • a. et vv.femorales, a.genus descendens, v.saphena magna.*

Tehnica

se punctează vertical (0,8–1,5 cun). Moxibustie 5–7 minute.

Senzația

în sus sau în jos, spre genunchi.

F10 Wuli

Indicații

- insomnie sau somnolență; astenie postgripală; crampe musculare; eczemă scrotală; enurezis;
- punct antialgic: scrot (dureri și prurit); punct cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) – gât, suprafața postero-laterală a membrelor superioare;
- punct sindromal: Umiditate-Căldură, Umiditate-Frig în regiunea organelor urogenitale; stagnarea Qi și Xue în regiunea organelor urogenitale (retenție urinară; durere).




Fig.126

Localizarea

regio femoralis anterior, la 1 cun sub F11 Yinlian, la 3 cun sub E30 Qichong.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia lata • m.adductor longus • m.pectineus • m.adductor brevis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.femoralis n.genitofemoralis* (L1,2) de la *plexus lumbalis*; mușchii – *n.obturatorius* (L2,3,4), *n.obturatorius et n.femoralis* (L1,2) • *a.obturatoria et a.femoralis*, *v.obturatoria*, *v.saphena magna*, *v. femoralis*.

Tehnica

se punctează vertical – 0,8–1,5 cun (nu se va puncta lateral, pentru a evita lezarea arterei femurale). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jos, spre suprafața medială a coapsei.

F11 Yinlian

Indicații

- dismenoree, sterilitate; punct specific pentru afectarea mușchilor părții mediale a coapsei;
- punct antialgic: articulația coxofemurală, membrele inferioare (dureri ce se intensifică noaptea); organele genitale externe (prurit); punct cu acțiune contralaterală "sus-jos" în afectarea articulațiilor: șold (F11) – umăr (MC2);
- punct sindromal: Umiditate-Căldură, Umiditate-Frig în regiunea organelor urogenitale; stagnarea Qi și Xue în regiunea organelor urogenitale (retenție urinară; durere).

Localizarea

regio femoralis anterior, la 2 cun sub E30 Qichong, la 2,5 cun lateral de linia mediană, la 1 cun de artera femurală.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia lata • m.adductor longus • m.pectineus • m.adductor brevis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.femoralis n.genitofemoralis (L1,2)* de la *plexus lumbalis*; mușchii – *n.obturatorius et n.femoralis (L1,2)*, *n.obturatorius (L2,3,4)* • *r.transversus a.circumflexae femoris medialis*, *v.saphena magna*.

Tehnica

se punctează vertical (0,8–1,5 cun). Moxibustie 3–5 minute.

Senzația

spre organele genitale și spre suprafața medială a coapsei.

F12 Jimai

Indicații

- punct specific în angiospasm al vaselor membrelor inferioare; migrenă oftalmică (F12 + RP11); afecțiunile ovarelor și testiculelor; prolaps rectal și uterin; orhită, epididimită;
- punct antialgic: abdomenul inferior; regiunea articulației coxofemorale, suprafața medială a coapsei; penis, scrot;
- punct sindromal: Umiditate-Căldură, Umiditate-Frig în regiunea organelor urogenitale; stagnarea Qi și Xue în regiunea organelor urogenitale (retenție urinară; durere).

Localizarea

regio femoralis anterior, la 1 cun sub marginea superioară a vârfului superior al osului pubian, la 2,5 cun lateral de linia mediană, lângă inelul extern al canalului inghinal, în locul intersecției pliului inghinal.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia lata • m.pectineus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.femoralis n.genitofemoralis (L1,2)* de la *plexus lumbalis*; mușchii – *n.obturatorius et n.femoralis (L1,2)* • *a. et vv.femorales, a. et vv.pudendae externae*.

Tehnica

se punctează perpendicular – 0,5–0,8 cun (în operele antice punctarea este interzisă). Moxibustie 5–15 minute.

Senzația

în jos, spre scrot.

F13 Zhangmen

- punct de alarmă al meridianului RP;
- punct al meridianului extraordinar Dai Mai;
- punct de încrucișare a meridianelor F, VB.



Fig. 127




Fig. 128

Indicații

- punct specific în simpaticotonie (pentru regiunea abdominală); punct important în tulburările metabolismului (obezitate) și insuficiența pancreasului; voma gravidelor; splenomegalie (F13 + RP6 + F3), ascită (F13 + VC9 + RP9), diaree;
- punct antialgic: inimă (precordialgii cu insomnie); rinichi; coloana vertebrală (dureri cu senzație de frig), lombalgie; abdomen (dureri cu dispepsie și vărsături), stomac;
- punct sindromal: stagnarea Qi a Ficatului (durere în hipocondru; depresie, tulburări de caracter); stagnarea hranei în Stomac; dezarmonia Ficat-Stomac și Ficat-Splină; Umiditate-Căldură a Ficatului și Veziculei Biliare (colecistită, indigestie, greață, vomă).

Localizarea

regio abdominalis lateralis, sub extremitatea liberă a coastei XI.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • m.obliquus externus abdominis • m.obliquus internus abdominis • m.transversus abdominis • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis (abdominalis) n.intercostalis X*; mușchii – *nn.intercostales (Th9-12), n.lumbalis (L1) • r.cutaneus lateralis a.intercostalis X-XI, aa. et vv.intercostales posteriores X-XI, a. et vv.epigastricae superficiales.*

Tehnica

se punctează oblic (0,5–0,8 cun); în obezitate se va înțepa de la punctul F13 Zhangmen spre VB25 Jingmen (atenție – în imediata apropiere se află ficatul și splina). Moxibustie 20–50 minute.

Senzația

în sus, spre coaste și în jos, spre abdomen.

F14 Qimen

- punct de alarmă al meridianului F;
- punct de ieșire din meridianul F;
- punct de încrucișare a meridianelor F, RP, Yin Wei Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yin Wei Mai.

Indicații

- hepatite, hepatomegalie; diabet; constipație, diaree; dispnee, pleurită; afectarea glandelor mamare (mastită, hipogalactie, tensiune premenstruală), menopauză;
- punct antialgic: nervii intercostali; vezicula biliară (dureri cu vărsături); inimă;
- punct sindromal: stagnarea Qi a Ficatului (frustrație, depresie; cefalee); dezarmonia Ficat-Stomac; Umiditate-Căldură în Ficat și Veziculă Biliară (greață, vomă, indigestie, colecistită); Căldura Xue (refrigerează Xue în Ficat); perversiunea fluxului Qi a Ficatului (iritabilitate; gust amar; tinitus, cefalee; oftat; distensie și durere epigastrică).

Localizarea

regio inframammaria, pe linia mamelonară, între coastele VI și VII, la 4 cun lateral de linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • m.pectoralis major • fascia thoracica • m.intercostalis externus • m.intercostalis internus • fascia endothoracica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (pectoralis) n.intercostalis VI*; mușchii – *nn.pectorales lateralis et medialis (C5-8, Th1), n.intercostalis VI • r.cutaneus lateralis a.intercostalis VI, aa. et vv.intercostales posteriores VI, rr.intercostales anteriores a.thoracicae internae.*

Tehnica

se punctează oblic (0,5–0,8 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat lateral, de-a lungul spațiului intercostal, mai aproape de marginea superioară a coastei VII. Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

în sus, spre zona medioclaviculară și mameloane.

II.

Meridianele secundare

- II.1. Meridianele extraordinare**
- II.2. Meridianele secundare Lo**
- II.3. Meridianele tendino-musculare**
- II.4. Meridianele distincte**

II.1. Meridianele extraordinare

II.1.1. Meridianul extraordinar Du Mai

Relațiile energetice:

1. Meridianul extraordinar Du Mai posedă 28 de puncte proprii de acupunctură (fig.129–133).
2. Punctul de intrare este VG1 Changqiang, punctul de ieșire – VG27 Duiduan.
3. Conexiunea punctului cheie IG3 Houxi cu meridianul curios Du Mai se realizează prin legătura energetică IG3 Houxi-IG15




Fig.129. Punctele meridianului Vas Guvernator (VG).

Jianzhongshu-E12 Quepen-VG13 Taodao-VG14 Dazhui.

4. Echilibrul energetic unipolar (Yang-Yang) este asigurat prin cuplarea Du Mai-Yang Qiao Mai.
5. Echilibrul energetic bipolar (Yang-Yin) este asigurat prin cuplarea Du Mai-Ren Mai.
6. Meridianul Du Mai împreună cu meridianul extraordinar Yang Wei Mai și cu meridianele principale Intestin Gros, Trei Focare, Intestin Subțire controlează suprafețele postero-superioare ale corpului omenesc.

Funcțiile energetice:

1. Meridianul Du Mai este de natură Yang cu tendință de Yang.
2. Meridianul Du Mai controlează (guvernează) toate funcțiile Yang ("marea meridianelor Yang").
3. Meridianul Du Mai este strâns legat funcțional cu creierul, măduva spinării și rinichii.

Acțiunea sindromal-energetică:

- dispersia Vântului Extern – VG12 + VG14 + V10 + GI4;
- dispersia Căldurii – VG14 + V40 + GI11 + MC9;
- calmarea hiperactivității Yang-Qi a Ficatului – VG8 + VG9 + F3 + VB20;
- dispersia Focului – VG13 + VG14 + VG26;
- diminuarea Umidității – VG6 + VG8 + VG16 + E40; VG20 + VG26 + E40;
- încălzirea Frigului Intern – VG3 + VG4 + V23 + V52 + E36;
- dinamizarea Qi (stagnarea Qi a Ficatului – VG6 + VG8 + V18 + RP6; stagnarea Qi a Splinei – VG20 + VG6 + RP4; stagnarea Qi a Plămânilor – VG11 + VG12 + VG14 + P7);
- fortificarea Yang-Qi (VG4 + VG14; la stimularea punctelor corespunzătoare ale Vasului Guvernator este posibilă stimularea Yang-Qi a organelor interne);
- diminuarea Vântului Intern – VG14 + VG16 + VG20;
- fortificarea Wei Qi – VG4 + VG12 + VG13 + VG14 + E36;
- fortificarea Jing a Rinichilor (punctul cel mai important este VG4 Mingmen, la stimularea lui se tonifică preponderent componenta Yang – VG4 + R3);
- armonizarea vorbirii articulate – VG15 + VG16 + VC23 + C5;
- ascendența Qi (punctele Vasului Guvernator sunt efective în prăbușirea Qi-ului manifestată prin diferite ptoze viscerale – VG1 + VG4 + VG20 + E36);
- armonizarea proceselor psihice (sunt alese punctele conform sindromului depistat, funcțiilor energetice ale acupunctelor și localizării metamerice a lor față de regiunea sau organul afectat; acțiunea psihotropă în mare măsură se datorează conexiunilor energetice ale Vasului Guvernator cu creierul și Inima).

Indicațiile generale ale acupunctelor localizate pe meridianul Du Mai:

- VG1-VG4 – tulburări neurologice; afectarea intestinelor și a organelor urogenitale;
- VG5-VG8 – tulburări neurologice; tulburări gastrointestinale;
- VG9-VG14 – tulburări neurologice; afectarea plămânilor; stări febrile;
- VG15-VG16 – tulburări neurologice și psihice; afectarea în regiunea cefei, nasului, limbii, gâtului;
- VG17-VG24 – tulburări neurologice și psihice; afectarea în regiunea capului, ochilor, nasului, urechii;
- VG25-VG28 – tulburări neurologice și psihice; afectarea în regiunea nasului, gurii și dinților.

VG1 Changqiang

- punct Lo general;
- punct Lo al meridianului extraordinar Du Mai;
- punct de intrare a meridianului extraordinar Du Mai;
- punct de încrucișare a meridianelor VG, R.

Indicații

- epilepsie (VG1 + VG14); patologia măduvei spinării și coloanei vertebrale; prolaps anal; disurie; emotivitate, depresie;
- punct antialgic: vagin; coxis; anus (dureri și senzație de greutate), hemoroizi; cefalee (vertex); lombalgie cu limitarea flexiei;
- punct sindromal: Umiditate-Căldură (afecțiuni anale, prurit, hemoroizi).

Localizarea

regio analis, în centrul între coccis și anus.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lig.anococcygeum • m.levator ani.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.rectales inferiores*, ramuri ale *n.pudendus* (S1-4), *nn.anococcygei* (S4,5), ramuri ale *plexus coccygeus* • *a.rectalis inferior et a.perinealis*, *aa. et vv.pudendae internae*.




Fig.130

Tehnica

se înțeapă oblic (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat spre partea anterioară a coccisului (punctarea profundă este contraindicată din cauza pericolului lezării intestinului gros). Moxibustie 10–30 minute.

Senzația

în jurul orificiului anal.

VG2 Yaoshu

Indicații

- impotență, spermatooree; dismenoree; hemoroizi, enterite, diaree;
- punct antialgic: regiunea lombosacrală (algii reumatice și nevralgii);
- punct sindromal: Umiditate-Căldură (afecțiuni anale); Vânt Intern (epilepsie); Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor.

Localizarea

regio sacralis, la nivelul centrului articulației sacrococciglene, pe linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lig.sacrococcygeum dorsale superficiale sinistrum et dextrum.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.mediales rr.dorsales nn. sacralium (S3, 4) • a. et vv. sacralis medianae.*

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat în sus. Tehnica de sângerare (dureri în regiunea lombară și picioare, sciatică). Moxibustie 10–30 minute.

Senzația

în sus, spre vertebrele lombare.

VG3 Yaoyangguan

- punct "barieră".

Indicații

- atonia intestinului gros și a vezicii urinare, incontinență de urină; impotență, spermatooree;
- punct antialgic: coloana vertebrală și coccis (algii de origine traumatică); nervii lombari și sacrați (nevralgii);
- punct sindromal: Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor.

Localizarea

regio vertebralis, sub apofiza spinoasă L4.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lig.supraspinale • fascia thoracolumbalis • lig.interspinalae.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.lateralis r.dorsalis n.lumbalis IV • r.dorsalis a.lumbalis IV, plexus venosus vertebralis externus (posterior).*

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,5–1 cun), vârful acului va fi orientat în sus. Tehnica de sângerare (dureri în regiunea lombară și picioare, sciatică). Moxibustie 10–20 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

în jos spre coccis.

VG4 Mingmen

Indicații

- prostatită, spermatooree, tulburări sexuale (are o influență importantă asupra funcției suprarenalelor și gonadelor);
- punct antialgic: cap (dureri lancinante, migrenă); regiunea lombară (VG4 + V40); testicule; dureri în coapsă ce iradiază în fesă;
- punct sindromal: invazia Vântului și Frigului Extern; Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor (impotență, sterilitate; depresie); Insuficiența Jing a Rinichilor și Insuficiența Xue a Ficatului (slăbiciune în mușchi și regiunea lombară; impotență, sterilitate); Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor și Inimii (somnolență; corp rece), Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor și Splinei (ptoze viscerale, hemoroizi).




Fig.131

Localizarea

regio vertebralis, sub apofiza spinoasă L2.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lig.supraspinale • fascia thoracolumbalis • lig.interspinale.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r.dorsalis n. thoracici XI • r.dorsalis a.lumbalis II, plexus venosus vertebralis externus (posterior).*

Tehnica

se punctează vertical (0,5-1 cun); se înțeapă sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în sus. Moxibustie 20-30 minute.

Senzația

în jos, spre coccis (punctare superficială) sau în sus, spre ombilic (punctare profundă).

VG5 Xuanshu

Indicații

- enterite acute și cronice;
- punct antialgic: stomac; nervul femural (nevralgie), lumbago.

Localizarea

regio vertebralis, sub apofiza spinoasă L1.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lig.supraspinale • fascia thoracolumbalis • lig.interspinale.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis r.dorsalis n. thoracici X • r.dorsalis a. lumbalis I, plexus venosus vertebralis externus (posterior).*

Tehnica

se înțeapă vertical sau sub un unghi ascuțit (0,5–1 cun), vârful acului va fi orientat în sus. Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

în jos (2–3 vertebre).

VG6 Jizhong

Indicații

- nefroptoză; prolaps rectal, hemoroizi; epilepsie;
- punct antialgic: rinichi (dureri în ectopia rinichilor);
- punct sindromal: Insuficiența Yang-Qi a Splinei (ptoze viscerale; diaree, inapetență; edeme); stagnarea Qi a Splinei (indigestie, senzație de distensie și durere în abdomen).

Localizarea

regio vertebralis, sub apofiza spinoasă ThXI.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lig.supraspinale • tendo m.latissimus dorsi • lig.interspinale.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus lateralis r.dorsalis n. thoracici IX • r.spinalis a. intercostalis posterior XI, plexus venosus vertebralis externus (posterior).*

Tehnica

se înțeapă vertical sau sub un unghi ascuțit (0,5–1 cun), vârful acului va fi orientat în sus. În operele antice moxibustia acestui punct este interzisă.

Senzația

în sus și în jos.

VG7 Zhongshu

Indicații

- esofagospasm; hipertrofia prostatei;

- punct antialgic: ficat (colică), stomac; lombalgie.

Localizarea

regio vertebralis, sub apofiza spinoasă ThX.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lig.supraspinale • tendo m.latissimus dorsi • lig.interspinale.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r. dorsalis n.thoracici VIII • r.spinalis a.intercostalis posterior X, plexus venosus vertebralis externus (posterior).*

Tehnica

se înțeapă vertical sau sub un unghi ascuțit (0,5–1 cun), vârful acului va fi orientat în sus. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în sus și în jos.

VG8 Jinsuo

Indicații

- spasme musculare în partea de sus a trunchiului; oligurie; isterie;
- punct antialgic: inimă; stomac (spasme); lombalgie;
- punct sindromal: stagnarea Qi a Ficatului (indigestie, distensie abdominală; depresie, frustrație); hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului (iritabilitate, cefalee); Vânt Intern al Ficatului (tremor, epilepsie); Umiditate-Căldură în Ficat și Vezicula Biliară (colecistită, hepatită).

Localizarea:

regio vertebralis, sub apofiza spinoasă ThIX.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lig.supraspinale • tendo m.trapezius et m.latissimus dorsi • lig.interspinale.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r. dorsalis n.thoracici VIII • r.spinalis a.intercostalis posterior IX, plexus venosus vertebralis externus (posterior).*

Tehnica

se înțeapă vertical sau sub un unghi ascuțit (0,5–1 cun), vârful acului va fi orientat în sus. Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în sus și în jos.

VG9 Zhiyang

- punct de inserție al meridianului tendino-muscular E.

Indicații

- astenie; colecistită (VG9 + VB34 + V19), icter; pleurită, dispnee,

tuse; sughiț la copii (VG9 + MC6); poliartrită cronică reumatică; depresie, anorexie;

- punct antialgic: nervii intercostali; inimă (precordialgii); coloana vertebrală, lombalgie;
- punct sindromal: stagnarea Qi a Ficatului; stagnarea Qi a Focarului Mediu; hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului și Vânt Intern al Ficatului; Umiditate-Căldură în Ficat și Vezicula Biliară.

Localizarea

regio vertebralis, sub apofiza spinoasă ThVII.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lig.supraspinale • tendo m.trapezius • lig. interspinale.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r. dorsalis n.thoracici VII • r.spinalis a.intercostalis posterior VII, plexus venosus vertebralis externus (posterior).*

Tehnica

se punctează vertical sau sub un unghi ascuțit (0,5–1 cun), vârful acului va fi orientat în sus. Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

în sus și în jos.

VG10 Lingtai

Indicații

- dispnee, astm psihogen; furunculoză; profilaxia gripei;
- punct antialgic: stomac; lombalgie.

Localizarea

regio vertebralis, sub apofiza spinoasă ThVI.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lig.supraspinale • tendo m.trapezius • lig. interspinale.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r.dorsalis n.thoracici VI • r.spinalis a.intercostalis posterior VI, plexus venosus vertebralis externus (posterior).*

Tehnica

se punctează vertical sau sub un unghi ascuțit (0,5–1 cun), vârful acului va fi orientat în sus. Tehnica de sângerare (dureri în coloana vertebrală; furunculoză; afecțiuni ale organelor respiratorii; gastralgii). În operele antice punctarea acestui punct este interzisă. Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

în sus și în jos.

VG11 Shendao

- punct de inserție al meridianului tendino-muscular RP.

Indicații

- astm bronșic, tuse; icter; afecțiunile inimii; convulsii; diminuarea memoriei, anxietate;
- punct antialgic: nervii intercostali;
- punct sindromal: Insuficiența Yang-Qi a Inimii (apatie, depresie; membre reci); stagnarea Qi a Inimii (insomnie; senzație de opresiune în piept, palpitații); Focul Inimii (isterie, agitație, insomnie); hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului (cefalee, iritabilitate, agitație, confuzie mentală).

Localizarea

regio vertebralis, sub apofiza spinoasă ThV.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lig.supraspinale • tendo m.trapezius • lig.interspinale.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r.dorsalis n.thoracici V • r.spinalis a.intercostalis posterior V, plexus venosus vertebralis externus (posterior).*

Tehnica

se punctează vertical sau sub un unghi ascuțit (0,5–1 cun), vârful acului va fi orientat în sus (atenție – zona segmentară a cordului; în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în sus și în jos; în timpul aplicării moxibustiei senzația iradiază spre regiunea cordului.

VG12 Shenzhu

Indicații

- afecțiuni ale sistemului nervos central; glosită; comportament pervers, agresivitate;
- punct antialgic: cap (cefalee cu grețuri, vărsături și insomnie); dinți (dureri cu mobilitatea dinților); dureri provocate de tuse;
- punct sindromal: Insuficiență Qi și Yang-Qi a Plămânilor (tuse, predispunere la răceală, bronșite); stagnarea Qi a Plămânilor (bronșită cronică, dispnee, senzație de opresiune în piept); Vânt Intern (epilepsie, spasme, tremor).

Localizarea

regio vertebralis, sub apofiza spinoasă ThIII.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lig.supraspinale • tendo mm.trapezius et rhomboideus • lig.interspinale.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r.dorsalis n.thoracici III • r.spinalis a. intercostalis posterior III, plexus venosus vertebralis externus (posterior).*

Tehnica

se punctează vertical sau sub un unghi ascuțit (0,5–1 cun), vârful acului va fi orientat în sus. Moxibustie 20–50 minute.

Senzația

în sus și în jos.

VG13 Taodao

- punct de centro-reunire generală (reunirea meridianelor Yang de la membrele inferioare);
- punct de încrucișare a meridianelor VG, V.

Indicații

- epilepsie; afonie; polachiurie nocturnă; tulburarea metabolismului de calciu; hipertermie; insomnie;
- punct antialgic: cap (cefalee cu senzație de greutate și vertij); regiunea cervico-occipitală și spate;
- punct sindromal: Vânt-Căldură și Căldură Internă.

Localizarea

regio vertebralis, sub apofiza spinoasă Th1.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lig.supraspinale • tendo mm.trapezius et rhomboideus • lig.interspinale.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus medialis r.dorsalis n.thoracici I • r.dorsalis a. intercostalis posterior I, plexus venosus vertebralis externus (posterior).*

Tehnica

se punctează vertical sau sub un unghi ascuțit (0,5–1 cun), vârful acului va fi orientat în sus; se punctează lateral (1–1,5 cun), spre stânga sau dreapta. Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

în jos; pentru acele introduse lateral senzația va iradia în sus, spre regiunea cervicală.

VG14 Dazhui

- punct de încrucișare a meridianelor VG, V, VB, E, GI, TR, IG.

Indicații

- epilepsie; anemie; polachiurie nocturnă; eczemă; hipertermie; astenie psihică, schizofrenie;
- punct antialgic: regiunea cervico-occipitală, coloana vertebrală, membrele superioare și inferioare; prurit vulvar;

- punct sindromal: Insuficiența Yang-Qi a Inimii (VG14 + VG11), Insuficiența Yang-Qi a Inimii și Rinichilor (VG14 + VG4); Insuficiența Yang-Qi a Plămânilor (VG14 + VG12); Vânt Extern (răceală, rinită, aversiune la rece, membre reci); Căldură Internă (VG14 + GI4 + GI11); Vânt Intern (accident cerebrovascular); stagnarea Qi a Plămânilor (bronșită, astm – VG14 + VG12 + VC17).

Localizarea

regio vertebralis, între apofizele spinoase C7 și Th1.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lig.supraspinale • tendo mm.trapezius et rhomboideus • lig.interspinale.

Inervația • Vascularizația

pielea – r.medialis r.dorsalis n.cervicalis VIII • a. et vv.transversae colli, plexus venosus vertebralis externus (posterior).

Tehnica

se punctează perpendicular (0,5–1 cun); se punctează lateral (1–1,5 cun); se punctează, orientând vârful acului în sus (sub un unghi de 40 grade) de-a lungul marginii superioare a vertebrei toracice I, ajungând până la *dura mater spinale*s (indicat în tetanus); se înțepă spre punctul V11 Dazhu (torticolis; dureri în spate). Tehnica de sângerare (febră; vomă; amețeli, cefalee, șoc hipertermic; afecțiuni ale organelor respiratorii). Moxibustie 15–30 minute.

Senzația

În sus și în jos; pentru acele introduse lateral senzația va iradia în sus, spre regiunea cervicală; spre cutia toracică (punctare profundă).

VG15 Yamen

- punct de încrucișare a meridianelor VG, V, Yang Wei Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Wei Mai.

Indicații

- afazie (VG15 + C5); epilepsie; crampe, ticuri, tremurături; schizofrenie;
- punct antialgic: regiunea cervicală (dureri ce iradiază în cap); dureri difuze în tot corpul;
- punct sindromal: Vânt Extern (în special în regiunea cefalică); Vânt Intern (cefalee, confuzie mentală; convulsii; hemiplegie, tulburări ale vorbirii).

Localizarea

regio cervicalis, pe ceafă, la 0,5 cun deasupra liniei de inserție a părului, între apofizele spinoase C1 și CII.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lig.nuchae.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis major (C2)* • *a. et vv.occipitales, plexus venosus vertebralis externus (posterior)*.

Tehnica

se punctează perpendicular (0,5–1 cun); se punctează oblic, vârful acului va fi orientat spre laringe (poziția capului puțin înclinat înainte). Inserția profundă a acului poate provoca lezarea bulbului rahidian. Punctarea este contraindicată la bolnavii cu tulburări ale procesului de coagulare a sângelui, deformări ale vertebrelor cervicale sau în inflamarea regiunii localizării punctului. În operele antice punctarea acestui punct este interzisă. Conform cercetărilor (Li Dingming et.al., 1992), adâncimea înțepării acestui punct (centimetri) se poate calcula după formula $2,7185 + 0,07X$ (unde X este circumferința gâtului la pacient). Moxibustie 3–5 minute (după autorii vechi, moxibustia acestui punct poate provoca afonie).

Senzația

În jos, de-a lungul gâtului, spre faringe.

VG16 Fengfu

- punct "fereastra cerului";
- punct de încrucișare a meridianelor VG, V, Yang Wei Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yang Wei Mai.

Indicații

- gripă, angină; torticolis; surditate;
- punct antialgic: suprafața posterioară a gâtului (mai sus de nivelul celei de-a VII vertebre cervicale); dinți; cefalee (vertex, occipit); lombalgie;
- punct sindromai: Vânt Extern (în special în regiunea cefalică); Vânt Intern (epilepsie, hemiplegie, tulburări de vorbire, tremurături ale mâinilor).

Localizarea

regio occipitalis, la 1 cun deasupra liniei de inserție a părului, în fosa de sub protuberanța occipitală externă.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *lig.nuchae* • *membrana atlantooccipitalis posterior*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis major (C2)* • *a. et vv.occipitales, plexus venosus vertebralis externus (posterior)*.

Tehnica

se punctează perpendicular (0,5–1 cun), pacientul înclinând capul anterior (atenție – bulbul rahidian). Conform cercetărilor (Li Dingming et.al., 1992), adâncimea înțepării acestui punct (centimetri) se poate calcula după formula $2,6475 + 0,0778X$ (unde X

este circumferința gâtului la pacient). Moxibustie 3–5 minute (în operele antice moxibustia acestui punct este interzisă).

Senzația

spre ambele regiuni temporale și în jos de-a lungul gâtului, spre faringe.

VG17 Naohu

- punct de încrucișare a meridianelor VG, V.

Indicații

- vertij; iritarea meningelor; tulburarea funcției hipofizei; punctul reprezintă "marea măduvei" (controlează aportul energetic și transformările energetice în organism, controlează eliminările prin "orificiile inferioare": urinar, digestiv, precum și prin piele); insomnie;
- punct antialgic: cap (cefalee cu senzație de greutate); ochi; articulații, algii reumatice cu agravări nocturne; prurit vulvar;
- punct sindromal: Vânt Intern (epilepsie, hemiplegie).

Localizarea

regio occipitalis, la marginea superioară a protuberanței occipitale, la 1,5 cun deasupra VG16 Fengfu.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • venter occipitalis m.occipitofrontalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis major (C2) • a. et vv.occipitales.*

Tehnica

se punctează sub un unghi ascuțit, aproape orizontal (0,5–0,8 cun), vârful acului va fi orientat în jos (în operele antice punctarea acestui punct este strict interzisă). Moxibustie 2–3 minute.

Senzația

locală.

VG18 Qiangjian

Indicații

- astenie; afectarea vertebrelor cervicale; isterie, insomnie, schizofrenie;
- punct antialgic: occipit.

Localizarea

regio occipitalis, la 1,5 cun deasupra VG17 Naohu sau la mijlocul distanței dintre VG16 Fengfu și VG20 Baihui.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • galea aponeurotica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis major (C2) • a. et vv.occipitales.*




Fig. 132




Fig. 133

Tehnica

se punctează aproape orizontal, subcutanat (0,5-0,8 cun). Moxibustie 5-15 minute.

Senzația

locală și în jos.

VG19 Houding

- punct de centro-reunire generală (reunirea meridianelor Yang de la membrele superioare).

Indicații

- amnezie, epuizare, emotivitate, insomnie, melancolie, agitație, frică în întuneric;
- punct antialgic: articulații; facies (nevralgii); gât (dureri și tumefier); regiunea cervicală (algii și spasm muscular); cap (occipit, migrenă).

Localizarea

regio parietalis, la 1,5 cun anterior de VG18 Qiangjian, la 3 cun deasupra VG17 Naohu.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • galea aponeurotica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis major (C2) • a. et vv.occipitales.*

Tehnica

se punctează aproape orizontal, subcutanat (0,5-0,8 cun). Moxibustie 5-20 minute.

Senzația

locală și în jos.

VG20 Baihui

- punct de inserție al meridianului tendino-muscular VB;
- punct de încrucișare a meridianelor VG, V.

Indicații

- afecțiunile sistemului nervos central; hemoroizi, prolaps rectal (VG20 + VG1 + V57); retard mental, schizofrenie;
- punct antialgic: cap (cefalee posttraumatică, cefalee cu senzație de greutate); sciatică (agravări noaptea);
- punct sindromal: Vânt al Ficatului (cefalee, hipertensiune arterială, tinitus); Insuficiența Qi și Xue (astenie, labilitate emoțională); Umiditate-Flegmă în regiunea cefalică (cefalee cu senzație de greutate, somnolență, depresie); Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor (depresie psihică; impotență; tinitus); Vânt Intern; la stimularea punctului se evidențiază efectul pronunțat de ascendență Yang-Qi (indicat în ptoze viscerale).

Localizarea

regio parietalis, la 5 cun de la linia anterioară de inserție a părului, la jumătatea liniei ce unește vârfurile urechilor.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • galea aponeurotica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.occipitalis major (C2) • a. et vv.occipitales, a. et vv.temporales superficiales.*

Tehnica

se punctează aproape orizontal (0,5-0,8 cun), vârful acului fiind orientat posterior; se punctează aproape orizontal, subcutanat, vârful acului va fi orientat consecutiv, fără a-l retrage din piele, anterior, posterior, spre dreapta, spre stânga; se punctează în direcția punctului VB7 Qubin (în hemiplegii). Moxibustie 5–20 minute (moxibustia este contraindicată la pacienții cu hipertensiune arterială și la alternarea depresiei și maniei).

Senzația

locală sau în patru direcții (anterior, posterior, lateral).

VG21 Qiandīng

Indicații

- convulsii;
- punct antialgic: facies și cap (nevralgii).

Localizarea

regio parietalis, la 1,5 cun anterior de punctul VG20 Baihui.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • galea aponeurotica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.supraorbitalis*, ramură a *n.frontalis* de la *n.opthalmicus (n.trigeminus)*, ramuri ale *n.occipitalis major (C2) • a. et vv.occipitales, a. et vv.temporales superficiales.*

Tehnica

se punctează oblic (0,5–0,8 cun), în direcția punctului VG20

Baihui. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

locală și în jos.

VG22 Xinhui

Indicații

convulsii; surditate; epistaxis, anosmie, obstrucție nazală; dereglările circulației sangvine în regiunea capului.

Localizarea

regio frontalis, la 3 cun anterior de VG20 Baihui.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • galea aponeurotica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.supraorbitalis*, ramură a *n.frontalis* de la *n.opthalmicus* (*n.trigeminus*) • *a. et vv.temporales superficiales*, *a. et vv.supra-orbitales*.

Tehnica

se punctează subcutanat, aproape orizontal (0,5–0,8 cun) în direcția punctului VG21 Qianding (se va puncta cu precauție la copii; în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 3–5 minute.

Senzația

în jos, spre regiunea frontală.

VG23 Shangxing

Indicații

- obstrucție nazală (VG23 + GI20), epistaxis;
- punct antialgic: cap (cefalee difuză cu senzație de căldură); nas (durere cu eliminări purulente); nervul oftalmic (nevralgii).

Localizarea

regio frontalis, la 1 cun deasupra liniei anterioare de inserție a părului, la 4 cun anterior de VG20 Baihui.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • galea aponeurotica.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.supraorbitalis*, ramură a *n.frontalis* de la *n.opthalmicus* (*n.trigeminus*); mușchii – *n.facialis* • *a. et vv.temporales superficiales*, *a. et vv.supraorbitales*.

Tehnica

se punctează subcutanat oblic, aproape orizontal – 0,5–0,8 cun (atenție – punctarea poate provoca colaps; în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jos, spre regiunea frontală.

VG24 Shenting

- punct de încrucișare a meridianelor VG, V, E.

Indicații

- epilepsie; fobii, insomnie, melancolie, slăbirea memoriei, nervozitate, trac;
- punct antialgic: cap (migrenă, cefalee frontală cu fotofobie); nervul oftalmic (nevralgie).

Localizarea

regio frontalis, la 0,5 cun deasupra liniei anterioare de inserție a părului, pe linia mediană a capului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • venter frontalis m. occipitofrontalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.supraorbitalis*, ramură a *n.frontalis* de la *n.opthalmicus* (*n.trigeminus*); mușchii – *n.facialis • a. et vv.supraorbitales, r. frontalis a.temporalis superficialis*.

Tehnica

se punctează subcutanat oblic (0,5–0,8 cun), spre punctul VG23 Shangxing (rinită; cefalee, vertij); se punctează lateral, spre regiunea temporală. Punctarea acestui punct în orele de seară poate provoca insomnie. Moxibustie 5–10 minute.

Senzația

în jos, spre regiunea frontală sau spre regiunea temporală.

VG25 Suliao

Indicații

- rinoree, epistaxis, abces nazal; colaps; lipotimie; efect de trezire în stare de ebrietate; ciclotimie;
- punct antialgic: nas și sinusurile paranazale (dureri profunde).

Localizarea

regio nasalis, la vârful nasului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • cartilagine alares majores nasi externi • pars membranacea septi nasi.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.nasales n.ethmoidalis anterior* de la *n.nasociliaris* (ramuri ale *n.opthalmicus n.trigeminus*) • *a.dorsalis nasi, v. nasofrontalis*.

Tehnica

se înțeapă oblic (0,3–0,5 cun), vârful acului va fi orientat în sus sau în jos (atenție – e posibilă schimbarea bruscă a tonusului vascular). În operele antice punctarea și moxibustia acestui punct este interzisă.

Senzația

spre interiorul nasului (cu efect de lăcrimare).

VG26 Renzhong

- punct de încrucișare a meridianelor VG, E, GI.

Indicații

- paralizie facială, trismus; anosmie; edem general (VG26 + VC9); polidipsie; prolaps anal (VG26 + VG1 + V58); colaps, șoc, lipotimie; sughiț; torticolis; epilepsie, afazie (VG26 + R1 + C5);
- punct antialgic: cap (cefalee în meningită); coloana vertebrală, suprafața dorsală a cutiei toracice (nivelul C7–Th1), lombalgie (VG26 + V40).

Localizarea

regio oralis, la unirea 1/3 superioare cu 2/3 inferioare pe șanțul nazolabial.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.orbicularis oris.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.labiales superiores n.infraorbitalis*, ramură a *n.maxillaris* de la *n.trigeminus*; mușchii – *n.facialis • a. et vv.labiales superiores*.

Tehnica

se înțeapă sub unghi ascuțit (0,3–0,5 cun), vârful acului va fi orientat în sus; se înțeapă spre punctul E4 Dicang (paralizie facială). Moxibustie 5–15 minute (moxibustia este interzisă, deoarece, conform autorilor antici, poate surveni moartea pacientului).

Senzația

locală (cu efect de lăcrimare și hipersalivație).

VG27 Duiduan

- punct de ieșire a meridianului extraordinar Du Mai.

Indicații

- epistaxis, obstrucții nazale; pierderea cunoștinței;
- punct antialgic: dinți.

Localizarea

regio oralis, pe tuberculul median al buzei superioare, în locul de trecere a pielii în mucoasă.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.orbicularis oris.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.labiales superiores n.infraorbitalis*, ramură a *n.maxillaris* de la *n.trigeminus*; mușchii – *n.facialis • a. et vv.labiales superiores*.

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,2–0,3 cun), vârful acului va fi orientat în sus. Moxibustie 3–5 minute.

Senzația

în interiorul buzei superioare.

VG28 Yinjiao

Indicații

- gingivită; hemoroizi;
- punct antialgic: rădăcina nasului, nas și sinusurile paranazale (dureri profunde, furuncul nazal); cavitatea bucală.

Localizarea

cavitas oris, pe frenul labial, între buză și gingie.

Proiecția

gingiva • frenulum labii superioris.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.labiales superiores n.infraorbitalis* de la *n.trigeminus • a. et vv.labiales superiores.*

Tehnica

se înțeapă perpendicular pe frenul labial (0,2–0,3 cun).

Senzația

locală.

II.1.2. Meridianul extraordinar Ren Mai

Relațiile energetice:

1. Meridianul curios Ren Mai posedă 24 puncte proprii de acupunctură (fig.134–136).
2. Punctul de intrare este VC1 Huiyin, punctul de ieșire – VC24 Chengjiang.
3. Conexiunea punctului cheie (P7 Lieque) cu meridianul curios Ren Mai se realizează prin legătura energetică P7 Lieque-traseul meridianului Plămân până la punctul P1 Zhongfu-VC17 Shanzhong-VC12 Zhongwan-VC9 Shuifen-VC1 Huiyin.
4. Echilibrul energetic unipolar (Yin-Yin) este asigurat prin cuplarea Ren Mai-Yin Qiao Mai.
5. Echilibrul energetic bipolar (Yin-Yang) este asigurat prin cuplarea Ren Mai-Du Mai.
6. Meridianul Ren Mai împreună cu meridianul extraordinar Yin Wei Mai și cu meridianele principale Plămân, Pericard, Inimă controlează suprafețele antero-superioare ale corpului omenesc.

Funcțiile energetice:

1. Meridianul Ren Mai este de natură Yin cu tendința de Yang;
2. Meridianul Ren Mai controlează toate funcțiile Yin ale organismu-




Fig.134. Punctele meridianului Vas de Concepție (VC).

lui ("marea meridianelor Yin").

3. Meridianul Ren Mai controlează actul de concepție și dezvoltare a fătului.

Acțiunea sindromal-energetică:

- reglarea Jing a Rinichilor – VC4 + VG4 + R6;
- fortificarea Yuan-Qi – VC4 + VC6 + VG4; pentru fortificarea Yuan-Qi a organelor afectate este indicată formula VC4 + punctele Yuan ale organului corespunzător;
- fortificarea și armonizarea Yin-Yang – VC4 + VG4;
- dinamizarea Qi (stagnarea în Focarul Superior – VC17 + VC6 + VC22; Focarul Mediu – VC6 + VC12 + VC13; Focarul Inferior – VC3 + VC6);
- ascendența Qi (prăbușirea Qi-ului a Focarului Inferior – VC12 +

- VC6 + VG20 + E36);
- descendența Qi (pervertirea fluxului Qi: Plămâni – VC4 + VC17 + VC22 + MC6; Stomac – VC4 + VC13 + VC10 + E36 + MC6; Inimă – VC4 + VC14 – VC24);
 - diminuarea Umidității – VC9 + VC12 – VC22;
 - încălzirea Frigului Intern – VC4 + VC6 + VG4 + VG14;
 - reglarea metabolismului hidric – VC4 + VC6 + VC9 + VC12 + E28 + R6;
 - reglarea uterului (punctele VC3 Zhongji, VC4 Guanyuan și VC6 Qihai sunt punctele principale ale formulelor terapeutice în funcție de sindromul depistat);
 - armonizarea vorbirii articulate – VC23 + VG15 + C5;
 - armonizarea proceselor psihice (punctele Vasului de Concepție intră în componența "centrelor energetice", care la un om sănătos se află în echilibru, pe când în diferite tulburări psihice apare dezechilibrul atât la nivelul unui "centru energetic", cât și la diferite nivele (tab.1); o metodă efektivă de reechilibrare energetică în tulburările psihice este asocierea punctului VC4 Guanyuan cu punctele Yuan ale organelor afectate).

Tabelul 1.

Punctele de acupunctură ale "centrelor energetice" și funcția lor

<i>Centrul energetic</i>	<i>Punctele de acupunctură</i>	<i>Funcția</i>
Vertexul	VG20	Viața spirituală, echilibrul spiritului și corpului fizic
Dan Tian (superior)	Yintang, VG18	Echilibrul intuiției și analizei
Gâtul	VC22, VC23, VG14, VG15, VG16	Creativitatea
Inima	VC17, VG11	Dragostea, compasiunea
Plexul solar	VC14, VC15, VG9	Sensibilitatea emoțională
Dan Tian (mediu)	VC12, VG6	Suportul (alimentarea) fizic, emoțional și mental
Dan Tian (inferior)	VC4, VC6, VG4	Păstrarea și difuzarea Energiei, forța și voința
Centrul reproductiv	VC2, VC3, V31, V32	Viața sexuală, reproducerea
Perineul	VC1, VG1	Supraviețuirea, conexiunea cu Energia pământului

Indicațiile generale ale acupunctelor localizate pe meridianul Ren Mai:

- VC1–VC8 – tulburări urogenitale; afecțiuni intestinale;
- VC9–VC15 – tulburări gastrointestinale; tulburări musculo-scheletice (hernie inghinală, lumbago etc.);
- VC16–VC12 – tulburări cardiorespiratorii; afectarea esofagului;
- VC22–VC23 – tulburări oro-laringo-faringiene;
- VC24 – afectarea în regiunea gurii și dinților.

VC1 Huiyin

- punct Lo general;
- punct Lo al meridianului extraordinar Ren Mai;
- punct de intrare a meridianului extraordinar Ren Mai;
- punct de încrucișare a meridianelor VC, VG, Chong Mai.

Indicații

- retenție urinară; prolaps uterin, afecțiunile vaginului; hemoroizi;
- punct antialgic: vagin; penis; anus (dureri și prurit);
- punct sindromal: Umiditate-Căldură a organelor genitale externe (prurit, durere; orhită); Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor (enurezis).

Localizarea

regio perinealis, la jumătatea distanței dintre marginea anterioară a anusului și originea scrotului (la bărbați) sau comisura posterioară a vulvei (la femei).

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia perinei superficialis • mm.transversi perinei superficialis et profundus.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.perineales n.pudendi (S2,3,4)* de la *plexus sacralis*; mușchii – *n.pudendus • aa. et vv.pudendae internae.*

Tehnica

se punctează vertical – 0,5–1 cm (în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

spre organele genitale.

VC2 Qugu

- punct de reunire periferică a meridianelor distincte F/VB;
- punct de reunire a meridianelor tendino-musculare (meridianele Yin ale membrilor inferioare);
- punct de încrucișare a meridianelor VC, F.

Indicații

- patologia organelor bazinului mic și a căilor urinare; incontinență urinară, enurezis (VC2 + E29 + RP6); spermatooree;
- punct antialgic: uretră, organele genitale externe; menstr;
- punct sindromal: Umiditate-Căldură a Focarului Inferior (disurie, prostatită; hemoroizi); Insuficiența Yang și Frig al Focarului Inferior (sterilitate, amenoree; impotență); punct cu acțiune de ascendență Qi (prolaps uterin; metroragie).

Localizarea

regio pubica, pe marginea superioară a simfizei pubiene, la intersecția cu linia mediană a abdomenului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • linia alba • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.iliohypogastricus* (Th12, L1) de la *plexus lumbalis* • *a. et vv.epigastricae superficiales*, *a. et vv.epigastricae inferiores*, *aa. et vv.pudendae externae*, *a.obturatoria*, *v.obturatoria*.

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun). Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

spre organele genitale și perineu.

VC3 Zhongji

- punct de alarmă al meridianului V;
- punct de reunire a meridianelor tendino-musculare (meridianele Yin ale membrilor inferioare);
- punct de încrucișare a meridianelor VC, RP, F, R.

Indicații

- oligurie, cistită, enurezis (VC3 + RP6 + VG20); sterilitate (VC3 + E28 + E29 + RP6);
- punct antialgic: glandele mamare; vezica urinară; organele genitale masculine, prostată (VC3 + V54 + VG1 + R3); uter;
- punct sindromal: Umiditate-Căldură a Focarului Inferior (menstre neregulate; disurie); stagnarea Qi a Focarului Inferior (amenoree; prostatită, retenție urinară); Insuficiența Qi și Yang-Qi a Rinichilor și Vezicii (impotență; edeme); Căldura Xue (menoragie).

Localizarea

regio pubica, pe linia mediană a abdomenului, la 4 cun sub ombilic.

Proiecția

cutis • *tela subcutanea* • *linia alba* • *fascia transversalis*.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis)* *n. subcostalis* (Th12) • *a. et vv.epigastricae superficiales*, *a. et vv.epigastricae inferiores*.

Tehnica

se punctează vertical (0,5–1 cun). Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

în jos spre uretră.

VC4 Guanyuan

- punct de alarmă al meridianului IG;
- punct "barieră";
- punct de reunire a meridianelor tendino-musculare (meridianele Yin ale membrilor inferioare);
- punct de încrucișare a meridianelor VC, RP, F, R.

Indicații

- astenie; afectarea organelor bazinului mic la femei, sterilitate

(VC4 + RP6 + RP8 + E28), patologia colului uterin; diaree (atonie a intestinului subțire);

- punct antialgic: cap (cefalee cu vertij); intestine (dureri spasmodice); vezica urinară (cistalgie ce iradiază în regiunea ombilicală, cistalgie cu hematurie); organele bazinului mic la femei, vulvă (prurit), ciclul menstrual (algomenoree);
- punct sindromal: Insuficiența Esenței Rinichilor (impotență); Insuficiența Qi a Rinichilor (enurezis); Insuficiența Qi a Rinichilor și Plămânilor (astm, tuse, respirație scurtă; epuizare); Insuficiența Qi a Rinichilor și Inimii (epuizare; palpitații; labilitate emoțională, anxietate); Insuficiența Qi a Rinichilor și Splinei (inapetență, indigestie; astenie); Insuficiența Qi a Rinichilor și hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului (cefalee, migrenă, fotofobie; dureri lombare; astenie; iritabilitate); Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor în asocieră cu Frig Intern (depresie; membre reci); punct cu efect de ascendență Qi a Splinei (scaune moi; hemoroizi; ptoză gastrică); Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor; Insuficiența Qi și Xue; perversiunea fluxului Qi a Rinichilor (astm; retenție urinară).

Localizarea

regio pubica, pe linia mediană a abdomenului, la 3 cun sub ombilic.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • linia alba • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n. subcostalis (Th12) • a. et vv.epigastricae superficiales, a. et vv.epigastricae inferiores.*

Tehnica

se punctează vertical (0,8–1,2 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, până la punctul VC3 Zhongji, provocând iradieri în organele urogenitale (indicat în algii ale organelor genitale; impotență). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

În jos spre uretră.

VC5 Shimen

- punct de alarmă al meridianului TR.

Indicații

- afecțiuni cronice ale intestinelor; patologia organelor bazinului mic; punct cu efect de reglare a lichidului în Focarul Inferior (indicat în edeme și retenție urinară); leucoree; frigiditate, nimfomanie.
- punct antialgic: abdomenul inferior, uter (dureri spasmodice).

Localizarea

regio umbilicalis, pe linia mediană a abdomenului, la 2 cun sub ombilic.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • linia alba • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n. intercostalis XI • a. et vv.epigastricae superficiales, a. et vv.epigastricae inferiores.*

Tehnica

se punctează vertical (0,8–1,2 cun). Moxibustie 20–30 minute. După autorii chinezi, punctarea și moxibustia acestui punct poate provoca sterilitatea la femei.

Senzația

în jos, spre uretră.

VC6 Qihai

Indicații

- astenie; dispnee; afectarea organelor bazinului mic (VC6 + RP6); insomnie cu emotivitate, anxietate;
- punct antialgic: cap (cefalee insuportabilă cu vertij); stomac (gastralgie cu aerofagie); rinichi; inimă (precordialgii); organele bazinului mic la bărbați; organele genitale externe la femei; lombalgie;
- punct sindromal: stagnarea Qi și Xue în Focarul Inferior (dismenoree, menstrre neregulate, durere cu senzație de distensie – VC6 + RP6; VC6 + F14 + MC6); stagnarea Qi a Ficatului; dezarmonia Ficat-Intestine (colită, constipație; depresie); stagnarea Umidității-Căldurii în Focarul Inferior (cistită, disurie); stagnarea Umidității-Frig în Focarul Inferior (edeme; orhită); stagnarea Qi în regiunea cutiei toracice (astm, senzație de distensie și durere; palpitații); stagnarea Qi și Insuficiența Qi a Rinichilor și Inimii (depresie, epuizare); Insuficiența Qi și Yang-Qi a Rinichilor; punct cu efect pronunțat de ascendență Qi a Splinei.

Localizarea

regio umbilicalis, pe linia mediană a abdomenului, la 1,5 cun sub ombilic.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • linia alba • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n. intercostalis XI • a. et vv.epigastricae superficiales, a. et vv.epigastricae inferiores.*

Tehnica

se punctează vertical (0,8–1,2 cun); se punctează sub un unghi ascuțit, vârful acului va fi orientat în jos. Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

în jos, spre uretră sau în sus, spre ombilic.

VC7 Yinjiao

- punct de alarmă al meridianului TR (pentru Focarul Inferior, fun-

- ctiile urogenitale);
- punct de încrucișare a meridianelor VC, Chong Mai.

Indicații

- orhită, uretrită, retenție urinară; punct cu efect de reglare a uterului (amenoree, sterilitate); delir, insomnie, coșmaruri;
- punct antialgic: abdomenul inferior; organele genitale, vagin (dureri cu senzația de "îngustare" a vaginului), vulvă (prurit); rinichi (colică, cu iradierea durerii în organele genitale);
- punct sindromal: Insuficiența Yin-Qi și Xue (menopauză).

Localizarea

regio umbilicalis, pe linia mediană a abdomenului, la 1 cun sub ombilic.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • linia alba • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis X • a. et vv.epigastricae superficiales, a. et vv.epigastricae inferiores.*

Tehnica

se punctează vertical (0,8–1,2 cun). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

în jos, spre uretră sau în sus spre ombilic.

VC8 Shenque

- punct de inserție al meridianelor tendino-musculare RP și C.

Indicații

- comă, șoc și colaps (moxibustie); enterite provocate de frig;
- punct antialgic: stomac (gastralgie cu gastroptoză);
- punct sindromal: Insuficiența Yang-Qi și sindromul Frig (moxibustie); Insuficiența Yang-Qi a Splinei (diaree cronică).

Localizarea

regio umbilicalis, în mijlocul ombilicului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • annulus umbilicalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n. intercostalis X • a. et vv.epigastricae inferiores, a. et vv.epigastricae superiores.*

Tehnica

punctarea acestui punct este interzisă. Moxibustia se efectuează printr-un strat de sare (20–30 minute).

Senzația

în interiorul abdomenului, spre stomac și în jos.

VC9 Shuifen

Indicații

- tulburări ale metabolismului hidrosalin (edeme – VC9 + VC6 + V22 + E36 + RP9); crampe și spasme în diferite regiuni; atonia stomacului, anorexie;
- punct antialgic: regiunea paraombilicală; vertebrele lombare; intestine (colică), rect;
- punct sindromal: Umiditate a Focarului Inferior (disurie).

Localizarea

regio umbilicalis, pe linia mediană a abdomenului, la 1 cun deasupra ombilicului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • linia alba • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n. intercostalis X • a. et vv.epigastricae inferiores, a. et vv.epigastricae superiores.*

Tehnica

se înțeapă vertical – 0,8–1,2 cun (în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 10–20 minute.

Senzația

în jos, spre uretră.

VC10 Xiawan

- punct de încrucișare a meridianelor VC, RP.

Indicații

- punct important cu influență asupra părții inferioare a stomacului (pilorus), atonia stomacului, anorexie, punct efectiv în retenția hranei în stomac (durere și distensie în epigastru, grețuri, regurgitație, inapetență);
- punct antialgic: gastralgie cu balonarea abdomenului;
- punct sindromal: Umiditate-Căldură în Intestine (dizenterie, diaree); Insuficiența Qi a Splinei; perversiunea fluxului Qi a Stomacului.

Localizarea

regio umbilicalis, pe linia mediană a abdomenului, la 2 cun deasupra ombilicului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • linia alba • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis IX • a. et vv.epigastricae inferiores, a. et vv.epigastricae superiores.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,8–1,2 cun). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

locală.

VC11 Jianli

Indicații

- vome; edeme difuze; spasme ale diafragmei;
- punct antialgic; vezicula biliară, stomac (dureri spasmodice); inimă (precordialgii).

Localizarea

regio epigastrica, pe linia mediană a abdomenului, la 3 cun deasupra ombilicului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • linia alba • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis IX • a. et vv.epigastricae superiores.*

Tehnica

se înțepă vertical (0,8–1,2 cun). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

locală.

VC12 Zhongwan

- punct de alarmă al meridianului E;
- punct de alarmă al meridianului TR (pentru Focarul Mediu);
- punct de încrucișare a meridianelor VC, IG, TR, E.

Indicații

- afectarea organelor Fu (VC12 + E36); punct parasimpaticomimetic (pentru regiunea abdominală); punct important cu influență asupra porțiunii de mijloc a stomacului; spasme ale diafragmei;
- punct antialgic: coaste; cap (cefalee cu insomnie în afecțiunile tractului digestiv); stomac (dureri cu vărsături sau aerofagie – VC12 + E34 + MC6); vezicula biliară (colecistită – VC12 + VB24 + VB34); intestine (dureri spasmodice);
- punct sindromal: Insuficiența Qi a Stomacului și Splinei (astenie; inapetență); Insuficiența Xue (anemie; astenie; piele uscată); Insuficiența Qi a Splinei cu Umiditate (edeme; durere și distensie abdominală); Umiditate-Căldură a Splinei (diaree, senzație de arsură în anus, inapetență, senzație de greutate); dezarmonia Ficat-Splină (gastrită, inapetență, scaune fracționate; iritabilitate); Umiditate-Frig a Focarului Mediu: afectarea Stomacului (dureri acute epigastrice, senzație de rece, aversune la băuturi și mâncare rece); afectarea Splinei (inapetență, scaune moi, senzație de rece și greutate în epigastru); Căldură a Focarului Mediu; retenția hranei în stomac și perversiunea fluxului Qi (greturi, regurgitații, vome; sughiț); punct cu efect pronunțat de ascendență Qi a Splinei (VC12 + E36); Insuficiența Yin-Qi a Stomacului (gastrită, senzație de gol în stomac, sete); Foc al Stomacului (arsură și durere în epigastru, sete de băuturi reci).

Localizarea

regio epigastrica, la jumătatea distanței dintre ombilic și apendicele xifoid, pe linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • linia alba • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis VIII • a. et vv.epigastricae superiores.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,8–1,2 cun); se înțeapă oblic spre punctele VC13 Shangwan, VC11 Jianli, R19 Yindu, E21 Liangmen (indicat în algi gastrice). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

locală (cu diametru aproximativ de 2,5–5 cun).

VC13 Shangwan

– punct de încrucișare a meridianelor VC, E, IG.

Indicații

- vomă de etiologie diversă, intoxicație alimentară; punct important cu influență asupra părții superioare a stomacului (fundus); hemoptizie; fobii, insomnie, iritabilitate;
- punct antialgic: cap (cefalee cu grețuri și vărsături); stomac și intestine (dureri spasmodice); ciclul menstrual (algomenoree cu vărsături); plexul solar;
- punct sindromal: perversiunea fluxului Qi a Stomacului (regurgitații, grețuri, vome; sughiț).

Localizarea

regio epigastrica, pe linia mediană a abdomenului, la 5 cun deasupra ombilicului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • linia alba • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis VIII • a. et vv.epigastricae superiores.*

Tehnica

se înțeapă vertical (0,8–1,2 cun). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

în sus, spre procesul xifoid.

VC14 Juque

– punct de alarmă al meridianului Inimii.

Indicații

- isterie, convulsii;
- punct antialgic: inimă (precordialgii); stomac, abdomen (dureri în

helmintoze);

- punct sindromal: dezarmonia Rinichi-Splină-Stomac (astenie, insomnie; scaune moi, inapetență, grețuri, vome, indigestie); dezarmonia Rinichi-Ficat (iritabilitate, cefalee; indigestie); dezarmonie Inimă-Rinichi (astenie, palpitații, labilitate emoțională, insomnie; dureri lombare); Insuficiența Yin-Qi a Inimii și Rinichilor (anxietate, insomnie); Foc al Inimii (hipertensiune arterială, cefalee; agitație psihomotorie); Flegmă-Foc a Inimii (confuzie mentală; palpitații, cardialgie).

Localizarea

regio epigastrica, pe linia mediană a abdomenului, la 6 cun deasupra ombilicului.

Protecția

cutis • tela subcutanea • linia alba • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis VII • a. et vv.epigastricae superiores.*

Tehnica

se înțeapă oblic, vârful acului este orientat în jos (0,5–1 cun); se înțeapă oblic, spre punctul R16 Huangshu, fără a reține acul în țesuturi (indicat în gastropatoză). Punctarea poate provoca coronarospasm, sughiț (în operele antice punctarea acestui punct este interzisă). Moxibustie 20–30 minute.

Senzația

în sus, în interiorul cutiei toracice.

VC15 Jiuwei

- punct de alarmă al meridianului MC;
- punct Lo al meridianului extraordinar Ren Mai.

Indicații

- dispnee; hemoptizie; sughiț; amețeli (în special la privirea în sus); astenie; convulsii, epilepsie, insomnie totală, diminuarea memoriei;
- punct antialgic: linia mediană a abdomenului, superior de ombilic; dinți (dureri cu mobilitatea dinților); nervii intercostali; inimă (precordialgii cu dispnee); veziculă biliară; plexul solar (solarită); stomac;
- punct sindromal: dezarmonia Rinichi-Splină, Rinichi-Ficat, Rinichi-Inimă; Insuficiența Yin-Qi a Inimii și Rinichilor; Foc al Inimii (iritabilitate, tulburări ale somnului, schizofrenie, fobii); Flegmă-Foc a Inimii; perversiunea fluxului Qi a Inimii (palpitații; anxietate).

Localizarea

regio epigastrica, pe linia mediană a abdomenului, la 7 cun deasupra ombilicului.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • linia alba • fascia transversalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (abdominalis) n.intercostalis VI • a.thoracica interna, vv.thoracicae internae.*

Tehnica

se înțeapă oblic, vârful acului este orientat în jos (0,5–1 cun). Moxibustie 10–30 minute. În operele antice punctarea și moxibustia acestui punct sunt interzise.

Senzația

în sus, în interiorul cutiei toracice, spre inimă.

VC16 Zhongting

Indicații

- disfagie esofagiană;
- punct antialgic: piele (dureri cu senzație de arsură); coaste; stomac (dureri cu vărsături).

Localizarea

regio presternalis, la joncțiunea xifosternală, la nivelul spațiului intercostal V, pe linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • synchondrosis xiphosternalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *rr.cutanei anteriores (pectorales) n.intercostalis V • a.thoracica interna, vv.thoracicae internae.*

Tehnica

se punctează sub un unghi ascuțit (0,3–0,5 cun), vârful va fi orientat în jos. La copii punctarea perpendiculară este contraindicată, pentru a evita penetrarea sternului și pătrunderea acului în mediastin. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în jos, spre stomac.

VC17 Shanzhong

- punct de alarmă al meridianului TR (pentru Focarul Superior, funcțiile cardiorespiratorii);
- punct de alarmă al meridianului MC;
- punct de încrucișare a meridianelor VC, C.

Indicații

- spasme ale esofagului; punct specific în simpaticotonie (pentru regiunea toracică); afectarea organelor respiratorii; tulburări ale metabolismului (procesele de asimilație); astenie (împreună cu punctele E9 Renying și V10 Tianzhu intră în componența "mării

energiei");

- punct antialgic: cutia toracică (afecțiunile plămânilor, bronșite); glandele mamare; nervii intercostali; inimă (precordialgii);
- punct sindromal: Insuficiența Qi a Focarului Superior: Insuficiența Qi și Yang-Qi a Inimii (palpitații; apatie, depresie); Insuficiența Qi a Plămânilor (tuse slabe; astenie); punct important în fenomenul de stagnare în Focarul Superior (VC17 + MC6): stagnarea Qi a Inimii (dureri precordiale cu iradiere în mâna stângă); stagnarea Qi în Plămâni; stagnarea Qi în glandele mamare (mastită, hipogalactie); stagnarea Flegmei în Plămâni (bronșite, astm, tuse cu acumularea sputei și dificultate de eliminare); perversitatea fluxului Qi a Plămânilor și a Stomacului (sughit; tuse; regurgitații).

Localizarea

regio presternalis, la nivelul spațiului IV intercostal, pe linia mamelonară orizontală, la unirea 1/4 inferioare și 3/4 superioare ale sternului, pe linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • corpus sterni.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (pectoralis) n.intercostalis IV • a.thoracica interna, vv. thoracicae internae.*

Tehnica

se punctează sub un unghi ascuțit (0,3–0,5), vârful acului va fi orientat în jos. În operele antice punctarea acestui punct este interzisă. Moxibustie 3–5 minute.

Senzația

locală sau pe toată suprafața pieptului.

VC18 Yutang

Indicații

- pleurită; psihostenie, nimfomanie, insomnie, somnolență postprandială;
- punct antialgic: stern, nervii intercostali; inimă (precordialgii).

Localizarea

regio presternalis, la nivelul spațiului III intercostal, la jumătatea distanței între extremitățile sternului, pe linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • corpus sterni.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (pectoralis) n.intercostalis III • a.thoracica interna, vv. thoracicae internae.*

Tehnica

se punctează sub un unghi ascuțit (0,3–0,5 cm), vârful acului va fi orientat în jos. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

adânc, în interiorul cutiei toracice.

VC19 Zigong

Indicații

- traheită, bronșită; hematemeză; spasmul esofagului;
- punct antialgic: inimă și piept.

Localizarea

regio presternalis, la nivelul spațiului II intercostal, la unirea 1/4 superioare și 3/4 inferioare ale sternului, pe linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • corpus sterni.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (pectoralis) n.intercostalis II • a.thoracica interna, vv.thoracicae internae.*

Tehnica

se punctează sub un unghi ascuțit (0,3–0,5 cun), vârful acului va fi orientat în jos. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

adânc, în interiorul cutiei toracice.

VC20 Huagai

Indicații

- spasmul coardelor vocale, afonie; punct cu efect parasimpaticomimetic; tiroidită;
- punct antialgic: torace; gât; nervii intercostali.

Localizarea

regio presternalis, pe joncțiunea manubriului cu corpul sternului, la nivelul spațiului I intercostal, pe linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • angulus sterni.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (pectoralis) n.intercostalis I • a.thoracica interna, vv.thoracicae internae.*

Tehnica

se punctează sub un unghi ascuțit (0,3–0,5 cun), vârful acului va fi orientat în jos. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

adânc, în interiorul cutiei toracice sau locală.

VC21 Xuanji

Indicații

- abcese ale gâtului; senzație de "nod" în gât; punct efectiv pentru prevenirea reflexului de vomă; palpitații; anxietate, emotivitate;

- punct antialgic: gât; stern; nervii intercostali; stomac.

Localizarea

regio presternalis, la mijlocul manubriului sternal, la 1 cun sub VC22 Tiantu, pe linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • fascia pectoralis • manubrium sterni.

Inervația • Vascularizația

pielea – *r.cutaneus anterior (pectoralis) n.intercostalis I, nn.supraclaviculares mediales (C3,4)* de la *plexus cervicalis • a.thoracica interna, vv.thoracicae internae.*

Tehnica

se punctează sub un unghi ascuțit (0,3–0,5 cun), vârful acului va fi orientat în jos. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

locală sau bilaterală de la acest punct.

VC22 Tiantu

- punct de încrucișare a meridianelor VC, Yin Wei Mai;
- punct al meridianului extraordinar Yin Wei Mai.

Indicații

- accese de astm bronșic; tiroidită; esofagospasm; globus hystericus, anxietate;
- punct antialgic: regiunea cervicală (nevralgii); gât; inimă (precordialgii);
- punct sindromal: stagnarea Qi a Plămânilor și Inimii; Flegmă în Plămâni; pervertirea fluxului Qi a Plămânilor și Stomacului.

Localizarea

regio cervicalis anterior, pe marginea superioară a manubriului sternal, pe linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina superficialis fasciae colli • lamina pretrachealis fasciae colli.

Inervația • Vascularizația

pielea – *nn.supraclaviculares mediales (C3,4)* de la *plexus cervicalis • a.thyroidea inferior, a.brachiocephalica, v.brachiocephalica sinistra, arcus aortae.*

Tehnica

punctarea se începe perpendicular (0,2 cun), apoi vârful acului va fi orientat sub un unghi ascuțit retrosternal – 0,5–1 cun (se va puncta cu precauție). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în jurul gâtului, spre glanda tiroidă, în regiunea tonzilelor (senzația osului de pește în gât).




Fig. 135



Fig. 136

VC23 Lianquan

- punct de încrucișare a meridianelor VC, Yin Wei Mai;
- punct de ieșire al meridianului extraordinar Yin Wei Mai.

Indicații

- laringită, faringită; hipersalivație sau uscăciune a gurii; afectarea cordelor vocale (afonie isterică);
- punct Biao din perechea Biao-Ben: VC23-R8; VC23-R7; VC23-R6; VC23-R2; VC23-RP6;
- punct antialgic: suprafața anterioară a gâtului; gură, limbă, gât (dureri și tumefiere);
- punct sindromal: Vânt Intern (regiunea gâtului); pervertirea fluxului Qi a Plămânilor și Stomacului.

Localizarea

regio cervicalis anterior, deasupra mărului lui Adam, pe marginea superioară a osului hioid, pe linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • lamina superficialis et pretrachealis fasciae colli • raphe m. mylohyoidei • membrana thyrohyoidea.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.transversus colli (C2,3)* de la *plexus cervicalis*; mușchii – *n.facialis • a. et vv.thyroidea superiores.*

Tehnica

se înțeapă oblic (0,5–1 cun), vârful acului va fi orientat spre baza limbii. Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în interiorul gâtului (senzația osului de pește în gât) sau sub limbă.

VC24 Chengjiang

- punct de ieșire al meridianului extraordinar Ren Mai;
- punct de încrucișare a meridianelor VC, E.

Indicații

- hipersalivație; torticolis; apoplexie; stomatită, gingivită; afonie;
- punct Biao din perechea Biao-Ben: VC24-GI11;
- punct antialgic: nervul mandibular, dinți (molarii, incisivi);
- punct sindromal: Insuficiența Qi sau Yin-Qi a Rinichilor și Inimii (dureri lombare; insomnie, anxietate; palpitații); Vânt și Frig în regiunea feței (paralizie facială).

Localizarea

regio mentalis, la mijlocul șanțului mentolabial, în foseta de la acest nivel, pe linia mediană.

Proiecția

cutis • tela subcutanea • m.orbicularis oris • m.depressor labii inferioris • m.mentalis.

Inervația • Vascularizația

pielea – *n.mentalis (n.alveolaris inferior de la n.mandibularis – n.trigeminus)*; mușchii – *n.facialis • a. et vv.labialis inferiores, a. mentalis.*

Tehnica

se înțeapă sub un unghi ascuțit (0,3–0,5 cun), vârful acului va fi orientat în sus; se punctează de-a lungul mandibulei, spre unghiul ei (indicat în nevralgia de trigemen); se înțeapă spre punctul E4 Dicang (în paralizia facială). Moxibustie 5–20 minute.

Senzația

în buza inferioară, în gingii și dinți (cu efect de hipersalivare).

II.1.3. Meridianul extraordinar Yang Qiao Mai

Relațiile energetice:

1. La alcătuirea meridianului curios Yang Qiao Mai participă punctele meridianelor principale Intestin Gros, Stomac, Intestin Subțire, Vezică, Veziculă Biliară (fig.137).
2. Punctul de intrare este V62 Shenmai, punctul de ieșire – VB20 Fengchi.
3. Punctul cheie al meridianului curios Yang Qiao Mai (V62 Shenmai) se localizează pe însuși meridianul curios.
4. Echilibrul energetic unipolar (Yang-Yang) este asigurat prin cuplarea Du Mai-Yang Qiao Mai.
5. Echilibrul energetic bipolar (Yang-Yin) este asigurat prin cuplarea Yang Qiao Mai-Yin Qiao Mai.
6. Meridianul Yang Qiao Mai împreună cu meridianul extraordinar Dai Mai și cu meridianele principale Stomac, Veziculă Biliară, Vezică controlează suprafețele postero-inferioare ale corpului omenesc.

Funcțiile energetice:

1. Meridianul Yang Qiao Mai este de natură Yang cu tendința de




Fig.137. Meridianul extraordinar Yang Qiao Mai.



Fig.138. Meridianul extraordinar Yin Qiao Mai.

Yin.

2. Meridianul Yang Qiao Mai are o funcție acceleratoare asupra circulației Energiei Yang.
3. Meridianul Yang Qiao Mai împreună cu meridianul extraordinar Yin Qiao Mai guvernează "Închiderea și deschiderea ochilor" (procesul de somn-veghe).

II.1.4. Meridianul extraordinar Yin Qiao Mai

Relațiile energetice:

1. La alcătuirea meridianului curios Yin Qiao Mai participă punctele meridianelor principale Vezică și Rinichi (*fig. 138*).
2. Punctul de intrare este R6 Zhaohai, punctul de ieșire – V1 Jingming.
3. Punctul cheie al meridianului curios Yin Qiao Mai (R6 Zhaohai) este localizat pe însuși meridianul curios.
4. Echilibrul energetic unipolar (Yin-Yin) este asigurat prin cuplarea Ren Mai-Yin Qiao Mai.
5. Echilibrul energetic bipolar (Yin-Yang) este asigurat prin cuplarea Yin Qiao Mai-Yang Qiao Mai.
6. Meridianul Yin Qiao Mai împreună cu meridianul extraordinar Chong Mai și cu meridianele principale Splină-Pancreas, Rinichi, Ficat controlează suprafețele antero-inferioare ale corpului omenesc.

Funcțiile energetice:

1. Meridianul Yin Qiao Mai este de natură Yin cu tendința de Yin.
2. Meridianul Yin Qiao Mai controlează Energia Yin pe fețele laterale ale corpului, are rolul de accelerare a transportului de Energie Yin.
3. Yin Qiao Mai împreună cu meridianul extraordinar Yang Qiao Mai guvernează "închiderea și deschiderea ochilor" (procesul somn-veghe).

II.1.5. Meridianul extraordinar Yang Wei Mai

Relațiile energetice:

1. La alcătuirea meridianului curios Yang Wei Mai participă punctele meridianelor principale Intestin Subțire, Vezică, Trei Focare, Veziculă Biliară, Vasul Guvernator (*fig. 139*).
2. Punctul de intrare este V63 Jinmen, punctul de ieșire – VG15 Yamen.
3. Conexiunea punctului cheie (TR5 Waiguan) cu meridianul curios Yang Wei Mai se realizează prin legătura energetică TR5 Waiguan-TR15 Tianliao-VB21 Jianjing-VG15 Yamen.
4. Echilibrul energetic unipolar (Yang-Yang) este asigurat prin cuplarea Yang Wei Mai-Dai Mai.
5. Echilibrul energetic bipolar (Yang-Yin) este asigurat prin cuplarea Yang Wei Mai-Yin Wei Mai.
6. Meridianul Yang Wei Mai împreună cu meridianul extraordinar Du Mai și cu meridianele principale Intestin Gros, Trei Focare, Intestin Subțire controlează suprafețele postero-superioare ale corpului omenesc.




Fig.139. Meridianul extraordinar Yang Wei Mai.




Fig.140. Meridianul extraordinar Yin Wei Mai.

Funcțiile energetice:

1. Meridianul Yang Wei Mai este de natură Yang cu tendința de Yin.
2. Meridianul Yang Wei Mai are ca funcție primară păstrarea și repartiția Energiei în zonele Yang ale organismului.

II.1.6. Meridianul extraordinar Yin Wei Mai

Relațiile energetice:

1. La alcătuirea meridianului curios Yin Wei Mai participă punctele meridianelor principale Splină-Pancreas, Rinichi, Ficat, Vas de concepție (fig.140).
2. Punctul de intrare este R9 Zhubin, punctul de ieșire VC23 Lianquan.
3. Conexiunea punctului cheie (MC6 Neiguan) cu meridianul curios Yin Wei Mai se realizează prin legătura energetică MC6 Neiguan-MC1 Tianchi-R23 Shenfeng-VC17 Shanzhong-VC13 Shangwan-VC12 Zhongwan-VC7 Yinjiao.
4. Echilibrul energetic unipolar (Yin-Yin) este asigurat prin cuplarea Yin Wei Mai-Chong Mai.
5. Echilibrul energetic bipolar (Yin-Yang) este asigurat prin cuplarea Yin Wei Mai-Yang Wei Mai.
6. Meridianul Yin Wei Mai împreună cu meridianul extraordinar Ren Mai și cu meridianele principale Plămân, Pericard, Inimă controlează suprafețele antero-superioare ale corpului omenesc.

Funcțiile energetice:

1. Meridianul Yin Wei Mai este de natură Yin cu tendința de Yin;
2. Meridianul Yin Wei Mai are funcția de păstrare și repartiție a Energiei în zonele Yin ale organismului, controlează legătura între diferite nivele Yin.

II.1.7. Meridianul extraordinar Dai Mai

Relațiile energetice:

1. La alcătuirea meridianului Dai Mai participă punctele meridianului principal Veziculă Biliară (fig.141).
2. Punctul de intrare este VB26 Daimai, punctul de ieșire – VB28 Weidao.
3. Conexiunea punctului cheie (VB41 Zulinqi) cu meridianul Dai Mai se realizează prin legătura energetică VB41 Zulinqi-VB26 Daimai.
4. Echilibrul energetic unipolar (Yang-Yang) este asigurat prin cuplarea Yang Wei Mai-Dai Mai.
5. Echilibrul energetic bipolar (Yang-Yin) este asigurat prin cuplarea Dai Mai-Chong Mai.
6. Meridianul Dai Mai împreună cu meridianul extraordinar Yang Qiao Mai și cu meridianele principale Stomac, Veziculă Biliară, Vezică controlează suprafețele postero-inferioare ale corpului omenesc.

Funcțiile energetice:

1. Meridianul Dai Mai este de natură Yang cu tendința de Yang.
2. Meridianul Dai Mai are funcția de păstrare a Energiei Yang; având




Fig.141. Meridianul extraordinar Dai Mai.




Fig.142. Meridianul extraordinar Chong Mai.

traseul specific în formă de "centură", controlează distribuția Energiei Yang "sus-jos", "dreapta-stânga", "anterior-posterior".

II.1.8. Meridianul extraordinar Chong Mai

Relațiile energetice:

1. Meridianul Chong Mai împrumută punctele de acupunctură de la meridianul principal Rinichi (fig. 142).
2. Punctul de intrare este R11 Henggu, punctul de ieșire – R21 Youmen.
3. Conexiunea punctului cheie (RP4 Gongsun) cu meridianul curios Chong Mai are loc prin legătura energetică RP4 Gongsun-RP12 Chongmen-RP13 Fushe-RP14 Fujie-VC3 Zhongji-VC4 Guanyuan-E30 Qichong-R11 Henggu.
4. Echilibrul energetic unipolar (Yin-Yin) este asigurat prin cuplarea Yin Wei Mai-Chong Mai.
5. Echilibrul energetic bipolar (Yin-Yang) este asigurat prin cuplarea Chong Mai-Dai Mai.

6. Meridianul Chong Mai împreună cu meridianul extraordinar Yin Qiao Mai și cu meridianele principale Splină-Pancreas, Rinichi, Ficat controlează suprafețele antero-inferioare ale corpului omenesc.

Funcțiile energetice:

1. Meridianul Chong Mai este de natură Yin cu tendința de Yang.
2. Meridianul Chong Mai ("marea celor 12 meridiane") are funcția de echilibrare a Qi și Xue în diferite regiuni ale corpului ("guvernează Qi și Xue în toate 12 meridiane").
3. Meridianul Chong Mai participă la reglarea ciclului menstrual.

II.2. Meridianele secundare Lo

II.2.1. Meridianele Lo longitudinale

Relațiile energetice:

1. Cele 15 meridiane Lo longitudinale (dintre care 12 aparțin meridianelor principale, 2 aparțin meridianelor Ren Mai și Du Mai și 1 "Marele Lo al Splinei") se situează între meridianele principale și meridianele tendino-musculare. Ele nu posedă puncte proprii.
2. Meridianele Lo longitudinale pornesc din punctele Lo ale meridianelor principale, merg ascendent sau descendent și se termină, ramificându-se în jurul articulațiilor, în diferite cavități (abdominală, toracică, craniană) sau în alte regiuni (fig.143–147, tab.2).

Funcțiile energetice:

1. Meridianele longitudinale au funcția de protecție pentru meridianele principale; au rolul de a evita acumularea Energiei patogene în meridianele principale și în organele interne corespunzătoare (funcția de sistem "tampon").
2. Meridianele longitudinale au funcția de a transporta energia nutritivă (Ying) către țesuturile periferice.
3. Meridianele Lo longitudinale controlează anumite regiuni sau funcții:

articulațiile în general.....	RP21 Dabao
articulațiile membrului superior.....	IG7 Zhizheng
articulația cotului.....	TR5 Waiguan
articulația mâinii.....	P7 Lieque
articulația membrelor inferioare.....	E40 Fenglong
articulația piciorului.....	VB37 Guangming
coloana vertebrală.....	VG1 Changqiang
regiunea cervicală.....	MC6 Neiguan
regiunea toracică.....	GI6 Pianli
regiunea lombară.....	R4 Dazhong

Tabelul 2.

Meridianele Lo longitudinale: puncte Lo și puncte terminus

Meridianul Lo longitudinal	Punctul Lo	Ramificațiile (punct terminus)
Pământ	P7 Lieque	Regiunea palmară
Inimă	C5 Tongli	Mediastin, față, rădăcina limbii, unghiul intern al ochiului
Pericard	MC6 Neiguan	Mediastin
Intestin Gros	GI6 Pianli	Față, mandibulă, urechi
Intestin Subțire	IG7 Zhizheng	Umăr
Trei Focare	TR5 Waiguan	Regiunea toracică superioară
Splină-Pancreas	RP4 Gongsun	Cavitatea abdominală (stomac, intestine)
Rinichi	R4 Dazhong	Cavitatea abdominală, mediastin, coloana vertebrală (regiunea dorsală și lombară)
Ficat	F5 Ligou	Regiunea genitală
Stomac	E40 Fenglong	Gât
Veziculă Biliară	VB37 Guangming	Regiunea dorsală a piciorului
Vezică	V58 Felyang	Unghiul intern al pleoapelor, gură
Ren Mai	VC15 Jiuwei	Regiunea epigastrică
Du Mai	VG1 Changqiang	De-a lungul coloanei vertebrale, regiunea capului
Marele Lo al Splinei	RP21 Dabao	Suprafața întregului corp



Fig. 143. Meridianele Lo longitudinale de natură Yang ale membrului superior.




Fig. 144. Meridianele Lo longitudinale de natură Yin ale membrului superior.




Fig.145. Meridianele Lo longitudinale de natură Yang ale membrilor inferioare.




Fig.146. Meridianele Lo longitudinale de natură Yin ale membrilor inferioare.

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| peretele abdominal | VC1 Huiyin |
| diafragma | C5 Tongli |
| gâtul (fonația) | E40 Fenglong |
| capul..... | VG1 Changqiang, V58 Feiyang |
| fața (nas, urechi, ochi, gură) | V58 Feiyang, GI6 Pianli |
| pielea..... | IG7 Zhizheng |
| funcția digestivă | RP4 Gongsun |
| funcția organelor genitale..... | F5 Ligou, R4 Dazhong |
| psihismul | E40 Fenglong |
4. Meridianele longitudinale Ren Mai, Du Mai și marele Lo al Splinei au funcții mai generale efectuând controlul întregii rețele a vaselor Lo.




Fig.147. Meridianele Lo longitudinale Du Mai (A), Ren Mai (B) și marele Lo al Splinei (C).

II.2.2. Meridianele Lo transversale

Relațiile energetice:

1. Meridianele Lo transversale (în număr de 12, câte unul pentru fiecare meridian principal) se situează între două meridiane principale, asigurând legătura lor conform cuplajului Biao-Li. Aceste meridiane sunt plasate între pumn și cot pe membrele superioare și între gleznă și genunchi pe membrele inferioare.
2. Meridianele Lo transversale nu posedă puncte proprii. Ele pornesc din punctul Lo al meridianului principal și se termină în punctul Yuan al Meridianului cuplat (tab.3).

Funcțiile energetice:

1. Meridianele Lo transversale realizează homeostazia energetică, efectuând șuntarea între două meridiane principale, conform relației Biao-Li (un organ Yang și altul Yin cuplate în loja energetică și plasate la același nivel al pulsului radial).
2. În funcție de starea energetică a meridianelor Lo principale, prin intermediul meridianelor Lo transversale se realizează trecerea Energiei din meridianul Yang către meridianul Yin și invers.
3. În procesul reglării homeostaziei energetice prin intermediul meridianelor Lo transversale Energia "curge" întotdeauna în același sens: din punctul Lo către punctul Yuan.

Meridianele Lo transversale: puncte Lo și puncte Yuan

Meridianul Lo transversal	Punctul Lo	Punctul Yuan
Plămân	GI6 Pianli	P9 Taiyuan
Intestin Gros	P7 Lieque	GI4 Hegu
Stomac	RP4 Gongsun	E42 Chongyang
Splina-Pancreas	E40 Fenglong	RP3 Taibai
Inimă	IG7 Zhizheng	C7 Shenmen
Intestin Subțire	C5 Tongli	IG4 Wangu
Vezică	R4 Dazhong	V64 Jinggu
Rinichi	V58 Feiyang	R3 Taixi
Pericard	TR5 Waiguan	MC7 Daling
Trei Focare	MC6 Neiguan	TR4 Yangchi
Veziculă Biliară	F5 Ligou	VB40 Qiuxu
Ficat	VB37 Guangming	F3 Taichong

II.3. Meridianele tendino-musculare

Relațiile energetice:

1. Meridianele tendino-musculare sunt "structuri energetice" superficiale, în formă de benzi fusiforme cu traiectul superpozabil cu cel al meridianelor principale. Ele nu posedă puncte proprii, în schimb au zone de concentrare în formă de puncte de inserție pe meridianele principale (fig.148–151, tab.4).
2. Meridianele tendino-musculare se încep în punctele Jīng-distale și nu pătrund în interiorul cavităților corpului (abdomen, torace, craniu) și în organele interne.
3. Meridianele tendino-musculare sunt cuplate câte trei în punctele de reunire:

MTM	Punct de reunire
E + VB + V	IG18 Quanliao
F + RP + R	VC2 Qugu, VC3 Zhongji
GI + TR + IG	VB13 Benshen
P + C + MC	VB22 Yuanye

Funcțiile energetice:

1. Meridianele tendino-musculare formează o peliculă energetică a organismului care apără organismul și meridianele principale de acțiunea factorilor patogeni exogeni. Pentru îndeplinirea acestei




Fig. 148. Meridianele tendino-musculare de natură Yang ale membrilor superioare: Intestin Gros (A), Trei Focare (B) și Intestin Subțire (C).




Fig. 149. Meridianele tendino-musculare de natură Yin ale membrilor superioare: Plămâni (A), Pericard (B) și Inimă (C).

funcții meridianele tendino-musculare sunt situate superficial și conțin energia protectoare Wei Qi.

2. Asigură motricitatea corpului sau a părților lui: inspirația – P, MC, V, R; expirația – VB, E; masticția – E, V, VB, TR; deglutiția – E, GI; mișcările frunții și pleoapei superioare – V; mișcările pleoapei inferioare – E; flexia mâinii și degetelor – C, MC, P; extensia mâinii și degetelor – IG, TR, GI etc.
3. Meridianele tendino-musculare armonizează funcția mușchilor, oaselor și tendoanelor în diferite regiuni ale corpului.






Fig.150. Meridianele tendino-musculare de natură Yang ale membrelor inferioare: Vezică (A), Veziculă Biliară (B) și Stomac (C).






Fig.151. Meridianele tendino-musculare de natură Yin ale membrelor inferioare: Splină-Pancreas (A), Ficat (B) și Rinichi (C).

Tabelul 4.
Punctele de inserție a meridianelor tendino-musculare (MTM)

MTM	Puncte de inserție	
	la meridianul omolog	la alte meridiane
P	P11, P9, P5, P3	VB22, E12
GI	C11, GI5, GI11, GI15, GI18, GI20	E5
E	E45, E41, E35, E30, E12, E9, E7, E5, E1	VB30, VG9, VC2, VC3
RP	RP1, RP5, RP9, RP12	VC2, VC8, VG11
C	C9, C7, C3	VB22, VC8
IG	IG1, IG5, IG8, IG10	
V	V67, V65, V61, V57, V39, V40, V30, V10, V12, V1	VB40, VB34, GI15, VB12
R	R3, R10	VC2, V10
MC	MC9, MC7, MC3	VB22
TR	TR1, TR4, TR10	VB1, VB13
VB	VB44, VB40, VB34, VB12, VB4, VB1	E35, E32, E12, VG20, IG18
F	F1, F4, F8	VC2

II.4. Meridianele distincte

Relațiile energetice:

1. Meridianele distincte sunt 12 la număr (6 meridiane Yang și 6 meridiane Yin), în corespundere cu meridianele principale. Fiecare meridian are două ramuri simetrice – stânga și dreapta.
2. Meridianele distincte nu posedă puncte proprii. Aceste meridiane sunt cuplate conform relației Biao-Li (unul Yang și altul Yin, ambele aparținând unei loje energetice).
3. Relațiile energetice ale meridianelor distincte sunt în strânsă legătură cu structura lor. Toate meridianele distincte posedă trei segmente (fig.152): periferic (de la punctul Jing-dist. până la punctul de reunire periferică); visceral (de la punctul de reunire periferică până la punctul de reunire centrală); central (de la punctul de reunire centrală până la zona cerebrală).
4. Relațiile energetice în mare măsură sunt determinate de traiectul ascendent al meridianelor distincte, cu amplasarea mediană a lor (plexul solar, cordul) ce explică legătura strânsă cu loja energetică Foc (Energia Shen).
5. Relațiile energetice ale meridianelor principale Yin cu zona cerebrală se realizează datorită legăturii lor cu meridianele distincte.

Funcțiile energetice:

1. Meridianele distincte sunt căi de circulație a Energiei psiho-informaționale (Shen).
2. Segmentul periferic al meridianelor distincte are funcția de




Fig.152. Reprezentarea schematică a meridianului distinct.

culegere a informației de la țesuturile periferice (sânge, tesutul conjunctiv, epitelial, osos, receptorii somatici etc.). Informația este transmisă la etajul visceral.

3. Segmentul visceral are funcția de a culege informația de la organele Zang și Fu.
4. Segmentul central are funcția de integrare a informației provenite din segmentele periferic și visceral, cât și din organele senzoriale (cele "șapte orificii"). Integrarea informației permite formarea unui răspuns adecvat, adaptarea individului în mediul din jur. Tulburarea funcțiilor energetice la diferite nivele explică apariția disfuncțiilor psihosomatice cu predominarea mecanismelor centrale sau periferice.

5. O funcție energetică importantă este distribuția fiziologică a Energiei Shen între diferite regiuni: exterior-interior (prin traiectul extern și intern al meridianelor distincte, prin punctele Shu-posterioare și punctele de "mobilizare" ale meridianului Vezică); sus-jos (prin intermediul celor trei segmente ale meridianelor distincte); dreapta-stânga (prin intermediul a două ramuri, dreapta și stânga, ale meridianului distinct).
6. În caz de invadare a meridianelor principale cu Energie patogenă se manifestă funcția de tampon a meridianelor distincte – Energia patogenă este deviată temporar în meridianele distincte, în așa fel împiedicând apariția tulburărilor energetice în meridianele principale și organele corespunzătoare Zang și Fu.

**Tratat
de acupunctură
clinică**

**VOLUMUL
II**

**DIAGNOSTICUL
ȘI TRATAMENTUL
ACUPUNCTIC**

Tratamentul și profilaxia cu aplicarea acupuncturii presupune un "diagnostic energetic", care include diferite procedee și metode specifice acupuncturii. Metodele de bază de culegere a informației sunt: anamneza, inspecția, auscultația, palparea, aprecierea mirosului. Folosind aceste metode, sunt atinse obiectivele finale ale diagnosticului energetic – stabilirea factorilor etiopatogeni, locului de afectare, tipului de energie afectată, caracterului procesului patologic și evoluția lui. Un loc deosebit în diagnosticul energetic are palparea pulsului radial (*tab. 5*).

După cum s-a menționat, inspecția este una din metodele de bază de culegere a informației. Această metodă vizează aprecierea tipului constituțional al pacientului, evidențierea particularităților generale și locale (culoare, tonus, troficitate, vascularizație etc.) în diferite regiuni ale corpului sau a excrețiilor organismului (urină, scaun, salivă etc). Un loc particular îl ocupă inspecția limbii. În procesul diagnosticului se atrage atenție la forma limbii, fisurile limbii și amprente dentare, consistența și motilitatea limbii, culoarea limbii și depozitul lingual (*tab. 6*).

Tratamentul acupunctiv se bazează pe diagnosticul și diferențierea bolilor conform următoarelor criterii:

- Diferențierea sindroamelor în acord cu opt principii (Extern-Intern, Frig-Căldură, Insuficiență-Exces, Yin-Yang).
- Diferențierea sindroamelor în acord cu factorii patogeni (șase factori patogeni exogeni, șapte emoții, traumele, dieta etc.).
- Diferențierea sindroamelor în acord cu concepția Qi și Xue (Insuficiența Qi și/sau Xue, stagnarea Qi și/sau Xue etc); diferențierea sindroamelor în afectarea Wei, Qi, Ying și Xue.
- Diferențierea sindroamelor în acord cu teoria organelor Zang și Fu (afectarea izolată a organelor, afectarea lojelor energetice sau sindroame complexe de afectare a organelor interne).
- Diferențierea sindroamelor în acord cu teoria meridianelor și colateralelor (12 meridiane principale, 8 meridiane extraordinare, meridianele secundare Lo, meridianele tendino-musculare, meridianele distincte, 6 nivele energetice).

Este obligatoriu de a stabili nu numai diagnoza dezechilibrului energetic (care permite alegerea adecvată a punctelor de acupunctură și a metodelor de stimulare), ci și diagnoza de tip occidental. Ultima este necesară pentru a stabili indicațiile și contraindicațiile pentru tratamentul prin acupunctură, a aprecia rolul și locul acupuncturii în tratamentul bolnavului concret.

Tabelul 5.

Clasificarea pulsului radial conform medicinei tradiționale chineze

Tipul pulsului	Denumirea pulsului		Caracteristica pulsului	Indicațiile (exemple)
	Orientală	Occidentală		
Puls superficial	Fu mai	Superficial	Puls superficial (dă senzație de plutire), dispare la presiune	Sindrom Extern, Insuficiența Wei Qi, sindrom de Insuficiență cronică
	Hong mai	Vast (mare)	Puls superficial, sosește puternic și se retrage slăbit (ca un val de mare)	Sindrom Căldură-Exces
	Ru mai	Moale	Puls superficial, fin și moale	Sindrom Umiditate, sindrom Insuficiență
	San mai	Dispersat	Puls superficial, dispersat (fără rădăcină, indistinct)	Epuiizarea Yin-ului și Yang-ului, epuiizarea Esenței Rinichilor
	Kou mai	Dicrot (scobit)	Puls superficial, mare și moale (senzație de "frunză de ceapă verde")	Insuficiența Xue (sindrom hemoragica), Insuficiența Yin-Qi
	Ge mai	Timpanic (separat)	Puls superficial, tensionat la suprafață și gol în profunzime (senzație de "piele întinsă de tobă")	Insuficiența Esenței, Insuficiența Xue (metroragii), epuiizarea Yin-ului
Puls profund	Chen mai	Profund	Se simte la palpare puternică și profundă (poate fi puternic sau slab)	Sindrom Intern-Exces, sindrom Intern-Insuficiență, Frig
	Fu mai	Ascuns	Foarte profund, aproape de os	Stagnarea factorilor patogeni, durere, sincope, Insuficiența Yang-Qi
	Lao mai	Dur (ferm)	Puls profund, plin, întins, încordat	Sindrom Intern-Exces, boli cronice (Yin-Frig), stagnarea Qi, algiile intense
	Ruo mai	Slab	Puls profund, extrem de slab, moale și fin	Insuficiența Qi și Xue, Insuficiența Yang-Qi
Puls lent	Chi mai	Lent	Puls lent (3 bătăi la o respirație)	Sindrom de Frig, Exces de Yin-Qi, stagnarea Frigului (lent și puternic), Frig-Insuficiență, Insuficiența Yang-Qi (lent și slab)
	Huan mai	Încetinit	Puls regulat (4 bătăi la o respirație). Este puțin mai rapid decât pulsul lent	Sindrom de Umiditate, Insuficiența Splinei și Stomacului
	Se mai	Rugos	Puls lent, fin și scurt (dă senzația de trecere a degetelor pe noduri de bambus)	Insuficiența Esenței, Insuficiența Xue, stagnarea Qi sau Xue, acumularea Flegmei
	Jie mai	Înnodat	Puls lent, cu pauze neregulate	Exces de Yin-Qi, stagnarea Qi sau Xue, Flegmă-Frig

Tabelul 5. Continuare

Tipul pulsului	Denumirea pulsului		Caracteristica pulsului	Indicațiile (exemple)
	Orientală	Occidentală		
Puls rapid	Shu mai	Rapid	Puls rapid (mai mult de 5 bătăi la o respirație), ritm regulat	Sindromul de Căldură-Exces (rapid și puternic) sau Căldură-Insuficientă (rapid și slab), Excesul de Yang-Qi
	Cu mai	Grăbit	Puls rapid, cu intervale neregulate	Sindrom de Exces Yang-Qi, stagnarea Qi și Xue, retenția Flegmei
	Ji mai	Iute (grabnic)	Puls rapid (7-8 bătăi la o respirație)	Hiperactivitatea Yang-Qi în urma Insuficienței Yin-Qi, colapsul Qi
	Dong mai	Agitat	Puls rapid și puternic (dă senzația unei "bile care se rostogolește")	Sindroame algice, frică, obstrucția Qi
Puls slab	Xu mai	Gol	Puls slab și gol	Sindrom de Insuficiență Qi sau Xue
	Xi mai	Fin (subțire, filiform)	Puls slab, subțire (ca un fir de păr)	Puls de suprasolicitare, Insuficiența Qi sau Xue
	Wei mai	Mic (vag)	Puls slab, subțire, abia perceptibil, foarte mic și moale (dispare la presiune)	Insuficiența Yin-Qi sau Yang-Qi, Insuficiența Qi sau Xue
	Dai mai	Intermitent	Puls slab cu pauze regulate	Epuizarea Qi a organelor Zang, sindroame algice, indică starea de Spaimă
	Duan mai	Scurt	Puls foarte scurt (nu ocupă tot spațiul lui)	Stagnarea Qi și Xue (puls scurt și puternic), Insuficiența Qi (puls scurt și slab)
Puls puternic	Shi mai	Plin	Puls plin, mare, puternic și larg	Sindrom de Exces
	Hua mai	Glisant (alunecos)	La palpare dă senzație de "perle care se rostogolesc pe farfurie"	Retenția Flegmei sau a hranei, Căldură-Exces în Yangming, puls fiziologic la femei gravide
	Jin mai	Încordat	Puls puternic, la palpare dă senzația unei "corzi răsucite de vioară"	Sindrom de Frig, durere sau retenție a hranei
	Chang mai	Lung	Puls puternic și lung (se simte dincolo de locul lui)	Hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului, Exces de Yang-Qi, Căldură Internă
	Xian mai	Întins	Puls puternic, drept, lung și întins ca o "coardă de vioară"	Afectarea Ficatului și Veziculei Biliare, sindroame algice, retenția Flegmei

Tabelul 6.

Criteriile diagnosticului lingual și interpretarea lor tradițională

	<i>Criteriile</i>	<i>Interpretarea tradițională</i>
I. Forma limbii	Limba subțire	Insuficiența Lichidelor
	Limba subțire și palidă	Insuficiența Xue
	Limba subțire și roșie	Insuficiența Yin-Qi
	Limba groasă	Insuficiența Qi a Splinei
	Limba groasă, palidă și umedă	Insuficiența Yang-Qi (în special Insuficiența Yang-Qi a Splinei și Rinichilor)
	Limba groasă și roșie	Căldura în Stomac și Inimă
	Limba groasă și cianotică	Intoxicația organismului, stagnarea Xue
	Limba groasă, cu depozit galben și alunecos	Căldură-Umiditate în Stomac și Splină
	Tumefierea paracentrală în mijlocul limbii	Insuficiența Qi a Splinei, Insuficiența Yang-Qi a Splinei
	Tumefierea marginilor limbii (culoare roșie)	Focul Ficatului în Exces, ascendența Yang-Qi a Ficatului
	Tumefierea vârfului limbii	Insuficiența Qi a Inimii
	Tumefierea vârfului limbii (culoare roșie)	Foc al Inimii
	Tumefierea porțiunii intermediare (zona localizată între vârf și centru)	Insuficiența Qi a Plămânilor
	Tumefierea fisurii centrale a limbii (care se întinde până la vârf)	Insuficiența Qi a Inimii
	Tumefierea fisurii centrale a limbii (culoare roșie)	Foc al Inimii
	Tumefierea unilaterală a limbii (devierea liniei mediane)	Insuficiența Qi și Xue în meridianele situate homolateral, Insuficiența Qi a Plămânilor (în plămânul homolateral)
	Tumefierea limbii în formă de clocan	Insuficiența Qi a Splinei și Stomacului
	Limba lungă și roșie	Căldura Inimii
	Limba scurtă și roșie	Căldura Internă care dă naștere la Vânt Intern al Ficatului
	Limba scurtă, roșie și uscată	Căldură cu epuizarea Lichidelor
	Limba scurtă și palidă	Insuficiența Qi, Insuficiența Yang-Qi, Insuficiența Yang-Qi a Splinei și Rinichilor, Frig Intern
	Limba scurtă și tumefiată.	Insuficiența Yang-Qi a Splinei, Insuficiența Yang-Qi a Plămânilor
II. Fisurile limbii și amprentele dentare	Fisuri superficiale și în număr redus	Afecțiune benignă
	Fisuri adânci și numeroase	Afecțiune gravă
	Fisuri orizontale și lungi (culoare normală a limbii)	Fazele incipiente ale Insuficienței Yin-Qi a Stomacului sau Plămânilor
	Fisuri orizontale și lungi, limba roșie, fără depozit	Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor
	Fisuri orizontale și scurte	Insuficiența Yin-Qi

Tabelul 6. Continuare

Criteriile		Interpretarea tradițională
II. Fisurile limbii și amprentele dentare	Fisuri scurte de diferită formă	Insuficiența Yin-Qi a Stomacului
	Fisuri transversale în porțiunile medio-laterale ale limbii	Insuficiența Qi a Splinei
	Fisuri transversale și umede în porțiunile medio-laterale ale limbii	Insuficiența Yang-Qi a Splinei
	Fisură verticală și largă în centrul limbii, cu depozit	Insuficiența Qi a Stomacului
	Fisură verticală și largă în centrul limbii, fără depozit	Insuficiența Yin-Qi a Stomacului
	Fisură verticală și largă în centrul limbii, cu depozit galben și uscat	Foc al Stomacului
	Fisură verticală, adâncă și lungă în centrul limbii (culoare normală a limbii)	Slăbiciune congenitală a Inimii
	Fisură verticală, adâncă și lungă în centrul limbii (culoarea limbii – roșie, vârful limbii – mai roșu și puțin tumefiat)	Foc al Inimii
	Fisură verticală, adâncă și lungă în centrul limbii (culoarea limbii – roșie), fără depozit	Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor și a Inimii
	Fisură verticală, adâncă și lungă în centrul limbii, cu fisuri adiacente orizontale (culoarea limbii – roșie), fără depozit	Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor
	Fisuri în porțiunea intermediară a limbii (între vârful și centrul limbii) situate sub un unghi	Insuficiența Yin-Qi a Plămânilor
	Ulcerația limbii	Căldură, Căldura Focarului Superior, Căldură (Foc) al Inimii
	Amprente dentare la marginile limbii (culoarea palidă sau normală)	Insuficiența Qi a Splinei
III. Consistența și motilitatea limbii	Limba cu consistența crescută, congestivă	Excesul Yang-Qi, Excesul de Căldură a Inimii
	Limba rigidă, roșie și uscată	Căldură pronunțată cu epuizarea Lichidelor
	Limba rigidă, roșie	Foc al Inimii
	Limba rigidă, palidă	Vânt intern, Vânt al Ficatului
	Limba moale	Insuficiența lichidelor, Insuficiența Qi
	Limba moale și palidă	Insuficiența Qi a Splinei, Insuficiența Qi a Inimii, Insuficiența Xue
	Limba moale, palidă, cu amprente dentare	Insuficiența Qi a Splinei
	Limba tremurândă	Afectarea lojei Foc (C/IG)
	Limba tremurândă și palidă	Insuficiența Qi și Xue
	Limba tremurândă, roșie și uscată	Căldură internă cu Vânt intern
	Limba deviată lateral	Afectarea lojei Lemn (F/VB)
	Limba deviată lateral, palidă	Insuficiența Qi a Inimii

Tabelul 6. Continuare

IV. Culoarea limbii	Criteriile	Interpretarea tradițională
	Limba palidă și umedă	Insuficiența Yang-Qi
	Limba palidă și uscată	Insuficiența Xue
	Limba roșie, uscată, cu depozit galben	Exces de Căldură
	Limba roșie, uscată, fără depozit (limba "cheală")	Insuficiența Yin-Qi
	Limba roșie și umedă	Focul Ficatului în Exces (ascendența Yang-Qi al Ficatului) în asociere cu Insuficiența Qi a Splinei
	Limba roșie	Căldură
	Vârful limbii roșu	Căldură a Inimii
	Marginile limbii roșii	Căldură a Ficatului
	Centrul limbii roșu	Căldură a Stomacului
	Centrul limbii roșu cu absența depozitului (limba "cheală")	Insuficiența Yin-Qi a Stomacului
	Limba purpurică	Stagnarea Xue
	Centrul limbii de culoare purpurie	Stagnarea Xue în Stomac
	Rădăcina limbii roșie, fără depozit (limba "cheală")	Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor
	Puncte roșii la rădăcina limbii, depozit galben	Căldură a Vezicii, Căldură în Intestine, Căldură a Focarului Inferior
	Puncte roșii la rădăcina limbii, cu absența depozitului (limba "cheală")	Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor
	Puncte roșii la vârful limbii	Foc al Inimii
	Puncte roșii la marginile laterale ale limbii	Căldură a Veziculei Biliare (puncte roșii la marginea dreaptă a limbii), Foc al Ficatului (puncte roșii la marginea stângă a limbii), ascendență Yang-Qi al Ficatului
	Limba roșie, cu pete roșii la vârf	Căldură și stagnarea Xue a Inimii
	Limba roșie, cu pete roșii la margini	Căldură și stagnarea Xue în Ficat
	Limba roșie, cu pete roșii la rădăcină	Căldură și stagnarea Xue în Focarul Inferior
	Limba roșie, cu pete roșii în centru	Căldură și stagnarea Xue în Stomac
	Limba roșie, cu papile proeminente	Căldură
	Limba roșie, cu papile proeminente în partea intermediară a limbii (între vârf și centru)	Căldură a Focarului Superior, Căldură a Plămânilor
	Limba roșie, cu papile proeminente în centru	Căldură a Focarului Mediu, Căldură a Stomacului
	Limba violetă	Stagnarea Xue, Frig Intern
	Limba cu puncte hemoragice	Căldură în Pericard

Tabelul 6. Continuare

	Criteriile	Interpretarea tradițională
V. Depozitul lingual	Depozitul mai subțire	Boală benignă
	Depozitul mai gros	Boală mai gravă
	Depozit fără "rădăcină" (depozit neaderent)	Insuficiența Qi a Stomacului, Insuficiența Qi a Splinei, Insuficiența Qi a Rinichilor
	Depozit fără "rădăcină" și uscat	Insuficiența Yin-Qi a Stomacului
	Depozit uscat și galben	Căldură a Stomacului, Căldură a Plămânilor, Căldură a Ficatului
	Depozit uscat, galben și subțire	Vânt-Căldură
	Depozit uscat, în cantități mici (sau fără depozit, limba "cheală")	Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor
	Depozit umed și alb	Insuficiența Yang-Qi
	Depozit umed, alb și subțire	Vânt-Frig
	Depozit umed și alunecos	Umiditate
	Depozit alb	Sindrom Extern
	Depozit alb și gros	Frig-Exces
	Depozit alb și subțire	Frig-Insuficiență
	Depozit alb și alunecos	Umiditate, Frig, stagnarea hranei în Stomac
	Depozit galben	Căldură, sindrom Intern, afectarea Stomacului și Splinei
	Depozit galben și alunecos	Umiditate-Căldură
	Depozit galben și murdar	Umiditate-Căldură în Stomac și Intestine
	Depozit galben și uscat	Căldură (Exces)
	Depozit cenușiu	Sindrom Intern, boli cronice
	Depozit cenușiu și uscat	Căldură
	Depozit cenușiu și umed	Frig
VI. Examenul limbii și cele opt reguli diagnostice	Sindromul Yin	Limba moale și groasă, palidă, depozit umed; evoluția cronică a semnelor
	Sindromul Yang	Limba solidă, roșie, depozit galben; evoluția acută a semnelor
	Sindromul Vid	Limba moale, palidă, depozit subțire; evoluția cronică a semnelor
	Sindromul Exces	Limba solidă, culoarea poate fi diferită, depozit gros; evoluția acută a semnelor
	Sindromul Frig	Limba moale, palidă, depozit alb și umed; evoluția cronică a semnelor
	Sindromul Căldură	Limba dură, roșie, depozit gălbui și uscat; evoluția acută a semnelor
	Sindromul Intern	Consistența și culoarea limbii pot fi diferite, depozit gros; evoluția cronică a semnelor
	Sindromul Extern	Consistența și culoarea limbii pot fi diferite, depozit subțire; evoluția acută a semnelor

În programul de tratament se va ține cont și de particularitățile constituționale și temperamentale ale bolnavului. Tratamentul efectiv presupune și alegerea punctelor optime în momentul optimal, reieșind din ritmicitatea și unitatea organismului și naturii. Însă în practica acupuncturii adeseori efectul terapeutic dorit nu se manifestă la nivelul cuvenit, cu toate că atât diagnoza energetică și occidentală, cât și alegerea punctelor necesare sunt corecte. Explicațiile posibile în aceste cazuri pot fi receptivitatea insuficientă a pacientului la acupunctură (manifestarea fenomenului de acupuncturo-rezistență) și tehnica nesatisfăcătoare de mânuire a acelor. În medicina tradițională chineză mânuirea acelor este o artă complicată, care necesită un antrenament special de lungă durată sub conducerea învățătorului. Un medic occidental este obligat să posede un minimum necesar de tehnici pentru a realiza un tratament acupunctiv eficient. Printre ele sunt tehnicile de tonifiere, dispersie și armonizare.

Tehnica de tonifiere în sindroamele de tip Insuficiență

- Prima etapă începe cu tehnica de "deschidere-închidere": medicul aplică policele și indexul mâinii stângi la capătul distal și proximal al punctului folosit, întinzând (tensionând) pielea pacientului. În timpul procedurii medicul presează cu policele sau cu indexul o parte a punctului (distal sau proximal) pentru a "închide" meridianul și a preveni pierderea Qi (în acest scop se presează partea punctului îndreptată spre regiunea sănătoasă). Cu alt deget nu se presează, lăsând "deschis" meridianul (nu se presează partea punctului îndreptată spre zona afectată) pentru a facilita circulația Qi spre zona afectată.
- A doua etapă – concomitent cu tehnica de "deschidere-închidere", când pacientul expiră profund, acul se introduce rapid cu o mică înclinare a vârfului spre regiunea afectată.
- A treia etapă – se efectuează manevre de "dute-vino" și rotația acului. Ciclul de stimulare constă din manevre active timp de 1 minut și repaus de 1 minut. Pentru tonifiere sunt necesare până la 4 cicluri de stimulare. În timpul procedurii pacientul respiră adânc.
- A patra etapă – acul se extrage în timpul inspirației profunde a pacientului.
- A cincea etapă – imediat după extragerea acului medicul trebuie să "închidă" porul (punctul se masează după scoaterea acului pentru a limita "scurgerea de Energie").

Tehnica de tonifiere în sindroamele de tip Frig-Insuficiență

- Prima etapă – acul se inserează superficial (nivelul Cer) în timpul expirației pacientului și se mobilizează prin manevre de "dute-vino" de 3 sau 9 ori. Apoi acul "se odihnește" la nivelul stratului Cer timp de 3 respirații.
- A doua etapă – medicul se concentrează asupra mâinii drepte și manevrelor cu acul ("emană Qi prin intermediul acului"), respiră adânc și în faza de expirație introduce lent acul prin mișcări de

îmbold și cu forță din stratul Cer (superficial) spre stratul Om (mijlociu). Se efectuează din nou manevre de "dute-vino" de 3 sau 9 ori. După aceasta medicul face o pauză, pentru a respira adânc (1–2 cicluri de respirație).

- A treia etapă – medicul introduce acul la nivelul stratului Pământ (adânc) și efectuează a treia oară manevrele de "dute-vino" de 3 sau 9 ori. După aceasta lasă acul timp de 1–2 acte de respirație profundă.
- A patra etapă – medicul expiră adânc, concomitent cu extragerea rapidă a acului până la nivelul Cer (superficial). Ciclul descris imediat se repetă de câteva ori până la apariția senzației de căldură. Dacă senzația de căldură nu apare, ciclul de stimulare se repetă peste o pauză de 5 minute.
- A cincea etapă – acul se extrage rapid în timpul când pacientul inspiră.
- A șasea etapă – după extragerea acului porul imediat se "închide".

Tehnica de dispersie în sindroamele de tip Exces

- Prima etapă începe cu tehnica de "deschidere-închidere" (descrisă mai sus).
- A doua etapă – concomitent cu tehnica de "deschidere-închidere" se introduce acul în timpul când pacientul inspiră adânc, cu o mică înclinare a vârfului acului spre regiunea afectată.
- A treia etapă – se efectuează manevre de "dute-vino" și de rotație intensivă. Un ciclu de stimulare constă din manevre active timp de 2 minute și un repaus de 2 minute. Pentru dispersie sunt necesare până la 4 cicluri de stimulare.
- A patra etapă – acul se extrage în timpul expirației profunde a pacientului.
- A cincea etapă – în timpul extragerii acului medicul lărgeste porul prin efectuarea mișcărilor de rotație antiorar, fără a închide porul după terminarea procedurii, facilitând "scurgerea de Energie" (orificiul nu se masează).

Tehnica de dispersie în sindroamele de tip Căldură-Exces

- Prima etapă – acul se inserează profund (nivelul Pământ) în timpul inspirației pacientului și se efectuează manevre de "dute-vino" de 6 ori. Apoi acul "se odihnește" la nivelul stratului Pământ timp de 2–3 respirații profunde.
- A doua etapă – medicul se concentrează asupra acului ("emană Qi prin intermediul acului"), respiră adânc și în faza de expirație extrage acul lent, dar cu forță spre stratul Om (mijlociu). Urmează o stimulare de "dute-vino" de 6 ori și o pauză de 1–2 respirații adânci.
- A treia etapă – medicul extrage acul până la nivelul stratului Cer (superficial, sub piele), efectuează manevre de "dute-vino" de 6

ori, după care urmează o pauză de 1–2 respirații.

- A patra etapă – medicul expiră adânc, concomitent cu introducerea rapidă a acului până la nivelul Pământ (adânc). Ciclul descris imediat se repetă de câteva ori, până la apariția senzației de rece. Dacă senzația de rece nu apare, ciclul de stimulare se repetă peste o pauză de 5 minute.
- A cincea etapă – acul se extrage lent în timpul când pacientul expiră.
- A șasea etapă – după extragerea acului porul se lărgiște prin rotirea acului și se lasă deschis.

Tehnica de armonizare în sindroamele mixte (Insuficiență-Exces) și sindroamele neclare

- Acul se introduce perpendicular, între inspirație și expirație.
- Se efectuează mișcări întâmplătoare de "dute-vino" și rotație (orar-antiorar).
- Acul se extrage forțat (până la straturile superficiale) și se introduce încet, apoi după o pauză acul se extrage încet și se introduce forțat.
- Acul se extrage complet între inspirație și expirație.

Este cunoscut faptul că la baza acupuncturii tradiționale stă o experiență empirică milenară, de o mare importanță practică. În publicațiile moderne, pentru a reda principiile de diagnostic și tratament ale acupuncturii tradiționale, sunt folosiți termeni, denumiri de maladii, simptome și sindroame cu caracter arhaic, care însă cu siguranță sunt înțelese de medicii calificați ce posedă acupunctura tradițională.

În volumul II al tratatului diagnosticul și tratamentul afecțiunilor sunt prezentate prin descrierea concisă a unor modele tipice. Semnele și simptomele afecțiunilor în cadrul unui model sunt descrise succint, fără specificarea detaliată a întregului tablou clinic. Cu toate acestea, simptomele prezentate sunt suficiente pentru efectuarea diagnosticului diferențiat al diferitelor modele în cadrul unei unități nosologice. Acest diagnostic este asigurat prin prezentarea simptomelor "cheie", a particularităților tabloului lingual și a pulsului.

Pentru ilustrare aducem un exemplu clinic.

Bolnava (32 ani) suferă de cefalee pe parcursul a 7 ani, cu acutizări periodice induse de stările emoționale negative și oboseală. În ultimii 3 ani a lucrat fără concediu și a susținut examene la Universitate. Durerile sunt localizate în regiunea temporo-parietală și vertex, au un caracter spasmodic, cu ameliorare la presare. Periodic apar dureri occipitale, care se agravează la presare (în special este dureroasă zona punctului VB20 Fengchi, la presarea căruia durerea iradiază spre ochi). Bolnava acuză vertij, diminuarea apetitului, greață, vomă, gust amar, scaune uscate, constipație, insomnie, palpitații. Pielea este palidă. Menstruațiile sunt regulate, profuze. Bolnava

suferă pe parcursul a 8 ani de gastrită cronică. Limba este palidă, cu depozit galben și gras, cu amprente dentare. Pulsul este întins, filiform și alunecos.

După cum se vede, în acest caz sunt prezente mai multe sindroame, printre care se evidențiază câteva direcții mai importante.

Prima – emoțiile și stresurile au tulburat curgerea fluentă a Qi-ului Ficatului (stagnarea Qi) cu apariția hiperactivității Yang-Qi a Ficatului (cefalee în regiunea vertexului, scaune uscate, menstrue profuze etc.). Hiperactivitatea Yang-Qi duce la disfuncția Veziculei Biliare (conform legăturii Exterior-Interior) și apariția gustului amar, cefaleei temporale. Pe de altă parte, apare disfuncția Splinei și a Stomacului (greață, vomă etc.).

A doua direcție etiopatogenică este cauzată de oboseala cronică (care duce la consumul exagerat de Qi și Xue) în asociere cu gastrita cronică (tulburarea funcțiilor de "transformare și transportare"). Acești factori duc la apariția Insuficienței Qi și Xue (piele și limbă palide, puls filiform etc.). Insuficiența Qi și Xue în mod inevitabil duce la diminuarea alimentației țesuturilor cu apariția tulburărilor din partea organelor. În acest caz concret apar tulburări din partea Inimii (palpitații, tulburări ale somnului etc.) și cefaleea (de tip Insuficiență). Așadar, în cazul expus sunt două sindroame de bază – hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului și Insuficiența Qi și Xue.

Analizând caracterul și localizarea cefaleei, se poate ajunge la concluzia că ea este de natură Insuficiență (durere timp de 7 ani, ameliorare la presare etc.) și periodic de tip Exces (spasme cu greață, agravare la presare etc.). Această afectare se referă la Shao-Yang și Tai-Yang. După cum se vede în cazul expus, cefaleea este cauzată de diferiți factori patogeni, tabloul clinic fiind complex.

Complexitatea tabloului clinic determină strategia și tactica tratamentului în cazul concret.

Un rol important revine asocierii punctelor de acupunctură în conformitate cu viziunea tradițională. De menționat că din multitudinea de puncte au fost selectate doar cele cu eficacitate curativă mai importantă și utilizare mai frecventă în cadrul modelelor prezentate. Numeroasele variante de formule sunt bazate pe următoarele principii de asociere a acupunctelor: anterior-posterior, sus-jos, dreapta-stânga, superficial-profund, intern-extern, local-distal.

- *Anterior-posterior.* Conform acestui principiu, se asociază punctele localizate pe suprafața anterioară a trunchiului (Yin) cu cele localizate pe suprafața posterioară (Yang). Drept exemplu poate servi metoda de asociere a punctelor de asentiment (Shu-post.) cu punctele de alarmă (Mu-ant.). În afară de aceasta, se pot folosi punctele sindromale și simptomatice localizate pe suprafața anterioară și posterioară a trunchiului. Este efectivă și folosirea, conform indicațiilor, asocierii de puncte localizate pe meridianul Guvernator și de Concepție.
- *Sus-jos.* Acest principiu presupune asocierea punctelor localizate

în partea de sus a corpului (Yang) cu cele localizate în partea de jos (Yin). De exemplu, în cefalee cu vertij (Vânt al Ficatului) poate fi aplicată formula bazată pe principiul sus-jos: VB20 + F3; în caz de tulburări gastrice – MC6 + E36 etc.

- *Dreapta-stânga*. Punctele localizate din dreapta aparțin Yin-lui, punctele din stânga – Yang-lui. Folosirea acestui principiu de asociere a punctelor permite reechilibrarea energetică în caz de perturbare dreapta-stânga.

Acest principiu este folosit în patologii cu localizare asimetrică (paralizie facială, nevralgie de trigemen etc.). Principiul dreapta-stânga poate fi realizat simetric (E36 Zusanli bilateral în caz de tulburări gastrice) sau asimetric (GI4 Hegu din dreapta în asociere cu F3 Taichong din stânga în nevralgie facială).

- *Superficial-profund*. Acest principiu constă în asocierea punctelor localizate pe meridianele Yin cu cele localizate pe meridianele Yang conform regulii Biao-Li. Formulele și metodele de stimulare a acupunctelor au fost expuse în compartimentele anterioare ale tratatului. Însă acest principiu se poate realiza nu numai folosind punctele Lo și Yuan, ci și alte puncte, reieșind din funcția lor energetică și particularitățile maladiei.
- *Intern-extern*. Conform acestui principiu, se asociază punctele localizate pe suprafața externă a corpului (Yang) cu cele localizate pe suprafața internă (Yin). Exemplu de asociere a acupunctelor: MC5 + TR6; MC6 + TR5; VB34 + RP9; E36 + RP6; E34 + RP10 etc.
- *Local-distal*. Acest principiu de asociere a punctelor este foarte des aplicat în diferite afecțiuni. În cazurile când patologia este localizată în regiunea cefalică, membrele superioare și inferioare, punctele locale sunt punctate înaintea celor distale. De exemplu, în algii cervico-brahiale sunt aplicate punctele locale (puncte dureroase Ashi) în asociere cu punctele distale (în funcție de localizarea durerii de-a lungul meridianelor principale: Plămân – Ashi + P10; Intestin Gros – Ashi + GI4; Trei Focare – Ashi + TR3; Intestin Subțire – Ashi + IG4; Inimă – Ashi + C8). În afectarea organelor interne (Zang și Fu) punctele distale sunt punctate înaintea celor locale (în dureri abdominale la început se punctează punctul E36 Zusanli, apoi – E25 Tianshu).
- *Asimetric*. Un principiu important este asocierea asimetrică a acupunctelor (stânga-dreapta, sus-jos). Experiența milenară a demonstrat o eficiență înaltă a acestui principiu. Punctarea asimetrică este efectivă în aplicarea punctelor cheie și de legătură a meridianelor curioase. Însă practica empirică a evidențiat și alte asocieri de acupuncte efective în tratamentul maladiilor prin metoda punctiei asimetrice. Aplicarea practică reiese din particularitățile maladiei și funcțiile energetice ale acupunctelor. În caz de algii alegerea acupunctelor este efectuată reieșind din localizarea durerii: puncte în zona dureroasă și puncte localizate

contralateral (pe partea nedureroasă). Puncția asimetrică se realizează reieșind din natura punctelor indicate (Yin sau Yang): punctele Yin se puntează din stânga (partea organismului care se referă la Yang), punctele Yang se puntează din dreapta (se referă la Yin). Punctarea acupunctelor în funcție de localizarea lor (sus-jos) și sexul pacientului se realizează în felul următor: la bolnavii de sex masculin punctele localizate pe membrele superioare se puntează din stânga; la pacienții de sex feminin punctele localizate pe membrele superioare se puntează din dreapta. Punctarea punctelor localizate pe membrele inferioare se efectuează în mod invers (la bărbați se puntează din dreapta, la femei — din stânga). Câteva exemple care ilustrează acest principiu. În caz de nevralgie de trigemen (sex feminin) cu localizarea durerii în dreapta (Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor) tratamentul se efectuează prin stimularea punctului G14 Hegu (din dreapta) în asociere cu punctul F3 Taichong (din stânga) și bilateral RP6 + R3. În caz de impotență, iritabilitate și anxietate (Insuficiența Rinichilor, Stagnarea Qi a Ficatului) tratamentul se efectuează prin stimularea punctului IG3 Houxi (din stânga) în asociere cu V62 Shenmai (din dreapta) și în scopul echilibrării energetice se stimulează punctul C7 Shenmen (din dreapta) în asociere cu F3 Taichong (din stânga); bilateral se folosește punctul R3 Taixi.

În practica cotidiană medicul nu se va limita numai la aplicarea metodelor și principiilor tradiționale ale acupuncturii, ci le va completa în mod obligatoriu cu cele contemporane. În acest context este importantă cunoașterea posibilităților influenței reflectorii a acupuncturii asupra funcțiilor organelor interne (luând în considerare corelațiile viscerocutanate, somatoviscerale, visceroviscerale și alte corelații din organism). Bazându-ne pe cele expuse, la alcătuirea rețelei acupunctice vor fi incluse puncte cu acțiune locală, segmentară, generală și de asemenea puncte și zone de hiperalgie, chiar dacă cele din urmă nu vor coincide ca localizare cu punctele de acupunctură. La selectarea punctelor se va lua în considerare și inervația polisegmentară a organelor interne:

inima	Th1-Th5, C2-C5;
plămânii și bronhiile	Th1-Th9, C2-C5;
esofagul	Th4-Th6, C2-C5;
stomacul	C2-C5;
partea cardiacă	Th5-Th7;
corpul	Th7-Th8;
pilorisul	Th8-Th9;
duodenul, intestinul subțire, segmentul ascendent al intestinului gros	Th9-L1;
segmentul descendent al intestinului gros, rectul	L1-L3, S1-S5;
ficatul, vezicula biliară	Th7-Th11, C2-C5;
pancreasul	Th8;

rinichii și ureterele	Th8-L2;
vezica urinară (corpul)	Th12-L2;
vezica urinară (sfincterul)	S2-S4;
prostata	Th10-Th12, S1-S2;
uterul	Th12-L3.

În procesul de asociere a acupunctelor pentru tratament se va ține cont de zonele de suprapunere a inervației vegetative și somatice. De exemplu: inervația vegetativă a capului și gâtului provine din segmentele C8-Th3, totodată aceleași segmente ale sistemului nervos somatic inervează preponderent mâna. Astfel, devine clar de ce folosind punctele de acupunctură plasate pe mână putem influența patologia gâtului și a capului. Analog explicăm influența prin stimularea punctelor de pe mână asupra sistemului cardiovascular: inervația cordului este efectuată de către neuronii simpatici postganglionari ai segmentelor C3-C4 și Th1-Th5. Aceste segmente participă la inervația mâinii. Ganglionul stelat participă la inervația vegetativă atât a mâinii, cât și a cordului. Anume aceste legături explică, în caz de ischemie acută a cordului, senzațiile algice pe traseul nervului ulnar, unde se proiectează meridianul Cord. Cunoașterea interrelațiilor de acest gen ne permite să influențăm funcția vegetativă a organelor interne, acționând asupra anumitor porțiuni de pe suprafața corpului uman.

Ca exemplu de aplicare a inervației segmentare la alcătuirea rețelei acupunctice vom prezenta retenția urinară provocată de spasmul sfincterului uretrei. În cazul acesta se va produce supraumplerea, iar apoi atonia vezicii urinare. Tratamentul acestei stări va consta în dispersia punctelor localizate în zona de inervație segmentară a sfincterului (S2-S4) – V31 Shangliao, V32 Ciliao, V33 Zhongliao, V34 Xialiao, apoi tonifierea punctelor localizate în zona de inervație a corpului vezicii urinare (Th12-L2) – R13 Qixue, R14 Siman, R15 Zhongzhu.

Pentru a alcătui o rețetă conform principiilor inervațiilor segmentare, se va lua în considerare informația prezentată în volumul I al tratatului, cât și corelațiile morfofuncționale dintre diferite structuri encefalice. De exemplu, în afecțiunile bronhiilor și ale plămânilor se va ține cont de faptul că inervația acestor organe este efectuată de ganglionii spinali C2-C5 (*n.phrenicus*), Th1-Th9 și de *n.vagus*. Prin urmare, în rețetă vor fi incluse punctele localizate în zona segmentelor respective (locale – P1 Zhongfu, E12 Quepen, V13 Feishu ș.a.; distale – P5 Chize, P11 Shaoshang, GI4 Hegu, GI10 Shousanli, MC5 Jianshi ș.a), iar pentru a influența *n.vagus* vor fi stimulate punctele de acupunctură amplasate în zona de inervație a *n.trigeminus*, ce are, prin intermediul formației reticulare a trunchiului cerebral, corelații funcționale strânse cu *n.vagus*.

Analiza minuțioasă a etiopatogenezei și a manifestărilor afecțiunii în fiecare caz concret va permite alegerea argumentată a punctelor de acupunctură, luând în considerare atât informația bazată pe

empirismul acupuncturii tradiționale, cât și informația obținută în domeniul acupuncturii științifice moderne.

În tratat acupunctura este expusă fără asociere cu alte tipuri de tratament. Aceasta însă nu înseamnă că acupunctura este recomandată în toate cazurile ca monoterapie. Tratamentul asociat se indică în fiecare caz aparte, reieșind din scopurile lui, particularitățile pacientului, faza maladiei și metodele asociate (psihoterapia, fizioterapia, kinetoterapia, farmacoterapia etc).

III

Opt principii de diferențiere a sindroamelor

- III.1. Yin-Yang**
- III.2. Insuficiență-Exces**
- III.3. Frig-Căldură**
- III.4. Interior-Exterior**

III.1. Yin-Yang

Diagnosticul clinic

Yang și Yin sunt două categorii de simptome și fenomene opuse ca sens. În cadrul celor opt reguli diagnostice Yang corespunde Căldurii, Plenitudinii, Exteriorului, în timp ce Yin corespunde Frigului, Insuficienței și Interiorului. Yang corespunde unui proces acut, Yin corespunde unui proces cronic.

În funcție de raportul Yin-Yang se evidențiază patru sindroame principale: Excesul Yang-Qi; Insuficiența Yang-Qi; Excesul Yin-Qi; Insuficiența Yin-Qi.

Evidențierea acestor sindroame se efectuează folosind metodele tradiționale de diagnostic clinic: anamneza, inspecția, auscultația, palparea, aprecierea mirosului etc.

În procesul diagnosticului diverselor maladii o mare importanță are aprecierea tipului constituțional și temperamental al pacientului.

Individ de tip Yang: activ; musculatura bine dezvoltată, mers sigur, gestică bogată și fermă, instalare sigură și confortabilă pe scaun; voce puternică; poziție a poligonului de susținere cu vârfurile picioarelor îndreptate în afară; extensie a corpului ("cu pieptul înainte").

Individul de tip Yin: hipoactiv, obez; mers nesigur, gestică săracă și obosită, așezare nesigură pe marginea scaunului; voce slabă; poziție a poligonului de susținere cu vârfurile picioarelor îndreptate înăuntru; flexie anterioară a corpului.

Este importantă evidențierea tulburărilor Yin-Yang generale (la nivelul întregului organism), regionale, locale sau în diferite organe interne.

Un grad pronunțat de Insuficiență Yin sau Yang se manifestă prin apariția sindromului de colaps Yin sau Yang.

Colapsul Yin-Qi – transpirație profuză; membre calde, piele fierbinte la palpare; gură uscată, cu dorință de a bea lichide reci (în cantități mici), constipație; retenție de urină. Limba – roșie și uscată. Pulsul – rapid.

Colapsul Yang-Qi – membre reci, senzație de frison; respirație slabă; transpirație profuză, lipicioasă; absența setei; scaune moi (posibil incontinență); urinare frecventă și profuză (posibil incontinență). Limba – palidă, umedă. Pulsul – gol, slab.

În tulburările externe și interne importanța simptomelor în diferențierea Yin-Yang este diferită. Un rol deosebit pentru diagnosticul tulburărilor locoregionale externe au indicii homeostaziei termice în asociere cu palparea pulsurilor radiale.

Excesul Yang în partea superioară a corpului: senzație de căldură

în regiunea feței și a capului; senzație de rece în membrele inferioare. Pulsurile Yang ale meridianelor membrelor superioare (TR, GI, IG) sunt mai puternice decât pulsurile Yang ale meridianelor membrelor inferioare (E, VB, V).

Excesul Yang în partea inferioară a corpului: senzație de căldură în membrele inferioare concomitent cu senzație de rece în regiunea cefalică și a feței. Pulsurile Yang ale meridianelor membrelor inferioare (E, VB, V) sunt mai puternice decât pulsurile Yang ale meridianelor membrelor superioare (TR, GI, IG).

Excesul Yin în partea superioară a corpului: fața palidă, membre superioare reci (mai reci în comparație cu picioarele). Pulsurile Yin ale meridianelor membrelor superioare (MC, P, C) sunt mai puternice în comparație cu pulsurile Yin ale membrelor inferioare (RP, F, R).

Excesul Yin în partea inferioară a corpului: membre inferioare reci (mai reci decât mâinile). Pulsurile Yin ale meridianelor membrelor inferioare (RP, F, R) sunt mai puternice în comparație cu pulsurile Yin ale meridianelor membrelor superioare (MC, P, C).

Din punct de vedere practic este important depistarea tulburărilor generale la nivelul organismului și tulburărilor locale (tab. 7, 8). O deosebită importanță diagnostică are clasificarea durerii, fiind cel mai frecvent fenomen clinic, în tip Yang și Yin. Cele 10 criterii de bază sunt următoarele:

<i>Durere Yang</i>	<i>Durere Yin</i>
Recentă	Veche
Superficială	Profundă
Agravată la mișcare	Ameliorată la mișcare
De tip violent	De tip contuzie
Localizată	Difuză
Migratoare	Fixă
Intermitentă	Permanentă
Agravată în cursul zilei	Agravată în cursul nopții
Cu hipertonus	Cu hipotonus, pareză
Fără edem	Cu edem

În practica de aplicare a acupuncturii se atestă cazuri când la același bolnav unele simptome indică asupra Excesului Yin și, concomitent, altele asupra Excesului Yang. În asemenea cazuri este posibilă existența stăgnării Yin sau Yang (tab. 9, 10). După cum se vede din datele expuse, în procesul diagnosticului se i-au în considerare următoarele criterii de bază:

- caracterul durerii (Yin sau Yang);
- influența temperaturii (corespunde sindromului Excesul Yin – ameliorare la cald și agravare la rece; indiferent de natura sindromului algic – Yin sau Yang);

Tabelul 7.

Diferențierea Excesului Yang și Insuficienței Yang

Criteriile	Excesul Yang	Insuficiența Yang
Psihismul	Potențial energetic înalt, iritabilitate, delir, tulburări de somn cu neliniște, dificultate la adormire	Scădere a potențialului energetic, indiferență, somnolență, tulburări de somn pe fond de astenie, oboseală și apatie
Homeostazia termică	Senzație de căldură, hipertermie; bolnavul preferă băuturi reci, aer rece și evită căldura	Membre și corp reci, aversiune la frig, preferă haine calde, mâncare și băuturi calde, posibil frison
Hiperhidroza	Profuză în asocierie cu hipertermia, sete pronunțată	Spontană ori la eforturi neînsemnate, sudoare rece. Posibilă hiperhidroza spontană în asocierie cu lipsa setei; transpirație mucoidă, lipicioasă
Apetitul, setea	Necesitatea de a consuma băuturi reci; greață, vomă; gust dulce, amar sau acru în gură; uscăciunea gurii, ulceratii, gingivită, stomatită	Apetit scăzut, hipersalivație, pierdere ponderală, necesitatea de băuturi calde
Defecația	Constipație sau scaun fierbinte, senzație de arsură în anus, durere în abdomen, uneori scaun cu sânge	Scaun moale (mai ales dimineața) sau scaun cu mâncare nedigerată, balonări abdominale după mâncare
Respirația, tusea	Tuse cu eliminări de spută galbenă ori sangvinolentă, dispnee, epistaxis cu sânge fierbinte, nas uscat	Respirație dificilă, dispnee la eforturi fizice mici
Urinarea	Urină de culoare galbenă, durere sau arsură în uretră, posibil hematurie	Urină de culoare deschisă
Menstre	Dureroase, neregulate (apar în avans), miros neplăcut al eliminărilor	Dureroase (dureri difuze și adânci în abdomenul inferior)
Durerea	De tip Yang, presăția și căldura agravează durerea; frigul diminuează durerea	De tip Yin (Yin-ul predomină relativ asupra Yang-ului). Durerea diminuează la presăție în zona dureroasă și la aplicarea de căldură
Pielea	Roșie, hiperemie cu hipertonus, elastică	Palidă cu elemente de cianoză, piele atonă, edeme de consistență moale
Fața	Hiperemie, buze roșii, ochi vioi și expresivi	Palidă, buze palide sau cianotice, ochii oșiți; edem
Limba	Roșie-închis sau cu puncte roșii, depozitul galben, gros și uscat	Palidă și umedă, depozit alb și subțire
Pulsul radial	Plin (Shi mai), întins (Huan mai), superficial (Fu mai), vast (Hong mai), rapid (Shu mai), grăbit (Cu mai). Pulsul la nivelul Cun este mai puternic decât la nivelul Guan și Chi	Gol (Xu mai), slab (Ruo mai), profund (Chen mai), lent (Chi mai). Pulsul la nivelul Cun este mai slab decât la nivelul Guan și Chi

Tabelul 8.

Diferențierea Excesului Yin și Insuficienței Yin:

Criteriile	Excesul Yin	Insuficiența Yin
Psihismul	Dispoziție subdepresivă; tulburări de somn cu simptome de oboseală, somnolență; senzație de greutate în corp	Anxietate, diminuarea memoriei; insomnie (tulburările de somn se asociază cu vertij, tinitus)
Homeostazia termică	Senzație de rece în corp și membre, bolnavul evită frigul și preferă căldura	Căldură în "cinci inimi", senzație de căldură care pleacă din interiorul oaselor spre exterior
Hiperhidroza	De regulă, nu se manifestă	Transpirații în timpul somnului, care se opresc la trezire, transpirație caldă și sărată
Apetitul, setea	Bolnavul preferă băuturi calde, însă bea în cantități mici; hiper-salivație, regurgitație a sucului gastric	Senzație de foame fără dorință de a mânca, gâtul și gura uscate
Defecația	Diaree rece, scaun lichid ori moale	Scaun uscat
Respirația, tusea	Senzație de greutate și rece în cutia toracică, rinoree, tuse cu eliminări de spută, dispnee	Nas uscat, afonie, dureri în gât și regiunea retrosternală (cu agravare spre seară), tuse fără eliminări de spută sau spută lipicioasă, sangvinolentă
Urinarea	Poliurie, urină clară fără miros	Urină de culoare galbenă, în cantitate redusă
Menstre	Dismenoree (cu întârzierea ciclului, ciclu de lungă durată) cu senzație de rece în abdomenul inferior	La intervale mari (mai mari de 28 zile), oligomenoree
Durerea	De tip Yin. Bolnavii preferă căldura; presația și frigul intensifică durerea	De tip Yang. Frigul diminuează durerea. Durerea poate apărea în urma uscăciunii mucoaselor (gât, regiunea retrosternală, abdomen)
Pielea	Palidă, cu cianoză, infiltrație sau edeme	Hiperemie ușoară
Fata	Palidă, cu cianoză, privire obosită	Roșeață malară
Limba	Palidă, umedă, cu depozit gros și alb	Roșie, uscată, fără depozit (limbă cheală) sau depozit în cantități foarte mici; posibili fisuri
Pulsul radial	Plin (Shi mai), profund (Chen Mai), încordat (Jin mai), lent (Chi mai), înnodat (Jie mai). Pulsul la nivelul Chi este mai puternic decât la nivelul Cun și Guan	Superficial (Fu mai), gol (Xu mai), subțire (Xi mai), moale (Ru mai), rapid (Shu mai). Pulsul la nivelul Chi este mai slab decât la nivelul Cun și Guan

Diferențierea stagnării Yin-Yang

Tabelul 9.

Criterii	Stagnarea Yang	Stagnarea Yin
Tipul durerii	Tip Yang	Tip Yin
Presația în zona dureroasă	Nu schimbă esențial durerea	Nu schimbă esențial durerea
Aplicarea căldurii, masajul, mișcarea	Diminuează durerea	Diminuează durerea
Aplicarea frigului, repausul	Agravează durerea	Agravează durerea

Diagnosticul diferențiat al sindroamelor Yin-Yang la aplicarea locală de rece sau cald

Tabelul 10.

Aplicarea locală	Insuficiența Yin	Excesul Yin	Insuficiența Yang	Excesul Yang	Stagnarea (Yin sau Yang)
Rece	-	+	+	-	+
Cald	+	-	-	+	-

Notă: (+) – agravare a sindromului; (-) – ameliorare a sindromului.

- influența presației și masajului (presația în zona afectată nu influențează esențial asupra manifestării durerii, pe când masajul poate ameliora starea bolnavului);
- influența mișcării și repausului (mișcarea ameliorează durerea, pe când repausul agravează).

Eficacitatea diagnosticului și tratamentului dezechilibrului Yin-Yang în mare măsură depinde de aprecierea corectă a pulsului radial. Adeseori prin intermediul palpării pulsului radial se precizează dezechilibrul energetic, care nu se poate deduce prin alte metode de diagnostic energetic.

Pentru bolnavii cu tulburări Yang pulsurile radiale au următoarele caracteristici:

- pulsurile din dreapta sunt mai mari decât pulsurile din stânga;
- pulsurile superficiale sunt mai mari decât pulsurile profunde;
- pulsurile superioare (nivelul Cun) sunt mai mari decât pulsurile inferioare (nivelul Guan și Chi);
- frecvența pulsului este mai mare;
- unda sistolică este mai mare comparativ cu unda diastolică.

Caracteristica pulsului radial la bolnavii cu tulburări de tip Yin:

- pulsurile din stânga sunt mai mari decât pulsurile din dreapta;
- pulsurile profunde sunt mai mari decât pulsurile superficiale;
- pulsurile inferioare (nivelul Chi) sunt mai mari decât pulsurile superioare (nivelul Cun și Guan);
- frecvența pulsului este mai mică;
- unda diastolică este mai mare comparativ cu unda sistolică.

Pentru diagnosticul tulburărilor energetice generale și locale este necesar de a evidenția particularitățile pulsului radial conform concepției celor 5 elemente, meridianelor și organelor (Zang, Fu): pe artera radială din dreapta se proiectează elementul Metal (GI, P la nivelul Cun), elementul Pământ (E, RP la nivelul Guan) și elementul Foc (TR, MC la nivelul Chi). În unele opere antice la nivelul Chi sunt proiectate pulsurile R-Yang și TR; pe artera radială din stânga se proiectează elementul Foc (IG, C la nivelul Cun), elementul Lemn (VB, F la nivelul Guan) și elementul Apă (V, R la nivelul Chi). La toate nivelele pulsului radial la suprafață se proiectează meridianele Yang, viscerele Fu, exteriorul (Yang) și partea dorsală a organismului (Yang). La toate nivelele pulsului radial în adâncime se proiectează meridianele Yin, organele Zang, interiorul (Yin) și partea ventrală a organismului (Yin).

Tratamentul

În funcție de rezultatele diagnosticului efectuat se realizează tratamentul acupunctic, folosind diferite procedee și metode. Este necesară aplicarea corectă a diferitelor puncte de acupunctură cu acțiune asupra Energiei Yin-Yang.

Puncte majore de reuniune Yin-Yang

Folosirea acestor puncte (reuniunea Energiei Yang: GI4 Hegu, VG13 Taodao, VG19 Houding; reuniunea Energiei Yin: V17 Geshu) face posibilă influențarea echilibrului Yin-Yang în regiuni mari ale organismului. Mai efective ele sunt în debutul maladiilor, acționând similar punctelor cheie ale meridianelor curioase. Efectul de tonifiere este mai pronunțat decât cel de dispersie.

Puncte cheie ale meridianelor curioase

Punctele cheie sunt de natură Yang (patru puncte) și de natură Yin (patru puncte) cu funcții energetice foarte importante. Ele sunt situate simetric în cele patru cadrane ale corpului:

<i>Punctele cheie</i>	<i>Cadrantul corpului</i>	<i>Acțiunea asupra Energiei Yin-Yang</i>
MC6 – P7	Antero-superior	Yin
TR5 – IG3	Postero-superior	Yang
R6 – RP4	Antero-inferior	Yin
V62 – VB41	Postero-inferior	Yang

În caz de tonifiere a punctelor cheie cu acțiune asupra Energiei Yang se tonifică Yang-ul și se dispersează Yin-ul; în caz de dispersie (în Excesul Yang) se manifestă un efect mai puțin pronunțat (tonifică Yin-ul).

La bolnavii cu Exces Yang tonifierea punctelor cheie cu acțiune asupra Energiei Yin tonifică Yin-ul și dispersează Yang-ul. La bolnavii cu Exces Yin dispersia acestor puncte tonifică Yang-ul și dispersează

Yin-ul, însă efectul obținut este mai puțin pronunțat decât în cazul tonifierii lor.

Puncte ale meridianelor Pericard și Trei Focare

Pentru a realiza o corecție efectivă a tulburărilor enegetice Yin-Yang este necesară evidențierea stării enegetice a meridianelor Pericard ("mama" Energiei Yin) și Trei Focare ("tatăl" Energiei Yang). La bolnavii cu Insuficiența Pericardului (hipotensiune arterială, diminuarea potenței sexuale, frigiditate, astenie etc.) este necesară tonifierea punctului MC9 Zhongchong (punct de tonifiere) în asocieri cu MC7 Daling (punct Yuan). În caz de Exces al Pericardului (hipersexualitate, ninfomanie, hipertensiune arterială, neliniște etc.) este necesară dispersia punctului MC7 Daling (punct sedativ), care în același timp este și punct Yuan.

Tulburările Yin-Yang la bolnavii cu Exces a Trei Focare (dereglări respiratorii, polifagie, sete, constipație sau diaree, urini hiperchrome sau poliurie, neliniște etc.) necesită tratamentul cu aplicarea punctului sedativ (TR10 Tianjing) în asocieri cu punctul Yuan (TR4 Yangchi). La bolnavii cu Insuficiența a Trei Focare (respirație diminuată, astenie, digestie proastă, poliurie etc.) este indicată tonifierea punctului TR3 Zhongzhu (punct de tonifiere) în asocieri cu punctul Yuan (TR4 Yangchi).

O mare importanță diagnostică are depistarea particularităților pulsului radial în conformitate cu concepția a Trei Focare: pulsurile la nivelul Cun corespund cu Focarul Superior, pulsurile la nivelul Guan corespund cu Focarul Mijlociu și pulsurile la nivelul Chi corespund cu Focarul Inferior. În toate cazurile în mod obligatoriu se ține cont și de simptomatologia prezentă.

Puncte Lo generale

Această categorie de puncte este folosită mai efectiv prin tonifiere și deci ele sunt indicate mai ales în sindromul de Insuficiență.

Punctele Lo generale fac legătură cu mai multe meridiane, având funcții enegetice duble sau triple:

<i>Punct Lo general</i>	<i>Alte funcții enegetice</i>
MC6 Neiguan	Punct Lo ordinar al meridianului Pericard; punct cheie al meridianului curios Yin Wei Mai.
TR5 Waiguan	Punct Lo ordinar al meridianului Trei Focare; punct cheie al meridianului curios Yang Wei Mai.
P7 Lieque	Punct Lo ordinar al meridianului Plămân; punct cheie al meridianului curios Ren Mai.
VC1 Huiyin	Punct Lo al meridianului curios Ren Mai.
VG1 Changqiang	Punct Lo al meridianului curios Du Mai.
RP21 Dabao	Punct Lo al meridianului Lo longitudinal Splină-Pancreas; punct de susținere și reglare Qi în Trei Focare.

O importanță mare în reechilibrarea energetică Yin-Yang au punctele VG1 Changqiang și VC1 Huiyin. Stimularea acestor puncte (dispersie sau tonifiere în funcție de tipul dezechilibrului energetic) favorizează restabilirea echilibrului energetic Yin-Yang la început în meridianele curioase Ren Mai (controlează Energia Yin) și Du Mai (controlează Energia Yang), apoi și în meridianele principale. Meridianele curioase Ren Mai și Du Mai formează "mica circulație energetică", care are legături strânse funcționale cu "marea circulație" a celor 12 meridiane principale. În cazul când pulsul la nivelul Cun este mai puternic decât la nivelul Guan și Chi se dispersează punctul VG1 Changqiang și se tonifică punctul VC1 Huiyin; în cazul când pulsul la nivelul Chi este mai puternic decât la nivelul Cun și Guan se dispersează punctul VC1 Huiyin și se tonifică punctul VG1 Changqiang.

Puncte Lo de grupă

Funcția acestor puncte este unirea a câte trei meridiane de natură Yin sau Yang ale membrilor superioare și inferioare:

<i>Punctele Lo de grupă</i>	<i>Meridianele unite</i>
TR8 Sanyangluo	TR, IG, GI
MC5 Jianshi	MC, C, P
VB39 Xuanzhong	VB, V, E
RP6 Sanyinjiao	RP, F, R.

Înțeparea punctelor Lo de grupă realizează echilibrarea energetică conform principiului vaselor comunicante. Punctele Lo de grupă se folosesc cu succes pentru reechilibrarea tulburărilor generale în organism, a dezechilibrului energetic "sus-jos" sau "dreapta-stânga".

Puncte locoregionale

Aceste puncte sunt efective în tulburările Yin-Yang, care se răspândesc în anumite regiuni ale corpului:

<i>Regiunile corpului</i>	<i>Acțiunea asupra Energiei Yin-Yang</i>	<i>Acupunctele</i>
Superioară	Yang	GI4 Hegu
Superioară	Yin	MC6 Neiguan
Mijlocie	Yang	VC12 Zhongwan
Mijlocie	Yin	VC6 Qihai
Inferioară	Yang	E36 Zusanli
Inferioară	Yin	RP6 Sanyinjiao

Puncte Shu, Mu, Yuan

Punctele de asentiment (Shu-post.) și de alarmă (Mu-ant.) se aplică cu succes în tratamentul tulburărilor Yin-Yang ale organelor

interne. Punctele Shu-post. sunt situate pe ramura internă a meridianului principal Vezică. Prin intermediul acestor puncte este posibilă conexiunea directă cu Energia Yang a organelor Zang sau Fu. Când organul corespunzător se află în Exces, aplicarea dispersiei în punctele Shu-poster. se manifestă prin efect pronunțat de calmare, dispersie. Când organul corespunzător se află în Insuficiență energetică, stimularea punctelor Shu-post. duce la tonifierea organului. Efectul obținut în mare măsură depinde de conexiunile energetice ale punctelor Shu-post. cu meridianul curios Du Mai ("marea meridianelor Yang"). În afară de acțiunea asupra organelor interne, aceste puncte au o influență vădită și asupra structurilor sau funcțiilor legate de nucleul energetic al lojelor afectate. De exemplu, punctul V18 Ganshu (punct Shu al Ficatului) este indicat nu numai în tulburările organului Ficat, el se aplică cu succes și în afectarea ochilor, spasmelor musculare etc.

Punctele de alarmă (Mu-ant.) realizează o conexiune directă cu Energia Yin a organelor interne Zang și Fu. La stimularea acestor puncte în sindrom de Insuficiență se manifestă un efect similar celui al punctelor de tonifiere. Când există un sindrom de Exces, la stimularea acestor puncte se manifestă un efect de dispersie. Efectul energetic al punctelor de alarmă în mare măsură depinde de conexiunile lor cu meridianul curios Ren Mai ("marea meridianelor Yin").

Tabelul 11.

Asocierea punctelor de asentiment, punctelor de alarmă și a punctelor Yuan în tratamentul tulburărilor Yin-Yang ale organelor interne.

Meridiane	Puncte de acupunctură		
	Shu-post.	Mu-ant.	Yuan
Plămân	V13	P1	P9
Intestin Gros	V25	E25	GI4
Stomac	V21	VC12	E42
Splină-Pancreas	V20	F13	RP3
Inimă	V15	VC14	C7
Intestin Subțire	V27	VC4	IG4
Vezică	V28	VC3	V64
Rinichi	V23	VB25	R3
Pericard	V14	VC15	MC7
Trei Focare	V22	VC5	TR4
Veziculă Biliară	V19	VB24	VB40
Ficat	V18	F14	F3

Pentru amplificarea efectelor energetice se folosesc punctele Yuan ale meridianelor principale corespunzătoare (tab. 11). Tonifierea acestor puncte provoacă efect similar cu efectul punctului de tonifiere, iar dispersia acestui punct duce la efect asemănător cu cel al punctului de dispersie.

În medicina tradițională este cunoscut procedeul de reechilibrare energetică numit "schimbarea Yang-lui prin Yin" și "schimbarea Yin-lui prin Yang". De exemplu, punctele Shu-post. (spatele este Yang) sunt mai efective în tratamentul organelor Zang (de natură Yin). Pe de altă parte, punctele Mu-ant. (partea anterioară a corpului, care este Yin) sunt mai efective în tratamentul organelor Fu (de natură Yang). Punctele de alarmă ale Stomacului și Splinei joacă un rol deosebit în reechilibrarea energetică a organelor interne, primul (VC12 Zhongwan) fiind punct de comandă pentru Energia Yang a viscerelor (Fu), al doilea (F13 Zhangmen) – punct de comandă pentru Energia Yin a organelor Zang.

Puncte de deblocare energetică

În cazul când există un obstacol în circulația normală a Energiei apare o acumulare a Energiei până la locul de blocare și o insuficiență a ei distal de locul de blocare. De exemplu, în apariția unui obstacol în circulația Energiei Yang (de la cer spre pământ) la nivel de torace-abdomen se constată un surplus Yang în regiunea cutiei toracice și un deficit Yang la nivelul abdomenului etc. Reieșind din aceasta, în reechilibrarea energetică se folosesc anumite puncte cu efecte terapeutice de deblocare a Energiei Yin sau Yang:

<i>Acupuncte</i>	<i>Indicații</i>
V10 Tianzhu	acumularea Yang în regiunea cefalică și deficitul Yang în regiunea cutiei toracice.
GI15 Jianyu	surplusul Yang în regiunea membrilor superioare și deficitul Yang în regiunea cutiei toracice.
E27 Daju	Excesul Yang în regiunea cutiei toracice și Insuficiența Yang în regiunea abdominală.
E37 Shangjuxu	acumularea Energiei Yang în regiunea abdominală (și a cutiei toracice) și deficitul Yang în membrele inferioare.
VG20 Baihui	descendența sau prăbușirea Yang-ului (efectiv în proteze viscerale, hemoroizi etc. în vederea ascendenței Yang spre regiunea cefalică).
R6 Zhaohai	acumularea Energiei Yin în membrele inferioare și deficitul Yin în regiunea abdominală.
F14 Qimen	surplusul Yin în regiunea abdominală și deficitul Yin în regiunea cutiei toracice.
P2 Yunmen	Excesul Yin în regiunea cutiei toracice și Insuficiența Yin în membrele superioare.
IG17 Tianrong	acumularea Energiei Yin în regiunea cutiei toracice și deficitul Yin în regiunea cefalică.
MC1 Tianchi	Excesul Yin în regiunea cefalică și Insuficiența Yin în regiunea cutiei toracice (indicat în vederea descendenței Yin de la regiunea cefalică spre cutia toracică).

În afectarea membrilor superioare și inferioare cu apariția sindromului algic sunt indicate diferite puncte de acupunctură, în funcție de sindromul energetic Yin sau Yang (tab. 12).

Tabelul 12.
Punctele de acupunctură indicate în sindromul algic Yin-Yang al membrilor superioare și inferioare.

Sindromul algic	Acupunctele indicate în afectarea membrilor					
	Umăr	Cot	Pumn	Șold	Gambuchi	Glezna
Insuficiența Yang	IG11	TR13	GI8	V29	VB33	E37
Insuficiența Yin	P2	C6	MC4	RP11	R5	F6
Excesul Yang	GI15	TR7	GI6	E31	VB36	V63
Excesul Yin	MC2	C6	P6	F11	R5	RP8

La bolnavii cu stagnare energetică Yin sau Yang se aplică punctele de acupunctură cu efect de înlăturare a stărnării. De exemplu, în stărnarea Yang la nivelul membrilor superioare este efectiv punctul TR8 Sanyangluo, la nivelul membrilor inferioare – VB39 Xuanzhong; în stărnarea Yin la nivelul membrilor superioare sunt indicate punctele MC5 Jianshi; la nivelul membrilor inferioare – RP6 Sanyinjiao etc. La bolnavii cu stărnarea Yin în regiunea bazinului mic sunt indicate punctele VC6 Qihai, R13 Qixue; în caz de stărnare Yang la nivelul bazinului mic sunt efective punctele VB28 Weidao, V32 Ciliao. În toate cazurile de stărnare Xue este indicat punctul RP21 Dabao cu efect de propulsare a sângelui în capilare.

Individualizarea tratamentului

Pentru a obține rezultate terapeutice bune, reechilibrarea Yin-Yang în fiecare caz se efectuează individual. La bolnavii cu tulburări generale de tipul Exces Yang se tonifică punctele MC6 Neiguan și se dispersează punctele TR5 Waiguan, GI4 Hegu, V62 Shenmai, VB41 Zulinqi, IG3 Houxi. În caz de Exces Yin se tonifică punctele TR5 Waiguan, GI4 Hegu și se dispersează punctele MC6 Neiguan, RP4 Gongsun, R6 Zhaohai, P7 Lieque. Pentru reechilibrarea Yin-Yang în operele antice se recomandă așa-numita "formula mică" (MC6 + E36) și "formula mare" (MC6 + GI4 + VG20 + VG14 + E36).

În tab. 13 sunt redată schematic unele dintre punctele de acupunctură și metode de stimulare în funcție de sindromul local Yin sau Yang.

La bolnavii cu dezechilibrare Yin-Yang intricate eficacitatea tratamentului în mare măsură depinde de tactica corectă de aplicare a acupuncturilor și metodelor de stimulare. Sunt posibile patru variante de bază:

- *Tulburare locală Yang la un bolnav de tip Yang.* În scopul tratamentului este posibilă dispersia Yang în zona afectată și în zonele

În medicina tradițională este cunoscut procedeul de reechilibrare energetică numit "schimbarea Yang-lui prin Yin" și "schimbarea Yin-lui prin Yang". De exemplu, punctele Shu-post. (spatele este Yang) sunt mai efective în tratamentul organelor Zang (de natură Yin). Pe de altă parte, punctele Mu-ant. (partea anterioară a corpului, care este Yin) sunt mai efective în tratamentul organelor Fu (de natură Yang). Punctele de alarmă ale Stomacului și Splinei joacă un rol deosebit în reechilibrarea energetică a organelor interne, primul (VC12 Zhongwan) fiind punct de comandă pentru Energia Yang a viscerelor (Fu), al doilea (F13 Zhangmen) – punct de comandă pentru Energia Yin a organelor Zang.

Puncte de deblocare energetică

În cazul când există un obstacol în circulația normală a Energiei apare o acumulare a Energiei până la locul de blocare și o insuficiență a ei distal de locul de blocare. De exemplu, în apariția unui obstacol în circulația Energiei Yang (de la cer spre pământ) la nivel de torace-abdomen se constată un surplus Yang în regiunea cutiei toracice și un deficit Yang la nivelul abdomenului etc. Reieșind din aceasta, în reechilibrarea energetică se folosesc anumite puncte cu efecte terapeutice de deblocare a Energiei Yin sau Yang:

<i>Acupuncte</i>	<i>Indicații</i>
V10 Tianzhu	acumularea Yang în regiunea cefalică și deficitul Yang în regiunea cutiei toracice.
GI15 Jianyu	surplusul Yang în regiunea membrelor superioare și deficitul Yang în regiunea cutiei toracice.
E27 Daju	Excesul Yang în regiunea cutiei toracice și Insuficiența Yang în regiunea abdominală.
E37 Shangjuxu	acumularea Energiei Yang în regiunea abdominală (și a cutiei toracice) și deficitul Yang în membrele inferioare.
VG20 Baihui	descendența sau prăbușirea Yang-ului (efectiv în proteze viscerale, hemoroizi etc. în vederea ascendenței Yang spre regiunea cefalică).
R6 Zhaohai	acumularea Energiei Yin în membrele inferioare și deficitul Yin în regiunea abdominală.
F14 Qimen	surplusul Yin în regiunea abdominală și deficitul Yin în regiunea cutiei toracice.
P2 Yunmen	Excesul Yin în regiunea cutiei toracice și Insuficiența Yin în membrele superioare.
IG17 Tianrong	acumularea Energiei Yin în regiunea cutiei toracice și deficitul Yin în regiunea cefalică.
MC1 Tianchi	Excesul Yin în regiunea cefalică și Insuficiența Yin în regiunea cutiei toracice (indicat în vederea descendenței Yin de la regiunea cefalică spre cutia toracică).

În afectarea membrelor superioare și inferioare cu apariția sindromului algic sunt indicate diferite puncte de acupunctură, în funcție de sindromul energetic Yin sau Yang (tab. 12).

Tabelul 12.

Punctele de acupunctură indicate în sindromul algic Yin-Yang al membrelor superioare și inferioare.

Sindromul algic	Acupunctele indicate în afectarea membrelor					
	Umăr	Cot	Pumn	Șold	Genunchi	Glezna
Insuficiența Yang	IG11	TR13	GI8	V29	VB33	E37
Insuficiența Yin	P2	C6	MC4	RP11	R5	F6
Excesul Yang	GI15	TR7	GI6	E31	VB36	V63
Excesul Yin	MC2	C6	P6	F11	R5	RP8

La bolnavii cu stagnare energetică Yin sau Yang se aplică punctele de acupunctură cu efect de înlăturare a stăgnării. De exemplu, în stagnarea Yang la nivelul membrelor superioare este efectiv punctul TR8 Sanyangluo, la nivelul membrelor inferioare – VB39 Xuanzhong; în stagnarea Yin la nivelul membrelor superioare sunt indicate punctele MC5 Jianshi; la nivelul membrelor inferioare – RP6 Sanyinjiao etc. La bolnavii cu stagnarea Yin în regiunea bazinului mic sunt indicate punctele VC6 Qihai, R13 Qixue; în caz de stagnare Yang la nivelul bazinului mic sunt efective punctele VB28 Weidao, V32 Ciliao. În toate cazurile de stagnare Xue este indicat punctul RP21 Dabao cu efect de propulsare a sângelui în capilare.

Individualizarea tratamentului

Pentru a obține rezultate terapeutice bune, reechilibrarea Yin-Yang în fiecare caz se efectuează individual. La bolnavii cu tulburări generale de tipul Exces Yang se tonifică punctele MC6 Neiguan și se dispersează punctele TR5 Waiguan, GI4 Hegu, V62 Shenmai, VB41 Zulinqi, IG3 Houxi. În caz de Exces Yin se tonifică punctele TR5 Waiguan, GI4 Hegu și se dispersează punctele MC6 Neiguan, RP4 Gongsun, R6 Zhaohai, P7 Lieque. Pentru reechilibrarea Yin-Yang în operele antice se recomandă așa-numita "formula mică" (MC6 + E36) și "formula mare" (MC6 + GI4 + VG20 + VG14 + E36).

În tab. 13 sunt redată schematic unele dintre punctele de acupunctură și metode de stimulare în funcție de sindromul local Yin sau Yang.

La bolnavii cu dezechilibrare Yin-Yang intricate eficacitatea tratamentului în mare măsură depinde de tactica corectă de aplicare a acupunctelor și metodelor de stimulare. Sunt posibile patru variante de bază:

- *Tulburare locală Yang la un bolnav de tip Yang*. În scopul tratamentului este posibilă dispersia Yang în zona afectată și în zonele

"sănătoase", deci dispersia Yang se realizează în întregul organism.

- *Tulburare locală Yin la un bolnav de tip Yin*. Optimal este de a realiza tratamentul prin tonifierea Yang, atât în zona afectată, cât și în întregul organism.
- *Tulburare locală Yang la un bolnav de tip Yin*. În acest caz există un deficit Yang în general, iar apariția tulburărilor locale de tip Yang atrage după sine o concentrare a Energiei Yang la nivel de afectare și, respectiv, vidarea și mai profundă în restul organismului. Reieșind din aceste raționamente, tratamentul optimal trebuie început cu tonifierea Yang-ului în părțile "sănătoase" ale organismului (în părțile vidate de Yang).
- *Tulburare locală Yin la un bolnav de tip Yang*. La acest tip de bolnavi există un deficit de Yin în general. Tulburările locale de tip Yin sunt o consecință de concentrare Yin la nivelul afectării cu vidarea Yin a părților "sănătoase" ale organismului. Reieșind din acest mecanism, reechilibrarea se începe prin difuzia Energiei Yin din zona afectată. În acest scop se tonifică Yin-ul în părțile "sănătoase" ale corpului.

Tabelul 13.

Reechilibrarea Yin-Yang în tulburările locale

Localizarea tulburării	Punctele de acupunctură și metoda de stimulare			
	Excesul Yang		Excesul Yin	
	Plasarea punctelor	Tonifiere	Plasarea punctelor	Tonifiere
Partea superioară a organismului	Sus Jos	MC6, P7 VB39	Sus Jos	TR5, IG3 RP6
Partea inferioară a organismului	Jos Sus	RP4, R6 TR8	Jos Sus	VB41, V62 MC5
Partea dreaptă a organismului	Din stânga Din dreapta	TR8, VB39 MC5, RP6	Din stânga Din dreapta	MC6, RP6 TR8, VB39
Partea stângă a organismului	Din dreapta Din stânga	TR8, VB39 MC5, RP6	Din dreapta Din stânga	MC6, RP6 TR8, VB39

Alegerea punctelor necesare pentru reechilibrarea energetică în mare măsură depinde de gradul de sintetizare a informației obținute prin diferite metode de diagnostic, printre care luarea pulsului joacă un rol foarte important:

- în cazul dezechilibrului între pulsurile superficiale și profunde corelate cu simptomatologia afectării organelor interne în mod obligatoriu se folosesc punctele VC12 Zhongwan, F13 Zhangmen și punctele Shu, Mu, Yuan;
- în dezechilibrul pulsurilor superficiale și profunde corelate cu simptome de afectare a părților dorsale și ventrale ale organismului

se utilizează punctele VG4 Mingmen (comandă Energia Yang în partea dorsală) și punctele cheie ale meridianelor curioase IG3 Houxi (pentru partea dorsală), P7 Lieque (pentru partea ventrală);

- în dezechilibrul pulsurilor superioare și inferioare (nivelul Cun-Chi) se utilizează punctele locoregionale (în cazul afectării suprafețelor mai mari ale organismului) sau punctele Lo de grupă (în patologia meridianelor corespunzătoare);
- în dezechilibrul global al pulsurilor în asociere cu simptomatologia generală de afectare a organismului în întregime se folosesc punctele majore de reunire Yin-Yang, punctele cheie ale meridianelor curioase, punctele meridianelor Pericard și Trei Focare și punctele Lo generale.

Reechilibrarea Yin-Yang necesită un tratament complex în funcție de etiopatogenia maladiei, particularitățile constituționale și temperamentale ale bolnavilor. În funcție de calitățile Yin/Yang ale celor șase axe energetice (care la rândul lor sunt determinate de lojile energetice corespunzătoare) se poate da o caracteristică generală a temperamentelor:

<i>Axele energetice</i>	<i>Temperamentul</i>
Tai Yang (V + IG)	pasionat;
Shao Yang (VB + TR)	coleric;
Yang Ming (E + GI)	sanguin (flegmatic);
Tai Yin (P + RP)	amorf (apatic);
Jue Yin (MC + F)	nervos;
Shao Yin (C + R)	sentimental.

În linii generale la bolnavii cu Insuficiența Yin-Qi este indicată tonifierea Qi, fortificarea Yin-Qi, dispersia Focului și armonizarea psihicului. În caz de Insuficiență Yang-Qi tratamentul constă în tonifierea Qi, fortificarea Yang-Qi, dispersia Frigului și armonizarea psihicului. Alegerea acupunctelor în cazul când predomină semnele psihice se face ținând seama de etiopatogenia bolilor, însă întotdeauna, conform indicațiilor, sunt incluse punctele cu acțiune psihotropă pronunțată, localizate pe meridianul Inimă (în special punctul C7 Shenmen) și pe ramurile externe ale meridianului Vezică (punctele Shu psiho-dorsale – V42 Pohnu, V44 Shentang, V47 Hunmen, V49 Yishe, V52 Zhishi).

Este imposibilă schematizarea tratamentului tulburărilor generale și locale pentru toate cazurile clinice. Fiecare bolnav necesită un diagnostic minuțios și un tratament individual.

III.2. Insuficiență-Exces

Diagnosticul clinic

În general, sindromul de Exces este produs de tulburările exogene (Energia patogenă exogenă se adaugă Energiei endogene), însă poate apărea și sub acțiunea factorilor patogeni endogeni. Excesul se referă la un factor patogen și antipatogen violent (tab. 14). Sindromul de Insuficiență este produs de o tulburare endogenă (afectarea producției Energiei de întreținere) sau poate apărea în consecința intervenției Energiilor patologice-exogene. Sindromul de Insuficiență Qi și Xue poate apărea în urma malnutriției, acțiunii celor șapte emoții, oboselii, activității sexuale excesive, maladiilor cronice (mai ales, în urma unui tratament greșit).

Tabelul 14.
Simptomele clinice principale de tip Insuficiență și Exces

Criterii	Exces	Insuficiență
Psihismul	Nervozitate, agitație, delir	Astenie, apatie, scăderea capacității de concentrare
Vocea	Puternică	Slabă
Respirația	Zgomotoasă, astmatică	Slabă, scurtă
Durerea	Agravare la presiune	Ameliorare la presiune
Limba	Groasă, cu depozit gălbui și lipicios	Palidă, moale, cu depozit în cantitate redusă
Pulsul	Puternic, plin	Moale, slab

Pentru sindromul Insuficiență, în general, este caracteristică triada: (1) astenie (fizică și psihică), (2) față palidă, (3) puls slab și gol. În caz de Insuficiență Qi sunt caracteristice "două triade": (1) astenia, (2) față palidă, (3) puls slab și gol; (1) voce slabă, (2) hiperhidroză, (3) limbă palidă. La bolnavii cu Insuficiență Xue apar simptome ale Insuficienței în general și senzații de parestezii în membre, tulburări ale ciclului menstrual (amenoree etc.); limbă – palidă și subțire; puls – filiform și slab. În afectarea organelor interne la simptomele sus-numite ale Insuficienței Qi se asociază semnele de tulburare a funcției organului afectat. De exemplu, în afectarea Plămânilor se asociază tulburări de respirație, în afectarea Rinichilor – tulburări sexuale etc.

Tabloul clinic de Insuficiență și Exces Yin-Yang, Căldură-Frig este descris în alte compartimente ale tratatului.

Tratamentul

În medicina tradițională chineză tratamentul organelor și meridianelor corespunzătoare este posibil prin două căi: a) folosind acupuncte ale organului și meridianului afectat; b) folosind acupuncte ale organelor și meridianelor aflate în diferite relații energetice cu organul

și meridianul afectat. Regulile și tehnicile de bază în tratamentul sindromului Insuficiență sau Exces la bolnavii cu afectarea organelor lojelor energetice pot fi sistematizate în felul următor.

I. Tehnica Shu-Mu

Fiecare organ Zang și Fu posedă câte un punct de asentiment (Shu-post.) și de alarmă (Mu-ant.).

Punctele Shu-post. sunt situate pe ramura internă a meridianului Vezică. Aceste puncte realizează conexiuni directe cu Energia (Qi) a organelor interne (în special cu Energia Yang). La stimularea punctelor Shu-post. se realizează un efect de tonifiere, mai pronunțat când organul respectiv se află în Insuficiență energetică. Pentru potențarea efectului terapeutic se pot folosi și punctele situate pe meridianul curios Du Mai – se folosesc punctele aflate la același nivel. De exemplu, pentru potențarea efectului terapeutic al punctului V13 Feishu se folosește și punctul VG12 Shenzhu. Este efectivă asocierea punctelor Shu-posterioare cu punctele respective Yuan.

Punctele Mu-ant. realizează conexiuni directe cu organele interne, cu Energia Qi (în special cu energia Yin). La stimularea acestor puncte se manifestă un efect de dispersie. Acest efect se evidențiază mai pronunțat când există un Exces al organelor. Este efectivă asocierea punctelor Mu-ant. cu punctele de "proiecție periferică" a organelor corespunzătoare.

Deși predomină efectele menționate, punctele Shu-post. și Mu-ant. sunt folosite atât în tratamentul sindromului de Insuficiență energetică, cât și al celui de Exces.

II. Tehnica celor patru ace

Una din metodele de bază este așa-numita "tehnica celor patru ace", la baza căreia stă aplicarea punctelor antice conform ciclului de stimulare ("mamă/fiu") și de inhibiție (*fig. 153*).

După această tehnică, în caz de Exces energetic prima pereche de puncte se deduce din relațiile de inhibiție a celor cinci elemente cu scopul de a intensifica inhibiția organului afectat aflat în Exces. Se folosesc punctele organului afectat și punctele organului aflat în relații de inhibiție cu organul afectat. De exemplu, în sindromul Exces al Plămânilor (Metal) se tonifică punctul P10 Yuji (punct Foc al organului afectat, reieșind din premisa: Focul inhibă Metalul) și punctul C8 Shaofu (punct Foc al organului Foc, care inhibă organul afectat). A doua pereche de puncte se deduce din relația de stimulare în ciclul celor cinci elemente. În tratamentul sindromului de Exces este necesar de a dispersa organul aflat în Exces energetic, folosind punctele organului afectat și punctele organului aflat în relația energetică "fiu" față de organul afectat. În ambele cazuri, pentru reechilibrarea energetică se aleg punctele "fiu" față de punctul "element în element". De exemplu, în Excesul energetic al Plămânilor organul afectat aparține Metalului, iar "fiul" organului afectat este Apa (Rinichii). Reieșind din aceasta determinăm punctul "element în element", care este P8




Fig. 153. Interrelațiile organelor Zang-Fu și a punctelor celor cinci elemente (reprezentare schematică).

Jingqu (pentru Plămâni) și R7 Fuliu (pentru Rinichi). În stârșit, alegem pentru tratament punctele "fiu" față de punctele "element în element": P5 Chize și R10 Yingu (ambele în dispersie).

La bolnavii cu sindromul de Insuficiență prima pereche de puncte se aplică cu scopul de a diminua inhibiția organului afectat conform ciclului celor cinci elemente. În Insuficiența energetică a Plămânilor, de exemplu, cu acest scop se dispersează punctele P10 Yuji (punctul Foc al organului afectat) și C8 Shaofu (punctul Foc al organului, care

inhibă organul afectat). A doua pereche de puncte se deduce din relația de stimulare ("mamă/fiu") a celor 5 elemente. În Insuficiența energetică a Plămânilor se aleg două puncte (ambele în tonifiere); unul aparține organului afectat P9 Taiyuan (punctul "mamă" față de punctul "element în element") și altul, RP3 Taibai, aparține organului precedent, conform ciclului de stimulare (punctul "mamă" față de punctul "element în element").

III. Regula "mamă/fiu" cu aplicarea punctelor celor cinci elemente ale organului afectat

Se aplică punctele organului afectat reieșind din relația "mamă/fiu" față de punctele sedative și de tonifiere. În cazul când este necesar de a tonifica organul (Insuficiența energetică) efectuăm tonifierea punctului "mamă" față de punctul de tonifiere (fig. 153). De exemplu, în Insuficiența Plămânilor se tonifică punctul P10 Yuji, care joacă rolul de punct "mamă" față de punctul de tonifiere (P9 Taiyuan). În caz de Exces energetic al organului efectuăm dispersia punctului "fiu" față de punctul de dispersie. De exemplu, în Excesul energetic al Plămânilor se dispersează punctul P11 Shaoshang, care este "fiul" punctului sedativ (P5 Chize).

IV. Regula "mamă/fiu" cu aplicarea punctelor sedative și de tonifiere a organelor neafectate conform ciclului de stimulare a celor cinci elemente

Se aplică punctele sedative și de tonifiere a organelor neafectate conform ciclului de stimulare ("mamă/fiu"). În sindromul de Exces (de exemplu, a Plămânilor) se dispersează punctul de dispersie a organului "fiu" (R1 Yongquan) conform ciclului de stimulare a celor 5 elemente (fig. 153). La bolnavii cu sindrom de Insuficiență (de exemplu, a Plămânilor) se tonifică punctul de tonifiere a organului "mamă" (RP2 Dadu) conform ciclului de stimulare a celor 5 elemente.

V. Regula "mamă/fiu" cu aplicarea punctelor sedative și de tonifiere conform mării circulații energetice

Regula "mamă/fiu" se aplică în diferite tehnici de reechilibrare energetică reieșind din concepția circulației profunde sau superficiale a Energiei. Una din tehnici de reechilibrare este regula "mamă/fiu" cu aplicarea punctelor sedative și de tonifiere conform mării circulații energetice.

În caz de Exces energetic la început se dispersează punctul de dispersie al organului precedent conform mării circulații energetice, apoi se tonifică punctul de tonifiere a meridianului ulterior. De exemplu, în Excesul energetic al Plămânilor se dispersează punctul sedativ al Ficatului (F2 Xingjian), apoi se tonifică punctul de tonifiere al Intestinului Gros (GI11 Quchi).

La bolnavii cu sindrom de Insuficiență energetică la început se tonifică punctul de tonifiere al organului precedent, conform mării circulații energetice, apoi se dispersează punctul de dispersie al

organului ulterior. În caz de Insuficiență a Plămânilor se tonifică punctul F8 Ququan și se dispersează GI2 Erjian.

O mare importanță are timpul optim pentru tratament. Cu scop de dispersie stimularea punctului se realizează în perioada de activitate maximă a organului, care durează 2 ore; pentru tonifiere – perioada de reflux energetic, care durează 2 ore și începe îndată după perioada maximă de activitate energetică. De exemplu, în Excesul Plămânilor dispersia punctului F2 Xingjian se realizează optim în intervalul de la ora 1 până la 3, apoi tonifierea punctului GI11 Quchi de la ora 7 până la ora 9. La bolnavii cu Insuficiență a Plămânilor tonifierea punctului F8 Ququan este optimă de la ora 3 până la ora 5, apoi în perioada orelor 5–7 – dispersia punctului GI2 Erjian.

După cum se vede, nu în toate cazurile este posibil tratamentul conform perioadelor optime, mai ales în perioada de noapte. Însă întotdeauna este necesar de a respecta succesiunea folosirii punctelor conform acestei reguli.

VI. Regula "miezul zilei/miezul nopții"

Această regulă reflectă raportul de opoziție orară în marea circulație energetică: un meridian Yin se află în raport funcțional cu un alt meridian Yang, separate de alte cinci meridiane. Meridianele opuse sunt despărțite de un interval de 12 ore: P-V, GI-R, E-MC, RP-TR, C-VB, IG-F.

Există mai multe posibilități de aplicare a acestei reguli. Una din modalități este folosirea punctului Lo (tonifiere) al meridianului aflat în raport de opoziție orară cu meridianul aflat în stare de Exces energetic. De exemplu, în caz de Exces al Vezicii se poate tonifica punctul Lo al Plămânilor (P7 Lieque), ce duce la diminuarea simptomelor de Plenitudine energetică în Vezică.

În afectarea organelor Zang și Fu sunt posibile diferite manifestări patologice, inclusiv în urma tulburărilor legăturilor viscero-somatice, somato-viscerale sau somato-somatice. Experiența milenară a acupuncturii a stabilit o eficacitate mare a punctelor speciale, care sunt folosite în baza raportului de opoziție orară ("miezul zilei-miezul nopții"). Aceste puncte se aplică cu succes în tratamentul algiiilor ("puncte cu acțiune contralaterală" – numite astfel pentru indicațiile lor în algiile unilaterale; ele sunt descrise în volumul I al tratatului). De exemplu, în sindromul algic, legat de afectarea Intestinului Subțire, cu succes se aplică anumite "puncte cu acțiune contralaterală" ale Ficatului.

VII. Regula "soț/soție"

Organele Zang și Fu se află în legături de inhibiție conform ciclului celor cinci elemente. Aceste raporturi de inhibiție corespund proiecției organelor Zang și Fu la nivelul pulsurilor radiale: din stânga "soț" și din dreapta "soție"; profund pentru organele Zang și superficial pentru organele Fu.

Raportul "soț/soție":

<i>Poziția pulsului</i>	<i>Organele Fu</i>	<i>Organele Zang</i>
Cun	IG – GI	C – P
Guan	VB – E	F – RP
Chi	V – TR	R – MC

Cu scop de tratament există diferite modalități de a influența organele aflate în raport "soț/soție". Din punct de vedere practic mai eficientă este metoda de tonifiere a punctului Lo cu scop de a diminua Excesul energetic în organul cuplat conform raportului "soț/soție". De exemplu, în sindromul de Exces a Intestinului Subțire se efectuează tonifierea punctului Lo al Intestinului Gros (GI6 Pianli).

VIII. Regula Biao-Li

În anumite situații patologice Excesul energetic în unul din meridianele principale ale lojei energetice duce la o Insuficiență energetică în alt meridian, cuplat după principiul Biao-Li și invers. În scopul reechilibrării energetice a meridianului aflat în Exces energetic la început se efectuează dispersia punctului Yuan al meridianului aflat în Exces, apoi tonifierea punctului Lo al meridianului cuplat. De exemplu, în caz de Exces al Inimii se dispersează punctul C7 Shenmen și se tonifică punctul IG7 Zhizheng. În caz de reechilibrare energetică a meridianului aflat în Insuficiență la început se efectuează tonifierea punctului Yuan al meridianului aflat în Insuficiență, apoi – dispersia punctului Lo al meridianului cuplat (în Insuficiența Inimii se tonifică punctul C7 Shenmen și se dispersează punctul IG7 Zhizheng).

Regula Biao-Li se aplică și în cazul apariției simptomelor legate de traiectul extern al meridianului principal. În acest caz se asociază punctele Yuan, Lo și punctele Ashi corespunzătoare. De exemplu, în afectarea meridianului Plămân (dureri în piept, umăr, antebraț și mână, nevrita nervului radial etc.) este indicată formula P9 + GI6 + Ashi.

IX. Regula punctelor sezoniere

În medicina tradițională o mare importanță practică are corespondența perioadelor de timp anumitor anotimpuri și lojelor energetice:

<i>Perioada</i>	<i>Anotimpul</i>	<i>Loja energetică</i>
27.V – 7.VIII	Vara	Foc
8.VIII – 25.VIII	al 5-lea sezon	Pământ
26.VIII – 6.XI	Toamna	Metal
7.XI – 24.XI	al 5-lea sezon	Pământ
25.XI – 5.II	Iarna	Apă
6.II – 24.II	al 5-lea sezon	Pământ
25.II – 8.V	Primăvara	Lemn
9.V – 26.V	al 5-lea sezon	Pământ

Punctele de acupunctură din fiecare lojă energetică corespund anotimpurilor, repetând consecutivitatea lojelor. Aceste puncte sunt cunoscute în medicina tradițională sub denumirea de puncte sezoniere (de dispersie sau tonifiere). Pentru a dispersa organul aflat în Exces sau a tonifia organul aflat în Insuficiență este necesar de a clarifica următoarele: a) organul afectat; b) starea de Insuficiență sau Exces; c) sezonul (anotimpul) în care se realizează tratamentul.

Punctele de dispersie ale unui organ corespund cu punctele "fiu" față de locul de proiecție al sezonului în loja afectată. De exemplu, punctul sezonier de dispersie a Plămânilor în perioada de Vară este P9 Taiyuan (*fig. 153*). După cum se vede, locul de proiecție al sezonului Vară în lojă este P10 Yuji. Punctul sedativ, deci, este punctul "fiu" – P9 Taiyuan. Punctele de tonifiere corespund cu punctele "mamă" față de locul de proiecție al sezonului în lojă. De exemplu, punctul de tonifiere al Inimii în perioada de Iarnă este C4 Lingdao. Acest punct reiese din următoarele considerente: Inima se referă la loja Foc; locul de proiecție a sezonului Iarnă în loja Foc este C3 Shaohai; punctul "mamă" față de locul de proiecție este C4 Lingdao. Punctele sezoniere sunt folosite în tratamentul Insuficienței și Excesului energetic al organelor afectate.

În sindromul de Exces al organului tratamentul constă din trei grupe de puncte:

- punctele sezoniere de dispersie ale sezonului corespunzător;
- punctele sezoniere de tonifiere ale organului precedent, conform ciclului de inhibiție, față de organul afectat;
- punctele sezoniere de tonifiere ale organului ulterior, conform ciclului de inhibiție, față de organul afectat.

De exemplu, în sindromul de Exces al Inimii (sezonul Vară) se dispersează punctul C7 Shenmen și se tonifică punctele R1 Yongquan și P11 Shaoshang.

În caz de Insuficiență tratamentul constă în aplicarea a trei grupe de puncte:

- punctele sezoniere de tonifiere ale sezonului în care se realizează tratamentul;
- punctele sezoniere de dispersie ale organului precedent, conform ciclului de inhibiție, față de organul afectat;
- punctele sezoniere de dispersie ale organului ulterior, conform ciclului de inhibiție, față de organul afectat.

Pentru ilustrarea acestei reguli aducem un exemplu de rețetă la un bolnav cu Insuficiența Inimii (sezonul Vară) – tonifierea punctului C9 Shaochong și dispersia punctelor R3 Taixi și P9 Taiyuan.

X. Tehnica de potențare a punctelor sezoniere (tehnica punctelor Shu-Mu- sezoniere)

Pentru a intensifica efectul terapeutic există diferite variante de potențare a efectelor punctelor sezoniere. O răspândire mai mare în practica acupunctică o are tehnica de potențare a punctelor sezoniere

prin folosirea punctelor Shu-Mu. Această tehnică presupune aplicarea la bolnavii cu sindrom de Exces sau Insuficiență a punctelor sezoniere (în dispersie sau tonifiere). Pentru amplificarea efectului terapeutic aceste puncte se asociază cu punctele Mu-ant. (dispersie) în caz de Exces energetic sau cu punctele Shu-post. (tonifiere) în caz de Insuficiență energetică. La bolnavii cu Insuficiență energetică a Plămânilor în perioada de toamnă pentru tratament se vor folosi punctele sezoniere de tonifiere (P9 Taiyuan) și punctele Shu-post. (V13 Feishu în tonifiere).

Corecția tulburărilor psihice în afectarea lojelor energetice

Tratamentul tulburărilor psihice în afectarea lojelor energetice este complex, fiind în funcție de gradul tulburărilor organelor Zang și Fu, care intră în componența lojei energetice respective, de factorii etiopatogeni, durata maladiei, tipul constituțional și temperamental etc. De regulă, temperamentul este raportat la axele energetice (Tai Yang, Shao Yang, Yang Ming, Tai Yin, Jue Yin, Shao Yin), pe când constituția – la cele cinci elemente (Foc, Pământ, Metal, Apă, Lemn). Bolile somatice sunt în dependență mai strânsă de tipul constituțional, pe când bolile psihice – de cel temperamental.

Punctele de acupunctură aplicate în corecția tulburărilor psihice pot fi divizate în câteva grupuri mari (tab. 15, 16):

- punctele cu efect general de reglare asupra funcțiilor organismului, inclusiv și celor psihice (ca exemplu pot servi punctele VG20 Baihui și E36 Zusanli);
- punctele de acupunctură alese în funcție de particularitățile temperamentale ale bolnavului;
- punctele celor 9 "centre energetice" (tab. 1);
- punctele Shu psiho-dorsale (punctele de "mobilizare") care corespund lojelor corespunzătoare afectate;
- punctele particulare, indicate în sindromul Exces sau Insuficiență ale lojelor energetice afectate.

Tabelul 15.
Corecția tulburărilor psihice în afectarea lojelor energetice

Loja energetică	Sindromul	Acupunctele (formule)
Foc	Exces Insuficiență	V44 + E36 + C7 + VG24 + VC14 + MC7 V44 + VG20 + C7 + C5 + C9 + V15 + VG11
Pământ	Exces Insuficiență	V49 + E36 + RP5 + VC12 V49 + VG20 + RP2
Metal	Exces Insuficiență	V42 + E36 + V13 + P5 + GI6 V42 + VG20 + GI11 + GI3 + E25
Apă	Exces Insuficiență	V52 + E36 + R2 + R9 V52 + VG20 + R7 + R6 + R1
Lemn	Exces Insuficiență	V47 + E36 + F2 + VB38 V47 + VG20 + F1 + V18 + VB43

Tabelul 16.

Manifestările emoționale în funcție de tipul constituțional Yin-Yang în cadrul celor 5 elemente

Element	Tip constituțional		Tratament acupunctiv
	Yin-Yang	Manifestări emoționale	
Foc	Yin	Tristețe (melancolie), singurătate, pierdere a interesului de viață, seriozitate, responsabilitate	C7, C8, MC6, MC8, VC4, VC17, R3
	Yang	Excitare psihoemoțională, activitate sexuală sportivă, entuziasm, iresponsabilitate, interes față de viața socială, logoree, depresie cu idei de suicid	C8, C6, R1, R6, VC14, VC17
Pământ	Yin	Îngrijorare (gânduri excesive cu acțiuni insuficiente), oboseală	VG20, Yintang, VC4, VC12, E36, RP1, RP3, RP6
	Yang	Îngrijorare excesivă și nesiguranță cu limitarea independenței altora («lipicios», posesiv și săcâitor)	E36, VC4, VC12, VC17, F1, F13
Metal	Yin	Limitare a participării active la fenomenele vieții sociale cu teamă de pierderi, energie insuficientă pentru formarea relațiilor noi (trăire din amintiri)	P6, P10, E36, VC4, VC12, VC17
	Yang	Suprimare a suferințelor, transmitere a emoțiilor negative asupra altora, folosire a noilor relații pentru alinarea suferințelor	P7, GI4, RP1, RP21, F1, F14, VC6, VC17
Apă	Yin	Frică de viață, ambiții insuficiente, discutare la dificultăți sau pericole, indeterminare în atingerea scopurilor	C8, V64, V52, R1, R7, VG20, VC4
	Yang	Pierdere de control, activitate și ambiții excesive, necesitate de putere și control asupra altora pentru a obține senzația de siguranță	E36, R1, R3, R6, MC6, VG20, VC14, VC17
Lemn	Yin	Hipersensibilitate, nesiguranță în sine și perspectivele sale, ușor dominat de alții, timiditate	E36, RP6, V48, TR4, VB13, VB40, VC4, VC14
	Yang	Agresivitate, furie, nerăbdare, intoleranță, egoism, impunere a părerilor proprii fără a ține cont de alții	R1, R6, F2, F8, MC8, VG20, Yintang

Profilaxia tulburărilor în lojele energetice

La acțiunea factorilor patogeni exogeni afectarea organelor interne este posibilă pe două căi – direct (meridianul principal) sau prin intermediul conexiunilor energetice (meridianele secundare). La etapele inițiale de acțiune a factorilor patogeni este posibilă profilaxia tulburărilor lojelor energetice și organelor corespunzătoare. Profilaxia se realizează prin diferite procedee. În linii mari, ele pot fi unite în trei grupe: protecția contra acțiunii factorilor patogeni; fortificarea energetică a organelor Zang și Fu; fortificarea potențialului energetic al segmentului periferic al meridianului principal corespunzător.




Fig.154. Punctele "de protecție" pentru organele Zang și Fu.

O mare importanță practică au punctele numite "de protecție" ("Penn points"). Aceste puncte aparțin categoriei celor cinci elemente și se utilizează cu scopul diminuării acțiunii patologice a factorilor exogeni (factori meteo, gusturi etc.). Punctele "de protecție" pentru organele Zang și Fu sunt diferite (fig. 154).

Pornind de la concepția celor 5 elemente, se cunoaște interrelația existentă între organele lojelor energetice, factorilor meteo, structurilor anatomice, gusturilor, emoțiilor etc. Alegerea punctelor "de protecție" în caz concret se poate realiza reieșind din următoarea regulă: organul afectat determină ciclul celor 5 elemente (Zang sau Fu), pe când factorul patogen determină loja energetică afectată. În toate cazurile, cu scop de profilaxie, punctele "de protecție" se stimulează prin dispersie. De exemplu, bolnavul suferă de diaree în urma acțiunii frigului și alimentației cu alimente crude. În acest caz factorul patogen este Frigul, organul afectat este Intestinul Gros. Se va folosi punctul V66 Tonggu în dispersie. În caz de lombosciatică apărută în urma activității fizice excesive și suprasolicitării musculare cu dureri pe traseul meridianului Vezică se aplică punctul VB41 Zulinqi în dispersie (factorul patogen este activitatea musculară, ce corespunde lojei Lemn, organul afectat este Vezica, ce corespunde ciclului Fu al celor cinci elemente).

Fortificarea organelor Zang și Fu aflate în pericol se realizează prin aplicarea punctelor de alarmă (Mu-ant.), de asentiment (Shu-post.) în asocieră cu punctul sursă (Yuan).

În scopul profilaxiei tulburărilor este necesar de a mări potențialul energetic al porțiunii periferice a meridianelor principale corespunzătoare. Unul din procedeele efective în acest sens este stimularea punctelor de clivaj (Xi). Funcția principală a acestor puncte este accelerarea vitezei de circulație a Energiei în meridian; ele mobilizează Energia disponibilă în organele Zang și Fu corespunzătoare, mărind aflusul în porțiunile periferice.

O profilaxie efectivă poate fi realizată în cazurile când sunt folosi-

te posibilitățile multiple reieșind din situația concretă.

III.3. Frig-Căldură

Diagnosticul clinic

Manifestările clinice depind de caracterul tulburărilor – Exces-Insuficiență, Extern-Intern, Yin-Yang (tab. 17, 18).

Tabelul 17.
Diferențierea sindroamelor Căldură-Exces și Căldură-Insuficiență

Criterii	Căldură-Exces	Căldură-Insuficiență
Psihismul	Agitație pronunțată, dificultate la adormire, visuri excesive	Anxietate slab pronunțată, diminuarea memoriei, treziri repetate în cursul nopții și spre dimineață
Senzație de căldură	Pe parcursul zilei întregi	Spre seară, senzație de căldură în "cinci inimi"
Febră	Febră înaltă	Febră mică (spre seară)
Hiperhidroza	În cursul zilei	În timpul somnului, cu diminuare la trezire
Setea	Dorință de băuturi reci	Dorință de băuturi calde sau băuturi reci în cantitate mică
Fața	Roșie, caldă la palpare	Pallidă, cu hiperemie malară
Erupții cutanate	Dureroase	Nedureroase
Gust	Gust amar	Absența gustului amar
Scaune	Constipații, abdominale	Scaune uscate, fără dureri abdominale
Organul afectat	Semne de afectare a organului	Semne de afectare a organului
Yin-Yang	Exces Yang	Insuficiența Yin
Limba	Roșie, cu depozit galben	Roșie, cu depozit neînsemnat ("cheală")
Pulsul	Rapid, întins, plin, vast	Rapid, superficial, subțire, gol

La acțiunea factorilor patogeni-exogeni pot apărea sindroame Căldură Externă sau Frig Extern:

Căldură Externă	Frig Extern
Febră și frison (febră mai pronunțată).	Febră și frison (frison mai pronunțat).
Intoleranță la frig și vânt.	Intoleranță la frig și vânt.
Prezența hiperhidrozei.	Absența hiperhidrozei.
Prezența setei.	Absența setei.
Limba cu depozit subțire și galben.	Limba cu depozit subțire, alb și umed.
Pulsul superficial, rapid.	Pulsul superficial, încordat.

În procesele cronice se manifestă sindroamele Frig Intern (absența febrei; puls încordat; limba cu depozit alb) sau Căldură Internă (febră; puls rapid; limba roșie, cu depozit galben).

O mare importanță practică are diferențierea sindroamelor Căldură-Exces și Căldură-Insuficiență (tab. 17).

Este important de notat că prezența febrei în sindromul Căldură-Exces nu este obligatorie. Ca exemplu pot servi sindroamele Focul Ficatului sau Focul Inimii. Căldura-Exces este un sindrom de Exces Yang. Etiopatogeneza acestui sindrom este diferită: consumarea excesivă a alimentelor "fierbinți", producătoare de Yang-Qi (ca exemplu poate servi sindromul Căldură în Stomac), existența de lungă durată a problemelor emoționale, care duc la stagnarea Qi cu eliberarea Căldurii (sindrom tipic în acest aspect este stagnarea Qi a Ficatului). Sunt frecvente variantele când diferiți factori patogeni exogeni (inclusiv Frigul), invadând organismul, se transformă în Căldură.

Criteriile de diferențiere a sindromului Căldură-Insuficiență au fost expuse mai sus. Este important a evidenția organele afectate, printre care un rol deosebit îl joacă Rinichii – Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor. Această importanță reiese din faptul că Energia Yin a Rinichilor este suportul principal al Energiei Yin în întregul organism. Apariția sindromului Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor duce la afectarea Yin-Qi a Ficatului, Inimii și Plămânilor, cu apariția în tabloul clinic a semnelor specifice pentru aceste organe.

Pentru realizarea tratamentului adecvat este necesară diferențierea sindroamelor de Frig-Exces și Frig-Insuficiență (tab. 18).

Tabelul 18.

Diferențierea sindroamelor Frig-Exces și Frig-Insuficiență

<i>Criterii</i>	<i>Frig-Exces</i>	<i>Frig-Insuficiență</i>
Senzație de rece	Membre și corp reci	Membre și corp reci
Hiperhidroza	Nu este caracteristică	Spontană sau la efort nelinșnat
Setea	Preferință de băuturi calde, însă consumate în cantități mici	Setea nu este caracteristică, preferință de băuturi calde
Scaune	Diaree rece, ameliorare după defecație	Scaune lichide dimineața, agravare după defecație
Durerea	Presăția și frigul intensifică durerea	Presăția diminuează durerea
Yin-Yang	Exces Yin	Insuficiența Yang
Limba	Palidă, umedă, cu depozit alb și gros	Palidă, umedă, cu depozit alb și subțire
Pulsul	Plin, profund, încordat, lent	Gol, profund, lent

Frigul are proprietatea de a contracta țesuturile, ceea ce cauzează apariția diferitelor algii. Sindromul Frig-Exces poate apărea în urma invaziei Frigului exogen în Stomac, Intestine sau uter. Este bine cunoscut sindromul de Frig al meridianului Ficat cu inflamare și dureri

în scrot.

În condiții de Insuficiență Yang-Qi în organism apare sindromul Frig-Insuficiență. Mai frecvent această variantă de patologie apare la afectarea Yang-Qi a Splinei, Rinichilor, Inimii și Plămânilor.

În condiții patologice apar diferite variante de asocieri ale semnelor Frig și Căldură: Frig în Interior – Căldură în Exterior și invers; Frig sus – Căldură jos și invers; Căldură adevărată – Frig fals și invers. În diferențierea Căldurii și Frigului fals și adevărat o importanță deosebită are culoarea limbii în asocieri cu alte semne clinice.

Semnele principale ale sindromului *Frig adevărat – Căldură falsă* sunt: sete fără dorință de a bea (sau bolnavul bea lichide calde); senzație de cald în corp în asocieri cu dorința de a se culca în pat și a se acoperi; iritabilitate; voce slabă; urină palidă; limba – palidă și umedă; pulsul – superficial, rapid.

Simptomele de bază ale sindromului *Căldură adevărată – Frig fals* sunt: membre reci în asocieri cu pieptul cald; facies întunecat, buze roșii și uscate; iritabilitate; voce sonoră; sete, cu dorința de a bea lichide reci; urină închisă; constipații cu senzație de arsură în anus; limba – roșie și uscată; pulsul – profund și plin.

În procesul diferențierii se va ține cont de posibilitatea asocierii sindroamelor Frig și Căldură, pentru a nu le confunda cu fenomenele de Frig și Căldură false.

Tratamentul

Tratamentul dezechilibrului energetic legat de Frig sau Căldură exogenă se realizează reieșind din următoarele principii: 1) diminuarea forței factorului patogen sau excluderea lui; 2) limitarea difuzării factorului patogen în organism; 3) fortificarea potențialului energetic al organului sau meridianului afectat. În acest scop se folosesc punctele antice, care corespund factorului patogen (Frig, Căldură). De exemplu, în afectarea Plămânilor de către factorul patogen Frig se stimulează prin dispersie punctul antic P5 Chize și prin tonifiere punctul P10 Yuji. Pentru a potența efectul terapeutic se stimulează prin dispersie punctul antic Shu ("transport"). Dispersia se realizează reieșind din considerentele că aceste puncte "absorb" Energia patogenă care ajunge pe calea meridianului până la acest nivel. În exemplul de mai sus acest punct este P9 Taiyuan (tab. 19). În scopul limitării propagării ulterioare a factorului patogen se tonifică punctele de asentiment corespunzătoare (Shu-post.). Punctele Xi (în tonifiere) provoacă un efect de mobilizare energetică, fortificând potențialul de apărare a organului sau meridianului afectat.

În scopul eliminării Frigului exogen sunt efective punctele V65 Shugu, VB31 Fengshi, VB14 Yangbai, VB18 Chengling. În sindromul Excesul Frig este indicată moxibustia în punctele VC4 Guanyuan, VC6 Qihai, VG4 Mingmen, E36 Zusanli, RP6 Sanyinjiao, V20 Pishu, V23 Shenshu, F3 Taichong, R3 Taixi. La bolnavii cu dureri generalizate cauzate de Frig sunt indicate punctele IG3 Houxi, GI4 Hegu, VB20

Tabelul 19.

*Punctele de acupunctură indicate în tratamentul tulburărilor exogene
Frig-Căldură.*

Meridianele	Punctele de acupunctură				
	Frig	Căldură	Shu, Shu-Yuan	Shu-post.	Xi
Plămân	P5	P10	P9	V13	P6
Intestin Gros	GI2	GI5	GI3	V25	GI7
Stomac	E44	E41	E43	V21	E34
Splină-Pancreas	RP9	RP2	RP3	V20	RP8
Inimă	C3	C8	C7	V15	C6
Intestin Subțire	IG2	IG5	IG3	V27	IG6
Vezică	V66	V60	V65	V28	V63
Rinichi	R10	R2	R3	V23	R5
Pericard	MC3	MC8	MC7	V14	MC4
Trei Focare	TR2	TR6	TR3	V22	TR7
Veziculă Biliară	VB43	VB38	VB41	V19	VB36
Ficat	F8	F2	F3	V18	F6

Punctele de acupunctură efective în sindromul Frig cu localizare diferită:

Regiunile	Punctele de acupunctură
degetele mâinii	P5 Chize, GI3 Sanjian, IG3 Houxi;
pumn	GI5 Yangxi, IG4 Wangu, IG5 Yanggu, TR4 Yangchi, MC7 Daling;
cot	P5 Chize, P6 Kongzui, GI10 Shousanli, C3 Shaohai, TR10 Tianjing;
umăr	GI15 Jianyu, IG9 Jianzhen, TR14 Jianliao;
degetele piciorului	RP2 Dadu, RP4 Gongsun, V65 Shugu;
gleznă	E41 Jiexi, RP5 Shangqiu, V60 Kunlun, VB40 Qiuxu;
genunchi	E35 Dubi, RP9 Yinlingquan, VB33 Xiyangguan, VB34 Yanglingquan;
șold	V54 Zhibian, VB29 Juliao, VB30 Huantiao;
regiunea lombară	VG4 Mingmen, V22 Sanjiaoshu, V23 Shenshu, V50 Weicang, V52 Zhishi;
epigastru	VC10 Xiawan, VC12 Zhongwan, R17 Shangqu, R20 Tonggu, E20 Chengman, E22 Guanmen;
abdomen inferior	VC2 Qugu, VC3 Zhongji, VC5 Shimen, VC6 Qihai, R12 Dahe, R14 Siman, E29 Guilai, E30 Qichong.

Frigul exogen atacă Plămânii, apoi, conform ciclului Sheng al celor cinci elemente, atacă "mama" (Splina); Frigul endogen atacă Rinichii, apoi, conform ciclului celor cinci elemente, atacă Splina. În toate cazurile de sindrom Frig este necesară stimularea Splinei (RP3 + RP6 + F13 + E36), fortificarea (armonizarea) Focarului Mediu (RP14 + RP6 + V21 + V20) și stimularea funcției de difuzie Qi a Plămânilor (V12 + P7 + GI4).

În practica medicală o importanță mare are sindromul de *Frig al Focarului Inferior (Insuficiența Yang-Qi al Focarului Inferior)*, care se asociază cu alte semne patologice (stagnarea Qi și Xue, Umiditate în partea de jos a organismului și membrele inferioare). Acest sindrom apare în cazuri de Insuficiență congenitală Yang-Qi și, în special, la femei care au fost expuse la frig în timpul menstruației sau îndată după naștere. Tabloul clinic include senzație de rece în regiunea lombosacrală și abdomenul inferior, menstrre neregulate, dismenoree, amenoree, infertilitate. Limba este de culoare roșie-închis sau cu echimoze, cu depozit alb și alunecos. Pulsul – profund și încordat. Tratamentul acestui sindrom include încălzirea Yang-Qi, dinamizarea Qi și Xue, armonizarea Focarului Inferior: VG9 Zhiyang, VC6 Qihai, VC4 Guanyuan, VC17 Shanzhong, V17 Geshu, V31 Shangliao, V32 Ciliao, V33 Zhongliao, V34 Xialiao, V23 Shenshu, RP10 Xuehai, VB34 Yanglingquan. Se aplică stimularea prin acupunctură și moxibustie. La bolnavii cu sindrom Frig și diaree este indicată moxibustia: 1) V20 Pishu, RP4 Gongsun, RP6 Sanyinjiao; 2) VC6 Qihai, VC12 Zhongwan, E36 Zusanli, E25 Tianshu, V25 Dachangshu; 3) GI4 Hegu, VC4 Guanyuan, E22 Guanmen.

În tratamentul sindromului Căldură este necesar de a diferenția Căldura-Exces (exogenă) și Căldura-Insuficiență (endogenă). Tratamentul în aceste două cazuri este diferit. În primul caz se realizează dispersia, eliminarea Căldurii; în al doilea caz este foarte importantă alimentarea Yin-Qi și Xue, activarea Qi concomitent cu eliminarea Căldurii.

În toate cazurile de Căldură Externă este indicat punctul IG3 Houxi; în toate cazurile de Căldură Internă este indicat punctul MC5 Jianshi.

În Căldură-Exces sunt indicate punctele GI4 Hegu, VG14 Dazhui, V40 Weizhong (sângerare).

În funcție de regiunea afectată de Căldura exogenă se recomandă diferite acupuncte:

Regiunile	Punctele de acupunctură
cap	V10 Tianzhu, V11 Dazhu, GI4 Hegu, VG14 Dazhui, VG23 Shangxing;
trunchi	V12 Fengmen, V13 Feishu, VG14 Dazhui;
membre superioare	P7 Lieque, GI1 Shangyang, C9 Shaochong, MC9 Zhongchong;
membre inferioare	E36 Zusanli, E45 Lidui, VB44 Zuqiaoyin.

În cazurile când Căldura se localizează la suprafața corpului (Tai Yang, Yang Ming, Shao Yang) este indicată metoda sudorației (P9 Taiyuan, P10 Yuji, R1 Yongquan, R2 Rangu sau G14 Hegu în asociere cu R7 Fuliu).

La bolnavii cu *Căldură-Exces în Stomac și Intestine* (dureri în abdomen cu agravare la presare, constipație, puls rapid) sunt indicate punctele V25 Dachangshu, E25 Tianshu, E40 Fenglong, E36 Zusanli. Tehnica de stimulare – la început se efectuează o presare cu degetul mâinii stângi în regiunea punctului, apoi cu mâna dreaptă se introduce acul în țesut și numai după obținerea senzației de acupunctură se întrerupe presarea cu degetul. Acul va fi manipulat (introducere lentă și extragere energică, rapidă) până la obținerea senzației de rece. În constipație sunt efective următoarele asocieri de puncte: 1) E41 + G16 + TR6; 2) G11 + V25 + TR6.

În *Căldura Xue* sunt efective punctele: 1) G11 Quchi, RP10 Xuehai, V20 Pishu, VB39 Xuanzhong, F2 Xingjian; 2) V40 Weizhong, R1 Yongquan, MC4 Ximen, F1 Dadun; 3) RP10 Xuehai, V15 Xinshu, V40 Weizhong, R1 Yongquan, MC4 Ximen, F2 Xingjian.

În acupunctura clinică un rol important joacă sindroamele de afectare a celor 6 meridiane mari (axe energetice). În etiopatogeneza afectării meridianelor mari sunt două aspecte de reper. Primul aspect ține de raportul Energiei patogene și a Energiei Defensive, care determină simptomele afectării și metodele de tratament folosite; sindromul de Exces este o manifestare a factorului patogen puternic și a Energiei Defensive puternice, pe când sindromul de Insuficiență reprezintă o stare patologică de o durată lungă și o Energie Defensivă relativ diminuată. Al doilea aspect ține de adâncimea agresiunii; în acest plan se evidențiază trei stadii Yang și trei stadii Yin.

Sindromul Tai Yang (IG + V) apare ca urmare a acțiunii (invaziei) Frigului exogen în organism – febră cu absența hiperhidrozei, aversiune la frig; redoare și dureri în ceafă și pe suprafața posterioară a gâtului, lombalgie, cefalee (ceafă), dureri în articulații; limba – cu depozit subțire, alb și umed; pulsul – superficial și încordat (posibil puls lent). La invazia Vântului-Căldură în Tai Yang se manifestă simptomele: febră, sete; absența sensibilității mărită la frig și vânt; dureri pe suprafețele posterioare ale gâtului (ceafă), cefalee; eliminări nazale de culoare galbenă; limba – roșietică, cu depozit subțire și galben; pulsul – superficial și rapid. În cazul invaziei Vântului-Frig în Tai Yang apar următoarele semne clinice: febră cu absența hiperhidrozei, frison, sensibilitate sporită la frig; rinoree apoasă; redoare a cefei; dureri în articulații; cefalee (ceafă); limba – cu depozit alb și umed; pulsul – superficial și lent.

În diagnosticul diferențiat o importanță primordială au următorii factori: 1) prezența sau absența aversiunii la frig sau vânt; 2) prezența pulsului superficial, încordat sau moderat; 3) prezența sau absența hiperhidrozei.

Tratamentul este îndreptat spre eliberarea Exteriorului (G14 Hegu,

TR5 Waiguan); dispersia Vântului (VG16 Fengfu, VB20 Fengchi, E8 Touwei); diminuarea aversiunii la Frig (VB20 Fengchi, VG12 Shenzhu, V12 Fengmen, VG16 Fengfu, VC8 Shenque); diminuarea hiperhidrozei (C6 Yinxi) sau stimularea perspirației (GI4 Hegu, P8 Jingqu); diminuarea tusei (P9 Taiyuan, VC22 Tiantu) și cefaleei (GI4 Hegu, VB20 Fengchi, E8 Touwei, V62 Shenmai).

Sindromul Yang Ming (GI + E) după natura lui este de tip Căldură-Exces și apare izolat sau ca o etapă a evoluției (în caz de tratament neadecvat) a sindroamelor Tai Yang și Shao Yang. Se evidențiază două variante clinice – afectarea meridianelor și afectarea organelor interne.

Semnele clinice în afectarea meridianelor: febră înaltă, hiperhidroză pronunțată, sete de lichide reci; hiperemia feței; iritabilitate, neliniște; cefalee (fruntea); limba – roșie, uscată, cu depozit galben; pulsul – mare (vast). Sunt caracteristice patru semne clinice "mari" (febra, setea, hiperhidroza, pulsul).

Simptomatologia în afectarea organelor interne – febră (cu intensificare spre seară); constipație, senzație de plenitudine și durere în abdomen (cu agravare la presare); iritabilitate, neliniște, delir; urină de culoare galben-închis; limba – cu depozit galben și uscat; pulsul este de tip Exces, profund.

Scopul tratamentului este diminuarea Căldurii (GI15 Jianyu, VG14 Dazhui, GI11 Quchi, TR5 Waiguan, E44 Neiting), înlăturarea stăgnării Căldurii (V17 Geshu, RP6 Sanyinjiao, RP4 Gongsun), armonizarea "centrului" cu refrigerarea Căldurii organelor digestive (MC5 Jianshi, V11 Dazhu, E40 Fenglong, E36 Zusanli, VC12 Zhongwan), armonizarea, refrigerarea și umectarea intestinelor (TR2 Yemen, V57 Chengshan, TR6 Zhigou, GI11 Quchi, E44 Neiting). La bolnavii cu constipație sunt indicate punctele V25 Dachangshu, TR6 Zhigou, V57 Chengshan, P6 Kongzui; în caz de distensie abdominală – E36 Zusanli, E44 Neiting, V57 Chengshan.

Sindromul Shao Yang (TR + VB) se manifestă prin alternarea febrei și frisonului; senzație de plenitudine în hipocondru și cutia toracică; dureri în flancuri; diminuarea apetitului, vomă, gust amar, uscăciune a gurii și a gâtului; tulburări ale vederii; cefalee (regiunea temporo-parietală); apatie, față inexpresivă, iritabilitate; limba – cu depozit alb sau suriu (predominant pe jumătatea dreaptă a limbii); pulsul – încordat. După natura sa acest sindrom aparține tipului intermediar (semiextern-semiintern).

Scopul tratamentului este diminuarea Căldurii în Ficat, Veziculă Biliară și Pericard (MC5 Jianshi, VC13 Shangwan, VB41 Zulinqi, VB34 Yanglingquan). Puncte importante în alternarea febrei și frisonului – MC5 Jianshi, TR10 Tianjing, VB34 Yanglingquan, VG14 Dazhui; febră – TR10 Tianjing, VB34 Yanglingquan; senzație de distensie în hipocondru – TR6 Zhigou, VB34 Yanglingquan; greață, vomă – MC6 Neiguan, RP4 Gongsun, E36 Zusanli; uscăciune în gât – TR2 Yemen, TR3 Zhongzhu; constipații – TR6 Zhigou; diaree cu defecație inefici-

entă – GI11 Quchi, E36 Zusanli.

Sindromul Tai Yin (P + RP) este de tipul Frig-Insuficiență (Insuficiența Yang-Qi a Splinei, Invadarea Splinei de Frig) și se manifestă prin senzație de plenitudine și durere în abdomen (ameliorare la presare și la cald); diminuarea apetitului, vomă, diaree; absența setei și febrei; senzație de greutate în membre, slăbiciune; hemoragii (afectarea Splinei); ptoză a uterului; hemoroizi; cefalee cu senzație de greutate. Limba – palidă, cu depozit alb. Pulsul – slab și moderat.

Scopul tratamentului este încălzirea "centrului", dispersia Frigului, fortificarea și armonizarea Splinei – GI4 Hegu, E25 Tianshu, VB20 Fengchi, E36 Zusanli, RP6 Sanyinjiao, TR5 Waiguan, VC6 Qihai; la bolnavii cu dureri în abdomenul inferior sunt indicate punctele GI4 Hegu, E36 Zusanli, TR6 Zhigou, E25 Tianshu, V57 Chengshan.

Sindromul Shao Yin (R + C) este de tipul Frig Intern – sensibilitate crescută la frig, absența febrei, bolnavul stă culcat și ghemuit; apatie, somnolență, membre reci, cianoza unghiilor; diaree cu alimente nedigerate; absența setei sau consumare de lichide calde în cantități mici; dureri în articulații; cefalee (dureri profunde); urină clară; limba – palidă, cu depozit alb; pulsul – profund, slab, filiform.

Scopul tratamentului este alimentarea Yang-ului, încălzirea Frigului, armonizarea circulației Qi – VG4 Mingmen, R3 Taixi, VC8 Shenque, VC6 Qihai, E36 Zusanli; la bolnavii cu somnolență este efectiv punctul VG5 Xuanshu; în caz de diaree este necesar de a stimula punctele E25 Tianshu, E36 Zusanli, VC6 Qihai, VC8 Shenque (moxibustie).

Sindromul Jue Yin (F + MC) este de tip mixt (Căldură și Frig) și se manifestă prin epuizare, astenie; sete permanentă; senzație de căldură și dureri în hipocondru și piept concomitent cu membre reci; senzație de foame fără dorința de a mânca, greață, vomă (uneori cu ascaride), diaree; cefalee (vertex), surditate; scrot retractat; limba – cu puncte roșii, depozit alb și alunecos; pulsul – profund și întins (ca o coardă de vioară).

Scopul tratamentului este armonizarea circulației Qi și Xue, armonizarea Căldurii-Frig sus-jos, înlăturarea Insuficienței – E36 Zusanli, VC6 Qihai (moxibustie), VC12 Zhongwan, F14 Qimen, V18 Ganshu, GI4 Hegu, GI11 Quchi, TR2 Yemen, VB41 Zulinqi; la bolnavii cu epuizare și insomnie sunt indicate punctele MC5 Jianshi, E45 Lidui.

Analizând meridianele mari din punct de vedere al celor opt principii fundamentale putem constata următoarele corelații:

<i>Meridianele mari</i>	<i>Corelațiile cu opt principii</i>
Tai Yang	Frig Extern;
Yang Ming	Căldură Internă, Exces Intern;
Shao Yang	semiextern-semiintern;
Tai Yin	afectarea Splinei de Frig;
Shao Yin	Insuficiența Inimii și Rinichilor, Insuficiența generală;
Jue Yin	Insuficiența Internă și complexul de Frig-Căldură.

Febra este un simptom frecvent întâlnit în diferite maladii (temperatura în cavitatea bucală mai mare de 37,3°C, în fosa axilară – mai mare de 37°C și temperatura rectală mai mare de 37,6°C). Având o etiopatogeneză diferită, febra în medicina tradițională se divizează în două tipuri: Exces și Insuficiență.

Febra de tip Exces este cauzată de factorii patogeni exogeni și se manifestă cu o temperatură înaltă a corpului (până la 39°C și mai mare). Această febră este caracteristică pentru maladiile febrile infecțioase și necesită asistența de urgență (VG14 Dazhui, GI11 Quchi, GI4 Hegu, P11 Shaoshang, VG26 Renzhong).

Febra de tip Insuficiență apare în urma disfuncției organelor interne (Zang, Fu), a perturbării Qi și Xue și a dezarmoniei Yin-Yang. Această febră este de o durată lungă, nu este înaltă și se manifestă cu oscilații mici de temperatură a corpului. Nu apare aversiunea la frig, însă sunt prezente semne de afectare a organelor interne (tumori, boli cardiovasculare, tulburări endocrino-metabolice etc.). Variantele de bază ale febrei de tip Insuficiență sunt următoarele:

- *Insuficiența Yin-Qi cu febră* – senzație de căldură în "cinci inimi" și în timpul nopții, căldură în oase, hiperhidroză nocturnă; nervozitate, insomnie, visuri excesive; gură și gât uscate, constipație; urină galbenă în cantitate redusă. Limba – roșie și uscată, posibil cu fisuri, cu depozit neînsemnat sau fără depozit. Pulsul – filiform și rapid.

Tratamentul este îndreptat spre alimentarea Yin-Qi și diminuarea Căldurii (R3 Taixi, V23 Shenshu, C7 Shenmen, V15 Xinshu, MC6 Neiguan, MC7 Daling, F3 Taichong, RP6 Sanyinjiao, GI11 Quchi, V40 Weizhong, V43 Gaohuangshu, V42 Pihu).

- *Insuficiența Qi cu febră* – senzațiile de căldură se intensifică după efort fizic sau mental; astenie, fatigabilitate; respirație scurtă; scaune moi; nedorința de a vorbi; bolnavul este predispus spre răceală. Limba este palidă, cu depozit alb și subțire. Pulsul – slab. Scopul tratamentului – fortificarea Energiei Vitale, armonizarea Focarului Mediu, diminuarea Căldurii (E36 Zusanli, VC12 Zhongwan, GI11 Quchi, VC8 Shenque, V20 Pishu, V21 Weishu).
- *Insuficiența Xue cu febră* – senzație de căldură în "cinci inimi", hiperhidroză nocturnă; tulburarea vederii; palpitații; insomnie; piele palidă; constipație. Limba – subțire și roșie, cu depozit neînsemnat. Pulsul – subțire și slab sau rapid.

Scopul tratamentului – fortificarea Yin-Qi și Xue, diminuarea Căldurii (C6 Yinxi, E36 Zusanli, GI11 Quchi, MC6 Neiguan, V15 Xinshu, V20 Pishu, RP6 Sanyinjiao).

- *Stagnarea Qi cu febră* – senzație de căldură cu agravare în stări emoționale; iritabilitate; senzație de distensie, disconfort sau durere în epigastriu, hipocondru sau cutie toracică; gust amar; căscat și oftat frecvent; menstrele neregulate. Limba – roșie, cu depozit galben. Pulsul este întins și rapid.

Scopul tratamentului – dinamizarea și armonizarea Qi și Xue, diminuarea Căldurii (F3 Taichong, F2 Xingjian, GI11 Quchi, GI4 Hegu, C7 Shenmen, VB20 Fengchi).

- *Stagnarea Xue cu febră* – senzație de căldură spre seară și noaptea în asocieră cu dureri localizate (fixe); la palpare se evidențiază diferite mase abdominale; gură și gât uscate (fără dorința de a bea); fața de culoare închisă. Limba – cianotică, cu peteșii. Pulsul – subțire.

Scopul tratamentului – armonizarea și dinamizarea Qi și Xue, diminuarea Căldurii (F3 Taichong, MC6 Neiguan, P9 Taiyuan, V17 Geshu, V15 Xinshu, GI11 Quchi).

În caz de febră la bolnavii cu afectarea organelor Zang acupunctura se realizează diferențiat, în funcție de organul afectat.

- *Afectarea Plămânilor* – senzație de căldură maximă în intervalul de la ora 15 până la ora 19 și transpirații maxime în intervalul de la ora 3 până la ora 7. Debutul maladiei se manifestă prin frison, hiperemie a obrazului drept, teamă de curent (de aer); dispnee, tuse, dureri în spate (cu limitarea respirației profunde); cefalee; transpirații reci. Limba – cu depozit gălbui (predominant în părțile anterioare). Pulsul – rapid.

Tratamentul – P10 Yuji, GI5 Yangxi, GI2 Erjian, V13 Feishu, P7 Lieque.

- *Afectarea Inimii* – senzație de căldură maximă de la ora 7 până la ora 11 și transpirații maxime de la ora 15 până la ora 19. Manifestările majore ale maladiei sunt precedate de indispoziție și hiperemia frunții, care durează mai multe zile. Apoi apar dureri în regiunea precordială, greață, cefalee, facies roșu. Limba – roșie (preponderent vârful). Pulsul – rapid.

Tratamentul – C8 Shaofu, C7 Shenmen, IG5 Yanggu, IG2 Qianggu, V15 Xinshu, V45 Yixi.

- *Afectarea Splinei* – senzație de căldură maximă de la ora 11 până la ora 15 și transpirații maxime de la ora 21 până la ora 3. Lombalgii; greață, balonare, diaree; senzație de greutate în cap; nas de culoare roșie-aprins. Limba – roșie. Pulsul – rapid.

Tratamentul – RP2 Dadu, E41 Jiexi, E44 Neiting, V20 Pishu, RP4 Gongsun.

- *Afectarea Ficatului* – senzație de căldură maximă de la ora 3 până la ora 7 și transpirații maxime de la ora 11 până la ora 15. Debutul maladiei se manifestă prin schimbarea culorii urinei (devine galbenă); dureri în abdomen și hiperemia obrazului stâng. În perioada de maximă manifestare a maladiei sunt posibile convulsii, delir, agitație psihomotorie. Limba – cu depozit galben (preponderent pe marginile limbii). Pulsul – rapid.

Tratamentul – F2 Xingjian, F3 Taichong, F4 Zhongfeng, VB43 Xiaxi, VB38 Yangfu, V18 Ganshu, VG14 Dazhui.

- *Afectarea Rinichilor* – senzație de căldură maximă de la ora 21

până la ora 3 și transpirații maxime de la ora 7 până la ora 11. Debutul maladiei se manifestă prin lombalgii, sete pronunțată, menton hiperemiat. Puțin mai târziu apar redoarea și durerile în regiunea cefei, senzația de frig și dureri în gambe, senzația de arsură în tălpi; vertij, cefalee, epuizare. Limba – roșie. Pulsul – rapid.

Tratamentul – V40 Weizhong, R2 Rangu, R3 Taixi, V23 Shenshu, R4 Dazhong.

În medicina tradițională se evidențiază sindromul *"Căldură sus și Frig jos"*, care este interpretat din punct de vedere al afectării Rinichilor (*"casa Apei și a Focului"*) și dezarmoniei Rinichi-Inimă. Rinichii sunt Yin (Apă), Inima este Yang (Foc). Yin-ul și Yang-ul (Apa și Focul) se află în echilibru dinamic. Apariția senzației de căldură în partea de sus a organismului și rece în partea de jos reflectă dezarmonia Rinichi-Inimă. Această patologie poate apărea în cazurile cu insuficiență congenitală a Rinichilor, după maladii cronice epuizante, în urma activității sexuale excesive etc. Pacientul are senzația de rece în picioare, regiunea lombară și abdomenul inferior. Concomitent apare senzația de căldură în regiunea cefalică. Se evidențiază aversiunea la rece, hiperemia feței și a ochilor, uscăciunea gurii și a gâtului (fără dorința de a bea), tumefierea gingiilor; urina clară, posibil diaree, leucoree (cu eliminări clare). Limba este roșie la vârf, cu depozit foarte subțire. Pulsul – subțire și slab.

Tratamentul sindromului *"Căldură sus și Frig jos"* în urma dezarmoniei Inimă-Rinichi este îndreptat spre fortificarea și armonizarea organelor afectate, coborârea Focului *"spre origine – poarta Vitală"*: VG1 Changqiang, VG9 Zhiyang, VG14 Dazhui, VG20 Baihui, VC4 Guanyuan, RP6 Sanyinjiao, C7 Shenmen, R3 Taixi, MC6 Neiguan, V23 Shenshu. Punctele se stimulează cu ace fierbinți (cu excepția punctului VG1 Changqiang).

În general, eficacitatea tratamentului în sindromul Frig și Căldură este în funcție de structurile sau organele afectate (Zang sau Fu), intensitatea factorilor patogeni, forța Qi-ului antipatogen, asocierea și stimularea adecvată a punctelor de acupunctură și alți factori.

III.4. Interior-Exterior

Diagnosticul clinic

Sindromul Intern și Extern reflectă profunzimea afectării organismului și evaluarea maladiei (spre exterior sau interior). Exemple de maladii cu sindrom Extern: dermatoze, afectarea organelor de simț, miozite, afectarea părului etc. Exemple de maladii cu sindrom Intern: afectarea organelor interne, peritonită, afectarea sistemului nervos central etc.

Interior-Exterior reflectă localizarea afectării și nu în mod automat legătura cauzală dintre factorii patogeni și caracterul bolii. De exemplu, un sindrom Extern poate fi provocat de un factor patogen exogen, însă, în cazul când acest factor afectează un organ intern, apare un sindrom Intern. Pe de altă parte, manifestările patologice în structurile organismului, care se referă la Extern, nu înseamnă inevitabil un sindrom Extern (afectarea cronică a pielii poate fi o manifestare a sindromului Intern).

Semnele clinice ale sindromului Extern sunt în funcție de natura factorului patogen și reacția organismului, însă, în general, ele includ febra, aversiunea la frig; durerile cu diferită localizare; limba cu depozit subțire și puls superficial.

Manifestările clinice ale sindromului Intern sunt foarte variate și depind de etiopatogeneza maladiei și organul (sau organele) intern afectat.

Simptomele sindromului Extern-Intern, apărute sub influența diverșilor factori patogeni, pot fi clasate conform celor opt principii de diferențiere (Yang-Yin, Căldură-Frig, Exces-Insuficiență), ceea ce permite un diagnostic și un tratament diferențiat.

Tratamentul

Un tratament corect cu scop de reechilibrare Yin-Yang, Exces-Insuficiență, Frig-Căldură în mod inevitabil duce și la reechilibrarea Exterior-Interior (Biao-Li).

Puncte importante cu efect de "eliberare" a suprafeței corpului sunt P7 Lieque, P10 Yuji, GI4 Hegu, IG3 Houxi, V11 Dazhu, V12 Fengmen, VB20 Fengchi, VG14 Dazhui, VG16 Fengfu. Tehnica de sudorație ocupă un loc important în eliminarea factorilor patogeni aflați la suprafață. În maladiile Biao se evită introducerea adâncă a acelor pentru a preîntâmpina pătrunderea factorilor nocivi în adâncime, se dă preferință punctelor localizate pe meridianele Yang.

IV

Diagnosticul și tratamentul acupunctic în afectarea meridianelor

- IV.1. Meridianele principale**
- IV.2. Meridianele extraordinare**
- IV.3. Meridianele secundare Lo**
- IV.4. Meridianele tendino-musculare**
- IV.5. Meridianele distincte**

IV.1. Meridianele principale

Meridianele lojei energetice Foc (C + IG)

Diagnosticul clinic

Criteriile de diagnostic al organelor afectate (tab. 20):

- *Constituția morfologică* – statura înaltă, cap relativ mic, mâna este lungă sau mică și subțire, degetele subțiri și mai lungi decât palma, mâna este elegantă, unghiile armonioase, de culoare normală.
- *Simptomele copilăriei* – hipersensibilitate și hiperemotivitate; ușor apar stări febrile asociate uneori de convulsii, predispoziție spre insolitație.
- *Simptomatologia de debut* – dureri precordiale, dureri în abdomenul inferior și în regiunea lombară până la scrotum.
- *Bolile* – tulburări ale sistemului cardiovascular, hiper- sau hipotensiune; tulburări ale sistemului simpatic (spasme, aritmii, dureri); tulburări circulatorii (varice, artrite etc.); scarlatină; amigdalite acute; convulsii, spasmofilie; cefalee; tulburări ale metabolismului colesterolic. Persoanele au o slăbiciune naturală a inimii și a intestinului subțire. *Emoțiile* – bucurie, veselie, hipersensibilitate. *Țesuturile* – vasele sangvine, "sânge" (tulburări circulatorii venoase și arteriale). *Orificiile* – limba. *Secreția* – sudoarea. *Gustul* – amar. *Culoarea* – roșie.
- *Limba* – vârful limbii (C), rădăcina limbii (IG). *Pulsul* - poziția Cui din stânga, pe artera radială; superficial pentru Intestin Subțire și profund pentru Inimă.
- *Anotimpul* – vara. Factorul patogen exogen este Căldura. Ea dispersează și consumă lichidul din organism, producând sete, gură și limbă uscate, micțiuni rare, urini de culoare galbenă-închis, febră.

Tratamentul

I. Tehnica Shu-Mu

- Cshi – VC14(d) + C3(d)
- IGshi – VC4(d) + E39(d)
- Cxu – V15(t) + VG11(t) + C7(t)
- IGxu – V27(t) + IG4(t)

II. Tehnica celor patru ace

- Cshi – C7(d) + RP3(d) + C3(t) + R10(t)
- IGshi – IG8(d) + E36(d) + IG2(t) + V66(t)
- Cxu – C9(t) + F1(t) + C3(d) + R10(d)
- IGxu – IG3(t) + VB41(t) + IG2(d) + V66(d)

Tabelul 20.

Criteriile de diagnostic în sindromul Insuficiență (Xu) și Exces (Shi) al meridianelor lojei energetice Foc

<i>Criterii</i>	<i>Sindrom Shi</i>	<i>Sindrom Xu</i>
Organ Zang (C)	Dureri precordiale, senzație de plenitudine în torace, tahicardie, aritmie	Tahicardie și dispnee la efort fizic minimal, astenie, slăbiciune în membrele superioare, senzație de rece în mâini, hiperhidroză spontană
Organ Fu (IG)	Dureri în regiunea ombilicală și abdomenul interior, constipație sau diaree cu scaune galbene, retenție a gazelor	Scaune cu alimente prost digerate, apoase sau mucoase, dureri abdominale (ameliorare la presare, bolnavul stă ghemuit); senzație de slăbiciune în mâini
Psihism	Hiperemotivitate, accese de râs sau de cântat nemotivate, crize de isterie, euforie, agitație ce împiedică somnul, logoree, extravaganță	Tristețe, teamă, melancolie, timiditate, sfială, depresie, amnezie, astenie
Țesut	Hipertensiune arterială, apoplexie, afazie	Hipotensiune arterială, lipotimii, vertij, stări sincopale, obnubilare
Orificii	Gură uscată, amară, ulcerăție în cavitatea bucală și pe limbă	Buze palide sau cianotice, limbă palidă
Gust	Bolnavul evită alimentele cu gust amar, nu suportă miros prăjit; ameliorare la consumul alimentelor picante	Bolnavul preferă alimentele cu gust amar și miros prăjit; agravare la consumul alimentelor picante.
Culoare	Piele și față roșie	Fața palidă, ștearsă, piele de paloare cadaverică sau ceroasă
Limbă	Roșie, cu depozit galben	Palidă, având o tumefiere ușoară la vârf, cu depozit alb
Puls	De tip Exces	De tip Insuficiență
Anotimp	Agravare vara; bolnavul evită căldura	Ameliorare vara; bolnavul preferă căldura

III. Regula "mamă/fiu" cu aplicarea punctelor celor cinci elemente ale organului afectat

- Cshi – C4(d)
- IGshi – IG1(d)
- Cxu – C3(t)
- IGxu – IG2(t)

IV. Regula "mamă/fiu" cu aplicarea punctelor sedative și de tonifiere a organelor neafectate conform ciclului de stimulare a celor cinci elemente

- Cshi – RP5(d)
- IGshi – E45(d)
- Cxu – F8(t)
- IGxu – VB43(t)

V. Regula "mamă/fiu" cu aplicarea punctelor sedative și de tonifiere conform mării circulației energetice

- Cshi – RP5(d) + IG3(t)
- IGshi – C7(d) + V67(t)
- Cxu – RP2(t) + IG8(d)
- IGxu – C9(t) + V65(d)

VI. Regula "miezul zilei/miezul nopții"

- Cshi – VB37(t)
- IGshi – F5(t)

Punctele cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) ale meridianului Veziculă Biliară indicate în algii legate de afectarea meridianului Inimă (Cshi):

<i>Localizarea durerii</i>	<i>Acupuncte (tonifiere contralaterală)</i>
Degetul auncular	VB6 Xuanli
Mână	VB9 Tianchong, VB33 Xiyangguan
Cot	VB33 Xiyangguan, VB44 Zuqiaoyin
Axila și centura scapulară	VB11 Qiaoyin, VB27 Wushu, VB33 Xiyangguan
Axila	VB38 Yangfu, VB40 Qiuxu, VB42 Diwuhui, VB44 Zuqiaoyin
Mușchiul mare pectoral (stern)	VB12 Wangu
Mușchiul mare pectoral (clavicula)	VB13 Benshen
Membrele superioare	VB12 Wangu, VB14 Yangbai
Articulațiile mâinii	VB38 Yangfu

Punctele cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) ale meridianului Ficat indicate în algii legate de afectarea meridianului Intestin Subțire (IG shi):

<i>Localizarea durerii</i>	<i>Acupuncte (tonifiere contralaterală)</i>
Degetele mâinii	F3 Taichong, F7 Xiguan
Regiunea carpo-metacarpiană	F7 Xiguan
Membrele superioare	F10 Wuli
Regiunea tricepsului	F8 Ququan
Umărul (articulația)	F3 Taichong
Maxilarul	F7 Xiguan

VII. Regula "soț/soție"

- Cshi – P7(t)
- IGshi – GI6(t)

VIII. Regula Biao-Li

- Cshi – C7(d) + IG7(t)

IGshi – IG4(d) + C5(t)

Cxu – C7(t) + IG7(d)

IGxu – IG4(t) + C5(d)

IX. Tehnica punctelor sezoniere (tab. 21, 22)

Tabelul 21.

Punctele sezoniere în sindromul Shi al organelor lojei Foc

Sezonul și organul afectat		Punctele sezoniere		
		Loja afectată	Protecția organelor (ciclul de inhibiție)	
			Dispersie	Tonifiere
Vara	C IG	C7 IG8	R1 V65	P11 GI3
Al 5-lea sezon	C IG	C4 IG1	R2 V60	P10 GI5
Toamna	C IG	C3 IG2	R3 V40	P9 GI11
Iarna	C IG	C9 IG3	R7 V67	P8 GI1
Primăvara	C IG	C8 IG5	R10 V66	P5 GI2

Tabelul 22.

Punctele sezoniere în sindromul Xu al organelor lojei Foc

Sezonul și organul afectat		Punctele sezoniere		
		Loja afectată	Protecția organelor (ciclul de inhibiție)	
			Tonifiere	Dispersie
Vara	C IG	C9 IG3	R3 V40	P9 GI11
Al 5-lea sezon	C IG	C8 IG5	R7 V67	P8 GI1
Toamna	C IG	C7 IG8	R10 V66	P5 GI2
Iarna	C IG	C4 IG1	R1 V65	P11 GI3
Primăvara	C IG	C3 IG2	R2 V60	P10 GI5

X. Tehnica punctelor Shu-Mu- sezoniere

Cshi – punct sezonier de dispersie al C(d) + VC14(d)

IGshi – punct sezonier de dispersie al IG(d) + VC4(d)

Cxu – punct sezonier de tonifiere al C(t) + V15(t)

IGxu – punct sezonier de tonifiere al IG(t) + V27(t)

Meridianele lojei energetice Pământ

Diagnosticul clinic

Criteriile de diagnostic al organelor afectate (tab. 23):

- *Constituția morfologică* – corp lat și solid, obezitate, menton dublu, buze groase, față rotundă, mână scurtă, groasă, eminentele tenoră și hipotenoră bine pronunțate; degete scurte, uneori umflate.
- *Simptomele copilăriei* – lacom-gurmand, preferă dulciuri, adeseori cu disfuncții abdominale; durduliu, uneori obez; vesel, vioi; enurezis; frecvent atins de viroze (sensibilitate a organelor respiratorii); hipermetropie, astigmatism, strabism divergent.
- *Simptomatologia de debut* – senzație de greutate în corp, gastralgie.
- *Bolile* – obezitate, tulburări de apetit, celulite, diabet de tip 2 (insulino-independent), prediabet, hiperlipoproteinemii; colagenoze, amiloidoze; afectare a organelor digestive (gastrită, ulcer, pancreatită etc.), vulnerabilitate a colonului (diaree alternând cu constipație); afectarea organelor respiratorii (bronșite, astm, sinuzite, rinofaringite); tulburări de ciclu la femei; furunculoze, psoriazis; hipermetropie, astigmatism etc. *Emoțiile* – griji, obsesii, persoane ambițioase, comportament calm. *Țesuturile* – conjunctiv (metabolismul); țesutul interstițial și metabolismul hidric. *Orificiile* – gura, buzele. *Secreția* – saliva. *Gustul* – dulce. *Culoarea* – galbenă.
- *Limba* – centrul limbii. *Pulsul* – poziția Guan din dreapta, pe artera radială: superficial pentru Stomac și profund pentru Splină-Pancreas.
- *Anotimpul* – al 5-lea sezon. Factorul patogen exogen este Umiditatea. Bolnavii afectați de Umiditate prezintă: senzația de greutate în cap, în corp, la nivelul articulațiilor, senzație de apăsare în capul pieptului. Bolile au tendința de a decurge cronic; micțiuni dificile și urină tulbură, diureză redusă, edeme; scaune cu mucozități sau vâscoase, dificil de eliminat, scaune cu sânge, balonări în epigastriu și abdomen; eczeme supurate. Este caracteristică limba cu depozit lipicios persistent.

Tratamentul

I. Tehnica Shu-Mu

- RPshi – F13(d) + RP9(d)
- Eshi – VC12(d) + E36(d)
- RPxu – V20(t) + VG6(t) + RP3(t)
- Exu – V21(t) + E42(t)

II. Tehnica celor patru ace

- RPshi – RP5(d) + P8(d) + RP1(t) + F1(t)
- Eshi – E45(d) + GI1(d) + E43(t) + VB41(t)
- RPxu – RP2(t) + C8(t) + RP1(d) + F1(d)
- Exu – E41(t) + IG5(t) + E43(d) + VB41(d)

Tabelul 23.
Criteriile de diagnostic în sindromul Insuficiența (Xu) și Exces (Shi) al meridianelor lojei energetice Pământ

Criterii	Sindrom Shi	Sindrom Xu
Organ Zang (RP)	Balonare, eructații, dureri prin distensie în epigastru (aggravate la palpare), dureri și senzație de greutate în hipocondru, constipație sau diaree; cefalee postprandială	Digestie proastă, pierdere în greutate, perete abdominal flasc (bombat), scaune cu mâncare nedigerată, diaree matinală, diaree apoasă sau rece; slăbiciune în membre
Organi Fu (E)	Dureri în epigastru (aggravare la presare), balonare, eructații, regurgitații, constipație, miros neplăcut din gură, vomă fierbinte imediat după mâncare, senzație de arsură pe cadrul esofagului, hiperaciditate, senzație de foame	Digestie lentă, anorexie, vomă (mase apoase, suc gastric și salivă); dureri în epigastru (ameliorare la presare), gastroptoză
Psihism	Idee fixe, obsesii, confabulație, gelozie, scrupulozitate excesivă	Lipsa de disciplină interioară, de responsabilitate, imposibilitatea de a se concentra, superficialitate
Țesut	Patologia țesutului conjunctiv (metabolism); polifagie ("flămând ca un lup")	Patologia țesutului conjunctiv (metabolism); scădere ponderală
Orificii	Gură și buze uscate ("gură arsă"), buze roșii, fisuri ale mucoasei bucale, fisuri ale comisurilor bucale; herpes labial	Buze de culoare cenușie, palide și ridate sau buze de culoare roz, umede și atone
Gust	Senzație de gust dulce în gură; bolnavul nu preferă alimentele cu gust dulce; ameliorare la consumarea alimentelor sărate	Lipsa gustului; bolnavul preferă gust dulce; agravare după consumul alimentelor sărate
Culoare	Tenta gălbuie a pielii	Față palidă, edemațiată
Limbă	Roșie, cu depozit galben	Palidă, cu depozit alb și amprente dentare sau cu fisuri în centru și la margini
Puls	De tip Exces	De tip Insuficiență
Anotimp	Aggravare în perioada celui de-I 5-lea sezon și sub acțiunea umidității; bolnavul evită umiditatea	Ameliorare în perioada celui de-al 5-lea sezon; bolnavul preferă umiditatea

III. Regula "mamă/fiu" cu aplicarea punctelor celor cinci elemente ale organului afectat

RPshi – RP9(d)
 Eshi – E44(d)
 RPxu – RP1(t)
 Exu – E43(t)

IV. Regula "mamă/fiu" cu aplicarea punctelor sedative și de tonifiere a organelor neafectate conform ciclului de stimulare a celor cinci elemente

RPshi – P5(d)

- Eshi - GI2(d)
- RPxu - C9(t)
- Exu - IG3(t)

V. Regula "mamă/fiu" cu aplicarea punctelor sedative și de tonifiere conform marii circulații energetice

- RPshi - E45(d) + C9(t)
- Eshi - GI2(d) + RP2(t)
- RPxu - E41(t) + C7(d)
- Exu - GI11(t) + RP5(d)

VI. Regula "miezul zilei/miezul nopții"

- RPshi - TR5(t)
- Eshi - MC6(t)

Punctele cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) ale meridianului Trei Focare indicate în algiile legate de afectarea meridianului Splină-Pancreas (RP shi):

<i>Localizarea durerii</i>	<i>Acupuncte (tonifiere contralaterală)</i>
Laba piciorului	TR2 Yemen, TR4 Yangchi, TR6 Zhigou
Gambă, genunchi	TR3 Zhongzhu, TR6 Zhigou
Genunchi	TR1 Guanchong, TR6 Zhigou
Suprafața medială a genunchiului	TR9 Sidu
Suprafața antero-medială a membrelor inferioare	TR4 Yangchi, TR5 Waiguan
O jumătate de corp	TR8 Sanyangluo

Punctele cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) ale meridianului Pericard indicate în algiile legate de afectarea meridianului Stomac (E shi):

<i>Localizarea durerii</i>	<i>Acupuncte (tonifiere contralaterală)</i>
Suprafața antero-laterală a membrelor inferioare	MC1 Tianchi
Fibula	MC5 Jianshi
Cutia toracică	MC1 Tianchi
Mușchiul mare pectoral	MC2 Tianquan
Gât	MC1 Tianchi, MC8 Laogong
Față (obraji, dinți)	MC7 Daling
Gură, partea internă a obrazului	MC8 Laogong, MC9 Zhongchong

VII. Regula "soț/soție"

- RPshi - F5(t)
- Eshi - VB37(t)

VIII. Regula Biao-Li

- RPshi - RP3(d) + E40(t)

- Eshi - E42(d) + RP4(t)
 RPxu - RP3(t) + E40(d)
 Exu - E42(t) + RP4(d)

IX. Tehnica punctelor sezoniere (tab. 24, 25).

Tabelul 24.
 Punctele sezoniere în sindromul Shi al organelor lojei Pământ

Sezonul și organul afectat		Punctele sezoniere		
		Loja afectată	Protecția organelor (ciclul de inhibiție)	
			Dispersie	Tonifiere
Vara	RP E	RP3 E36	F1 VB41	R1 V65
Al 5-lea sezon	RP E	RP5 E45	F2 VB38	R2 V60
Toamna	RP E	RP9 E44	F3 VB34	R3 V40
Iarna	RP E	RP1 E43	F4 VB44	R7 V67
Primăvara	RP E	RP2 E41	F8 VB43	R10 V66

Tabelul 25.
 Punctele sezoniere în sindromul Xu al organelor lojei Pământ

Sezonul și organul afectat		Punctele sezoniere		
		Loja afectată	Protecția organelor (ciclul de inhibiție)	
			Dispersie	Tonifiere
Vara	RP E	RP1 E43	F3 VB34	R3 V40
Al 5-lea sezon	RP E	RP2 E41	F4 VB44	R7 V67
Toamna	RP E	RP3 E36	F8 VB43	R10 V66
Iarna	RP E	RP5 E45	F1 VB41	R1 V65
Primăvara	RP E	RP9 E44	F2 VB38	R2 V60

X. Tehnica punctelor Shu-Mu- sezoniere.

- RPshi - punct sezonier de dispersie al RP(d) + F13(d)
 Eshi - punct sezonier de dispersie al E(d) + VC12(d)
 RPxu - punct sezonier de tonifiere al RP(t) + V20(t)
 Exu - punct sezonier de tonifiere al E(t) + V21(t)

Meridianele lojei energetice Metal

Diagnosticul clinic

Criteriile de diagnostic al organelor afectate (tab. 26):

- *Constituția morfologică* – statura înaltă, talie longilină, cap mic, nas lung; mână longilină, palme înguste, degete lungi, uneori strâmbe.
- *Simptomele copilăriei* – rino-faringite, bronșite, traheite, astm, anosmie, rinită alergică; otite seroase; constipații, intoleranță la lapte; polipoză intestinală; preferă mâncare picantă; eczemă, acnee în perioada adolescenței; enurezis; laxitatea ligamentelor; colagenoze; copil cuminte și lent; lipsă de atenție.
- *Simptomatologia de debut* – dispnee, tuse; dureri intestinale, borborisme.
- *Bolile* – slăbiciune naturală a aparatului respirator și digestiv (coriză, bronșită, laringită, sinusite, rinite; astm, emfizem pulmonar; colite cronice sau diaree cu trezirea bolnavului la ora 5–7, constipații, polipoză intestinală, hemoroizi, prolaps rectal); colagenoze, poliartrită reumatoidă, spondilită anchilopoietică, laxitate ligamentară cu luxații și entorse; sensibilitate crescută a sistemului limfatic și al pielii (adenite, acnee, eczeme, psoriazis, micoze etc.); cari dentare multiple. *Emoțiile* – supărare, tristețe, oboseală crescând progresiv în a doua jumătate de zi, necesitate de mult somn, pesimism. *Țesuturile* – pielea, părul. *Orificiile* – nasul. *Secreția* – sputa. *Gustul* – picant. *Culoarea* – albă.
- *Limba* – partea intermediară a limbii, între vârf și centrul ei (P), rădăcina limbii (GI). *Pulsul* – poziția Cun din dreapta, pe artera radială: superficial pentru Intestin Gros și profund pentru Plămâni.
- *Anotimpul* – toamna. Factorul patogen exogen este Uscăciunea. Acest factor patogen afectează mai des Plămânii și funcția lor de dispersie și coborâre a Energiei (Qi). La bolnavi sunt posibile simptome de deficit al lichidului: nas și gât uscate, tuse uscată cu spută lipicioasă sau striuri sangvinolente, gură uscată și sete, piele crăpată și zbârcită, constipație, micțiuni rare.

Tratamentul

I. Tehnica Shu-Mu

- Pshi – P1(d) + P3(d)
- Glshi – E25(d) + E37(d)
- Pxu – V13(t) + VG12(t) + P9(t)
- Glxu – V25(t) + VG3(t) + GI4(t)

II. Tehnica celor patru ace

- Pshi – P5(d) + R10(d) + P10(t) + C8(t)
- Glshi – GI2(d) + V66(d) + GI5(t) + IG5(t)
- Pxu – P9(t) + RP3(t) + P10(d) + C8(d)
- Glxu – GI11(t) + E36(t) + GI5(d) + IG5(d)

Tabelul 26.

Criteriile de diagnostic în sindromul Insuficiență (Xu) și Exces (Shi) al meridianelor lojei energetice Metal

<i>Criterii</i>	<i>Sindrom Shi</i>	<i>Sindrom Xu</i>
Organ Zang (P)	Tuse sonoră și uscată, cu expectorație filantă, galbenă; dureri și senzație de plenitudine în torace, expirații dificile; bolnavul nu suportă poziția orizontală pe spate; febră sau senzație de căldură în tot corpul, transpirații fierbinți	Tuse răgușită și superficială, cu expectorații seroase de culoare deschisă, inspirație dificilă; senzație de slăbiciune pronunțată și frig în torace; voce răgușită și slabă; transpirații reci, frison, transpirații nocturne
Organ Fu (GI)	Dureri în abdomen (agravare la presare), constipație spastică, scaune uscate sau diaree cu sânge și puroi, scaune fierbinți cu miros fetid, senzație de arsură în anus, dureri în perineu până și după defecație, miros neplăcut din gură, sete	Dureri abdominale (cu ameliorare la presare), abdomen flasc, la palparea intestinelor clapotaj, diaree lichidă, scaune reci cu spumă, constipație atonică
Psihism	Melancolie, obsesii pentru viitor, tendință la suicid, scăderea plăcerii de a trăi, tristețe	Astenie psihică, plâns ușor, contrarietate chiar la lucruri mărunte
Țesut	Afectarea pielii și a țesutului epitelial (respirator și digestiv); hirsutism	Căderea părului
Orificii	Obstrucție nazală, nas uscat, epistaxis	Rinoree cu eliminări de culoare deschisă
Gust	Bolnavul nu suportă gustul picant; starea bolnavului se ameliorează moderat la consumarea alimentelor acre	Bolnavul preferă gustul picant; starea bolnavului se agravează la consumul alimentelor acre
Culoare	Tentă albicioasă a pielii	Tentă palidă, față puțin tumefiată
Limbă	Groasă, roșie, cu depozit galben	Palidă, flască, puțin tumefiată, cu depozit alb
Puls	De tip Exces	De tip Insuficiență
Anotimp	Agravare în perioada de toamnă și sub influența uscăciunii; bolnavul evită uscăciunea	Ameliorare toamna; bolnavul preferă uscăciunea

III. Regula "mamă/fiu" cu aplicarea punctelor celor cinci elemente ale organului afectat

- Pshi – P11(d)
- Glshi – G13(d)
- Pxu – P10(t)
- Glxu – G15(t)

IV. Regula "mamă/fiu" cu aplicarea punctelor sedative și de tonifiere a organelor neafectate conform ciclului de stimulare a celor cinci elemente

- Pshi – R1(d)
- Glshi – V65(d)
- Pxu – RP2(t)
- Glxu – E41(t)

V. Regula "mamă/fiu" cu aplicarea punctelor sedative și de tonifiere conform mării circulații energetice.

- Pshi – F2(d) + GI11(t)
- GIshi – P5(d) + E41(t)
- Pxu – F8(t) + GI2(d)
- GIxu – P9(t) + E45(d)

VI. Regula "miezul zilei/miezul nopții".

- Pshi – V58(t)
- GIshi – R4(t)

Punctele cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) ale meridianului Vezică indicate în algiile legate de afectarea meridianului Plămân (P shi):

<i>Localizarea durerii</i>	<i>Acupuncte (tonifiere contralaterală)</i>
Mână	V62 Shenmai
Membrele superioare	V59 Fuyang
Suprafața laterală a brațului	V39 Weiyang, V61 Pushen
Centura scapulară, cutia toracică	V6 Chengguang, V7 Tongtian
Centura scapulară	V39 Weiyang
Articulațiile	V11 Dazhu, V62 Shenmai

Punctele cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) ale meridianului Rinichi indicate în algiile legate de afectarea meridianului Intestin Gros (GIshi):

<i>Localizarea durerii</i>	<i>Acupuncte (tonifiere contralaterală)</i>
Articulațiile degetelor de la mână	R15 Zhongzhu
Indexul, partea superioară a centurii scapulare	R26 Yuzhong
Suprafața dorsală a membrelor superioare	R25 Shencang
Antebraț (pronatorii, flexorii), braț	R8 Jiaoxin
Centura scapulară	R7 Fuliu
Gât	R1 Yongquan, R5 Shuiquan
Gură	R5 Shuiquan
Dinți	R7 Fuliu
Gingii	R6 Zhaohai
Maxilare	R25 Shencang
Comisura bucală, obraz	R17 Shangqu
Nas extern	R27 Shufu

VII. Regula "soț/soție"

- Pshi – C5(t)
- GIshi – IG7(t)

VIII. Regula Biao-Li

- Pshi – P9(d) + GI6(t)
- GIshi – GI4(d) + P7(t)
- Pxu – P9(t) + GI6(d)
- GIxu – GI4(t) + P7(d)

IX. Tehnica punctelor sezoniere (tab. 27, 28).

Tabelul 27.

Punctele sezoniere în sindromul Shi al organelor lojei Metal

Sezonul și organul afectat		Punctele sezoniere		
		Loja afectată	Protecția organelor (ciclul de inhibiție)	
			Dispersie	Tonifiere
Vara	P GI	P9 GI11	C9 IG3	F1 VB41
Al 5-lea sezon	P GI	P8 GI1	C8 IG5	F2 VB38
Toamna	P GI	P5 GI2	C7 IG8	F3 VB34
Iarna	P GI	P11 GI3	C4 IG1	F4 VB44
Primăvara	P GI	P10 GI5	C3 IG2	F8 VB43

Tabelul 28.

Punctele sezoniere în sindromul Xu al organelor lojei Metal

Sezonul și organul afectat		Punctele sezoniere		
		Loja afectată	Protecția organelor (ciclul de inhibiție)	
			Dispersie	Tonifiere
Vara	P GI	P11 GI3	C7 IG8	F3 VB34
Al 5-lea sezon	P GI	P10 GI5	C4 IG1	F4 VB44
Toamna	P GI	P9 GI11	C3 IG2	F8 VB43
Iarna	P GI	P8 GI1	C9 IG3	F1 VB41
Primăvara	P GI	P5 GI2	C8 IG5	F2 VB38

X. Tehnica punctelor Shu-Mu- sezoniere.

- Pshi – punct sezonier de dispersie al P(d) + P1(d)
- GIshi – punct sezonier de dispersie al GI(d) + E25(d)
- Pxu – punct sezonier de tonifiere al P (t) + V13(t)
- GIxu – punct sezonier de tonifiere al GI (t) + V25(t)

Meridianele lojei energetice Apă

Diagnosticul clinic

Criteriile de diagnostic al organelor afectate (tab. 29):

- *Constituția morfologică* – statură medie, abdomen mare, capul pare mare în raport cu umerii; mână scurtă, cu degetele scurte și groase; unghiile late și lungi, puțin bombate.
- *Simptomele copilăriei* – slăbiciune naturală a rinichilor, suprarenalelor, gonadelor și a vezicii; vulnerabilitatea organelor ORL (anghine, otite etc.); reumatism, rahitism; întârzierea ciclului la fete; copilul este hipersensibil, retras; vitalitate slabă; tuberculoză extrapulmonară.
- *Simptomatologia de debut* – dureri în abdomenul inferior, lombalgie, oligo-anurie.
- *Bolile* – nefropatii, pielonefrite, malformații ale arborelui urinar, albuminurie ortostatică, edeme matinale ale pleoapelor, edeme ale gleznelor la sfârșitul zilei; lombalgie menstruală, dismenoree, amenoree; patologia sistemului osos (artroze, poliartrite, spondilită, osteoporoză etc.); anghine, otite supurale, mastoidite; furunculoză; manifestări depresive. *Emoțiile* – frica, teama. *Țesuturile* – măduvă, oase (sistemul mineral și hidroelectrolitic), părul capului, dinții. *Orificiile* – urechi, uretră, anus. *Secreția* – urina. *Gustul* – sărat. *Culoarea* – neagră.
- *Limba* – rădăcina. *Pulsul* – poziția Chi din stânga, pe artera radială: superficial pentru Vezică și profund pentru Rinichi.
- *Anotimpul* – iarna. Factorul patogen exogen este Frigul. Acest factor patogen se caracterizează prin contracție și stagnare, dereglare a procesului de deschidere și închidere a porilor pielii, apar simptome cauzate de afectarea circulației Qi și Xue (crampe musculare, membre reci, senzație de frig și durere, urină limpede, diaree cu hrană nedigerată etc.).

Tratamentul

I. Tehnica Shu-Mu

- Rshi – VB25(d) + R10(d)
- Vshi – VC3(d) + V40(d)
- Rxu – V23(t) + VG4(t) + R3(t)
- Vxu – V28(t) + V64(t)

II. Tehnica celor patru ace

- Rshi – R1(d) + F1(d) + R3(t) + RP3(t)
- Vshi – V65(d) + VB41(d) + V40(t) + E36(t)
- Rxu – R7(t) + P8(t) + R3(d) + RP3(d)
- Vxu – V67(t) + G11(t) + V40(d) + E36(d)

III. Regula "mamă/fiu" cu aplicarea punctelor celor cinci elemente ale organului afectat

- Rshi – R2(d)

Tabelul 29.

Criteriile de diagnostic în sindromul Insuficiență (Xu) și Exces (Shi) al meridianelor logei energetice Apă

Criterii	Sindrom Shi	Sindrom Xu
Organ Zang (R)	Creștere a potenței sexuale; lombalgii, senzație de căldură în regiunea lombară; cefalee acută; edeme, anurie, oligurie	Scădere a potenței sexuale; oboseală matinală (mai pronunțată decât seara); edeme în regiunea suboculară sau generalizate; incontinență urinară, poliurie
Organ Fu (V)	Spasme în organele urogenitale, micțiuni frecvente, hematurie sau piurie, urină tulbură cu miros puternic, disurie; cefalee frontooccipitală, durere în unghiul intern al ochiului, lăcrimare excesivă, senzație de înțepare în ochi; mușchi tensionați și algici ai coloanei vertebrale	Edematierea organelor urogenitale, micțiuni rare, incontinență urinară (la răs și tuse), disurie; cap greu; hipotonie a mușchilor coloanei vertebrale, senzație de "înghețare" în regiunea lombară și abdomenul inferior
Psihism	Autoritarism, comportament categoric, lipsa de respect față de cei din jur, suspiciune, visuri erotice, neliniște interioară, tensionare	Indecizie, timiditate, lipsă de caracter, lipsă de voință, teamă
Țesut	Tulburări ale metabolismului hidro-electrolitic; dureri în oase; creștere excesivă a părului în regiunea cefalică	Tulburare a metabolismului hidroelectrolitic; pierderea părului în regiunea cefalică
Orificii	Micțiuni rare, anurie sau micțiuni frecvente și dureroase; pavilioanele urechii sunt elastice și lucitoare; varice hemoroidal	Incontinență urinară, poliurie; diaree matinală, varice hemoroidal; diminuarea auzului, pavilioane auriculare atone și palide
Gust	Bolnavul evită gustul sărat; ameliorare la consumul alimentelor amare	Bolnavul preferă gustul sărat
Culoare	Ten pământiu al feței	Față palidă, pământie sau cenușie
Limbă	Roșie, cu depozit galben (hiperemie mai pronunțată la rădăcina limbii)	Palidă, umedă și plată
Puls	De tip Exces	De tip Insuficiență
Anotimp	Agravare iarna și la frig; bolnavul evită frigul	Ameliorare iarna; bolnavul preferă frigul

Vshi – V60(d)

Rxu – R3(t)

Vxu – V40(t)

IV. Regula "mamă/fiu" cu aplicarea punctelor sedative și de tonifiere a organelor neafectate conform ciclului de stimulare a celor cinci elemente:

Rshi – F2(d)

Vshi – VB38(d)

Rxu – P9(t)

Vxu – GI11(t)

V. Regula "mamă/fiu" cu aplicarea punctelor sedative și de tonifiere conform mării circulații energetice

Rshi – V65(d) + MC9(t)

- Vshi – IG8(d) + R7(t)
 Rxu – V67(t) + MC7(d)
 Vxu – IG3(t) + R1(d)

VI. Regula "miezul zilei/miezul nopții"

- Rshi – GI6(t)
 Vshi – P7(t)

Punctele cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) ale meridianului Intestin Gros indicate în algiile legate de afectarea meridianului Rinichi (Rshi):

<i>Localizarea durerii</i>	<i>Acupuncte (tonifiere contralaterală)</i>
Suprafața antero-medială a membrilor inferioare	GI1 Shangyang, GI4 Hegu, GI5 Yangxi
Membrele inferioare	GI9 Shanglian, GI8 Xialian
Suprafața medială a halucelui	GI4 Hegu, GI3 Sanjian
Articulația tibio-tarsiană	GI3 Sanjian, GI9 Shanglian, GI13 Wuli
Suprafața medială a gambei	GI4 Hegu, GI6 Pianli, GI7 Wenliu, GI9 Shanglian
Suprafața medială a genunchiului	GI3 Sanjian, GI4 Hegu, GI9 Shanglian, GI13 Wuli
Membrele inferioare (adductorii)	GI18 Futu
Mușchii abdomenului	GI15 Jianyu
Cutia toracică	GI1 Shangyang

Punctele cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) ale meridianului Plămân indicate în algiile legate de afectarea meridianului Vezică (Vshi):

<i>Localizarea durerii</i>	<i>Acupuncte (tonifiere contralaterală)</i>
Articulațiile membrilor inferioare	P6 Kongzui
Gambă	P11 Shaoshang
Genunchi, gambă	P8 Jingqu
Suprafața posterioară a articulației genunchiului	P11 Shaoshang
Membrele inferioare (durere și tumefiere)	P1 Zhongfu
Regiunea lombară (vertebrele)	P5 Chize
Regiunea lombară (durere și slăbiciune)	P7 Lieque
Partea laterală a cefei	P3 Tianfu
Omoplat, ceafă	P8 Jingqu
Capul	P7 Lieque
Ochii, pleoapele	P3 Tianfu, P4 Xiabai, P7 Lieque

VII. Regula "soț/soție

Rshi – MC6(t)

Vshi – TR5(t)

VIII. Regula Biao-Li

Rshi – R3(d) + V58(t)

Vshi – V64(d) + R4(t)

Rxu – R3(t) + V58(d)

Vxu – V64(t) + R4(d)

IX. Tehnica punctelor sezoniere (tab. 30, 31).

Tabelul 30.

Punctele sezoniere în sindromul Shi al organelor lojei Apă

Sezonul și organul afectat		Punctele sezoniere		
		Loja afectată	Protecția organelor (ciclul de inhibiție)	
			Dispersie	Tonifiere
Vara	R	R3	C9	RP1
	V	V40	IG3	E43
Al 5-lea sezon	R	R7	C8	RP2
	V	V67	IG5	E41
Toamna	R	R10	C7	RP3
	V	V66	IG8	E36
Iarna	R	R1	C4	RP5
	V	V65	IG1	E45
Primăvara	R	R2	C3	RP9
	V	V60	IG2	E44

Tabelul 31.

Punctele sezoniere în sindromul Xu al organelor lojei Apă

Sezonul și organul afectat		Punctele sezoniere		
		Loja afectată	Protecția organelor (ciclul de inhibiție)	
			Dispersie	Tonifiere
Vara	R	R1	C7	RP3
	V	V65	IG8	E36
Al 5-lea sezon	R	R2	C4	RP5
	V	V60	IG1	E45
Toamna	R	R3	C3	RP9
	V	V40	IG2	E44
Iarna	R	R7	C9	RP1
	V	V67	IG3	E43
Primăvara	R	R10	C8	RP2
	V	V66	IG5	E41

X. Tehnica punctelor Shu-Mu- sezoniere.

Rshi – punct sezonier de dispersie al R(d) + VB25(d)

- Vshi – punct sezonier de dispersie al V(d) + VC3(d)
- Rxu – punct sezonier de tonifiere al R(t) + V23(t)
- Vxu – punct sezonier de tonifiere al V(t) + V28(t)

Meridianele lojei energetice Lemn

Diagnosticul clinic

Criteriile de diagnostic al organelor afectate (tab. 32):

- *Constituția morfologică* – spate lat, umeri largi, musculos, mâini cărnoase, articulații interfalangiene noduroase (se observă bine pe dosul mâinii); palma cu numeroase striuri paralele și longitudinale, uneori profunde.
- *Simptomele copilăriei* – slăbiciune naturală a ficatului și veziculei biliare cu dificultăți în digestie (intoleranță alimentară la ouă, ciocolată, grăsimi); miopie; crize alergice la alimente (urticarie, prurit), alergii de contact; copiii sunt nervoși sau timizi (își rod unghiile, au ticuri).
- *Simptomatologia de debut* – cecitate temporară, durere în hipocondru, gură amară, oftat frecvent.
- *Bolile* – alergii alimentare, reacții alergice la mușcături de insecte, la soare, medicamente (urticarie, eczemă, rinită alergică, conjunctivită, astm bronșic etc.); migrene, cefalee (mai ales declanșate de vânt, mese copioase, furie, ciclu menstrual); hepatite, colecistită, constipații, hemoroizi; artralгии; cicluri dureroase, fibrom uterin; spasmofilie; patologie a ochilor (sensibilitate crescută, conjunctivite, miopie); herpes (genital, ocular, bucal). *Emoțiile* – furie, mânie, instabilitate emoțională. *Țesuturile* – mușchi, unghii. *Orificiile* – ochii. *Secreția* – lacrimi. *Gustul* – acru. *Culoarea* – verde.
- *Limba* – marginile (din stânga și din dreapta). *Pulsul* – poziția Guan din stânga, pe artera radială: superficial pentru Veziculă Biliară și profund pentru Ficat.
- *Anotimpul* – primăvara. Factorul patogen exogen este Vântul. Tulburările provocate de către Vânt se caracterizează prin simptome migratorii, instalare bruscă a bolii, schimbări rapide (dureri migratorii, urticarii, convulsii etc.). Se dereglează procesul de deschidere și închidere a porilor pielii.

Tratamentul

I. Tehnica Shu-Mu

- Fshi – F14(d) + F8(d)
- VBshi – VB24(d) + VB34(d)
- Fxu – V18(t) + VG8(t) + F3(t)
- VBxu – V19(t) + VG7(t) + VB40(t)

II. Tehnica celor patru ace

- Fshi – F2(d) + C8(d) + F4(t) + P8(t)
- VBshi – VB38(d) + IG5(d) + VB44(t) + GI1(t)

Tabelul 32.

Criteriile de diagnostic în sindromul Insuficiență (Xu) și Exces (Shi) al meridianelor lojei energetice Lemn

Criterii	Sindrom Shi	Sindrom Xu
Organ Zang (F)	Sclere icterice, pielea de culoare galben-verzui; cefalee (mai des unilaterală), vertij; dureri în hipocondru cu iradiere pelvină, dureri la rotația corpului și percuția arcurilor costale, senzație de plenitudine în hipocondru (agravare la presăție); dereglare a ciclului menstrual, coagulare a sângelui menstrual, metrorragie	Hemii; varicocеле, orhită; slăbiciune musculară; ptoza uterului și a vaginului, la femei dureri în partea inferioară a abdomenului, eliminări menstruale abundente de culoare deschisă, prelungite; frigiditate, dereglări ale erecției, ejaculare precoce; meteorism, diaree cu scaune galbene sau fără culoare
Organ Fu (VB)	Gură uscată, gust amar, greață, vomă cu lichid, spasme abdominale; cefalee hemicraniană (cu ameliorare la întuneric și liniște), migrenă temporoparietală, vertij; dureri în regiunea comisurii oftalmice externe	Greață matinală, dureri în hipocondru, digestie proastă (steatoze); icter
Psihism	Excitabilitate crescută, furie, nemulțumire, dereglări ale somnului cauzate de emoții excesive, hiperemotivitate	Indiferență, somnolență, lipsă de entuziasm, plictiseală
Țesut	Spasme musculare, tensionare și rigiditate lemnoasă a mușchilor scheletici, dureri în partea internă a gambei și coapsei	Slăbiciune în membre, atonia mușchilor
Orificii	Ochi inflamați și roșii, lăcrimare, tulburări vizuale	Scădere a acuității vizuale, ambliopie, fotofobie, uscăciune a sclerelor
Gust	Evită alimentele cu gust acru; ameliorare la consumarea alimentelor dulci	Bolnavul preferă alimente cu gust și miros acru; agravare după consumul alimentelor cu gust dulce
Culoare	Piele de culoare galben-verzui	Față palidă, pământie sau verzuie și ceroasă; cearcăne sub ochi
Limbă	Roșie, cu depozit galben	Palidă și umedă, cu depozit alb
Puls	De tip Exces	De tip Insuficiență
Anotimp	Agravare primăvara, la vânt; bolnavul evită vântul	Ameliorare primăvara; bolnavul preferă vântul

Fxu – F8(t) + R10(t) + F4(d) + P8(d)

VBxu – VB43(t) + V66(t) + VB44(d) + G11(d)

III. Regula "mamă/fiu" cu aplicarea punctelor celor cinci elemente ale organului afectat

Fshi – F3(d)

VBshi – VB34(d)

Fxu – F4(t)

VBxu – VB44(t)

IV. Regula "mamă/fiu" cu aplicarea punctelor sedative și de tonifiere a organelor neafectate conform ciclului de stimulare a celor cinci elemente

Fshi – C7(d)

- VBshi – IG8(d)
 Fxu – R7(t)
 VBxu – V67(t)

V. Regula "mamă/fiu" cu aplicarea punctelor sedative și de tonifiere conform mării circulații energetice

- Fshi – VB38(d) + P9(t)
 VBshi – TR10(d) + F8(t)
 Fxu – VB43(t) + P5(d)
 VBxu – TR3(t) + F2(d)

VI. Regula "miezul zilei/miezul nopții"

- Fshi – IG7(t)
 VBshi – C5(t)

Punctele cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) ale meridianului Intestin Subțire indicate în algii legate de afectarea meridianului Ficat (Fshi):

<i>Localizarea durerii</i>	<i>Acupuncte (tonifiere contralaterală)</i>
Haluțe, articulația tibiotarsiană	IG18 Quanliao
Articulațiile membrelor inferioare, suprafața medială a coapsei	IG4 Wangu
Articulațiile membrelor inferioare	IG6 Yanglao
Membrele inferioare, articulația tibiotarsiană	IG3 Houxi
Suprafața medială a coapsei	IG2 Qiangu, IG4 Wangu
Cutia toracică	IG2 Qiangu

Punctele cu acțiune contralaterală (miezul zilei/miezul nopții) ale meridianului Inimă indicate în algii legate de afectarea meridianului Vezicula Biliară (VBshi):

<i>Localizarea durerii</i>	<i>Acupuncte (tonifiere contralaterală)</i>
Suprafața dorsală a labei piciorului	C6 Yinxi
Maleola externă	C7 Shenmen
Suprafața antero-laterală a gambei	C5 Tongli, C6 Yinxi, C7 Shenmen
Suprafața antero-laterală a genunchiului	C5 Tongli
Suprafața antero-laterală a membrilor inferioare	C3 Shaohai
Spații intercostale	C8 Shaofu, C9 Shaochong
Suprafața posterioară a centurii scapulare	C5 Tongli
Ceafă, suprafața laterală a gâtului	C3 Shaohai
Obraji, ochii	C6 Yinxi
O jumătate de corp (hemitip)	C4 Lingdao

VII. Regula "soț/soție"

Fshi – RP4(t)

VBshi – E40(t)

VIII. Regula Biao-Li

Fshi – F3(d) + VB37(t)

VBshi – VB40(d) + F5(t)

Fxu – F3(t) + VB37(d)

VBxu – VB40(t) + F5(d)

IX. Tehnica punctelor sezoniere (tab. 33, 34).

Tabelul 33.

Punctele sezoniere în sindromul Shi al organelor lojei Lemn

Sezonul și organul afectat		Punctele sezoniere		
		Loja afectată	Protecția organelor (ciclul de inhibiție)	
			Dispersie	Tonifiere
Vara	F	F3	P11	RP1
	VB	VB34	GI3	E43
Al 5-lea sezon	F	F4	P10	RP2
	VB	VB44	GI5	E41
Toamna	F	F8	P9	RP3
	VB	VB43	GI11	E36
Iarna	F	F1	P8	RP5
	VB	VB41	GI1	E45
Primăvara	F	F2	P5	RP9
	VB	VB38	GI2	E44

Tabelul 34.

Punctele sezoniere în sindromul Xu al organelor lojei Lemn

Sezonul și organul afectat		Punctele sezoniere		
		Loja afectată	Protecția organelor (ciclul de inhibiție)	
			Dispersie	Tonifiere
Vara	F	F1	P9	RP3
	VB	VB41	GI11	E36
Al 5-lea sezon	F	F2	P8	RP5
	VB	VB38	GI1	E45
Toamna	F	F3	P5	RP9
	VB	VB34	GI2	E44
Iarna	F	F4	P11	RP1
	VB	VB44	GI3	E43
Primăvara	F	F8	P10	RP2
	VB	VB43	GI5	E41

X. Tehnica punctelor Shu-Mu- sezoniere.

- Fshi – punct sezonier de dispersie al F(d) + F14(d)
- VBshi – punct sezonier de dispersie al VB(d) + VB24(d)
- Fxu – punct sezonier de tonifiere al F(t) + V18(t)
- VBxu – punct sezonier de tonifiere al VB(t) + V19(t)

IV.2. Meridianele extraordinare

Diagnosticul clinic

Relațiile energetice, traseul intern și extern al meridianelor extraordinare determină specificul afectării lor. În linii generale, în funcție de localizarea afecțiunilor sunt indicate diferite meridiane extraordinare:

<i>Puncte cheie</i>	<i>Meridianele extraordinare</i>	<i>Localizarea afecțiunii</i>
MC6-RP4	Yin Wei Mai-Chong Mai	Inimă, cutia toracică, stomac
IG3-V62	Du Mai-Yang Qiao Mai	Spate, coloană vertebrală, ceafă, regiunea scapulo-humerală, unghiul intern al ochilor.
TR5-VB41	Yang Wei Mai-Dai Mai	Regiunea retroauriculară, obraz, unghiul extern al ochilor.
P7-R6	Ren Mai-Yin Qiao Mai	Gât, cutia toracică, plămâni.

Aceste indicații nu reflectă toate variantele de patologie, apărute în afectarea meridianelor extraordinare, ci numai una din multiplele posibilități de aplicare a punctelor cheie după principiul sus-jos, având în vedere localizarea afecțiunii. De exemplu, în afectarea stomacului sunt indicate punctele MC6 Neiguan (sus) și RP4 Gongsun (jos).

În *tab. 35* sunt redată semnele afectării meridianelor curioase, sindroamele energetice de bază și informația necesară pentru efectuarea diagnosticului și tratamentului diferențiat.

Tratamentul

În procesul tratamentului acupunctic cu folosirea meridianelor extraordinare se respectă anumite condiții.

- Tratamentul prin intermediul meridianelor curioase se efectuează în special la bolnavii anterior tratați cu alte tehnici de tratament acupunctic, însă la care nu s-a obținut efectul dorit.
- Meridianele extraordinare se aplică în cazurile când la bolnav sunt depistate simptomele afectării, se evidențiază puncte sensibile sau dureroase (spontane sau la palpare) pe traseul meridianelor curioase, și în special a punctelor cheie.

**Afectarea meridianelor curioase Du Mai-Yang Qiao Mai:
simptomatologia și diagnosticul diferențiat**

Criteriile		Diagnosticul diferențiat	
		Du Mai	Yang Qiao Mai
I. Tulburări energetice	Sindroamele de bază	Insuficiența Yang-Qi; Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor (tinitus, diminuarea memoriei, impotență); Insuficiența Yang-Qi a Inimii (depresie, palpitații, dureri precordiale); Vânt-Extern (rinită, febră, cefalee); Vânt Intern (tremor, convulsii, torticolis, ictus cerebral); afectarea creierului și măduvii spinării	Vânt-Extern în regiunea cefalică (paralizie facială); Vânt-Intern în regiunea cefalică (afazie, tinitus, surditate); Vânt-Căldură și Vânt-Frig (cefalee, răceală, lombalgie acută) în meridianul Vezică; stagnarea Qi în meridianul Vezică (dureri lombare și în membrele inferioare); Excesul Yang-Qi în regiunea cefalică (tensionare nervoasă, insomnie)
II. Durerea	Localizarea algiilor	Esofag, glande salivare, gât (inflamare); spate (coloana vertebrală); ochi; dinți	Rinichi, vezică; regiunea lombară și sacro-iliacă, suprafața postero-externă a membrilor inferioare; gât (inflamare); cefalee; piele
III. Palparea	Punct cheie Punct de intrare Punct de ieșire Punct de alarmă Punct Xi Punctele meridianelor curioase	IG3 VG1 VG27 — — VG1 – VG28	V62 V62 VB20 VB29 V59 GI15, GI16, E1, E3, E4, IG10, V1, V59, V61, V62, VB20, VB29
		Yang Wei Mai	Dai Mai
I. Tulburări energetice	Sindroamele de bază	Sindromul semiextern-semiintern (alternarea febrei și frisonului); hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului, ascendența Yang-Qi a Ficatului (tinitus, hipoacuzie); Umiditate-Căldură în Ficat și Vezicula Biliară (otita medie, afectarea pielii); stagnarea Qi în partea exterioră a trunchiului, membrilor și hipocondru	Hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului și Veziculei Biliare (cefalee, migrenă), Focul Ficatului în Exces; Insuficiența Xue a Ficatului (afectarea mușchilor și articulațiilor); stagnarea Qi a Ficatului; stagnarea Qi și Xue în membrele inferioare; Insuficiența meridianului Splină și Stomac (atrofie și atonie a mușchilor în membrele inferioare); Umiditate-Căldură în Ficat, Vezicula Biliară și organele urogenitale (disurie, leucoree, prolaps uterin)
II. Durerea	Localizarea algiilor	Urechii, dinți, cap; articulații, regiunea brațului și antebrăului, degetele mâinii și a picioarelor; regiunea gâtului (mai jos de nivelul C3); suprafața externă a membrilor inferioare	Regiunea lombară (dureri "în centură"), articulațiile membrilor inferioare, regiunea centurii scapulare și a brațului; bazinul mic; inimă; piele (prurit)

Tabelul 35. Continuare

Criteriile		Diagnosticul diferențiat	
		Yang Wei Mai	Dai Mai
III. Palparea	Punct cheie	TR5	VB41
	Punct de intrare	V63	VB26
	Punct de ieșire	VG15	VB28
	Punct de alarmă	–	VB26
	Punct Xi	VB36	–
	Punctele meridi- anelor curioase	IG10, V63, TR15, VB13 - VB21, VB35, VG15, VG16	VB26, VB27, VB28
		Ren Mai	Yin Qiao Mai
I. Tulburări energetice	Sindroamele de bază	Insuficiența Esenței Rinichi- lor; Insuficiența Yin-Qi a Rin- chilor; Insuficiența Yin-Qi a Plămânilor; Insuficiența Yin- Qi a Inimii; Insuficiența Yin-Qi și Xue; dezarmonia Rinichi- Plămâni (astm bronșic cro- nic); stagnarea Qi în Focarul Superior, Mediu; stagnarea Qi în abdomenul inferior și uter (dismenoree, amenoree, fibrom uterin; hernie); sin- drome de afectare Xue și a uterului (graviditate, meno- pauză, sterilitate, menora- gie, metroragie); Umiditate în abdomenul inferior; tulburări psihoemoționale legate de sfera reproductivă (divorț, perioada climacterică etc.)	Sindroamele de tulburare a somnului (Insuficiența Yin Qiao Mai – insomnie; Excesul Yin Qiao Mai – somnolență); sindroame atrofice (stagnarea și obstrucția Qi în mușchii de pe suprafața internă a mem- brelor inferioare), atonia mușchilor; Excesul (stagna- rea) în Focarul Inferior la femei (distensie abdominală, disurie, fibrom uterin); dez- armonia energetică stânga- dreapta a corpului; dez- armonia energetică externă- internă a membrelor inferioa- re (mușchii pe suprafața externă și internă)
	Localizarea algiilor	Cap, față, nas, sinusuri, dinți, plămâni, glande mamare; ab- domen	Rinichi, vezică, uretră, regiunea bazinului mic, organe genitale, abdomen
	III. Palparea		
III. Palparea	Punct cheie	P7	R6
	Punct de intrare	VC1	R6
	Punct de ieșire	VC4	V1
	Punct de alarmă	–	E11
	Punct Xi	–	R8
	Punctele meridi- anelor curioase	VC1 – VC24	V1, R6, R8

Tabelul 35. Continuare

Criteriile		Diagnosticul diferențiat	
		Yin Wei Mai	Chong Mai
I. Tulburări energetice	Sindroamele de bază	Dezarmenia Inimă-Rinichi; Insuficiența Yin-Qi și Xue cu tulburări psihoemoționale: insomnie, anxietate, claustrofobie (în special la femei); Insuficiența Xue a Inimii (dureri precordiale, anxietate, depresie); Insuficiența Xue în regiunea cefalică; stagnarea Qi și Xue în Inimă, cutia toracică; epigastriu	Insuficiența congenitală Qi a organelor digestive (stomac, splină) cu inapetență, constituție astenică, indigestie cronică; Insuficiența Qi și Xue a Splinei; stagnarea Qi și Xue în Inimă, cutia toracică (dureri precordiale, palitații), epigastriu, abdomenul inferior și uter (dureri și distensie abdominale, dismenoree, sterilitate), membre superioare și inferioare
II. Durerea	Localizarea algilor	Inimă (precordiale); intestine, hemoroizi; articulațiile carpo-metacarpiene	Inimă (precordiale); stomac, intestine (durere cu diaree), ficat, căile biliare; suprafața anterioară a peretelui abdominal, regiunea lombară; regiunea gâtului (mai jos de nivelul C3); suprafața internă a labeli piciorului; oase
III. Palparea	Punct cheie Punct de intrare Punct de ieșire Punct de alarmă Punct Xi Punctele meridianelor curioase	MC6 R9 VC23 VC12 R9 RP13, RP15, RP16, R9, F14, VC22, VC23	RP4 R11 R21 E10 - R11 - R21




Fig.155. Interrelațiile punctelor cheie și de legătură a meridianelor extraordinare

- Eficacitatea tratamentului cu aplicarea meridianelor curioase în mare măsură depinde de alegerea corectă a punctelor cheie, punctelor de legătură și de asemenea de echilibrarea spațială a punctelor folosite (fig.155). Cele mai răspândite metode de aplicare a punctelor cheie și de legătură pot fi clasificate în trei grupe: 1) folosirea bilaterală (din stânga și din dreapta); 2) folosirea unilaterală în zona afectată din dreapta sau din stânga; 3) folosirea contralaterală în funcție de sexul pacientului.

Punctarea asimetrică a punctelor cheie și de legătură este cea mai eficientă variantă: la pacienții de sex masculin punctul cheie indicat se punctează din stânga, apoi contralateral (din dreapta) se punctează punctul de legătură. De exemplu, în afectarea meridianului curios Chong Mai se punctează punctul cheie RP4 Gongsun din stânga în asocieră cu punctul de legătură MC6 Nelguan din dreapta. La bolnavii de sex feminin la început se punctează punctul cheie din dreapta, apoi punctul de legătură din stânga. De exemplu, în afectarea meridianului curios Ren Mai la femei se punctează P7 Lieque din dreapta în asocieră cu punctul R6 Zhaohai din stânga. În toate cazurile de mai sus extragerea acelor se efectuează în consecutivitate inversă.

- În procesul tratamentului se aleg punctele de acupunctură în funcție de particularitățile tulburării meridianului curios: a) exogene sau endogene; b) afectarea globală a meridianului curios sau afectarea unor segmente ale acestuia; c) tulburarea traseului extern sau intern. Cu succes se utilizează punctele de acupunctură a meridianelor principale, care intră în componența meridianelor curioase și sunt indicate, reieșind din tabloul clinic al bolnavului.
- La bolnavii cu semne de afectare de-a lungul unei ramuri a meridianului (în special cu tulburări algice), în existența dezechilibrului energetic Yin-Yang, sus-jos, stânga-dreapta, pentru potențarea efectului terapeutic punctele cheie se asociază cu punctele Lo de grup:
 1. TR8 + IG3 + V62;
 2. VB39 + TR5 + VB41;
 3. RP6 + P7 + R6;
 4. MC5 + MC6 + RP4.
- La bolnavii cu predominarea algiiilor în tabloul clinic este necesară asocierea punctelor cheie cu punctele dureroase (spontane sau la palpare) și punctele Xi ale meridianului curios sau ale meridianelor principale care alcătuiesc meridianul curios afectat.
- În caz de afectare a mai multor meridiane principale care alcătuiesc meridianele curioase este indicată aplicarea punctelor de "încrucișare" (centro-reunire), care se află la intersecția a două sau mai multe meridiane. Din punct de vedere practic este importantă aplicarea punctelor de "încrucișare" în două aspecte: a) puncte de "încrucișare" a meridianelor curioase; b) puncte de "încruci-

șare" a meridianelor principale care alcătuiesc meridianele curioase.

- tehnică importantă este asocierea punctelor cheie și de legătură cu punctele meridianelor Vasul Guvernator (VG) și Vasul de Concepție (VC). Prezentăm câteva exemple care ilustrează această tehnică.
 - Du Mai: Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor (impotență, slăbiciune lombară) – IG3 + V62(t) + VG4 + VG20(t,m).
 - Yang Qiao Mai: Vânt-Frig (răceală) – V62 + IG3(t) + VG14(m).
 - Yang Wei Mai: hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului – TR5 + VB41 + VG20(d).
 - Dai Mai: Umiditate-Căldură în Ficat și Veziculă Biliară (inflamația organelor bazinului mic) – VB41 + TR5 + VC3 + VC6(d).
 - Ren Mai: Insuficiența Yin-Qi a Plămânilor (traheită, bronșită, gât uscat, tuse) – P7 + R6 + VC22 + VC23(a).
 - Yin Qiao Mai: Stagnarea Qi în Focarul Inferior (distensie abdominală) – R6 + P7 + VC6(d).
 - Yin Wei Mai: stagnarea Xue în Inimă (cardialgie) – MC6 + RP4 + VC17(d).
 - Chong Mai: Stagnarea Qi și Xue în uter (dismenoree) – RP4 + MC6 + VC3(d).
- În practica acupunctică o largă aplicare are metoda de asociere a punctelor cheie și de legătură cu punctele locale sindromale sau simptomatice (localizate în zona afectată sau dureroasă). De exemplu, în hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului (migrenă) cu afectarea meridianului curios Dai Mai este efectivă asocierea VB41 + TR5 + VB14 + VB20(d).
- Mare importanță practică are principiul de asociere a punctelor cheie și de legătură cu punctele Shu-post. (de asentiment) și Mu-ant. (de alarmă). Prezentăm câteva exemple care demonstrează acest principiu.
 - Dai Mai: Umiditate-Căldură în Ficat și Veziculă Biliară (leucoree, dureri în hipocondru) – VB41 + TR5 + VB24 + VC3(d).
 - Yin Wei Mai: Stagnarea Xue în Inimă (dureri precordiale) – MC6 + RP4 + V15 + V17(d).
 - Chong Mai: Stagnarea Xue în epigastriu (distensie și durere gastrică) – RP4 + MC6 + V17 + V21(d).
 - Du Mai: Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor (diminuarea memoriei) – IG3 + V62 + V23(t).
- La bolnavii cu predominarea tulburărilor generale, psihice și în dereglarea mecanismelor centrale de autoreglare a funcțiilor organismului este efectivă asocierea punctelor cheie și de legătură a meridianelor curioase cu anumite puncte auriculare.
- Meridianele curioase conform indicațiilor pot fi utilizate separat

sau în pereche reieșind din relațiile lor energetice – formarea cuplului unipolar (Yin-Yin, Yang-Yang) sau bipolar (Yin-Yang).

IV.3. Meridianele secundare Lo.

Meridianele Lo longitudinale

Diagnosticul clinic

Pentru tratamentul acupunctiv efektiv este necesar de a efectua un diagnostic diferențiat al afectării meridianelor Lo longitudinale (tab.36).

Tabelul 36.
Diagnosticul diferențiat al afectării meridianelor Lo longitudinale

Meridian Lo longitudinal	Simptomele afectării	
	Exces	Insuficiența
Plămân	Senzație de căldură în regiunea palmară	Polakiurie, disurie, enurezis; tuse; balonare abdominală
Intestin Gros	Surditate; odontalgie, carii dentare, dureri în gingii	Senzație de rece în dinți și gingii; durere sau opresiune toracică
Stomac	Agitație psihomotorie, delir, epilepsie; afonie	Scădere a tonusului, paralizie sau atrofie a mușchilor membrului inferior cu instabilitate articulară
Splină-Pancreas	Dureri abdominale, diaree, vomă	Balonare abdominală, ascită
Inimă	Dureri toracice și în regiunea diafragmei	Dificultate în articularea cuvintelor
Intestin Subțire	Impotența funcțională în articulațiile cotului și umărului	Afecțiunile pielii (foliculită, acnee, furunculoză)
Vezică	Obstrucție nazală; cefalee; lombalgie, crampe (<i>m.gastrocnemius</i>)	Rinoree apoasă, epistaxis; lombalgie
Rinichi	Disurie, oligurie; constipație	Lombalgii, dorsalgii
Pericard	Dureri precordiale, jenă toracică; iritabilitate	Dureri și redoare cervicală
Trei Focare	Impotență funcțională a brațului și a cotului (senzație de contractură)	Senzație de slăbiciune a cotului
Veziculă Biliară	Senzație de rece (frig) în gambe și în picioare	Instabilitate a membrilor inferioare cu dificultate la mers
Ficat	Tumefiere a scrotului și a penisului, erecție violentă și dureroasă; vaginită	Durere și prurit în zonele genitale (herpes)
Du Mai	Redoare a coloanei vertebrale	Senzație de cap greu; tremurături ale extremității cefalice, vertij
Ren Mai	Durere în peretele abdominal	Prurit abdominal
Marele Lo al Splinei	Dureri difuze (dispersate) pe întregul corp	Slăbiciune în tot corpul, laxitate a tuturor încheieturilor

Tratamentul

Tratamentul tulburărilor meridianelor Lo longitudinale decurge din natura dezechilibrului energetic. În tulburările exogene sensul de propagare a dezechilibrului energetic este următorul: țesuturi periferice – meridianul Lo longitudinal – meridianul principal – organul Zang sau Fu. În aceste cazuri tulburările au caracter de Exces (suma Energiei patologice și Energiei fiziologice). În tulburările endogene are loc o trecere exagerată sau o blocare a trecerii Energiei din organul Zang sau Fu către periferie. Aceste tulburări apar sub influența factorilor alimentari și psihici.

În sindromul de Insuficiență a meridianului Lo longitudinal cu scop de reechilibrare energetică se efectuează tonifierea punctului Lo al meridianului cuplat și a punctelor Yuan ale meridianului afectat (tab.37).

Tabelul 37.
Tratamentul acupunctic în sindromul Exces-Insuficiență
a meridianelor Lo longitudinale

Meridian	Exces	Insuficiență	
	Punct Lo corespun- dent (dispersie)	Punct Lo cuplat (tonifiere)	Punct Yuan cores- pondent (tonifiere)
P	P7	GI6	P9
GI	GI6	P7	GI4
E	E40	RP4	E42
RP	RP4	E40	RP3
C	C5	IG7	C7
IG	IG7	C5	IG4
V	V58	R4	V64
R	R4	V58	R3
MC	MC6	TR5	MC7
TR	TR5	MC6	TR4
VB	VB37	F5	VB40
F	F5	VB37	F3

La bolnavii cu Exces al meridianului Lo longitudinal cu scop de tratament se dispersează punctul Lo al meridianului afectat.

În sindromul de Exces sau Insuficiență a meridianelor Lo longitudinale Du Mai, Ren Mai și marele Lo al Splinei se dispersează (în Exces) sau se tonifică (în Insuficiență) punctele Lo corespunzătoare (VG1 Changqiang, VC15 Jiuwei, RP21 Dabao).

În caz de dezechilibru energetic în cele două ramuri ale meridianului Lo longitudinal, cu manifestări algice, se aplică cu succes tehnica de tratament "marea înțepătură" – tonifierea punctului Lo pe partea "sănătoasă" (opusă durerii, partea insuficientă).

În unele surse ale medicinei tradiționale chineze este descris al 16-lea meridian Lo longitudinal – marele Lo al Stomacului (se începe din regiunea Stomacului, traversează cutia toracică, trecând prin punctul VC17 Shanzhong, Inimă și punctul E18 Rugen). În sindromul de Exces (dureri epigastrice, dureri în partea de mijloc a cutiei toracice cu dificultate la respirație) este indicată dispersia punctelor VC12 + VC17; în sindromul de Insuficiență (dureri precordiale cu localizare din stânga, în zona punctului E18 Rugen) se recomandă tonifierea punctelor VC17 + E18 + E12.

Meridianele Lo transversale

Diagnosticul clinic

În textele antice este descrisă simptomatologia afectării a opt meridiane Lo transversale și nu este descrisă clinica afectării meridianelor Lo transversale Plămân, Inimă, Intestin Subțire, Pericard. Simptomele afectării au un caracter preponderent extern și acut (Yang):

<i>Meridian Lo transversal</i>	<i>Simptomele afectării</i>
Intestin Gros	dispnee, opresiune toracică, senzație de caldură în piept; surditate episodică.
Stomac	epistaxis, coriză; senzație de rece în dinții superiori.
Splină-Pancreas	dureri în regiunea lombară cu iradiere în jos sau în sus (laterotoracic), dificultate pentru clinostatismul dorsal.
Vezică	redoare în spate, dureri în spate cu iradiere în zonele laterale, dureri în regiunea gâtului și a capului.
Rinichi	opresiune toracică, dureri precordiale; balonare abdominală, dureri la deglutiție.
Trei Focare	dureri în gât, limbă retractată, gură uscată; dureri pe fața externă a brațului cu limitarea ridicării în sus.
Veziculă Biliară	dureri laterotoracice cu împiedicarea respirației însoțite de tuse, transpirații.
Ficat	dureri în zonele genitale și în regiunea hipogastrică.

Tratamentul

În afectarea meridianelor Lo transversale se aplică două variante de tratament. Prima variantă se bazează pe concepția afectării meridianelor Lo transversale, descrise în textele antice. În procesul corecției punctul Lo oferă Energia, iar punctul Yuan crește "absorbția" Energiei în meridianul insuficient. A doua variantă presupune corecția dezechilibrului energetic, reieșind din relația Biao-Li: Excesul în unul din meridianele principale ale lojei energetice este însoțit, de regulă, de Insuficiență în altul, și invers. Diagnosticul este efectuat, reieșind

din simptomatologia afectării meridianelor principale, cuplate în lojele energetice corespunzătoare.

În medicina tradițională chineză există regula de tratament numită Gazdă/Invitat, care se bazează pe folosirea punctelor Lo și Yuan:

<i>Gazdă</i>	<i>Invitat</i>	<i>Acupuncte</i>
P	GI	P9 + GI6
GI	P	GI4 + P7
RP	E	RP3 + E40
E	RP	E42 + RP4
C	IG	C7 + IG7
IG	C	IG4 + C5
R	V	R3 + V58
V	R	V64 + R4
TR	MC	TR4 + MC6
MC	TR	MC7 + TR5
F	VB	F3 + VB37
VB	F	VB40 + F5

Dacă în evoluția bolii un organ (Zang sau Fu) este afectat primul (Gazda), pentru tratament se folosesc punctele Yuan ale meridianului afectat; dacă în evoluția procesului patologic se implică un alt organ al lojei energetice corespunzătoare, pentru tratament se folosesc punctele Lo ale organului implicat mai târziu (Invitat). De exemplu, în cazul când la momentul dat sunt afectați Plămânii și Intestinul Gros, însă Plămânii au fost implicați în procesul patologic primii, pentru tratament este necesar de a folosi punctele P9 + GI6. Dacă însă în acest caz Intestinul Gros a fost afectat primul, iar patologia Plămânilor s-a asociat mai târziu, se va proceda la stimularea punctelor GI4 + P7.

IV.4. Meridianele tendino-musculare

Diagnosticul clinic

Tulburările legate de afectarea meridianelor tendino-musculare pot avea un caracter de Exces sau Insuficiență energetică. Afectarea meridianelor tendino-musculare se manifestă prin apariția simptomelor cu "expresie" externă: dureri musculare, dureri nevralgice, artralgiile, simptome de inflamare a pielii (*tumor, rubor, calor, dolor*) etc. Manifestările clinice în afectarea meridianelor tendino-musculare au, de regulă, un caracter acut. Însă, în condițiile când tratamentul este neadecvat sau factorul patogen extern nu este înlăturat procesul patologic progresează și devine subacut sau cronic. Simptomele afectării meridianelor tendino-musculare (MTM) în linii generale se

reprezintă în felul următor:

<i>MTM</i>	<i>Simptomele afectării</i>
Plămân	dureri pe fața radială a pumnului, în police, dureri în șanțul bicipital, afectarea articulației sterno-claviculare, dureri și contractură a marelui pectoral.
Intestin Gros	dureri pe fața radială a pumnului, epicondilită, dureri în articulația acromio-claviculară, dureri anterolaterale în regiunea gâtului, dureri interscapulo-vertbrale (la nivelul Th1-Th5).
Stomac	afectarea feței dorsale a piciorului și a gleznei, dureri de-a lungul crestei tibiale, dureri inghinale, dureri latero-abdominale, dureri subaxilare, afectarea în regiunea gurii, paralizie facială, tulburări de închidere și deschidere a pleoapelor.
Splină-Pancreas	dureri în regiunea maleolei interne, pe fața antero-internă a gambei și a coapsei, dureri inghinale și subombilicale, dureri toracice profunde, dureri la nivelul vertebrelor Th4-Th6, afectarea organelor genitale cu manifestări algice.
Inimă	dureri pe suprafața internă a pumnului, antebrațului și brațului, dureri axilare și laterotoracice cu iradiere spre manubriul sternal.
Intestin Subțire	dureri pe suprafața intero-posterioară a pumnului, antebrațului și umărului, dureri în regiunea scapulară, contractura mușchilor romboid, dureri postero-laterale ale gâtului, torticollis, dureri în regiunea parotidiană, în maxilarul inferior, dureri în regiunea ochiului sau a urechii.
Veziă	dureri pe suprafața externă a piciorului și a gambei, talon dureros, dureri subaxilare și supraclaviculare cu iradiere spre fața laterală a gâtului, imposibilitatea de a ridica brațul, nevralgie facială, dureri în regiunea mastoidiană, dureri cervicale posterioare, otalgie.
Rinichi	dureri plantare, pe fața internă a piciorului, dureri pe fața postero-internă a gambei și a coapsei, dureri lombare.
Pericard	dureri pe suprafața anterioară a brațului și antebrațului, dureri toracice cu iradiere spre stern.
Trei Focare	dureri pe suprafața posterioară a brațului și antebrațului, dureri în regiunea olecraniană, dureri temporo-mandibulare, dureri în limbă.
Veziiculă Biliară	dureri în regiunea maleolei externe, pe fața laterală a gambei și a coapsei, dureri laterotoracice, dureri temporo-parietale, dureri în regiunea unghiului extern al ochiului.
Ficat	dureri pe suprafața antero-internă a piciorului, gleznei, gambei și coapsei, dureri și contracturi ale mușchilor, dureri în organele genitale.

Un rol important în diagnosticul afectării meridianelor tendino-musculare are palparea (presăția) punctelor de reunire. În acest caz se atrage atenție la caracterul și iradierea durerii.

- A. *Afectarea meridianelor Yang ale membrelor inferioare (V, VB, E).* Punctul IG18 Quanliao devine spontan dureros sau dureros la palpare. O importanță mare diagnostică o are iradierea durerii la presația punctului:

<i>Iradierea durerii</i>	<i>Meridianul afectat</i>
Regiunea temporală	VB
Buzele sau nasul	E
Unghiul intern al ochiului	V

- B. *Afectarea meridianelor Yin ale membrelor inferioare (F, R, RP).* Punctul VC2 Qugu (sau VC3 Zhongji) este dureros la palpare. La presația acestui punct apar diferite variante de iradiere a durerii, cu importanță diagnostică diferită:

<i>Iradierea durerii</i>	<i>Meridianul afectat</i>
Bazinul mic (în asociere cu jenă sau durere în regiunea lombară)	R
Regiunea organelor genitale	F
Regiunea ombilicală sau cutia toracică	RP

- C. *Afectarea meridianelor Yang ale membrelor superioare (GI, TR, IG).* În aceste cazuri punctul VB13 Benshen devine dureros (spontan sau la palpare). Este caracteristică apariția migrenei. La o presare a punctului VB13 Benshen în funcție de iradierea durerii se trag concluzii diagnostice:

<i>Iradierea durerii</i>	<i>Meridianul afectat</i>
Umărul, urechea, mandibula	IG
Umărul, gâtul	TR
Regiunea zigomatică, mandibula	GI

- D. *Afectarea meridianelor Yin ale membrelor superioare (P, MC, C).* Palparea punctului VB22 Yuanye este dureroasă. Iradierea durerii în acest caz are importanță diagnostică:

<i>Iradierea durerii</i>	<i>Meridianul afectat</i>
Umărul, cutia toracică	P
Axila (cu senzație de jenă în piept)	MC
Axila (cu durere în regiunea precordială)	C

Tratamentul

În funcție de caracterul tulburărilor apărute (exogene sau endo-

gene, Exces sau Insuficiență) se aplică diferite tehnici de tratament al meridianelor tendino-musculare (MTM):

<i>Acupuncte</i>	<i>Excesul MTM</i>	<i>Insuficiența MTM</i>
Puncte locale dureroase de-a lungul meridianului	Dispersia	Tonifierea
Punct de inserție supra- și subiacentă zonei afectate	Dispersia	Tonifierea
Punct Jing-dist.	Dispersia	Tonifierea
Punct de reunire a MTM	Dispersia	Tonifierea
Punct sezonier a meridianului principal	Tonifierea punctului de tonifiere	Dispersia punctului de dispersie

La o acțiune exogenă a factorului patogen apare prima fază a dezechilibrului energetic, care se manifestă prin simptome de Exces în meridianele tendino-musculare (hiperemie locală, dureri acute, spasme, hipersensibilitate etc.) și o Insuficiență relativă la nivelul meridianului principal corespunzător.

A doua fază a dezechilibrului energetic se manifestă prin simptome de Insuficiență în meridianele tendino-musculare (dureri surde, hipotonus, hiposensibilitate, atonie musculară, senzație de rece, pareze etc.) și un Exces relativ la nivelul meridianelor principale corespunzătoare.

IV.5. Meridianele distincte

Diagnosticul clinic

În funcție de afectarea segmentelor meridianelor distincte apar diferite simptome și particularități. La bolnavii cu afectarea segmentului periferic apar diferite simptome (dureri, tulburări de sensibilitate) de-a lungul traseului meridianului distinct. În caz de afectare a segmentului visceral apar semne de disfuncție a organelor interne, fenomene algice și de tulburare a sensibilității viscerale. Manifestări psiho-vegetative, tulburări senzoriale și diferite fenomene algice sunt caracteristice pentru afectarea segmentului central al meridianelor distincte.

În procesul diagnosticului o mare importanță au particularitățile manifestărilor clinice: unilateralitatea algiilor sau a altor tulburări și intermitența acestor manifestări. Pe de altă parte, este necesar de a evidenția caracterul tulburărilor existente – exogene (de regulă, sunt de tip Exces) sau endogene (însoțite de simptomatologie de tip Insuficiență).

În literatură sunt redată semnele de afectare individuală a meridianelor distincte și semnele de afectare a perechilor de meridiane distincte (MD), ultima variantă fiind, din punctul de vedere practic, mai utilă.

<i>MD</i>	<i>Simptomele afectării</i>
GI/P	Colită cronică; afectarea plămânilor; dureri în regiunea maxilarelor; triada Y.Manaka – 1) semne clinice de afectare a meridianului distinct P/GI; 2) test Akabane pozitiv (punctele P11 Shaoshang, GI1 Shangyang); 3) sensibilitate crescută în punctele P1 Zhongfu, (afectarea Plămânilor), E26 Wailing (afectarea Intestinului Gros)
E/RP	Tulburări gastro-pancreatice; afectarea mușchilor; lombalgii cu iradi-eri dorsale și în fosa iliacă (aggravate de decubitusul dorsal); epistaxis; durere și senzație de rece în buze și dinți; triada Y.Manaka – 1) semne clinice de afectare a meridianului distinct RP/E; 2) test Akabane pozitiv (punctele RP1 Yinbai, E45 Lidui); 3) sensibilitate crescută în punctele RP21 Dabao, F13 Zhangmen (afectarea Splinei), E21 Liangmen (afectarea Stomacului)
IG/C	Nevroze; afecțiunile inimii și intestinelor; bronșite, dispnee cu senzație de opresiune toracică; diminuarea auzului; odontalgii, stomatite; hematurie; triada Y. Manaka – 1) semne clinice de afectare a meridianului distinct C/IG; 2) test Akabane pozitiv (punctele C9 Shaochong, IG1 Shaoze); 3) sensibilitate crescută în punctele R24 Lingxu, R25 Shencang (afectarea Inimii), E27 Daju (afectarea Intestinului Subțire)
V/R	Tulburări urogenitale; dureri cervico-occipitale, dureri în gât (cu dificultate la deglutiție), dureri toracice paramediane, lombalgii, dureri latero-abdominale, dureri ano-rectale, hemoroizi; obstrucții nazale; triada Y.Manaka – 1) semne clinice de afectare a meridianului distinct R/V; 2) test Akabane pozitiv (punctele V67 Zhiyin și punctul localizat la 0,1 cun inapoia și în interiorul unghiului unghial intern al degetului mic al piciorului); 3) sensibilitate crescută în punctele R16 Huangshu (afectarea Rinichilor), R11 Henggu, R12 Dahe (afectarea Vezicii)
TR/MC	Tulburări circulatorii (hepertensiune arterială, cardiopatii ischemice, edeme); dureri pe față anterioară sau posterioară a brațului și antebrăului cu iradieri în regiunea toracică; dureri în gât, redoare a limbii, uscăciune în gură; triada Y. Manaka – 1) semne clinice de afectare a meridianului distinct MC/TR; 2) test Akabane pozitiv (punctele MC9 Zhongchong, TR1 Guanchong); 3) sensibilitate crescută în punctele VC17 Shanzhong, R21 Youmen, E20 Chengman (afectarea Pericardului), VC5 Shimen (afectarea Trei Focare)
VB/F	Tulburări hepatobiliare; nevroze; dureri subcostale și latero-toracice, dureri în regiunea șoldului; dureri în organele genitale externe cu iradieri latero-abdominale, priapism, prurit genital; afecțiuni ale mușchilor și tendoanelor; triada Y. Manaka – 1) semne clinice de afectare a meridianului distinct F/VB; 2) test Akabane pozitiv (punctele VB44 Zuqiaoyin, F1 Dadun); 3) sensibilitate crescută în punctele F14 Qimen (afectarea Ficatului), VB24 Riyue (afectarea Veziculei Biliare)

Tratamentul

După stabilirea diagnosticului se efectuează corecția dezechilibrului energetic, folosind tehnica de tonifiere în sindromul de Insufici-

ență și de dispersie în sindromul de Exces. Sunt posibile diferite variante de combinare a acupunctelor. Unele din punctele principale folosite în tratamentul meridianelor distincte sunt redate în *tab. 38*.

Tabelul 38.

Tratamentul tulburărilor meridianelor distincte

Acupuncte	Meridiane distincte					
	GI/P	E/RP	IG/C	V/R	TR/MC	VB/F
Jing-distale	GI1 P11	E45 RP1	IG1 C9	V67 R1	TR1 MC9	VB44 F1
Shu (Shu-Yuan)	GI3 P9	E43 RP3	IG3 C7	V65 R3	TR3 MC7	VB41 F3
Xi	GI7 P6	E34 RP8	IG6 C6	V63 R5	TR7 MC4	VB36 F6
Reunire periferică	P1	E30	VB22	V40	VB22	VC2
Reunire centrală	GI18	E9	IG16	V10	TR16	VB1
Mu anterioare	E25 P1	VC12 F13	VC4 VC14	VC3 VB25	VC5 VC15	VB24 F14
Shu posterioare	V25 V13	V21 V20	V27 V15	V28 V23	V22 V14	V19 V18
Acțiune generală	VG20 VB20	VG20 VB20	VG20 VB20	VG20 VB20	VG20 VB20	VG20 VB20

Reieșind din concepțiile tradiționale Yoshio Manaka (1960) a elaborat formule terapeutice indicate în afectarea meridianelor distincte.

Tratamentul meridianelor distincte (MD) ale membrilor inferioare:

MD	Ace de argint	Ace de aur
R/V	V11	V64 + V58 + V40
	V11	R3 + R4 + R10
F/VB	VB1	F3 + F5 + F8
	VB1	VB40 + VB37 + VB34
RP/E	E1	RP3 + RP4 + RP9
	E1	E42 + E40 + E36

Tratamentul meridianelor distincte (MD) ale membrilor superioare:

MD	Ace de aur	Ace de argint
C/IG	V1	C7 + C5 + C3
	V1	IG4 + IG7 + IG8
MC/TR	VB12	MC7 + MC6 + MC3
	VB12	TR4 + TR5 + TR10
P/GI	E12	P9 + P7 + P5
	E12	GI4 + GI6 + GI11

După cum se vede, la baza acestor formule stă aplicarea punctelor de reunire centrală ale meridianelor distincte (de remarcat că componența acestor puncte se deosebește în diferite surse ale medicinei tradiționale chineze), stimularea punctelor Yuan, Lo și punctelor antice He. În afectarea meridianelor distincte ale membrelor inferioare (R/V, F/VB, RP/E) se aplică stimularea punctelor de reunire centrală cu ajutorul acelor de argint sau prin electropunctură cu aplicarea electrodului pozitiv (+), pe când punctele Yuan, Lo și He sunt stimulate cu ace de aur sau prin electrostimulare cu aplicarea electrodului negativ (-). În cazul afectării meridianelor distincte ale membrelor superioare (C/IG, MC/TR, P/GI) stimularea acestor puncte se efectuează în mod invers. Pentru electrostimulare se folosește curentul electric până la 1,5V și frecvența de 2Hz, durata electrostimulării fiind scurtă (circa 5 minute).

V

Acupunctura în tratamentul tulburărilor psihice

- V.1. Confuzia mentală**
- V.2. Psihoza maniaco-depresivă**
- V.3. Tulburările anxioase**
- V.4. Tulburările asteno-depresive**
- V.5. Nevroza isterică**
- V.6. Vomele psihogene**
- V.7. Tulburările de somn**
- V.8. Scăderea capacității de memorare**

V.1. Confuzia mentală*

Modelul clinic 1

Confuzia mentală

[Stagnarea Qi a Ficatului]

Simptome

1) psihice: emoții instabile, iritabilitate, oftat, insomnie, frustrație, tensiune emoțională premenstruală; simptome ale confuziei mentale; 2) somatice: senzație de disconfort, distensie sau durere în hipocondru și epigastru, eructație, greață, gust amar; senzație de distensie în glandele mamare. *Limba* – normală sau roșie la margini. *Pulsul* – profund și întins (în special din stânga).

Tratamentul

normalizarea circulației Qi, armonizarea Ficatului și a Energiei Hun, calmarea mentală:

Shu – MC7 Daling, TR6 Zhigou, F3 Taichong;

Shu-post. – V18 Ganshu;

Mu-ant. – F14 Qimen;

Lo – RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;

& – R14 Siman, VB13 Benshen, VG24 Shenting.

Formule

- F2 + F3 + F14 + VB40 + V18 + TR6 (formulă cu efect de dinamizare Qi și armonizare a Ficatului);
- F14 + F1 + Yintang** + TR6;
- RP6 + RP12 + F3 + F14 + VC17;
- F3 + MC7; F3 + VB34;
- VG24 + VB13 + MC7.

Modelul clinic 2

Confuzia mentală

[Stagnarea Xue a Ficatului]

Simptome

1) psihice: tulburările apar pe fond de furie, frustrație cronică, gelozie; depresie, anxietate, iritabilitate pronunțată, mânie, obsesii, insomnie, psihoză; simptome ale confuziei mentale; 2) somatice: dureri în hipocondru și abdomen, greață; epistaxis recidivant.

* Semnele psihice ale confuziei mentale sunt: tulburări ale lucidității și clarității conștiinței, diminuarea procesului de concentrare (în convorbire bolnavul cu greu alege cuvinte adecvate situației), gândire lentă, bolnavul nu poate exterioriza sau percepe emoțiile fine; diminuare a intuiției și a facultății de înțelegere. În MTC, în cazul confuziei mentale, ca și în alte tulburări psihice, se deosebesc diferite variante clinice (sindroame), având în vedere atât simptomele psihice asociate, cât și cele somatice.

** Yintang – între două sprâncene, la mijlocul distanței.

Limba – puncte sau pete purpurii pe margini. *Pulsul* – profund, întins și rugos.

Tratamentul

normalizarea circulației Xue, armonizarea Ficatului și a Energiei Hun, calmarea mentală:

- Shu – MC7 Daling, F3 Taichong;
- Shu-post. – V17 Geshu, V18 Ganshu, V19 Danshu;
- Mu-ant. – F14 Qimen;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
- & – V47 Hunmen, V52 Zhishi, VB13 Benshen, VG24 Shenting.

Formule

- V17 + RP10;
- MC6 + F3 + F14;
- VG24 + VC4.

Modelul clinic 3

Confuzia mentală

[Stagnarea Xue în Focarul Inferior]

Simptome

1) psihice: tulburările apar pe fond de emoții negative (furie, frustrație etc.), mai frecvent la femei cu afectarea uterului sau după naștere; astenie, delir; simptome ale confuziei mentale; 2) somatice: dureri în abdomenul inferior, senzație de căldură noaptea, dismenoree. *Limba* – cu depozit galben sau alb. *Pulsul* – încordat.

Tratamentul

înlăturarea stărnării Qi și Xue, armonizarea Focarului Inferior, calmarea mentală:

- Shu – RP1 Yinbai;
- Shu-post. – V17 Geshu, V18 Ganshu;
- Lo – RP4 Gongsun, RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
- & – E29 Gulai, RP10 Xuehai, VC6 Qihai.

Formule

- V17 + RP10;
- E29 + RP8;
- VC6 + F3 + RP6 + E28.

Modelul clinic 4

Confuzia mentală

[Stagnarea Qi a Inimii și a Plămânilor]

Simptome

1) psihice: tulburările apar pe fond de tristețe și anxietate de lungă durată (bolnavul este foarte sensibil la factorii psihici); simptome ale confuziei mentale; 2) somatice: senzație de obstrucție în cutia toracică, dispnee, palpitații. *Limba* – puțin tumefiată în par-

tea anterioară. *Pulsul* – ferm sau slab (în special în poziția Cun).

Tratamentul

normalizarea circulației Qi, armonizarea Focarului Superior și calmarea mentală:

- Shu – GI4 Hegu, C7 Shenmen, IG5 Yanggu;
- Mu-ant. – VC15 Jiuwei, VC17 Shanzhong;
- Lo – P7 Lieque, C5 Tongli, MC6 Neiguan;
- & – RP21 Dabao, R21 Youmen.

Formule

- GI4 + F3 + MC6;
- C7 + P9 + V15 + V44 + V13 + V42;
- C5 + R4 + MC7 + V44;
- RP21 + RP1 + RP4 + MC6 + VC17;
- VC15 + VG20;
- P7 + IG5;
- P7 + R6 + Yintang.

Modelul clinic 5

Confuzia mentală

[Stagnarea Xue în Inimă]

Simptome

1) psihice: tulburările apar pe fond de exces de bucurie, furie, șoc emoțional sau frustrație cronică; depresie, emoții labile, insomnie (cu trezire repetată în cursul nopții), anxietate la nivelul pieptului și gâtului; simptome ale confuziei mentale; 2) somatice: palpitații, senzație de sufocare și opresiune în cutia toracică; extremități reci; cianoza buzelor. *Limba* – cu pete purpurii, cianotică sau cu puncte violete. *Pulsul* – filiform, rugos sau înnodat.

Tratamentul

normalizarea circulației Xue, armonizarea Inimii și calmarea mentală:

- Shu – C7 Shenmen;
- Shu-post. – V14 Jueyinshu, V15 Xinshu, V17 Geshu;
- Mu-ant. – VC17 Shanzhong;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
- & – V44 Shentang.

Formule

- C7 + IG5;
- V17 + RP10;
- RP6 + RP21 + MC6 + VC17.

Modelul clinic 6

Confuzia mentală

[Flegmă-Căldură]

Simptome

1) psihice: tulburările apar ca urmare a Flegmei care tulbură Inima (tulburări de vorbire, palpitații etc.) și a disfuncției Splinei și Plămânilor; simptomele confuziei mentale sunt pronunțate; 2) somatice: senzație de distensie și greutate în piept și abdomen, tuse cu spută groasă de culoare galbenă, sete, cefalee. *Limba* – roșie, cu depozit galben, lipicios sau tumefiată, umedă, cu depozit alb. *Pulsul* – alunecos și rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii și Flegmei, armonizarea Inimii, Splinei și Plămânilor, calmarea mentală:

- Shu – E36 Zusanli, C9 Shaochong, MC5 Jianshi, MC7 Daling;
Shu-post. – V13 Feishu, V15 Xinshu, V20 Pishu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
Lo – E40 Fenglong, MC6 Neiguan;
& – V44 Shentang, VG14 Dazhui, VG20 Baihui, VG26 Renzhong.

Formule

- VC17 + C6 + MC6 + F3 + E40 + VG20 (dispersie) + MC9 (sângerare) + RP6 (tonifiere; formula antică);
- VG26 + VG16 + E40 + C7 + Jing-distale (formulă cu efect de diminuare a Flegmei și calmare mentală);
- R1 + MC8 + VG20 (formula celor "cinci puncte centrale", punctare în ordinea expusă);
- E36 + MC6;
- V13 + V42
- V15 + V44 + E40 + MC6;
- V20 + V47 + E40 + MC6;
- V44 + V15 + C7 + MC1;
- VG20 + C5 + C8 + VB13 + E40.

V.2. Psihoza maniaco-depresivă

Modelul clinic 7

Faza depresivă a psihozei maniaco-depresive

[Stagnarea Qi și a Flegmei]

Simptome

tristețe patologică, inhibiție motorie și intelectuală, vorbire monotonă, inapetență, constipație; astenie, insomnie; posibile halucinații verbale și auditive. *Limba* – cu depozit gras. *Pulsul* – încordat,

rapid sau întins.

Tratamentul

reglarea circulației Qi, diminuarea Flegmei, armonizarea psihicului:

- Shu – C7 Shenmen, MC7 Daling, R3 Taixi;
- Shu-post. – V15 Xinshu, V18 Ganshu, V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC17 Shanzhong;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, 40 Fenglong;
- & – Yintang (Extra), V1 Jingming, IG19 Tinggong, VG20 Baihui, VG26 Renzhong.

Formule

- VC17 + Yintang + C7 + MC7 + E40 + RP6;
- V15 + V18 + V20 + C7 + E40;
- F3 + GI4 + TR8 + E40.

Modelul clinic 8

Faza depresivă a psihozei maniaco-depresive

[Insuficiența Qi a Inimii și Splinei]

Simptome

tristețe patologică, inhibiție motorie și intelectuală, vorbire monotonă și lentă, insomnie; inapetență; oboseală pronunțată, slăbiciune în membre; palpitații, dureri precordiale, surde. *Limba* – palidă, cu depozit alb. *Pulsul* – gol.

Tratamentul

fortificarea Qi a Inimii și a Splinei, armonizarea psihicului:

- Shu – C7 Shenmen, MC7 Daling, E36 Zusanli;
- Shu-post. – V15 Xinshu, V18 Ganshu, V20 Pishu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao.

Formula

V20 + V15 + RP3 + E36 + C7.

Modelul clinic 9

Faza maniacală a psihozei maniaco-depresive

[Foc-Flegmă]

Simptome

excitație psihică și motorie, gesticulație excesivă, excitație intelectuală (*"fuga idearum"*), logoree, insomnie pronunțată pe parcursul câtorva zile, râs nemotivat, iritabilitate; anorexie. *Limba* – roșie cu depozit galben și gras. *Pulsul* – încordat, mare, alunecos și rapid.

Tratamentul

reducerea Focului și a Flegmei, armonizarea psihicului:

- Shu – C7 Shenmen, TR6 Zhigou, MC8 Laogong, MC7 Daling, F3 Taichong, P11 Shaoshang, RP1 Yinbai;
- Mu-ant. – VC14 Jueque;
- Lo – E40 Fenglong, R4 Dazhong, MC6 Neiguan;

& – VG26 Renzhong, VG16 Fengfu.

Formule

- VG26 + VG16 + MC8 + GI11 + E40 (dispersie) + P11 + RP1 (sângerare);
- VG14 + VG16 + VG26 + MC6 + E40;
- E40 + MC8.

Modelul clinic 10

Faza maniacală a psihozei maniaco-depresive

[Excesul Focului cu epuizarea Yin-Qi]

Simptome

excitație psihică și motorie, insomnie, logoree; astenie, epuizare, slăbiciune în membre; inapetență. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – subțire și rapid.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi, diminuarea Focului, armonizarea psihicului:

Shu – C7 Shenmen, MC7 Daling, R3 Taixi;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – VG26 Renzhong, VC13 Shangwan.

Formule

- C3 + C9 + R1;
- R3 + MC7.

Modelul clinic 11

Alternarea fazei depresive și maniacale a psihozei maniaco-depresive

[Insuficiența Yang-Qi a Inimii/Excesul Focului în Inimă]

Simptome

alternarea depresiei psihice, ideilor de suicid și disperare cu excitabilitatea crescută, entuziasmul, hiperemotivitatea, euforia; acces neadekvat de râs, trezire înainte de vreme; durere sau senzație de disconfort în regiunea precordială și abdomen, palpitații. *Limba* – palidă (în special vârful) sau roșie (la vârf), tremurândă. *Pulsul* – profund și slab sau rapid și plin.

Tratamentul

restabilirea echilibrului în loja energetică Foc și armonizarea funcțiilor psihice:

Shu – E36 Zusanli, C3 Shaohai, R1 Yongquan, MC8 Laogong;

Mu-ant. – VC17 Shanzhong;

Lo – MC6 Neiguan;

& – VG20 Baihui, VG26 Renzhong.

Formule antice

- în faza depresivă – R1(moxibustie) + VC4(tonifiere); în faza maniacală – R1 + VG20(dispersie);

- VG26 + P11 + RP1 + MC7 + V62 (punctare rapidă de 3 ori cu ac fierbinte) + VG16 + E6 + VG24 + MC5 + VG23 + VC1 + GI11 (punctare cu ac fierbinte) + punct localizat pe partea inferioară a limbii, pe linia mediană (sângerare). Aceste 13 puncte sunt înțepate în ordinea expusă.

V.3. Tulburările anxioase

Modelul clinic 12

Tulburările anxioase

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului]

Simptome

1) psihice: depresie, diminuarea memoriei (simptomele apar după boli cronice, activitate sexuală excesivă, hemoragii etc.); anxietate pronunțată, astenie mentală, insomnie (cu trezire repetată în cursul nopții), agitație, labilitate emoțională, semne de somatizare a emoțiilor; 2) somatice: vertij; senzație de căldură în "cinci inimi", transpirații nocturne, uscăciune a pielii, părului și a conjunctivei ochilor. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – filiform, rapid.

Tratamentul

fortificarea Ficatului, alimentarea Yin-Qi, calmarea mentală:

Shu	-	R3 Taixi, F8 Ququan;
Mu-ant.	-	VC4 Guanyuan;
Lo	-	RP6 Sanyinjiao;
&	-	V47 Hunmen, VB13 Benshen, VG24 Shenting.

Formula

F8 + VB13.

Modelul clinic 13

Tulburările anxioase

[Excesul Focului în Ficat]

Simptome

1) psihice: iritabilitate, mânie, furie, insomnie, agitație; 2) somatice: cefalee, vertij; gust amar, gură uscată, senzație de disconfort, durere sau arsură în hipocondru; spasme musculare. *Limba* – roșie (în special marginile), cu depozit galben. *Pulsul* – rapid și întins.

Tratamentul

diminuarea Focului în Ficat, calmarea mentală:

Shu	-	F2 Xingjian, C7 Shenmen, MC7 Daling;
Lo	-	RP6 Sanyinjiao;
&	-	Taiyang (Extra).

Formule

- F2 + F3 + V18 + VB20 + Taiyang*;
- F2 + VB13.

Modelul clinic 14

Tulburările anxioase

[Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor]

Simptome

1) psihice: slăbire a capacității de memorare, amețeli, frigiditate, anxietate asociată cu frica, insomnie, semne de somatizare a emoțiilor; 2) somatice: senzație de căldură spre seară și noaptea, uscăciune în gură și gât, sete; tinitus; constipații; dureri lombare și în genunchi. *Limba* – roșie, uscată, fără depozit (limbă "cheală"). *Pulsul* – subțire, rapid.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi a Rinichilor, calmarea mentală:
Shu – C7 Shenmen, R3 Taixi, R6 Zhaohai;
Shu-post. – V23 Shenshu;
Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
& – V52 Zhishi.

Formule

- V23 + VC4 + R6;
- C7 + R3;
- VC4 + R6;
- V52 + V23 + VC6 + R3.

Modelul clinic 15

Tulburările anxioase

[Insuficiența Qi a Inimii]

Simptome

1) psihice: anxietatea se asociază cu semne de labilitate emoțională pronunțată, se agravează la efort psihic; astenie mentală, insomnie, semne de somatizare a emoțiilor; 2) somatice: palpitații; transpirații spontane, fatigabilitate. *Limba* – palidă (în special vârful). *Pulsul* – gol, neregulat.

Tratamentul

fortificarea Qi a Inimii și armonizarea funcțiilor psihice:
Shu – E36 Zusanli, C7 Shenmen, IG3 Houxi;
Shu-post. – V15 Xinshu, V23 Shenshu;
Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
Lo – MC6 Neiguan;
& – VC6 Qihai.

* Taiyang – la 1 cun înapoia mijlocului distanței dintre extremitatea externă a s-prâncenei și unghiul extern al ochiului.

Formule

- IG3 + V62 + V15;
- IG3 + VG24.

Modelul clinic 16

Tulburările anxioase

[Insuficiența Yin-Qi a Inimii]

Simptome

1) psihice: anxietate cu senzații de disconfort în regiunea precordială, diminuarea memoriei și a capacității de concentrare a atenției (simptomele nevrotice se agravează în orele de seară), insomnie, labilitate emoțională, semne de somatizare a emoțiilor; 2) somatice: palpitații; căldură în "cinci inimi", transpirații nocturne. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – filiform, rapid.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi a Inimii, calmarea mentală:

- Shu – C7 Shenmen;
- Shu-post. – V15 Xinshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Xi – C6 Yinxi;
- Lo – RP6 Sanyinjiao.

Formule

- C7 + V15 + P9 + R3 + RP6 + MC6 + E36 (formulă cu efect de alimentare Yin-Qi);
- V15 + C6;
- VC4 + RP6 + R6;
- C7 + C3 + R3 + VC4;
- C6 + R7; C6 + R6 + RP6.

Modelul clinic 17

Tulburările anxioase

[Insuficiența Yin-Qi a Inimii și a Rinichilor]

Simptome

1) psihice: anxietate cu senzație de disconfort în regiunea precordială, labilitate emoțională, diminuarea memoriei și a capacității de concentrare; simptome nevrotice cu agravare spre seară; semne de somatizare a emoțiilor; 2) somatice: palpitații; dureri în regiunea lombară și genunchi; căldură în "cinci inimi", transpirații nocturne. Șocul emoțional, frica, activitatea sexuală excesivă, perioada de menopauză sunt factori importanți în apariția acestui sindrom. *Limba* – roșie, fără depozit, puncte roșii la rădăcina limbii. *Pulsul* – filiform, rapid.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi a Inimii și a Rinichilor, calmarea mentală:

- Shu – C7 Shenmen, R3 Taixi;

- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Xi – C6 Yinxi, R9 Zhubin;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – R6 Zhaohai.

Formule

- VC17 + VC14 + VC4 + RP6 + R6 + C6;
- C6 + R7;
- C7 + R3 + VC4;
- R9 + C6 + VC4.

Modelul clinic 18

Tulburările anxioase

[Insuficiența Xue a Inimii]

Simptome

1) psihice: anxietate, diminuarea memoriei, diverse cene-stopatii, tulburări nevrotice (astenție, diminuarea procesului de concentrare, stări depresive), insomnie; 2) somatice: piele și buze palide; dureri precordiale (depind de starea emoțională), palpitații; cefalee. Sindromul apare în urma maladiilor somatice grave și a hemoragiilor pe fond de program nerațional de muncă și a traumelor psihice. *Limba* – palidă și subțire. *Pulsul* – subțire.

Tratamentul

fortificarea Xue, armonizarea Inimii și calmarea mentală:

- Shu – E36 Zusanli, C7 Shenmen;
- Shu-post. – V15 Xinshu, V17 Geshu, V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – V43 Gaohuangshu, V44 Shentang.

Formule

- V15 + V20 + V43 + RP10;
- E36 + C7 + RP6 + VC4 + VC12;
- V17 + V15 + RP10 + C7 + MC6;
- RP6 + C7 + VG20 + MC6 + VC12.

Modelul clinic 19

Tulburările anxioase

[Excesul Focului în Inimă]

Simptome

1) psihice: anxietate, iritabilitate și disperare pe fond de astenie, agitație, logoree, tulburări pronunțate de somn; 2) somatice: senzație de căldură în piept; sete; facies, ochi și buze roșii; urini hiperchrome cu senzație de arsură la urinare. *Limba* – roșie (în special vârful), cu depozit galben, uneori limbă ulcerată. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

diminuarea Focului, armonizarea Inimii și calmarea mentală:

- Shu – C3 Shaohai, C8 Shaofu, R1 Yongquan, MC3 Quze;
Mu-ant. – VC14 Jique;
Lo – C5 Tongli.

Formule

- C7 + V15 + MC8 + E36 + C6 (formulă cu efect de diminuare a Focului și armonizare a Inimii);
- R1 + R3 + RP6;
- VC17 + C8.

Modelul clinic 20

Tulburările anxioase

[Flegmă-Foc]

Simptome

1) psihice: anxietate pronunțată cu semne de confuzie mentală, agitație, astenie intelectuală; diminuarea memoriei, depresie sau stare maniacoală; 2) somatice: senzație de sufocare și distensie în piept, dispnee. *Limba* – roșie și tumefiată, cu depozit gros și galben. *Pulsul* – alunecos, rapid.

Tratamentul

diminuarea Flegmei și a Focului, armonizarea Stomacului și a Splinei, calmarea mentală:

- Shu – RP3 Taibai, C3 Shaohai, C8 Shaofu;
Shu-post. – V20 Pishu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan, VC14 Jique, VC17 Shanzhong;
Lo – E40 Fenglong, MC6 Neiguan;
& – E8 Touwei, V49 Yishe, VB13 Benshen.

Formule

- E40 + MC6 + VG14;
- RP3 + C5; RP3 + E40.

V.4. Tulburările asteno-depresive

Modelul clinic 21

Tulburările asteno-depresive

[Insuficiența Qi a Plămânilor]

Simptome

1) psihice: tulburări nevrotice, inhibiție psihomotorie, timiditate, izolare de prezent cu "lacrimi pentru viața din trecut", slăbiciune psihică, depresie, indiferență, lipsa dorinței de a vorbi, insomnie; 2) somatice: transpirații spontane; fațes palid; agravare la efort fizic sau intelectual; constituția și reacțiile patologice în copilărie; predispunere la răceală, afectarea organelor cutiei toracice, voce

slabă; eczemă, acnee. *Limba* – palidă, în regiunea Plămânului (regiunea intermediară între centrul limbii și vârful ei); pot apărea una sau două fisuri amplasate oblic față de linia mediană. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Qi a Plămânilor și armonizarea proceselor psihice:

Shu – E36 Zusanli, P9 Taiyuan;

Shu-post. – V13 Feishu;

& – VG12 Shenzhu, VC6 Qihai, V42 Pöhu.

Formule

- P9 + VC17 + V13 + V20 (formulă cu efect de fortificare Qi a Plămânilor);
- V13 + V15 + V18 + V20 + C7 + E40;
- VC4 + VC17 + E36 + P9.

Modelul clinic 22

Tulburările asteno-depresive

[Insuficiența Qi a Splinei / Insuficiența Yang-Qi a Splinei]

Simptome

1) psihice: tulburări nevrotice, inhibiție psihomotorie, îngrijorare fără acțiuni active, slăbiciune psihică, depresie, lipsa dorinței de a vorbi, insomnie; 2) somatice: transpirații spontane; facies palid; agravare la efort fizic sau intelectual; scăderea apetitului, scaune moi, balonare abdominală; constituția și reacțiile patologice în copilărie: atonie musculară; apetit scăzut, tulburări digestive, balonări abdominale; copii durdulii, uneori obezi (preferă dulciuri). *Limba* – palidă, puțin tumefiată în părțile laterale, cu amprente dentare. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Qi a Splinei și armonizarea proceselor psihice:

Shu – E36 Zusanli, RP3 Taibai;

Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu;

Mu-ant. – VC12 Zhongwan;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – VG6 Jizhong, VG20 Baihui, V49 Yishe.

Formule

- RP2 + RP3 + E36 + V20 + F13 + VC4 + VG4 (formulă cu efect de stimulare Qi și Yang-Qi a Splinei);
- VG4 + VG6 + VG20 + E36 + GI4;
- V20 + V15 + V18 + C7 + E40;
- RP4 + MC6 + VC12 + E25 + RP1;
- VG20 + VC6.

Modelul clinic 23

Tulburările asteno-depresive

[Insuficiența Qi a Inimii / Insuficiența Yang-Qi a Inimii]

Simptome

1) psihice: tulburări nevrotice, inhibiție psihomotorie, labilitate emoțională cu epuizare rapidă, pierdere a interesului de viață, singurătate, "senzație de lipsa dragostei", depresie, insomnie, lipsa dorinței de a vorbi; 2) somatice: transpirații spontane; facies palid; agravare la efort fizic sau intelectual; palpitații, dureri precordiale; constituția și reacțiile patologice în copilărie: nervozitate, labilitate emoțională, tulburări de somn, hiperemotivitate. *Limba* – palidă (în special vârful), uneori apare o fisură pe linia mediană, care ajunge până la vârf. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Qi a Inimii, armonizarea proceselor psihice:

Shu – C7 Shenmen, E36 Zusanli, C9 Shaochong;

Shu-post. – V23 Shenshu, V15 Xinshu;

Lo – C5 Tongli;

& – VC6 Qihai, VG11 Shendao, VG14 Dazhui, VG20 Baihui, V44 Shentang.

Formule

- E14 (din dreapta; tonifiere sau dispersie în funcție de caracteristica pulsului radial în poziția Guan din dreapta) + C3 + C9 (tonifiere);
- VC17 + VC4 + E36 + C7;
- VG4 + VG14 + V15 + V23 + V60;
- VG11 + VG20 + V44 + C7;
- VG20 + VC6;
- V20 + V15 + V18 + C7 + E40;
- V15 + V23 + VG4 + VG14.

Modelul clinic 24

Tulburările asteno-depresive

[Insuficiența Qi a Rinichilor / Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor]

Simptome

1) psihice: tulburări nevrotice, inhibiție psihomotorie, depresie, pierderea controlului cu supunere, epuizare fizică și psihică, lipsa dorinței de a vorbi, pesimism, insomnie; 2) somatice: transpirații spontane; agravare la efort fizic sau intelectual; dureri lombare și în genunchi; edeme lombare; corp și extremități reci (aversiune la frig; facies tumefiat și palid; tinitus; constituția și reacțiile patologice în copilărie: enurezis; căderea părului; slăbiciune naturală a rinichilor, suprarenalelor, gonadelor și a vezicii; rahitism; întârzierea ciclului la fetițe; vitalitate slabă. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab și profund.

Tratamentul

fortificarea Qi a Rinichilor și armonizarea proceselor psihice:

- Shu – E36 Zusanli, R3 Taixi, R7 Fuliu;
- Shu-post. – V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- & – VG4 Mingmen, VC6 Qihai, V8 Luoque, VG20 Baihui, V52 Zhishi.

Formule

- $VG20 + VC4 + R1 + R2 + R7 + C7$;
- $VG20 + VG4 + VG14 + V23 + V60$;
- $IG3 + V62 + VG1$;
- $V23 + V20 + V15 + V18 + C7 + E40$;
- $V23 + VG4 + V52$.

Modelul clinic 25

Tulburările asteno-depresive

[Insuficiența Xue a Splinei / Insuficiența Qi și Xue]

Simptome

1) psihice: depresie, indiferență, lipsa dorinței de a vorbi, uitucie, tulburări nevrotice, astenie (tulburările apar în urma maladiilor grave și a hemoragiilor, la pacienții cu program încordat de muncă); 2) somatice: palpitații; parestezii în membre; fațes și buze palide; agravare la efort fizic sau intelectual; amețeli; senzație de vâil în fața ochilor; inapetență. *Limba* – palidă și subțire, cu amprente dentare. *Pulsul* – filiform și slab.

Tratamentul

fortificarea Qi și Xue, armonizarea funcțiilor psihice:

- Shu – E36 Zusanli, C7 Shenmen;
- Shu-post. – V13 Feishu, V15 Xinshu, V17 Geshu, V20 Pishu, V21 Weishu, V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – V44 Shentang, V49 Yishe, VG20 Baihui, VC6 Qihai.

Formule

- E14 (din dreapta; tonifiere sau dispersie în funcție de caracteristica pulsului radial în poziția Guan din dreapta) + E36 + VG20 + C3 + C9 + MC9 (tonifiere);
- $E36 + VG20 + VC4 + VC12$;
- $V17 + V20 + V15 + V18 + C7 + E40$;
- $RP6 + E36 + V20 + V43 + VG20$;
- $V20 + V15 + V17 + RP10 + MC6$.

Modelul clinic 26

Tulburările asteno-depresive

[Insuficiența Xue în Ficat]

Simptome

1) psihice: depresie, astenie, "ceață în fața ochilor". Astenia fizică și psihică este caracteristică pentru femei cu diferite tulburări ale ciclului menstrual (hemoragii etc.) sau după naștere cu pierderi de sânge. Este specifică o ameliorare a asteniei după ce pacientul stă culcat în cursul zilei (în poziție orizontală sângele în cantități mai mari revine în Ficat); 2) somatice: uscăciune a pielii și a ochilor, uscăciune a părului; senzație de amorțire a membrelor, spasm muscular; constipație; buze palide; la femei – oligomenoree sau amenoree. *Limba* – palidă și subțire. *Pulsul* – filiform.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi și Xue a Ficatului, armonizarea funcțiilor psihice:

- Shu – E36 Zusanli, F8 Ququan;
- Shu-post. – V17 Geshu, V18 Ganshu, V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao.

Formule

- F8 + V17 + V20 + V15 + V18 + C7 + E40;
- E36 + GI10;
- F8 + E36 + RP6.

Modelul clinic 27

Tulburările asteno-depresive

[Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor]

Simptome

1) psihice: depresie, pesimism, insomnie, frigiditate; 2) somatice: facies palid cu pomeți hiperemiati; senzație de căldură în "cinci inimi"; uscăciune în gură și în gât, sete; tinitus, hipoacuzie, amețeli. *Limba* – roșie, uscată, cu depozit subțire sau fără depozit. *Pulsul* – fin și rapid.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi a Rinichilor, armonizarea funcțiilor psihice:

- Shu – R3 Taixi;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – V8 Luoque, V52 Zhishi, R6 Zhaohai.

Formule

- R3 + V20 + V15 + V18 + C7 + E40;
- RP4 + MC6 + VC4 + C6 + Yintang;
- VC4 + VC17 + E36 + RP6 + C6 + R6.

Modelul clinic 28

Tulburările asteno-depresive

[Insuficiența Yin-Qi și Xue a Inimii]

Simptome

1) psihice: labilitate emoțională cu anxietate și depresie, fatigabilitate pronunțată, epuizare fizică și psihică, insomnie; 2) somatice: disconfort sau dureri precordiale (cu agravare în mijlocul zilei și în orele de seară); uscăciune a gurii și a gâtului. *Limba* – subțire, palidă, cu vârf roșu. *Pulsul* – subțire, neregulat.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi și Xue, armonizarea funcțiilor psihice:

- | | | |
|-----------|---|------------------------|
| Shu | – | E36 Zusanli, R3 Taixi; |
| Shu-post. | – | V17 Geshu, V20 Pishu; |
| Xi | – | C6 Yinxi |
| Lo | – | RP6 Sanyinjiao. |

Formule

- V17 + V20 + V15 + V18 + C7 + E40;
- RP6 + V20;
- V17 + V15 + RP10 + C7 + MC6.

Modelul clinic 29

Tulburările asteno-depresive

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului]

Simptome

1) psihice: depresie cu iritabilitate, astenie, cefalee (vertex), slăbiciune generală cu agravare ziua (orele 13–15); 2) somatice: tinitus; gură uscată, uscăciune a ochilor; crampe musculare; roșeață malară; constituția și reacțiile patologice în copilărie; miopie; slăbiciune naturală a ficatului și veziculei biliare cu dificultate de digestie; copii nervoși; ticuri. *Limba* – roșie, uscată, cu depozit neînsemnat sau fără depozit. *Pulsul* – filiform, rapid.

Tratamentul

alimentarea Yin-Qi a Ficatului și armonizarea proceselor psihice:

- | | | |
|-----|---|----------------------------|
| Shu | – | F8 Ququan; |
| Lo | – | RP6 Sanyinjiao; |
| & | – | VG24 Shenting, V47 Hunmen. |

Formule

- F8 + V20 + V15 + V18 + C7 + E40;
- F8 + RP6.

Modelul clinic 30

Tulburările asteno-depresive

[Insuficiența Yin-Qi a Plămânilor și a Rinichilor]

Simptome

1) psihice: depresie, astenie, melancolie, prurit cutanat psihogen, insomnie. Tulburările apar după boli febrile cu consumarea lichidelor organismului sau la pacienții cu constituție slabă; 2) somatice: gât și gură uscate; transpirații nocturne; căldură în "cinci inimi"; dureri lombare și la nivelul genunchilor; tuse seacă, afonie. *Limba* – roșie, uscată (limbă "cheală"). *Pulsul* – filiform și rapid.

Tratamentul

alimentarea Yin-Qi, armonizarea Plămânilor și a Rinichilor, armonizarea funcțiilor psihice:

Shu – P5 Chize, P9 Taiyuan, R3 Taixi;
Mu-ant, – VC4 Guanyuan;
Lo – P7 Lieque;
& – V42 Pihu, V52 Zhishi, R6 Zhaohai.

Formule

- P7 + R6 + VC6;
- P7 + IG5;
- R3 + V13 + V23 + V15 + V18 + C7 + E40;
- P9 + RP6;
- P5 + R6 + VC4.

Modelul clinic 31

Tulburările asteno-depresive

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului și a Rinichilor]

Simptome

1) psihice: depresie, astenie psihică, insomnie; 2) somatice: fațes palid cu pomeți hiperemiați; senzație de căldură în "cinci inimi"; uscăciune în gură și a conjunctivei ochilor; zgomote în urechi; amețeli; senzație de slăbiciune, greutate sau durere în regiunea lombară și în membrele inferioare; menstr neregulate. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – rapid, filiform și întins.

Tratamentul

alimentarea Yin-Qi, armonizarea a Trei Focare, armonizarea funcțiilor psihice:

Shu – C7 Shenmen, R3 Taixi, F8 Ququan;
Mu-ant, – VC4 Guanyuan;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – V47 Hunmen, V52 Zhishi, R6 Zhaohai, VG24 Shenting, VC6 Qihai.

Formule

- R3 + F8 + V20 + V15 + V18 + C7 + E40;
- RP6 + F8; RP6 + R6;

- V47 + V23 + V52.

Modelul clinic 32

Tulburările asteno-depresive

[Stagnarea Qi a Ficatului / Excesul Focului în Ficat]

Simptome

1) psihice: alternare a depresiei cu agresivitatea, iritabilitatea și furia; astenia în stagnarea Qi a Ficatului se agravează ziua (starea bolnavului se ameliorează după odihnă în poziție orizontală sau după exerciții fizice fără mare efort la aer liber); 2) somatice: durere sau senzație de disconfort, arsură în hipocondru; gust amar, constipații cu scaune uscate; oftat; amețeli, cefalee; dureri în ochi, hiperemia sclerelor. *Limba* – roșie, uscată. *Pulsul* – rapid și întins.

Tratamentul

Înlăturarea stagnării Qi, diminuarea Focului și armonizarea funcțiilor psihice:

- | | |
|---------|--|
| Shu | - R1 Yongquan, F1 Dadun, F2 Xingjian, F3 Taichong; |
| Mu-ant. | - F14 Qimen; |
| Lo | - RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan; |
| & | - VC6 Qihai. |

Formule

- F1 + F2 + F5 + VB38 + VB39 + TR10 + VG11 (formulă indicată în depresie cu agresivitate);
- VG8 + V18 + V20 + RP6 + E36;
- MC6 + F3;
- F3 + V20 + V15 + V18 + C7 + E40;
- F3 + TR6 + F14;
- F14 + VG20 + TR6;
- VC6 + E25 + F3 + F14.

Modelul clinic 33

Tulburările asteno-depresive

[Vânt al Ficatului]

Simptome

1) psihice: depresie, astenie cu tremor; 2) somatice: tulburări de sensibilitate, cefalee, tulburări de echilibru și de vorbire, paralizii, ticuri. *Limba* – roșie, tremurândă sau cu deviație. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

armonizarea Ficatului, diminuarea Vântului și armonizarea funcțiilor psihice:

- | | |
|-----|--|
| Shu | - GI11 Quchi, IG3 Houxi, F3 Taichong; |
| & | - VB12 Wangu, VB20 Fengchi, VG16 Fengfu. |

Formule

- F3 + V20 + V15 + V18 + C7 + E40 + VB20;

- F3 + R3;
- VG16 + VG20 + VB20 + GI4 + RP6 + F3.

Modelul clinic 34

Tulburările asteno-depresive

[Umiditate-Flegmă]

Simptome

1) psihice: apatie, astenie, depresie. Astenia în sindromul Umiditate are semne specifice: senzație de greutate în corp și regiunea cefalică, somnolență (în special după mâncare), astenia nu se micșorează după un somn în cursul zilei. În cazuri grave – vorbire incoerentă, pierderea cunoștinței; 2) somatice: inapetență, senzație de opresiune în abdomen, scaune cu mucus, gust amar, salivă lipicioasă; spută abundentă care stagnează în gât; disurie, urină tulbură; în caz de Umiditate-Căldură – sete; urină galbenă-închis; la defecație senzație de arsură în anus, scaune cu sânge. *Limba* – tumefiată, cu depozit gros (în Umiditate-Căldură – limba cu depozit galben), lipicios. *Pulsul* – alunecos.

Tratamentul

eliminarea Umidității, diluarea Flegmei, tonifierea Splinei, armonizarea funcțiilor psihice:

- | | | |
|-----------|---|--|
| Shu | - | P5 Chize, GI11 Quchi, E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan; |
| Shu-post. | - | V20 Pishu, V22 Sanjiaoshu, V25 Dachangshu, V28 Pangguangshu; |
| Mu-ant. | - | E25 Tianshu, VC12 Zhongwan; |
| Lo | - | P7 Lieque, RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong; |
| & | - | E8 Touwei, VG20 Baihui, VC9 Shuifen. |

Formule

- VC12 + V20 + V15 + V18 + C7 + E40 + E36;
- E25 + VC12 + E40 + VG20.

V.5. Nevroza isterică

Modelul clinic 35

Nevroza isterică

[Stagnarea Qi]

Simptome

depresie, inhibiție psiho-motorie, somnolență; senzație de obstrucție în regiunea gâtului. *Limba* – palidă, cu depozit alb. *Pulsul* – ferm sau întins.

Tratamentul

dinamizarea Qi, armonizarea proceselor psihice:

- | | | |
|-----|---|--|
| Shu | - | F3 Taichong, F2 Xingjian, MC7 Daling, R1 |
|-----|---|--|

- | | | |
|---------|---|------------------------------|
| | | Yongquan; |
| Mu-ant. | – | VC17 Shanzhong; |
| Lo | – | RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan; |
| & | – | VC22 Tiantu. |

Formule

- VC22 + VC17 + F3 + F14 + MC6;
- VG26 + GI4 + F3 + VB34 + VC17 + TR6.

Modelul clinic 36

Nervoza isterică

[Stagnarea Qi și Insuficiența Yin-Qi]

Simptome

globus hystericus, depresie, insomnie; senzație de căldură în "cinci inimi", uscăciune în gură; tinitus. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – subțire și rapid.

Tratamentul

dinamizarea Qi, fortificarea Yin-Qi și armonizarea proceselor psihice:

- | | | |
|---------|---|--|
| Shu | – | F2 Xingjian, F3 Taichong, R1 Yongquan, R3 Taixi, C7 Shenmen; |
| Mu-ant. | – | VC17 Shanzhong; |
| Lo | – | MC6 Neiguan, RP6 Sanyinjiao; |
| & | – | VC22 Tiantu. |

Formule

- F2 + GI4 + R3 + TR6;
- VG26 + GI4 + F3;
- V18 + F13 + F2 + TR6 + E40 + VC22.

Modelul clinic 37

Nevroza isterică

[Vânt al Ficatului]

Simptome

spasm al mușchilor sternocleidomastoidian, scalen și trapez cu producerea răsucirii gâtului de partea opusă (rotație cu caracter tonic sau clonic); nervozitate, iritabilitate. *Limba* – roșie (uneori tremurândă). *Pulsul* – tensionat.

Tratamentul

calmarea Ficatului, diminuarea Vântului, normalizarea tonusului muscular:

- | | | |
|-----|---|--|
| Shu | – | IG3 Houxi, IG4 Wangu, V40 Weizhong, V60 Kunlun, VB34 Yanglingquan; |
| Lo | – | P7 Lieque, IG7 Zhizheng, VB39 Xuanzhong, TR5 Waiguan; |
| & | – | V10 Tianzhu, VG14 Dazhui. |

Formule

- R1 Yongquan (în paralizia membrelor inferioare se stimulează prin mișcări "dute-vino", rotație; concomitent bolnavului i se recomandă de a mișca cu picioarele; dacă efectul pozitiv nu este obținut, se stimulează punctele GI11 + TR5 + E36 + VB39, cu lăsarea acelor în țesuturi timp de 3–10 minute);
- VG14 + VB20 + C7 + MC6;
- VB34 + RP9;
- VG26 + GI4 + F3.

Modelul clinic 38

Nervoza isterică

[Vânt-Flegmă]

Simptome

crize convulsive (bolnavul cade unde este mai moale), mișcări dezordonate, demonstrativ își rupe părul de pe cap sau hainele; crize de contractură și spasme musculare; vome; respirație zgomotoasă cu raluri, senzație de opresiune în piept; *globus hystericus*. *Limba* – roșie, cu depozit albicios sau gros. *Pulsul* – întins și alunecos.

Tratamentul

diminuarea Vântului, expulzarea Flegmei, armonizarea proceselor psihice:

- | | | |
|---------|---|--|
| Shu | - | F4 Zhongfeng, VB34 Yanglingquan, F3 Taichong, R1 Yongquan; |
| Mu-ant. | - | VC12 Zhongwan; |
| Lo | - | E40 Fenglong, MC6 Neiguan; |
| & | - | VG26 Renzhong, VC22 Tiantu. |

Formule

- VG26 + GI4 + F3;
- TR17 + VB20 + VG16 (trei puncte ale Vântului Intern).

Modelul clinic 39

Nervoza isterică

["Agitarea" organelor Zang]

Simptome

accese de râs și plâns; crize convulsive sau de contracturi și spasme, paralizii funcționale locale sau generalizate care nu coincid cu sistemul anatomic de inervație, astazie-abazie; spasme respiratorii, tuse; *globus hystericus*; greață, vome. *Limba* – palidă, cu depozit albicios sau gros. *Pulsul* – încordat sau întins, alunecos sau rapid.

Tratamentul

armonizarea organelor Zang și a proceselor psihice:

- | | | |
|-----|---|---------------------------------------|
| Shu | - | C7 Shenmen, R1 Yongquan, F3 Taichong; |
|-----|---|---------------------------------------|

- Lo – MC6 Neiguan;
- & – VG26 Renzhong, VG20 Baihui, VC22 Tiantu.

Formule

- VG15 + VG14 + VB20 + C7 + MC6 + VB30 + VB34 (în paralizie isterică);
- VG26 + GI4 + F3;
- Yintang + VC13 (în vomă isterică).

Modelul clinic 40

Nevroza isterică

[Insuficiența Yin-Qi a Inimii și a Rinichilor]

Simptome

disconfort în regiunea precordială, lombară și a genunchilor; labilitate emoțională (simptomele nevrotice se agravează spre seară); tremurături ale mâinilor; palpitații; căldură în "cinci inimi". *Limba* – roșie, fără depozit (cu posibile puncte roșii la rădăcină). *Pulsul* – filiform, rapid.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi, armonizarea Inimii, Rinichilor și a proceselor psihice:

- Shu – VB34 Yanglingquan, F3 Taichong, R1 Yongquan, C7 Shenmen, R3 Taixi;
- Shu-post. – V23 Shenshu, V15 Xinshu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
- & – R6 Zhaohai.

Formule

- C7 + V15 + P9 + R3 + RP6 + MC6 + E36 (formulă cu efect de alimentare Yin-Qi);
- VG26 + GI4 + F3;
- MC6 + R6;
- C7 + R3 + MC6.

Modelul clinic 41

Nervoza isterică

[Insuficiența Qi și Xue]

Simptome

globus hystericus; respirație scurtă; palpitații; piele și buze palide; hiperhidroză spontană, astenie; inapetență; paralizii funcționale localizate sau generalizate (care nu corespund cu sistemul anatomic de inervație), astazie-abazie, tremor. *Limba* – palidă, cu depozit subțire. *Pulsul* – filiform, slab, mic sau gol.

Tratamentul

fortificarea Qi și Xue, armonizarea proceselor psihice:

- Shu – E36 Zusanli, R1 Yongquan, C7 Shenmen;
- Shu-post. – V17 Geshu, V20 Pishu, V15 Xinshu;

- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
 Lo – MC6 Neiguan, RP6 Sanyinjiao;
 & – RP10 Xuehai, VC22 Tiantu, VG26 Renzhong.

Formule

- VG26 + GI4 + F3 + VC15 + MC6;
 – E36 + V17 + V20.

V.6. Vomele psihogene

Modelul clinic 42

Vomele psihogene

[Dezarmonia Ficat-Stomac]

Simptome

iritabilitate sau depresie; greață și vome psihogene cu senzație de distensie sau durere în epigastru și hipocondru, eructații, regurgitații acide. *Limba* – normală; palidă sau roșie la margini, fără depozit; depozit albicios sau suriu. *Pulsul* – întins (în special din stânga).

Tratamentul

armonizarea Ficatului, Stomacului și a proceselor psihice:
 Shu – GI4 Hegu, F3 Taichong, VB34 Yanglingquan, E36 Zusanli;
 Shu-post. – V21 Weishu;
 Mu-ant. – VC12 Zhongwan, F14 Qimen;
 Lo – MC6 Neiguan;
 & – VB21 Jianjing, VC13 Shangwan, VC10 Xiawan.

Formule

- VC12 + F3; VC12 + MC6;
 – MC6 + VC12 + E36 + VC22 + V17.

Modelul clinic 43

Vomele psihogene

[Căldură în Stomac / Insuficiența Yin-Qi]

Simptome

vome psihogene; aversiune la cald și preferință de alimente și băuturi reci, sete, gură uscată, constipație. *Limba* – roșietică, cu depozit galben. *Pulsul* – mare și rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, fortificarea Yin-Qi, armonizarea circulației Qi și a proceselor psihice:
 Shu – GI4 Hegu, GI1 Shangyang, E44 Neiting, E36 Zusanli;
 Mu-ant. – VC12 Zhongwan;

Lo – MC6 Neiguan, RP6 Sanyinjiao.

Formule

- VC12 + GI1;
- RP6 + VC12 + GI4;
- E44 + VC12 + MC6.

Modelul clinic 44

Vomele psihogene

[Frig al Stomacului / Stagnarea Qi]

Simptome

vome psihogene; senzație de rece în abdomenul superior, cu dureri periodice, pacientul consumă hrana în cantități mici, periodic – scaune moi (prezența setei nu este caracteristică sau este prezentă setea fără dorința de a bea). *Limba* – cu depozit alb și subțire. *Pulsul* – adânc, încordat sau slab.

Tratamentul

Încălzirea Splinei și a Stomacului, dispersia Frigului, armonizarea circulației Qi și a proceselor psihice:

- Shu – GI4 Hegu, E36 Zusanli;
- Shu-post. – V21 Weishu, V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
- Lo – MC6 Neiguan;
- & – VC11 Jianli, VG14 Dazhui.

Formule

- E36 + MC6 + VC12 + V20 + V21 + RP4 (acupunctură + moxibustie; formulă cu efect de încălzire a Stomacului și dispersie a Frigului);
- VG14 + V21;
- MC6 + VC12;
- VC11 + GI4 + E36.

V.7. Tulburările de somn

Modelul clinic 45

Insomnia

[Excesul Yang Qiao Mai și Insuficiența Yin Qiao Mai]

Simptome

insomnia este însoțită de cefalee, dureri în ceafă și în regiunea lombară, spasme musculare, contracturi, atrofii (în special ale membrilor inferioare), dureri în oase și articulații. Punctul V62 Shenmai poate fi sensibil la palpare. *Limba* – roșie. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

dispersia meridianului curios Yang Qiao Mai și tonifierea Yin Qiao

Mai, armonizarea psihicului:

- Shu – E44 Neiting, C7 Shenmen, VB34 Yanglingquan;
& – V10 Tianzhu, V62 Shenmai, R6 Zhaohai, VB20
Fengchi.

Formule

- V62 (dispersie) + R6 (tonifiere; formula antică);
- V62 + R6 + C7 + RP6 + Anmian^{*}.

Modelul clinic 46

Tulburările de somn la copii în ascaridoză

[Stagnarea Qi a Ficatului și a Veziculei Biliare cu acumularea Umidității în Intestine]

Simptome

tulburările de somn (insomnie, coșmaruri, treziri repetate în cursul nopții, somn agitat, plâns în cursul nopții) sunt însoțite de dureri în abdomen și în hipocondrul drept, irascibilitate; greață matinală, salivatie abundentă. *Limba* – palidă, cu depozit gros. *Pulsul* – subțire și întins.

Tratamentul

Înlăturarea stagnării Qi, dispersia Umidității, armonizarea organelor digestive și a psihicului:

- Shu – E44 Neiting, C7 Shenmen, V67 Zhiyin, VB34 Yanglingquan, F3 Taichong;
Mu-ant. – F14 Qimen, VC12 Zhongwan, VB24 Riyue;
Lo – RP6 Sanyinjiao, RP4 Gongsun;
& – E14 Kufang, E21 Liangmen, V62 Shenmai, R6 Zhaohai.

Formule

- VB34 + F3;
- E44 + MC6 + Yintang;
- F3 + MC6 + F14;
- C7 + RP6 + Anmian + F3;
- VC12 + E40 + F3 + MC6;
- VB24 + VB34 + F3 + F14.

Modelul clinic 47

Insomnia

[Hiperactivitatea Focului în Ficat]

Simptome

insomnia este însoțită de cefalee, vertij, tinitus, iritabilitate, coșmaruri; palitații; fațes și ochi roșii; constipații, dureri în hipocondru, gust amar, sete; urină de culoare galbenă. *Limba* – roșie (în

* Anmian 1 – între punctul Yiming și punctul TR17 Yifeng, la jumătatea distanței.

Anmian 2 – la jumătatea distanței între punctul Yinming și punctul VB20 Fengchi.

special marginile), cu depozit galben. *Pulsul* – întins și rapid.

Tratamentul

armonizarea Ficatului și a psihicului:

- Shu – VB34 Yanglingquan, VB44 Zuqiaoyin, F2 Xingjian, F3 Taichong;
Lo – RP6 Sanyinjiao.
& – E14 Kufang, V62 Shenmai, R6 Zhaohai, VB12 Wangu, VB13 Benshen, VB20 Fengchi, VG24 Shenting.

Formule

- V62 (dispersie) + V1 (armonizare) + R6 (tonifiere; formula antică);
- RP6 + F3 + VB34 + Anmian;
- C7 + RP6 + Anmian + F2;
- VB20 + VB34 + Taiyang + F2 + RP6;
- C7 + RP6 + F2 + VB44 + VB20.

Modelul clinic 48

Insomnia

[Stagnarea Qi și a hranei în Stomac / Căldură-Flegmă în Stomac cu ascendența fluxului Qi]

Simptome

insomnia apare ca urmare a meselor neregulate (mai ales a consumului de alimente greu digerabile) și după consumul lacom al alimentelor; somn neliniștit, coșmaruri; balonare, distensie, senzație de greutate sau durere în epigastriu, greață, sughiț, gust amar, pirozis și eructație, inapetență. *Limba* – roșie, cu depozit gros, lipicios sau depozit de culoare galbenă-murdar. *Pulsul* – alune-cos, rapid.

Tratamentul

normalizarea circulației Qi, dispersia Căldurii-Flegmei, înlăturarea stăgnării alimentelor, armonizarea organelor digestive și a psihicului:

- Shu – E36 Zusanli, E44 Neiting, E45 Lidui, RP1 Yinbai;
Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
Lo – E40 Fenglong, RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
& – E14 Kufang, V62 Shenmai, R6 Zhaohai.

Formule

- V43 + MC6 + TR2 + C7 + E41 (formula antică; punctare în ordinea expusă; primul punct se stimulează timp de 2 minute, în ultimele patru puncte după obținerea senzației de acupunctură acele sunt lăsate în țesuturi timp de 30 minute);
- E45 Lidui (moxibustie de scurtă durată; excepție – aplicarea moxei în sindrom Căldură);
- VC12 + E36 + MC6 + C7 + RP6;

- E40 + MC6 + Anmian;
- C7 + RP6 + Anmian + E40.

Modelul clinic 49

Insomnia

[Hiperactivitatea Focului în Stomac]

Simptome

insomnia apare după alimentația picantă, consumul de mâncare fierbinte, alcool, emoții negative; dureri și senzație de arsură în epigastriu, greață, eructație, halenă fetidă, pirozis, ulcerație și tumefiere a gingiilor, constipație, sete (preferință de băuturi reci); urină galbenă. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – mare, rapid.

Tratamentul

diminuarea Focului, armonizarea organelor digestive și a psihicului:

- | | |
|---------|--|
| Shu | - E36 Zusanli, E44 Neiting, E45 Lidui; |
| Mu-ant. | - VC12 Zhongwan; |
| Lo | - MC6 Neiguan, RP4 Gongsun; |
| & | - E12 Quepen, E21 Liangmen. |

Formule

- V43 (stimulare timp de 2 minute), apoi MC6 + TR2 + C7 + E41 (formulă antică);
- E45 + RP1 + Anmian;
- C7 + RP6 + Anmian + E44;
- VC12 + MC6 + RP1 + E44 + Yintang.

Modelul clinic 50

Insomnia

[Hiperactivitatea Focului în Inimă]

Simptome

somn neliniștit, agitat (cu trezire repetată), coșmaruri; constipație, gust amar, sete; palpitații; ten roșietic al feței. *Limba* – roșie (în special la vârf), cu depozit galben; posibil limbă ulceroasă. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

diminuarea Focului, armonizarea Inimii și a psihicului:

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| Shu | - C7 Shenmen, C8 Shaofu, R1 Yongquan; |
| Shu-post. | - V15 Xinshu; |
| Lo | - RP6 Sanyinjiao, C5 Tongli; |
| & | - V44 Shentang, VG19 Houding. |

Formule

- C8 + VC17 (dispersie) + R6 + RP6 (tonifiere; formulă antică);
- C7 + V15 + MC8 + E36 + C6 (formulă cu efect de diminuare a Focului și armonizare a Inimii);

- C7 + RP6 + Anmian + C5;
- C8 + Anmian.

Modelul clinic 51

Insomnia

[Căldură reziduală în regiunea diafragmei]

Simptome

somn neliniștit, trezire repetată în cursul nopții (bolnavul este iritat, nu poate șede și nu suportă poziția orizontală), senzație de disconfort în cutia toracică și în regiunea diafragmei; disconfort în epigastru, regurgitație. Acest sindrom apare după invazia Vântului-Căldură în organism cu formarea Căldurii Interne și care după tratament persistă în cantitate redusă. *Limba* – roșie (în partea anterioară) sau cu puncte roșii în jurul centrului. *Pulsul* – adânc, rapid.

Tratamentul

Înlăturarea Căldurii reziduale, armonizarea psihicului:

- Shu – P10 Yuji, G11 Quchi, C8 Shaofu;
- Shu-post. – V17 Geshu;
- Mu-ant. – VC15 Jiuwei;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong;
- & – V62 Shenmai, R6 Zhaohai.

Formule

- V62 (dispersie) + R6 (tonifiere; formulă antică);
- C7 + RP6 + Anmian + P10;
- P7 + R6 + V1 + V2 + Anmian.

Modelul clinic 52

Insomnia

[Dezarmonia Inimă-Rinichi]

Simptome

insomnie în asociere cu anxietate și palpitații, dificultate la adormire, trezire repetată în cursul nopții; dureri sau senzații neplăcute în regiunea precordială și lombară; transpirații nocturne; gât uscat; senzații de căldură în "cinci inimi"; vertij, zgomote în urechi; astenie intelectuală, diminuarea memoriei; poluții; leucoree. *Limba* – roșie (în special vârful), uscată, tremurândă. *Pulsul* – filiform și rapid.

Tratamentul

armonizarea Inimii și a Rinichilor, alimentarea Yin-Qi, armonizarea psihicului:

- Shu – C7 Shenmen, R2 Rangu, R3 Taixi, MC7 Daling;
- Shu-post. – V15 Xinshu, V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Xi – C6 Yinxi;

& – V44 Shentang, V52 Zhishi, R6 Zhaohai.

Formule

- RP9 + R2 (formula antică; după obținerea senzației de acupunctură acele se lasă în țesuturi timp de 30 minute);
- R3 + C7 + Anmian + Ashi (puncte sensibile la presare, localizate în segmentul dintre punctele R9 Zhubin și R10 Yingu);
- C7 + F2 (dispersie) + RP6 + R3 (tonifiere);
- MC7 + V44 + Anmian (dispersie) + V52 + R7 (tonifiere);
- C5 + R6 + V15 + V23;
- C7 + RP6 + MC7 + R3 + V15 + V23;
- C7 + RP6 + Anmian + R3.

Modelul clinic 53

Insomnia

[Insuficiența Qi a Inimii și a Veziculei Biliare]

Simptome

trezire în a doua jumătate a nopții cu dificultate de adormire, somn superficial cu visuri abundente, timiditate pronunțată, lipsa de inițiativă; palpitații; astenie. *Limba* – palidă. *Pulsul* – gol.

Tratamentul

fortificarea Qi a Inimii și Veziculei Biliare, armonizarea psihicului:

Shu – C7 Shenmen, VB40 Qiuxu;

Shu-post. – V15 Xinshu, V19 Danshu;

& – V44 Shentang, V52 Zhishi.

Formule

- C7 (armonizare) + R6 (tonifiere; formulă antică);
- C7 + RP6 + Anmian + V15 + V19;
- VB40 + C7 + VB12 + Anmian.

Modelul clinic 54

Insomnia

[Insuficiența Yin-Qi a Inimii]

Simptome

trezire frecventă în cursul nopții, labilitate emoțională; transpirații nocturne; senzație de căldură în "cinci inimi"; palpitații; uitucie; gură uscată. *Limba* – roșie, fără depozit (vârful limbii mai roșu). *Pulsul* – subțire și rapid.

Tratamentul

alimentarea Yin-Qi a Inimii, armonizarea psihicului:

Shu – C7 Shenmen, E36 Zusanli;

Shu-post. – V15 Xinshu;

Mu-ant. – VC4 Guanyuan;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – R6 Zhaohai.

Formule

- MC6 + MC7 + C7 (formula antică; în toate punctele acele sunt lăsate în țesuturi timp de 30 minute);
- C7 + V15 + P9 + R3 + RP6 + MC6 + E36 (formulă cu efect de alimentare Yin-Qi);
C7 + RP6 + Anmian + Yintang.

Modelul clinic 55

Insomnia

[Insuficiența Qi și Xue a Inimii și a Splinei]

Simptome

insomnie, somn cu coșmaruri, anxietate, uitucie, tulburări depresive, apatie; slăbiciune generală; dureri precordiale, palpitații; anorexie, scaune moi; vertij, zgomote în urechi; facies și buze palide. *Limba* – palidă, cu depozit subțire, albicios. *Pulsul* – slab, gol.

Tratamentul

fortificarea Inimii și Splinei, armonizarea Qi, Xue și a psihicului:

- Shu – E36 Zusanli, C7 Shenmen;
Shu-post. – V15 Xinshu, V20 Pishu;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – Yintang (Extra).

Formule

- V15 + C7 + C5 + MC6 + RP6 + Anmian;
- V20 + E36 + Yintang;
- C7 + RP6 + V15 + V20;
- RP6 + E36 + VG20 + VC4 + C7;
- VC4 + E36 + RP6 + R6 + C7 + Anmian.

Modelul clinic 56

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului și a Rinichilor]

Insomnia

Simptome

insomnie; vertij, scăderea memoriei; zgomote în urechi; senzație de slăbiciune, greutate sau durere în regiunea lombară și în membrele inferioare (genunchi); senzație de căldură în palme, tălpi și regiunea sternului, pomeți roșii, transpirații nocturne; gură și gât uscate, piele și păr uscat, uscăciune a sclerelor; la bărbați – pierderi seminale nocturne, la femei – oligomenoree. *Limba* – roșie, fără depozit sau cu depozit neînsemnat. *Pulsul* – rapid, filiform și întins.

Tratamentul

fortificarea Ficatului și a Rinichilor, armonizarea psihicului:

- Shu – R3 Taixi, F8 Ququan;
Shu-post. – V18 Ganshu, V23 Shenshu;
Mu-ant. – VC4 Guanyuan;

- Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – C2 Qingling, V43 Gaohuangshu, V47 Hunmen, V52 Zhishi, R6 Zhaohai, VG24 Shenting, Anmian (Extra).

Formule

- V23 + F3 + Anmian;
- V18 + F8 + Yintang;
- VG24 + VB13;
- C7 + RP6 + Anmian + R3 + F8;
- F8 + R6 + VC4;
- R6 + VC4 + E36.

Modelul clinic 57

Hipersomnia

[Insuficiența Yang Qiao Mai și Excesul Yin Qiao Mai]

Simptome

somnolență, depresie, astenie; slăbiciune în coloana vertebrală; edeme; furunculoză pe suprafețele Yang ale corpului (spate, ceață, suprafața externă a membrilor inferioare). Punctul R6 Zhaohai poate fi sensibil la presare. *Limba* – palidă. *Pulsul* – lent.

Tratamentul

armonizarea meridianelor curioase Yang Qiao Mai și Yin Qiao Mai:

- Shu – C9 Shaochong, VB34 Yanglingquan, F3 Taichong;
Shu-post. – V13 Feishu;
Lo – C5 Tongli;
& – V62 Shenmai, R6 Zhaohai, VG4 Mingmen, VG20 Baihui.

Formule antice

- R6 (dispersie) + V62 (tonifiere) + V1 (armonizare);
- VG20 + E36 + V62, apoi R6 + RP6 (stimularea în punctul R6 Zhaohai se efectuează până la momentul propagării senzației de acupunctură la nivelul punctului RP6 Sanyinjiao, acul fiind imediat extras și inserat în punctul RP6 Sanyinjiao).

Modelul clinic 58

Hipersomnia

[Insuficiența Yang-Qi a Inimii]

Simptome

somnolență cu apatie și senzație de frig în membre; disconfort sau durere în regiunea precordială, palpitații; dispnee; tegumente palide. *Limba* – palidă (în special vârful). *Pulsul* – profund și slab.

Tratamentul

potențarea Yang-Qi a Inimii și normalizarea proceselor psihice:

- Shu – C8 Shaofu, C9 Shaochong;

- Lo – E40 Fenglong;
- & – V62 Shenmai, R6 Zhaohai.

Formule

- C7 + V15 + V23 + P9 + MC6 + VC4 (formulă cu efect de fortificare Yang-Qi);
- C9 + C8 + V64 + R3;
- V15 + V44 + V42 + RP6.

Modelul clinic 59

Hipersomnia

[Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor]

Simptome

somnolența excesivă apare după maladii cronice epuizante sau la persoanele de vârstă înaintată; facies palid și tumefiat; edeme; corp și extremități reci (cu ameliorare la cald); bolnavul vorbește puțin; mănâncă puțin; amețeli, capacitate de memorare redusă. *Limba* – palidă, tumefiată, cu depozit alb. *Pulsul* – profund, slab.

Tratamentul

potențarea Yang-Qi a Rinichilor, armonizarea psihicului:

- Shu – C9 Shaochong, R7 Fuli;
- Shu-post. – V17 Geshu, V23 Shenshu;
- & – V52 Zhishi, V62 Shenmai, R6 Zhaohai, VG14 Dazhui, VG20 Baihui, VC6 Qihai.

Formule

- V23 + VG4;
- VG20 + VG4 + V62.

Modelul clinic 60

[Insuficiența Qi a Splinei]

Hipersomnia

Simptome

somnolență excesivă, mai ales după mâncare; față palidă; oboseală; poftă redusă de mâncare, abdomen balonat, scaune moi; extremități reci. *Limba* – palidă, cu depozit alb. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Splinei, armonizarea organelor digestive și a funcțiilor psihice:

- Shu – E36 Zusanli, C3 Shaohai;
- Shu-post. – V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
- Lo – RP4 Gongsun, RP6 Sanyinjiao, C5 Tongli;
- & – V62 Shenmai, R6 Zhaohai, VG20 Baihui.

Formule

- VG20 + VC6;
- VC12 + E36 + RP3.

Modelul clinic 61

Hipersomnia

[Stagnarea Qi și Xue în regiunea cefalică]

Simptome

hipersomnie în asociere cu vertij și cefalee. Somnolența apare după diferite traume în regiunea cefalică sau după o frică puternică, un stres puternic, care au provocat stagnarea Qi și Xue. *Limba* – purpurie. *Pulsul* – rugos.

Tratamentul

normalizarea circulației Qi și Xue, armonizarea proceselor psihice:

- Shu – MC9 Zhongchong, TR3 Zhongzhu;
- Shu-post. – V17 Geshu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, P7 Lieque;
- & – V2 Zanzhu, V62 Shenmai, R6 Zhaohai, VB12 Wangu, VB19 Naokong, TR20 Jiaosun.

Formula

V17 + RP10.

V.8. Scăderea capacității de memorare

Modelul clinic 62

Scăderea capacității de memorare

[Insuficiența Qi a Splinei]

Simptome

astenie intelectuală, slăbire a memoriei (în special a procesului de memorare), diminuarea procesului de concentrare a atenției; inapetență, scaune moi. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

ameliorarea funcției Splinei, fortificarea capacității de memorare:

- Shu – E36 Zusanli, RP3 Taibai;
- Shu-post. – V15 Xinshu, V20 Pishu;
- & – V49 Yishe, VG14 Dazhui, VG20 Baihui.

Formule

- V43 + VG20 + C7;
- VG20 + VG4 + E36.

Modelul clinic 63

Scăderea capacității de memorare

[Insuficiența Yang-Qi a Inimii / Insuficiența Yin-Qi a Inimii]

Simptome

slăbirea memoriei (în special la evenimentele din trecut); palpitații; astenie, dispnee la efort fizic neînsemnat. *Limba* – palidă sau

roșie (în funcție de sindromul Insuficiența Yang sau Insuficiența Yin). *Pulsul* – slab sau fin.

Tratamentul

tonifierea Inimii, fortificarea memoriei:

Shu – C7 Shenmen;

Shu-post. – V15 Xinshu;

Lo – C5 Tongli, E40 Fenglong;

& – V44 Shentang, VG14 Dazhui.

Formule

– V43 + VG20 + C7;

– C3 + C6 + V15.

Modelul clinic 64

Scăderea capacității de memorare

[Insuficiența Esenței Rinichilor]

Simptome

slăbirea memoriei (în special la evenimentele actuale în cursul zilei, pacientul nu reține cifrele, denumirile etc.); tinitus; slăbiciune în regiunea lombară și genunchi; diminuarea activității sexuale. *Limba* – palidă sau roșie (în funcție de sindromul Insuficiența Yang sau Insuficiența Yin). *Pulsul* – profund și subțire sau dispersat.

Tratamentul

tonifierea Rinichilor, păstrarea Esenței și fortificarea capacității de memorare:

Shu – R3 Taixi;

Shu-post. – V23 Shenshu, V15 Xinshu;

Mu-ant. – VC4 Guanyuan;

& – VG20 Baihui, V52 Zhishi.

Formule

– VC4 + VC8 + VG4 + V23;

– IG3 + V62 + VG11;

– R3 + VC4 + R6 + VB39 + E36.

VI

Acupunctura în tratamentul bolilor neurologice

- VI.1. Sindromul de neuron motor central**
- VI.2. Sindromul parkinsonian**
- VI.3. Cefaleea. Migrena**
- VI.4. Hiperhidroza**
- VI.5. Nevralgia de trigemen**
- VI.6. Nevralgia intercostală**
- VI.7. Sindromul de neuron motor periferic**
- VI.8. Paralizia facială periferică**
- VI.9. Spasmul facial**

VI.1. Sindromul de neuron motor central

Modelul clinic 65

Faza prodromală a apoplexiei

[Vânt Intern / Stagnarea Qi și Xue / Flegmă / Hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului]

Sîmptome

cefalee cu senzație de distensie, vertij, tinitus; ataxie tranzitorie ușoară, acroparestezie; crize de hipertensiune arterială. *Limba* și *pulsul* sunt în funcție de sindromul predominant.

Tratamentul

diminuarea Vântului Intern, armonizarea Qi și Xue, armonizarea organelor interne:

- | | | |
|-----|---|---------------------------------------|
| Shu | – | F3 Taichong, E36 Zusanli, GI11 Quchi; |
| Lo | – | VB39 Xuanzhong; |
| & | – | VG20 Baihui, VB20 Fengchi. |

Formule cu scop de profilaxie a apoplexiei

- VG20 + Sishencong + VB20 + F3 (acupunctură 30 minute cu stimulare ușoară la fiecare 10 minute);
- E36 + GI11 (acupunctură 30 minute);
- E36 + VB39 (moxibustie 20 minute);
- VG20 (moxibustie la fiecare 3–5 zile, cu o durată de 30–50 minute la procedură).

Modelul clinic 66

Hemiplegia – faza acută [forma spastică]

[Afectarea organelor Zang Fu: colapsul Yin]

Sîmptome

colaps vascular; obnubilare, somn sau comă; fălci și pumni încheștați; fața și pavilioanele urechilor – roșii, piele fierbinte la palpare; respirație stertoroasă; oligurie (retenție urinară); constipație. *Limba* – roșie, deviată, cu depozit galben. *Pulsul* – dur, rapid sau alunecos.

Tratamentul

diminuarea Vântului și a Flegmei, reechilibrarea Yin-Yang, înlăturarea spasmelor, deschiderea orificiilor, restabilirea funcțiilor vitale:

- | | | |
|-----|---|---|
| Shu | – | Jing-distale ale membrelor superioare (sângerare),
GI4 Hegu, MC8 Laogong, R1 Yongquan; |
| Lo | – | E40 Fenglong, C5 Tongli; |

* Sishencong – 4 puncte situate la 1 cun anterior, posterior și lateral de punctul VG20 Baihui.

- & – E6 Jiache, VB20 Fengchi, VG16 Fengfu, VG20 Baihui, VG26 Renzhong.

Formule

- GI4 + E6;
- E40 + VC22.

Modelul clinic 67

Hemiplegia – faza acută [forma flască]

[Afectarea organelor Zang Fu / Colapsul Yang]

Simptome

obnubilare, somn sau comă, colaps vascular; gură și pumni deschise, membre hipotone și reci; ochi închiși; față palidă; respirație slabă; transpirație profuză și lipicioasă; urinare frecventă și profuză, incontinență urinară; scaune moi, incontinență anală. *Limba* – palidă, tumefiată, deviată. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

reechilibrarea Yin-Yang, restabilirea funcțiilor vitale:

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- & – VG4 Mingmen, VC6 Qihai, VC8 Shenque.

Formula

VG26 + VC4 + VC8 (moxibustie).

Modelul clinic 68

Hemiplegia

[Afectarea meridianelor și colateralelor / Vânt Intern]

Simptome

hemiplegie; asimetrie facială, bolnavul nu are mișcări active în membrele superioare sau inferioare, tulburare a tonusului muscular; cefalee, vertij, tinitus; tulburări de tranzit intestinal; incontinență urinară; dereglări în procesele de comutare de la un sunet sau cuvânt la altul, tulburări ale cineticii procesului de vorbire, repetare permanentă a cuvintelor sau a sunetelor. *Limba* – cu deviație sau cu tremor. *Pulsul* – subțire, tensionat.

Tratamentul

Înlăturarea Vântului și obstrucției meridianelor, ameliorarea circulației Qi și Xue și a funcțiilor motore.

Paralizia membrelor superioare

- Shu – GI4 Hegu, GI11 Quchi, E36 Zusanli, IG3 Houxi, TR6 Zhigou, VB34 Yanglingquan;
- Lo – E40 Fenglong, TR5 Waiguan;
- & – GI10 Shousanli, GI13 Wuli, GI14 Binao, GI15 Jianyu, IG9 Jianzhen, IG10 Naoshu, TR14 Jianliao, V7 Tongtian, VB20 Fengchi, VB21 Jianjing, VG20

- Baihui.
- Locale – G14 Hegu, G110 Shousanli, G111 Quchi, G113 Wuli, G114 Binao, G115 Jianyu, IG3 Houxi, IG9 Jianzhen, IG10 Naoshu, TR5 Waiguan, TR6 Zhigou, TR14 Jianliao.
- Distale – E36 Zusanli, E40 Fenglong, V7 Tongtian, VB20 Fengchi, VB21 Jianjing, VB34 Yanglingquan, VG20 Baihui.

Formule

- MC3 + MC6;
- G115 + G111 + G14;
- G116 + G114 + G110.

Paralizii membrelor inferioare

- Shu – G14 Hegu, E36 Zusanli, V40 Weizhong, V60 Kunlun, MC3 Quze, VB34 Yanglingquan, VB40 Qixu;
- Lo – VB39 Xuanzhong, E40 Fenglong;
- & – E31 Biguan, E32 Futu, V7 Tongtian, V57 Chengshan, VB20 Fengchi, VB30 Huantiao, VB31 Fengshi, VB39 Xuanzhong, VG20 Baihui.
- Locale – E31 Biguan, E32 Futu, E36 Zusanli, E40 Fenglong, V40 Weizhong, V57 Chengshan, V60 Kunlun, VB30 Huantiao, VB31 Fengshi, VB34 Yanglingquan, VB40 Qixu.
- Distale – G14 Hegu, V7 Tongtian, MC3 Quze, VB20 Fengchi, VG20 Baihui.

Formule

- RP9 + RP6;
- VB34 + VB30 + VB39 + V17 + V20;
- E36 + E37 + V27 + V20;
- VB30 + VB31 + VB34 + VB40;
- V23 + VG3 + VB30 + VB34 + E37 + E39 + VB39 + F3;
- E31 + E32 + E33 + E36 + E41 + Huatuojiayi (Extra, L2,4) + V32.

Afazia motorie

- Shu – G14 Hegu, R3 Taixi;
- Lo – C5 Tongli;
- & – G118 Futu, E4 Dicang, E6 Jiache, R6 Zhaohai, VB20 Fengchi, VG20 Baihui, VC23 Lianquan, VC24 Chengjiang, VG16 Fengfu, Jinjin – Yuye (Extra), Shanglianquan (Extra).

* Huatuojiayi (Jiayi) – la 0,5 cun lateral de linia mediană, la nivelul marginii inferioare a fiecărei apofize spinose (de la C1 până la L5).

** Jinjin – pe suprafața inferioară a limbii, lateral de venele sublinguale (din stânga).

*** Yuye – pe suprafața inferioară a limbii, lateral de venele sublinguale (din dreapta).

**** Shanglianquan – la 0,5 cun superior de punctul VC23 Lianquan.

Formule

- VG15 + VC23 + C5;
- IG3 + V62 + VG15;
- C5 + MC6 + VC23 + VG15 + E40 + F3.

Disfagia

- Shu - GI5 Yangxi;
& - VG16 Fengfu, VC22 Tiantu, VC23 Lianquan, VB20 Fengchi, VB12 Wangu, TR17 Yifen.

Formula

VC23 + GI18 + VB20 + GI4.

Hipertensiunea arterială

- Shu - E36 Zusanli, F2 Xingjian, GI11 Quchi;
Lo - MC6 Neiguan, E40 Fenglong;

Formula

E36+GI11.

Tulburările de tranzit intestinal

- Shu - GI4 Hegu, F3 Taichong;
Shu-post. - V23 Shenshu, V25 Dachangshu;
Mu-ant. - VC4 Guanyuan;
Lo - RP6 Sanyinjiao;
& - V33 Zhongliao, V57 Chengshan, VB20 Fengchi, VG4 Mingmen, VC6 Qihai.

Formula

- VG20 + V20 + V23.

Incontinența urinară

- Shu - R3 Taixi, RP9 Yinlingquan, E36 Zusanli;
Shu-post. - V23 Shenshu;
Mu-ant. - VC3 Zhongji, VC4 Guanyuan;
Lo - RP6 Sanyinjiao;
& - VG4 Mingmen, VB20 Fengchi, VC6 Qihai.

Formule

- V23+VC6 + E36 + VC4;
- IG3 + V62 + V33.

Modelul clinic 69

Hemiplegia

[Hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului în urma Insuficienței Yin-Qi / Vânt Intern]

Simptome

sincopă; delir; hemiplegie; respirație zgomotoasă și neregulată; hipertensiune arterială; sânge în lichidul cefalorahidian (hemoragie cerebrală). *Limba* – roșie. *Pulsul* – încordat, întins, fin și alunecos.

Tratamentul

diminuarea Vântului Intern, armonizarea Yin-Yang, diminuarea Căldurii și Flegmei, descendența Qi-ului pervers și ameliorarea funcțiilor motorii:

- Shu – 12 puncte Jing.dist. (sângerare);
Lo – RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong;
& – VC22 Taintu, VC23 Lianquan.

Formula antică

E40 + RP6 (punctare bilaterală cu reținerea acelor 30 minute; stimularea punctului E40 Fenglong până la obținerea senzației de rece transmise la genunchi; stimularea punctului RP6 Sanyinjiao până la obținerea senzației de rece transmise la degetele piciorului).

Modelul clinic 70

Hemiplegia

[Stagnarea Qi și Xue / Vânt Intern]

Simptome

pierdere tranzitorie a cunoștinței; hemiplegie sau monopareză, afazie (tromboză cerebrală); buze palide, cianotice. *Limba* – cianotic-purpurie, cu peteșii la margini. *Pulsul* – încordat și rugos.

Tratamentul

diminuarea Vântului Intern, promovarea circulației Qi și Xue, ameliorarea funcțiilor motorii:

- Shu – GI4 Hegu, GI11 Quchi, VB34 Yanglingquan, E36 Zusanli;
& – VG16 Fengfu, VB20 Fengchi, VG20 Baihui.

Formule

- VG16 + VB20 (punctare bilaterală cu obținerea senzației de căldură transmise în interiorul capului);
- GI11 + GI4 + VB34 + E36 (punctare bilaterală cu reținerea acelor timp de 10–20 minute);
- TR17 + VB20 + VG16 (trei puncte ale Vântului Intern).

Modelul clinic 71

Hemiplegia

[Insuficiența Qi a Splinei și a Rinichilor /Vânt Intern]

Simptome

hemiplegie de lungă durată cu atrofia mușchilor, afazie, contracturi; inapetență, scaune moi; vertij, tinitus; râs sau plâns involuntar. *Limba* – palidă, cu depozit subțire și alb. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Splinei și Rinichilor, diminuarea Vântului Intern, armonizarea Qi și Xue, ameliorarea funcțiilor motorii:

- Shu – E36 Zusanli, GI11 Quchi, GI4 Hegu, VB34

- Yanglingquan;
 Shu-post. – V20 Pishu, V23 Shenshu;
 Lo – TR5 Waiguan, RP6 Sanyinjiao, VB39 Xuanzhong;
 & – V11 Dashu, V12 Fengmen, GI15 Jianyu, V26
 Guanyuanshu, V54 Zhibian, VB30 Huantiao, VB31
 Fengshi, VB20 Fengchi.

Formule în paralizia membrelor superioare

- V11 + V12 + V20 (punctare bilaterală cu obținerea senzației de căldură în spate și regiunea scapulară);
- GI15 + GI11 + TR9 + TR15 + GI4 (punctare pe partea afectată timp de 15 minute cu obținerea senzației de căldură, transmisă spre degetele mâinii).

Formule în paralizia membrelor inferioare

- V23 + V26 + V54 (punctare bilaterală cu obținerea senzației de căldură în regiunea lombosacrală și membrele inferioare);
- VB30 + VB31 + VB34 + E36 + VB39 + RP6 (punctare pe partea afectată timp de 10–15 minute cu obținerea senzației de căldură transmisă în degetele piciorului).

VI.2. Sindromul parkinsonian

Modelul clinic 72

Sindromul parkinsonian

[Flegmă-Căldură cu agitarea Vântului]

Simptome

rigiditate și tremurături, încetinirea mișcărilor (bradikinezie); senzație de opresiune în cutia toracică, spută groasă de culoare galbenă; senzație de greutate în membre; gură uscată, constipații; transpirații; urini hiperchrome; cefalee. *Limba* – roșie, cu depozit galben și gros. *Pulsul* – alunecos, rapid.

Tratamentul

- diminuarea Căldurii și Flegmei, ameliorarea circulației Qi și Xue:
- Shu – GI11 Quchi, RP9 Yinlingquan, VB34 Yanglingquan, F3 Taichong;
 Shu-post. – V20 Pishu;
 Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
 Lo – RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong;
 & – VB20 Fengchi, VB31 Fengshi, VG19 Houding.

Formule

- GI11 + E40 + VB20 + VG16;
- VG20 + VG14 + VB20 + GI4 + F3 + GI11 + TR5 (tremor al membrelor superioare);
- VG20 + VG14 + VB20 + GI4 + F3 + VB34 + VB39 (tremor al membrelor inferioare);

- VG20 + VG14 + VB20 + GI4 + F3 + Taiyang + VG26 + E6 + E4 (afectarea feței cu apariția de "mască");
- VG20 + VG14 + VB20 + GI4 + F3 + C6 + E36 (hiperhidroză);
- VG20 + VG14 + VB20 + GI4 + F3 + E4 + VC23 (hipersalivație);
- VG20 + VG14 + VB20 + GI4 + F3 + VG26 + MC6 + V15 (stări depresive).

Modelul clinic 73

Sindromul parkinsonian

[Insuficiența Qi și Xue]

Simptome

tremurături și încetinirea mișcărilor voluntare, astenie, crampe musculare, bolnavul pierde posibilitatea de a executa mișcări mai fine ale degetelor; lipotimii, vertij, insomnie. *Limba* – palidă, tumefiată, cu amprente dentare. *Pulsul* – gol, slab.

Tratamentul

tonifierea Qi, alimentarea Xue:

- | | | |
|---------|---|---|
| Shu | - | GI4 Hegu, GI10 Shousanli, GI11 Quchi, E36
Zusanli, VB34 Yanglingquan, F8 Ququan; |
| Mu-ant. | - | VC4 Guanyuan; |
| Lo | - | RP6 Sanyinjiao; |
| & | - | VB20 Fengchi, VB31 Fengshi. |

Formula

E36 + RP6 + VB39.

Modelul clinic 74

Sindromul parkinsonian

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului și a Rinichilor]

Simptome

rigiditate (hipertonie) musculară, tremurături și încetinirea mișcărilor voluntare (bradikinezie), bolnavul pierde posibilitatea de a executa mișcări mai fine ale degetelor; dureri în regiunea lombară, slăbiciune în articulațiile genunchilor; senzație de căldură în "cinci inimi", transpirații nocturne, gură și gât uscate; scăderea memoriei; insomnie; zgomote în urechi. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – întins, fin și rapid.

Tratamentul

fortificarea Ficatului și a Rinichilor, ameliorarea circulației Qi și Xue:

- | | | |
|-----------|---|---|
| Shu | - | R3 Taixi, VB34 Yanglingquan, F3 Taichong; |
| Shu-post. | - | V23 Shenshu; |
| Mu-ant. | - | VC4 Guanyuan; |
| Lo | - | RP6 Sanyinjiao; |
| & | - | GI10 Shousanli, VB20 Fengchi. |

Formule

- GI10 + GI4 + TR5;
- VB34 + VB31 + VB40.

VI.3. Cefaleea. Migrena

Modelul clinic 75

Cefaleea

[Vânt-Frig]

Simptome

cefalee acută, mai pronunțată în regiunea occipitală și a cefei; dureri în partea superioară a spatelui; aversiune la rece (agravarea cefaleei), frison, posibilă febră; absență a setei și a transpirației; obstrucție nazală cu eliminări transparente, strănut; dureri în articulații; urină transparentă. În general, cefaleea se manifestă în funcție de afectarea celor șase nivele energetice: cefalee temporo-parietală (tipul Shao Yang); cefalee frontală (tipul Yang Ming); cefalee occipitală (tipul Tai Yang); cefalee de vertex (tipul Jue Yin); cefalee profundă, fără localizare precisă (tipul Shao Yin); cefalee cu senzație de greutate (tipul Tai Yin). *Limba* – cu depozit alb, subțire. *Pulsul* – superficial.

Tratamentul

eliminarea Vântului și a Frigului, înlăturarea obstrucției în meridiene, diminuarea durerii:

- | | | |
|-----|---|--|
| Shu | - | GI4 Hegu, IG3 Houxi, V60 Kunlun, V66 Tonggu, V67 Zhiyin; |
| Lo | - | P7 Lieque; |
| & | - | V10 Tianzhu, VB20 Fengchi, VG16 Fengfu, VG20 Baihui. |

Formule

- IG3 + V62;
- P7 + VG16 + TR5 + VC24;
- P7 + VB20 + GI4;
- VB19 + VB20 + P7 + P9 + GI4 + E41;
- VG20 + V7 + F2 + puncte Ashi (cefalee, vertex);
- GI4 + VG23 + E8 + Yintang; VB20 + GI4 + TR23 + VG23 + VB14 (cefalee, regiunea frontală);
- IG3 + V60 + V10 + VG19 + puncte Ashi (cefalee, occipit);
- VB43 + VB7 + VB8 + Taiyang + puncte Ashi; VB20 + VB8 + TR5 + VB43 (cefalee, regiunea temporo-parietală).

Modelul clinic 76

Cefaleea

[Vânt-Căldură]

Simptome

cefalee (dureri interne) intensă cu senzație de distensie; frison, febră, sete intensă; obstrucție nazală cu eliminări galbene; gât uscat; ochi hiperemiați; urină galbenă. *Limba* – roșie (în special la margini), depozit gălbui și subțire. *Pulsul* – superficial și rapid.

Tratamentul

eliminarea Vântului și a Căldurii, înlăturarea obstrucției în meridiane, diminuarea durerii:

- | | | |
|-----|---|---|
| Shu | – | P10 Yuji, P11 Shaoshang, GI4 Hegu, GI11 Quchi; |
| Lo | – | TR5 Waiguan; |
| Xi | – | P6 Kongzui; |
| & | – | V12 Fengmen, VB20 Fengchi, VG14 Dazhui, VG16 Fengfu, VG20 Baihui. |

Formule

- TR5 + VB20;
- VG14 + GI4 + E43.

Modelul clinic 77

Cefaleea

[Vânt-Umiditate]

Simptome

cefalee cu senzație de greutate (agravare la umiditate înaltă); aversiune față de frig, frison (uneori febră); senzație de greutate în globii oculari; opresiune în cutia toracică sau epigastru, inapetență; senzație de greutate în tot corpul. *Limba* – cu depozit lipicios. *Pulsul* – alunecos.

Tratamentul

expulzarea Vântului și Umidității, înlăturarea obstrucției în meridiane, diminuarea durerii:

- | | | |
|-----|---|--|
| Shu | – | GI4 Hegu, RP9 Yinlingquan; |
| Lo | – | P7 Lieque, RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong; |
| & | – | E8 Touwei, V7 Tongtian, VB20 Fengchi, VG20 Baihui. |

Formula

V12 + VB20 + VG16 (trei puncte ale Vântului Extern).

Modelul clinic 78

Cefaleea

[Stagnarea Frigului în meridianul Ficat]

Simptome

cefalee intensivă (în special în regiunea vertexului); senzație de rece în corp și membre (în special pe traseul meridianului Ficat);

spasme musculare; tumefiere sau durere a scrotului; hernie inghinală; vomă. *Limba* – palidă (mai târziu marginile devin roșii). *Pulsul* – întins sau încordat.

Tratamentul

Încălzirea Frigului, ameliorarea circulației Qi și Xue, diminuarea durerii:

- | | | |
|---------|---|-------------------------|
| Shu | – | F3 Taichong; |
| Mu-ant. | – | VC4 Guanyuan; |
| Lo | – | RP6 Sanyinjiao; |
| & | – | VG20 Baihui, VC6 Qihai. |

Formula

VC3 + F5 + F1 (moxibustie).

Modelul clinic 79

Cefaleea

[Stagnarea Qi a Ficatului]

Simptome

cefalee (predominant în regiunea frontală și tâmples) provocată de anxietate, stres; senzație de distensie sau durere în hipocondru, diminuarea procesului de digestie, senzație de distensie în abdomen, scaun fracționat. *Limba* – normală sau roșie la margini. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

ameliorarea circulației Qi și Xue, diminuarea durerii:

- | | | |
|---------|---|--|
| Shu | – | GI4 Hegu, E36 Zusanli, TR3 Zhongzhu, VB34 Yanglingquan, F3 Taichong; |
| Mu-ant. | – | F14 Qimen; |
| & | – | VG24 Shenting, Taiyang (Extra). |

Formule

- F2 + F3 + F14 + V18 + VB40 + TR6 (formulă cu efect de dinamizare Qi și armonizare a Ficatului);
- GI4 + F3;
- TR3 + VB40;
- VB34 + VG24.

Modelul clinic 80

Cefaleea

[Ascendența Yang-Qi a Ficatului / Excesul Focului în Ficat]

Simptome

cefalee (cu senzație de distensie, pulsație, în special pe traseul meridianului Veziculă Biliară); tinitus, vertij (bolnavul evită mișcările capului); gât uscat, gust amar, sete, grețuri, constipație cu scaun uscat; hiperemia ochilor; iritabilitate, insomnie. *Limba* – roșie, cu depozit galben (în caz de ascendență Yang-Qi a Ficatului, din cauza Insuficienței Xue a Ficatului, limba poate fi palidă).

Pulsul – întins (în special din stânga), lung, rapid.

Tratamentul

normalizarea funcției Ficatului, diminuarea durerii:

- Shu – GI4 Hegu, GI11 Quchi, R3 Taixi, F2 Xingjian, F3 Taichong, F8 Ququan, VB38 Yangfu, VB43 Xiashi, VB44 Zuqiaoyin;
Lo – RP6 Sanyinjiao, TR5 Waiguan;
& – VB4 Hanyan, VB5 Xuanlu, VB9 Tianchong, VB14 Yangbai, VB20 Fengchi, Taiyang (Extra).

Formula

VB5 + VB20 + VB43 + F2.

Modelul clinic 81

Cefaleea

[Stagnarea Qi și a hranei în Stomac / Pervertirea fluxului Qi / Căldură în Stomac]

Simptome

cefalee (în special regiunea frontală), care apare în cazul alimentației excesive cu hrană picantă și fierbinte; plenitudine sau durere în epigastriu, eructație, gust neplăcut în gură. *Limba* – roșie, cu depozit gros și lipicios sau galben. *Pulsul* – alunecos, rapid.

Tratamentul

restabilirea fluxului normal al Energiei (Qi), diminuarea Căldurii, ameliorarea digestiei, diminuarea cefaleei:

- Shu – E36 Zusanli, E44 Neiting, E45 Lidui, GI4 Hegu;
Xi – E34 Liangqiu;
Lo – E40 Fenglong, MC6 Neiguan, RP4 Gongsun;
& – E8 Touwei, E21 Liangmen, VC10 Xiawan, VC13 Shangwan.

Formula

E36 + RP4.

Modelul clinic 82

Cefaleea

[Umiditate / Flegmă]

Simptome

cefalee surdă, difuză (sau în regiunea frontală) în asocierie cu senzație de greutate, distensie (mai pronunțate în orele de dimineață); senzație de greutate în corp; grețuri, inapetență, senzație de distensie în epigastriu; sinusite. *Limba* – cu depozit gros, lipicios. *Pulsul* – alunecos.

Tratamentul

tonifierea Splinei, diminuarea Umidității / Flegmei și a cefaleei:

- Shu – GI11 Quchi, RP3 Taibai, E36 Zusanli;
Shu-post. – V20 Pishu;

- Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
 Lo – RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong;
 & – E8 Touwei, VG20 Baihui, VG23 Shangxing.

Formula

E36 + MC6.

Modelul clinic 83

Cefaleea

[Stagnarea Xue]

Simptome

cefalee cronică intermitentă (în anamneză – traume cerebrale) și severă cu localizare fixă; dureri în hipocondru sau abdomen. *Limba* – normală sau cianotică, uneori cu pete purpurii (este posibilă apariția unei pete purpurii la vârful limbii ce indică asupra unei traume cerebrale suportate în trecut). *Pulsul* – slab, profund sau rugos, înnodat.

Tratamentul

Înlăturarea stagnării Xue, diminuarea cefaleei:

- Shu – GI4 Hegu, F3 Taichong;
 Lo – RP6 Sanyinjiao, TR5 Waiguan;
 & – RP10 Xuehai, V2 Zanzhu, Taiyang (Extra).

Formula

GI4 + F3 + RP6.

Modelul clinic 84

Cefaleea

[Insuficiența Xue]

Simptome

cefalee severă, surdă, profundă (cu agravare seara și ameliorare în poziția orizontală a corpului); diminuarea atenției și proceselor de memorare, astenie, insomnie; palpitații; față și buze palide. Acest sindrom apare după maladii cronice, hemoragii, traume psihice repetate. *Limba* – palidă și subțire. *Pulsul* – subțire.

Tratamentul

fortificarea Xue, armonizarea Qi și Xue, diminuarea cefaleei:

- Shu – E36 Zusanli, C7 Shenmen, F8 Ququan;
 Shu-post. – V15 Xinshu, V18 Ganshu, V20 Pishu;
 Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
 Lo – RP6 Sanyinjiao;
 & – RP10 Xuehai, VG20 Baihui.

Formula

VG20 + VC6 + E36 + V18 + V20 + V23.

Modelul clinic 85

Cefaleea

[Insuficiența Qi]

Simptome

cefalee (difuză sau în regiunea frontală) surdă, permanentă (se agravează în activitate fizică și intelectuală și se ameliorează după repaus și odihnă); astenie; inapetență, scaune moi; dispnee; palpitații. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab sau gol.

Tratamentul

fortificarea Energiei (Qi) și diminuarea cefaleei;

Shu – G14 Hegu, E36 Zusanli;

Shu-post. – V20 Pishu, V23 Shenshu;

& – V7 Tongtian, VG20 Baihui, VG23 Shangxing, VC6 Qihai.

Formula

E36 + VG20 + V20.

Modelul clinic 86

Cefaleea

[Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor]

Simptome

cefalee difuză, adâncă sau în regiunea occipitală; corp și extremități reci; facies tumefiat și palid; senzație de slăbiciune în regiunea lombară și genunchi; dispnee. *Limba* – palidă, tumefiată, cu depozit alb. *Pulsul* – profund și lent.

Tratamentul

fortificarea Yang-Qi a Rinichilor, diminuarea cefaleei;

Shu – R7 Fuliu;

Shu-post. – V23 Shenshu;

Mu-ant. – VC4 Guanyuan;

& – VG20 Baihui, VG4 Mingmen, VC6 Qihai.

Formula

V23 + R7 + VG20.

Modelul clinic 87

Cefaleea

[Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor]

Simptome

cefalee difuză sau occipitală; tinitus; slăbire a capacității de memorare; amețeli; senzație de căldură în a doua jumătate a zilei; facies palid cu pomeți hiperemiați; uscăciune în gură și gât; constipații; insomnie. *Limba* – roșie, cu depozit subțire sau fără depozit. *Pulsul* – fin.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi a Rinichilor, diminuarea cefaleei:

- Shu – R3 Taixi, E36 Zusanli, V60 Kunlun;
- Shu-post. – V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – V7 Tongtian, V10 Tianzhu, R6 Zhaohai.

Formula

R3 + RP6 + VC1.

Modelul clinic 88

Migrena

[Vânt-Frig]

Simptome

accese de cefalee, care apar la schimbările timpului (localizate în regiunea temporală, occipitală sau frontală); aversiune față de vânt și frig (ameliorarea cefaleei la acoperirea capului). *Limba* – cu depozit albicios, subțire. *Pulsul* – superficial, încordat.

Tratamentul

eliminarea Vântului și a Frigului, normalizarea tonusului vascular:

- Shu – VB41 Zulinqi, GI4 Hegu;
- Lo – P7 Lieque, VB39 Xuanzhong, TR5 Waiguan;
- & – VB8 Shuaigu, TR23 Sizhukong, VB20 Fengchi, V10 Tianzhu.

Formula

GI4 + P7 + Taiyang + VB20.

Modelul clinic 89

Migrena

[Stagnarea Qi și Xue]

Simptome

accese de cefalee, apărute după emoții negative de lungă durată (în anamneză sunt posibile traume fizice ale capului); dureri fixe; la femei cefaleea se începe înainte de începerea menstruelor. *Limba* – purpurie, cianotică, cu peteșii. *Pulsul* – scurt, rugos sau înnodat.

Tratamentul

dinamizarea și armonizarea Qi și Xue, normalizarea tonusului vascular:

- Shu – GI4 Hegu, VB41 Zulinqi;
- Lo – P7 Lieque;
- & – Taiyang (Extra), E8 Touwei, TR23 Sizhukong, VB8 Shuaigu, VB20 Fengchi, RP10 Xuehai.

Formula antică

Taiyang + F3 + GI4 (Taiyang și F3 Taichong se punctează pe par-

tea "bolnavă", GI4 Hegu – pe partea "sănătoasă").

Modelul clinic 90

Migrena

[Migrena de genul F / Insuficiența Yin-Qi cu hiperactivitatea Yang-Qi]

Simptome

accese de vertij, cefalee, tulburări de vedere (în cazuri grave – fotofobie, greață, vomă), lăcrimare; tinitus; față îmbujorată și ochi injectați; bolnavul se culcă, închide ochii, evită cele mai mici mișcări ale capului; uscăciune în gât, gust amar, scădere a apetitului. Consumarea apei poate provoca vome, senzații neplăcute sau dureri în hipocondru. *Limba* – roșie. *Pulsul* – întins, lute.

Tratamentul

normalizarea și armonizarea Ficatului și a Veziculei Biliare, diminuarea ascendenței Yang, normalizarea tonusului vascular;

Shu – GI4 Hegu, VB41 Zulinqi, F3 Taichong, P9 Taiyuan,
& – E8 Touwei, TR17 Yifeng, VB15 Linqi, VB20
Fengchi, VB5 Xuanlu (punctare spre VB6 Xuanli).

Formule antice

- VB41 + TR5 + VG20 + VB1 + VB20 (dispersie) + RP6 (tonifiere);
- F3 + VB14 + VB20 (dispersie);
- TR2 + VB43 (dispersie);
- F3 + VB38 + Ashi (la început se stimulează puternic punctul F3 Taichong timp de 3–5 minute, apoi se punctează VB38 + Ashi cu lăsarea acelor timp de 30–60 minute și stimularea lor la fiecare 10 minute).

Modelul clinic 91

Migrena

[Migrena de genul RP / Dezarmonia Ficat-Splină / Dezarmonia Ficat-Stomac]

Simptome

migrenă cu senzație de cap greu (accesele pot apărea după emoții negative sau alimentație neadecvată), dureri nelocalizate, vertij însoțit de tulburări digestive (gastralgii, grețuri, senzații de căldură în epigastru), cefalee după ingerarea alimentelor; amnezie. *Limba* – cu depozit galben. *Pulsul* – rapid, alunecos sau întins.

Tratamentul

armonizarea Ficatului, Splinei și a Stomacului, normalizarea tonusului vascular;

Shu – E41 Jiexi, RP2 Dadu, E36 Zusanli, F3 Taichong, P9
Taiyuan;
& – VB6 Xuanli, E8 Touwei, VB20 Fengchi.

Formula

E40 + E36 + RP10 + Taiyang + VB20.

Modelul clinic 92

Migrena

[Umiditate-Flegmă]

Simptome

migrenă cu senzație de cap greu; corp și membre grele; persoanele preferă dulciuri și sunt predispuse la obezitate. *Limba* – cu depozit alb și lipicios. *Pulsul* – alunecos.

Tratamentul

diminuarea Umidității și Flegmei, normalizarea tonusului vascular;

Shu – E36 Zusanli;

Lo – MC6 Neiguan, RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong;

& – VB20 Fengchi, E8 Touwei.

Formula

E40 + F3 + VG20 + Taiyang + VB20.

Modelul clinic 93

Migrena

[Migrena de genul R / Dezarmonia Inimă-Rinichi]

Simptome

migrenă cu senzație de cap foarte greu; senzație de greutate și dureri în regiunea lombară; dureri în regiunea inimii; edeme. *Limba* – roșie la rădăcină sau la vârf. *Pulsul* – profund, rapid și fin.

Tratamentul

armonizarea Rinichilor, Inimii și a Vezicii Urinare, normalizarea tonusului vascular;

Shu – C7 Shenmen, P9 Taiyuan, R7 Fuliu, GI4 Hegu, F3 Taichong, R3 Taixi;

Lo – MC6 Neiguan;

& – E8 Touwei, V62 Shenmai, VB20 Fengchi.

Formula în accese de migrenă

R1 + F3 + Yintang + Taiyang + VB20.

Modelul clinic 94

Migrena

[Insuficiența Qi și Xue]

Simptome

migrenă la bolnavii astenizați, epuizați; piele și buze palide (accesele se instalează după maladii cronice sau hemoragii masive). *Limba* – palidă și subțire. *Pulsul* – filiform, mic și slab.

Tratamentul

fortificarea Qi și Xue, normalizarea tonusului vascular:

- Shu – E36 Zusanli, GI4 Hegu;
Shu-post. – V17 Geshu, V20 Pishu;
& – VB20 Fengchi, VG20 Baihui.

Formula

E36 + RP10 + VG20 + Taiyang + VB20.

VI.4. Hiperhidroza

Modelul clinic 95

Hiperhidroza spontană

[Dezarmonia Energiei Nutritive și Defensive]

Simptome

hiperhidroză spontană (în special la vânt și în stare de depresie mentală); senzație de greutate în corp și regiunea cefalică; fatigabilitate; alternarea senzației de căldură și rece; insomnie. *Limba* – cu depozit subțire și alb. *Pulsul* – superficial și încetinit.

Tratamentul

armonizarea Energiei Nutritive și Defensive:

- Shu – GI4 Hegu;
Lo – P7 Lieque;
& – VB20 Fengchi, V12 Fengmen.

Formula

GI4 + R7; VC4 + R7.

Modelul clinic 96

Hiperhidroza spontană

[Insuficiența Qi a Plămânilor]

Simptome

hiperhidroză spontană (cu aversiune față de frig și vânt); intensificarea dispneei și transpirației la efort fizic minimal; respirație scurtă; voce slabă; piele palidă. *Limba* – palidă, atonă, zonele anterioare puțin tumefiate; cu depozit alb și subțire. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

tonifierea Qi a Plămânilor:

- Shu – E36 Zusanli, P9 Taiyuan;
Shu-post. – V13 Feishu;
Mu-ant. – P1 Zhongfu.

Formule

- P9 + VC17 + V13 + V20 (formulă cu efect de fortificare Qi a Plămânilor);
- V43 + VG14 + R7 (tonifiere; formula antică);

- VG1 + VG4 + VG14 + VC4 + VC6 + E36 + R2.

Modelul clinic 97

Hiperhidroza nocturnă
[Insuficiența Xue a Inimii]

Simptome

hiperhidroză nocturnă care dispare imediat după trezire; respirație scurtă; palpitații, dureri retrosternale; vertij, tinitus; insomnie cu visuri; oboseală pronunțată, epuizare, facies palid (pământiu), buze palide. *Limba* – palidă, cu depozit alb și subțire. *Pulsul* – filiform.

Tratamentul

alimentarea Xue:

Shu – C7 Shenmen, GI4 Hegu;

Shu-post. – V17 Geshu;

Lo – MC6 Neiguan.

Formula

C7 + V17.

Modelul clinic 98

Hiperhidroza nocturnă
[Insuficiența Yin Qi / Insuficiență-Foc]

Simptome

hiperhidroză nocturnă; senzație de căldură în "cinci inimi"; menstrale neregulate; emisii seminale nocturne; epuizare. *Limba* – roșie, cu depozit neînsemnat. *Pulsul* – superficial și rapid.

Tratamentul

alimentarea Yin Qi, diminuarea Focului:

Shu – MC7 Daling, R3 Taixi, C7 Shenmen, F3 Taichong;

Xi – C6 Yinxi.

Formule

- C7 + V15 + P9 + R3 + RP6 + MC6 + E36 (formulă cu efect de alimentare Yin-Qi);
- R3 + V13 + R10 + R6 + RP6;
- P10 + R3;
- V13 + R7 + V45.

VI.5. Nevralgia de trigemen

Modelul clinic 99

Nevralgia de trigemen
[Vânt-Frig]

Simptome

paroxisme dureroase de mare intensitate cu durată de câteva se-

cunde în regiunea feței, durerile apar sub influența frigului și diminuează sub influența căldurii; rinoree. *Limba* – cu depozit alb, subțire. *Pulsul* – superficial, încordat.

Tratamentul

eliminarea Vântului și a Frigului, restabilirea circulației Qi și Xue în regiunea cefalică:

Shu – GI4 Hegu, E36 Zusanli;
Lo – TR5 Waiguan;
& – V12 Fengmen.

- puncte locale pentru ramura superioară (oftalmică) – acupunctura: E8 Touwei, VB1 Tongzilliao, VB2 Tinghui, TR23 Sizhukong, V2 Zanzhu, E7 Xiaguan; moxibustie: Taiyang (Extra), VB3 Shang-guan, VB14 Yangbai;
- puncte locale pentru ramura mijlocie (maxilară) – acupunctura: GI20 Yingxiang, E2 Sibai, E3 Juliao, E6 Jiache, IG18 Quanliao, E7 Xiaguan; moxibustie: VB1 Tongzilliao, E2 Sibai, E7 Xiaguan, IG18 Quanliao;
- puncte locale pentru ramura inferioară (mandibulară) – acupunctura: E4 Dicang, E5 Daying, E6 Jiache, E7 Xiaguan, TR17 Yifeng, VC24 Chengjiang; moxibustie: E6 Jiache, E5 Daying, VB6 Xuanli;
- puncte adiacente – VB20 Fengchi, TR18 Qimal, VG16 Fengfu.

Formule

- TR5 + Taiyang + V2 + VB14 + TR23 + E8 (nevralgia oftalmică);
- GI4 + GI20 + E3 + E2 + IG18 (nevralgia maxilară);
- GI4 + E6 + VC24 + E7 (nevralgia mandibulară);
- GI4 + TR5 + V12 + puncte locale.

Modelul clinic 100

Nevralgia de trigemen

[Vânt-Căldură / Căldură în meridianul Yangming]

Simptome

paroxisme dureroase de mare intensitate și cu durată de câteva secunde în regiunea feței, durerile apar la intervale variabile de timp (mai des sub acțiunea vântului și căldurii); sete, miros neplăcut în cavitatea bucală, constipație; urină de culoare galbenă-închis. *Limba* – roșie, cu depozit galben, subțire. *Pulsul* – încordat și rapid.

Tratamentul

eliminarea Vântului și a Căldurii, restabilirea circulației Qi și Xue în regiunea cefalică:

Shu – GI4 Hegu, GI11 Quchi, F2 Xingjian, E44 Neiting, E45 Lidui;
Lo – TR5 Waiguan;

Punctele locale sunt indicate în modelul 99.

Formula

GI4 + E44 + GI11 + puncte locale.

Modelul clinic 101

Nevralgia de trigemen

[Insuficiența Yin-Qi cu hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului / Stagnarea Qi a Ficatului cu transformare în Foc]

Simptome

paroxisme dureroase de mare intensitate și de scurtă durată în regiunea feței; durerile apar sub influența emoțiilor negative, furiei; iritabilitate, agitație; ten roșu al feței; gust amar; tinitus, amețeli; ochi hiperemiați; dureri sau senzație de arsură în hipocondru, inapetență, scaune uscate; insomnie, coșmaruri. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – întins și iute.

Tratamentul

Înlăturarea stagnării Qi, diminuarea Focului, armonizarea funcțiilor Ficatului:

Shu – F2 Xingjian, F3 Taichong, VB38 Yangfu, R7 Fuliu, R10 Yingu;

Shu-post. – V18 Ganshu.

Punctele locale sunt indicate în modelul 99.

Formula

GI4 + F2 + puncte locale.

Modelul clinic 102

Nevralgia de trigemen

[Stagnarea Qi și Xue]

Simptome

algii intermitente (aggravate de emoții negative și în cursul nopții); posibile diferite traume fizice în trecut. *Limba* – cu depozit alb sau cianotică. *Pulsul* – încordat, dur sau rugos.

Tratamentul

Înlăturarea stagnării Qi și Xue, diminuarea durerii:

Shu – GI4 Hegu;

Shu-post. – V18 Ganshu, V20 Pishu, V23 Shenshu;

Mu-ant. – VC4 Guanyuan;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – RP10 Xuehai, VC6 Qihai.

Punctele locale sunt indicate în modelul clinic 99.

Formula

F3 + GI4 + RP6 + puncte locale.

VI.6. Nevralgia intercostală*

Modelul clinic 103

Nevralgia intercostală

[Umiditate / Flegmă]

Simptome

algii intercostale; senzație de plenitudine în piept și hipocondru; dispnee, tuse cu eliminări de spută, senzație de greutate în cutia toracică. *Limba* – cu depozit alb și gras. *Pulsul* – alunecos.

Tratamentul

eliminarea Umidității / Flegmei și diminuarea durerii:

- Shu – P9 Taiyuan, VB34 Yanglingquan;
- Mu-ant. – VB24 Riyue, F14 Qimen, VC17 Shanzhong;
- Lo – E40 Fenglong;
- & – Jiaji (Extra, corespunzător nevralgiei se aleg puncte metamerice).

Formule

- MC6 + VB34 (punctare spre punctul RP9 Yinlingquan cu reținerea acelor timp de 30 minute și stimularea la fiecare 5 minute concomitent cu respirația adâncă a pacientului) + Jiaji + puncte metamerice locale (exemplu: pentru nevralgia intercostală III – V13 Feishu, E16 Yingchuang, R24 Lingxu etc.);
- VB34 + TR6 + puncte metamerice locale.

Modelul clinic 104

Nevralgia intercostală

[Stagnarea Qi a Ficatului]

Simptome

algii migratoare, intermitente în regiunea intercostală (induse sau agravate de emoții negative); senzație de plenitudine în cutia toracică și epigastriu, eructații, inapetență. *Limba* – cu depozit alb. *Pulsul* – întins, încordat.

Tratamentul

înlăturarea stagnării Qi, diminuarea durerii:

- Shu – TR6 Zhigou, VB34 Yanglingquan (VB34 + TR6), VB40 Qiuxu, F3 Taichong;
- Shu-post. – V18 Ganshu;
- Mu-ant. – VB25 Jingmen, F14 Qimen;
- Lo – MC6 Neiguan.

Formule

- F2 + F3 + F14 + V18 + VB40 + TR6 (formulă cu efect de dinamizare Qi și armonizare a Ficatului);

* Nevralgia intercostală în zona Zoster este descrisă în capitolul "Acupunctura în tratamentul bolilor infecțioase".

- TR6 + F5 + VB34 + MC6 + Jiaji + puncte metamerice locale;
- VC17 + F1.

Modelul clinic 105

Nevralgia intercostală

[Stagnarea Xue]

Simptome

algii intercostale cronice, intermitente, cu localizare fixă, cu senzație de distensie locală și agravare noaptea (traume fizice ale cutiei toracice în anamneză). *Limba* – cianotică, cu echimoze sau pete purpurii. *Pulsul* – profund, încordat și rugos.

Tratamentul

Înlăturarea stagnării Xue și diminuarea durerii:

Shu – VB34 Yanglingquan, F3 Taichong;

Shu-post. – V17 Geshu, V18 Ganshu;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – RP21 Dabao, Jiaji (Extra, corespunzător nevralgiei se aleg puncte metamerice).

Formula

VB34 + TR6 + Jiaji + puncte metamerice locale.

Modelul clinic 106

Nevralgia intercostală

[Insuficiența Yin-Qi]

Simptome

algii migratoare intercostale, ce se agravează la schimbarea poziției corpului sau la efort fizic; tinnitus; senzație de căldură în "cinci inimi", gât uscat, tuse seacă, neproductivă, hemoptizie (Insuficiența Yin-Qi a Plămânilor); vertij, cefalee; uscăciune a ochilor (Insuficiența Yin-Qi a Ficatului). *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – filiform și rapid (în crize de durere pulsul este încordat).

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi, diminuarea durerii:

Shu – VB34 Yanglingquan, R3 Taixi;

Shu-post. – V15 Xinshu;

Xi – C6 Yinxi;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – Jiaji (Extra).

Formula

VB34 + TR6 + Jiaji + puncte metamerice locale.

VI.7. Sindromul de neuron motor periferic

Modelul clinic 107

Hipotonie și atrofia musculară

[Colapsul Inimii și al Splinei]

Simptome

hipotonie musculară care se instalează brusc (după șoc); palpi-
tații, față și piele palidă; insomnie; inapetență, scaune moi. *Limba*
– palidă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

tonifierea Inimii și a Splinei, ameliorarea circulației Qi și Xue:

Shu – GI11 Quchi, E36 Zusanli, E41 Jiexi, C7 Shenmen;

Shu-post. – V15 Xinshu, V20 Pishu;

Mu-ant. – VC4 Guanyuan;

Lo – C5 Tongli, RP6 Sanyinjiao, TR5 Waiguan;

& – VB30 Huantiao, VG14 Dazhui.

Formule

- GI15 + GI11 + GI5 + GI4 + TR5 + VG14 + Jiaji + C5 (afectarea
membrelor superioare);
- E31 + E34 + E36 + E41 + VB30 + VB34 + VB39 + VG3 + Jiaji +
RP6 (afectarea membrelor inferioare);
- C5 + RP6 + VC4.

Modelul clinic 108

Hipotonie și atrofia musculară

[Căldură în Plămâni cu epuizarea Lichidelor]

Simptome

slăbiciune în membre care se instalează după o maladie febrilă
(virală); piele uscată; astenie; sete, gât uscat, tuse; scaune
uscate; urini hiperchrome. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* –
filiform și rapid.

Tratamentul

eliminarea Căldurii, normalizarea metabolismului hidrosalin și a
circulației Qi și Xue:

Shu – P5 Chize, P9 Taiyuan, GI11 Quchi, E36 Zusanli,
E44 Neiting;

Shu-post. – V13 Feishu;

Mu-ant. – P1 Zhongfu;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – VB31 Fengshi, VG14 Dazhui.

Formule

- GI15 + GI11 + GI5 + GI4 + TR5 + VG14 + Jiaji + P5 + V13 (afec-
tarea membrelor superioare);

- E31 + E34 + E36 + E41 + VB30 + VB34 + VB39 + VG3 + Jiaji + P5 + V13 (afectarea membrelor inferioare);
- P5 + GI11.

Modelul clinic 109

Hipotonia și atrofia musculară

[Umiditate-Frig]

Simptome

slăbiciune în membre, senzație de greutate în tot corpul, astenie, membre reci (starea bolnavului se agravează la rece și umezeală). *Limba* – palidă, umedă, cu depozit alb. *Pulsul* – profund și alunecos.

Tratamentul

încălzirea Splinei, eliminarea Umidității, ameliorarea circulației Qi și Xue:

- Shu – P9 Taiyuan, E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan;
- Shu-post. – V20 Pishu;
- Mu-ant. – F13 Zhangmen, VC12 Zhongwan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong;
- & – VB30 Huantiao, VG3 Yaoyangguan, VG4 Mingmen, VC6 Qihai.

Formule

- GI15 + GI11 + GI5 + GI4 + TR5 + VG14 + Jiaji + P9 (afectarea membrelor superioare);
- E31 + E34 + E36 + E41 + VB30 + VB34 + VB39 + VG3 + Jiaji + VC6 + RP9 (afectarea membrelor inferioare);
- RP9 + VB34.

Modelul clinic 110

Hipotonia și atrofia musculară

[Umiditate-Căldură]

Simptome

slăbiciune în membre, senzație de căldură în picioare, edem al membrelor inferioare; senzație de greutate în tot corpul; senzație de opresiune în cutia toracică și epigastriu; piele palidă, icter; apatie; urini de culoare galbenă, tulbure. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – rapid, alunecos.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, eliminarea Umidității, normalizarea circulației Qi și Xue:

- Shu – GI11 Quchi, E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan;
- Shu-post. – V22 Sanjiaoshu;
- Xi – VB35 Yangjiao;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – GI14 Binao, IG9 Jianzhen, VB30 Huantiao, VG14

Dazhui.

Formule

- GI15 + GI11 + GI5 + GI4 + TR5 + VG14 + Jiaji + V20 + RP9 (afectarea membrelor superioare);
- E31 + E34 + E36 + E41 + VB30 + VB34 + VB39 + VG3 + Jiaji + RP9 + V20 (afectarea membrelor inferioare);
- RP4 + RP6 + RP5 + E36 + V20 (formulă cu efect de diminuare a Căldurii și eliminare a Umidității);
- GI11 + RP9.

Modelul clinic 111

Hipotonia și atrofia musculară

[Stagnarea Qi și Xue în meridiane]

Simptome

slăbiciune și durere în membre, amorteală, atrofie musculară, parestezii, piele cianotică, hipotermie cutanată. *Limba* – cianotică sau purpurie. *Pulsul* – profund și subțire.

Tratamentul

normalizarea circulației Qi și Xue în meridiane:

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V17 Geshu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong;
- & – E33 Yinshi, RP10 Xuehai, V11 Dazhu, V32 Ciliao, VB32 Zhongdu, VG8 Jinsuo.

Formule

- GI15 + GI11 + GI5 + GI4 + TR5 + VG14 + Jiaji + F3 + RP10 + V17 (afectarea membrelor superioare);
- E31 + E34 + E36 + E41 + VB30 + VB34 + VB39 + VG3 + Jiaji + F3 + RP10 + V17 (afectarea membrelor inferioare);
- GI4 + F3 + RP6 + RP10 + V17.

Modelul clinic 112

Hipotonia și atrofia musculară

[Insuficiența Qi a Stomacului și a Splinei]

Simptome

slăbiciune în membre, astenie, hipotonie musculară; inapetență, scaune moi; culoare pământie a feței; semne de ptoză viscerală. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

tonifierea Stomacului și a Splinei, normalizarea circulației Qi și Xue:

- Shu – E36 Zusanli, RP3 Taibai;
- Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
- Xi – E34 Liangqiu;

- & – P3 Tianfu, GI13 Wuli, E31 Biguan, IG10 Naoshu, VB30 Huantiao, VG3 Yaoyangguan.

Formule

- GI15 + GI11 + GI5 + GI4 + TR5 + VG14 + Jiaji + V20 + GI10 + E36 (afectarea membrelor superioare);
- E31 + E34 + E36 + E41 + VB30 + VB34 + VB39 + VG3 + Jiaji + V20 + RP3 (afectarea membrelor inferioare);
- RP3 + RP2 + E36 + V20 + F13 (formulă cu efect de fortificare Qi și armonizare a Splinei);
- RP3 + E36; E36 + GI10.

Modelul clinic 113

Hipotonia și atrofia musculară

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului și a Rinichilor]

Simptome

atrofie musculară, hipotonie musculară (la palpare și la mișcări pasive); senzație de căldură în "cinci inimi"; tinitus; gât uscat; uscăciune a sclerelor, tulburări de vedere; dureri lombare. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – filiform, întins și rapid.

Tratamentul

alimentarea Yin-Qi a Ficatului și Rinichilor, normalizarea circulației Qi și Xue:

- | | |
|-----------|--|
| Shu | – R3 Taixi, VB34 Yanglingquan, F8 Ququan; |
| Shu-post. | – V23 Shenshu; |
| Mu-ant. | – VC4 Guanyuan; |
| Lo | – VB39 Xuanzhong; |
| & | – E33 Yinshi, V32 Ciliao, VG3 Yaoyangguan. |

Formule

- GI15 + GI11 + GI5 + GI4 + TR5 + VG14 + Jiaji + F3 + F8 + VB34 + VB39 (afectarea membrelor superioare);
- E31 + E34 + E36 + E41 + VB30 + VB34 + VB39 + VG3 + Jiaji + R3 + F8 (afectarea membrelor inferioare);
- F8 + R3 + VB34.

VI.8. Paralizia facială periferică

Modelul clinic 114

Paralizia facială periferică

[Vânt-Frig]

Simptome

paralizie mușchilor mimici, față asimetrică, pliul nazo-labial șters, dificultate la fluierat, masticatie dificilă; închidere incompletă a ochilor, dificultate la mișcarea sprâncenelor. În funcție de tabloul clinic și severitatea afectării se evidențiază trei variante clinice:

Vânt-Frig cu afectarea meridianului Yangming (lăcrimare); Vânt-Frig cu afectarea meridianelor Yangming și Shaoyang (lăcrimare, durere retroauriculară, în regiunea procesului mastoidian și inferior de pavilionul auricular); Vânt-Frig cu afectarea atât a meridianului Yangming, cât și a organelor Splină, Stomac (anorexie, schimbarea senzației de gust în cavitatea bucală etc.). *Limba* – palidă, cu depozit alb și subțire. *Pulsul* – superficial, încordat.

Tratamentul

eliminarea Vântului și a Frigului, facilitarea circulației Qi și Xue, armonizarea funcției mușchilor mimici:

Shu – GI4 Hegu;

Locale – GI20 Yingxiang, E1 Chengqi, E2 Sibai, E4 Dicang, E6 Jiache, IG18 Quanliao, V1 Jingming, V2 Zanzhu, TR23 Sizhukong, VB14 Yangbai, VG26 Renzhong, VC24 Chengjiang;

Adiacente – TR17 Yifeng, VB20 Fengchi.

Formule

- VC23 + VG26 + E4 + E36 + GI20 + GI4 + puncte locale;
- GI4 + TR5 + P7 + puncte locale (afectarea meridianelor Yangming și Shaoyang);
- GI4 + VC12 + E36 + puncte locale (afectarea organelor Splină și Stomac).

Modelul clinic 115

Paralizia facială periferică

[Vânt-Căldură]

Simptome

paralizia mușchilor mimici, față asimetrică; lăcrimare; cefalee; febră; durere sau senzație de arsură în ureche; uscăciune în gură, gust amar; constipație; urini hipercrome. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – superficial, rapid.

Tratamentul

eliminarea Vântului și Căldurii, facilitarea circulației Qi și Xue, armonizarea funcției mușchilor mimici:

Shu – GI4 Hegu, E41 Jiexi;

Lo – P7 Lieque.

Punctele locale și adiacente sunt indicate în modelul 114.

Formula

GI4 + E41 + VB20 + TR17 + puncte locale.

Modelul clinic 116

Paralizia facială periferică

(Umiditate-Căldură în Ficat și Vezicula Biliară)

Simptome

paralizia mușchilor mimici, față asimetrică; dureri retroauriculare; hiperacuzie, otalgie; herpes Zoster; gust amar, anorexie, dureri în hipocondru și epigastru. Această variantă a maladiei este mai gravă și tratamentul este mai dificil în comparație cu modelele Vânt-Frig și Vânt-Căldură. *Limba* – cu depozit galben. *Pulsul* – întins, rapid sau alunecos.

Tratamentul

eliminarea Umidității, diminuarea Căldurii, facilitarea circulației Qi și Xue, ameliorarea funcției mușchilor mimici:

Shu – GI4 Hegu, F2 Xingjian, VB34 Yanglingquan, E41 Jiexi.

Punctele locale și adiacente sunt indicate în modelul 114.

Formula

GI4 + VB34 + VB20 + TR17 + puncte locale.

Modelul clinic 117

Paralizia facială periferică

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului și Rinichilor]

Simptome

paralizia mușchilor mimici, față asimetrică; senzație de slăbiciune sau durere în regiunea lombară și genunchi; senzație de căldură în "cinci inimi"; transpirații nocturne; zgomote în urechi; gât uscat. Această variantă a maladiei este foarte gravă, cronică (variante endogenă). Un simptom important este agravarea semnelor de paralizie facială în timpul stresului emoțional, nervozității (fenomen "paradoxal"). *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – filiform, rapid sau întins și fin.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi a Ficatului și Rinichilor, facilitarea circulației Qi și Xue, ameliorarea funcției mușchilor mimici:

Shu – GI4 Hegu, R3 Taixi, F3 Taichong, F8 Ququan;
Shu-post. – V23 Shenshu.

Punctele locale și adiacente sunt indicate în modelul 114.

Formula

GI4 + R3 + F8 + VB20 + TR17 + puncte locale.

VI.9. Spasmul facial

Modelul clinic 118

Spasmul facial

[Vânt- Frig]

Simptome

spasme faciale, agravate la vânt și frig; cefalee occipitală. *Limba* – normală sau palidă, cu depozit subțire și albicios. *Pulsul* superficial și încordat.

Tratamentul

eliminarea Vântului și a Frigului, armonizarea circulației Qi și Xue;

Shu – E36 Zusanli;

Lo – TR5 Waiguan;

& – VB12 Wangu, V12 Fengmen, VG16 Fengfu.

Formule

– V12 + VB20 + VG16 + TR17;

– F3 + GI4 + Taiyang + E4 + E6 + E7 + TR5.

Modelul clinic 119

Spasmul facial

[Flegmă-Foc cu agitarea Vântului]

Simptome

spasm facial; cefalee cu senzație de greutate; gură uscată (posibile afte bucale), constipații. *Limba* – roșie, cu depozit galben-suriu, uscată, tremurândă. *Pulsul* – rapid, alunecos.

Tratamentul

diminuarea Focului, Flegmei și a Vântului;

Shu – RP9 Yinlingquan, GI4 Hegu;

Mu-ant. – VC12 Zhongwan;

Lo – E40 Fenglong, MC6 Neiguan;

& – VG26 Renzhong, VB20 Fengchi.

Formule

– F3 + VB20 + VB34;

– E40 + VB20 + VG16;

– VC12 + VB34 + E40 + F3 + GI4 + E7 + E6 + E4 + Taiyang.

Modelul clinic 120

Spasmul facial

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului cu hiperactivitatea Yang-Qi]

Simptome

spasm facial cu hipertensiune arterială; iritabilitate; roșeață malară; cefalee, vertij; disconfort în hipocondru. *Limba* – roșie, cu depozit neînsemnat, tremurândă. *Pulsul* – filiform, întins, iute.

Tratamentul

alimentarea Yin-Qi, armonizarea Ficatului:

- Shu – F3 Taichong, GI4 Hegu;
Lo – TR5 Waiguan, RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
& – VG16 Fengfu.

Formule

- F8 + VB21 + VB34;
- IG3 + V62 + V18;
- F3 + F8 + R3 + VB38.

Modelul clinic 121

Spasmul facial

[Insuficiența Qi a Splinei cu acumularea Umidității / Insuficiența Qi și Xue]

Simptome

spasm facial; abdomen balonat (în special după masă), inapetență, scaune moi; astenie; piele palidă. *Limba* – palidă, cu depozit alb și umed. *Pulsul* – slab, alunecos sau fin.

Tratamentul

fortificarea Qi și Xue, diminuarea Umidității și armonizarea Splinei:

- Shu – RP9 Yinlingquan, E36 Zusanli, GI4 Hegu;
Shu-post. – V20 Pishu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan, F13 Zhangmen;
Lo – MC6 Neiguan, RP6 Sanyinjiao;
& – VG20 Baihui.

Formule

- VG20 + E36 + RP6;
- E36 + RP6 + VC6 + E7 + E6 + E4 + Taiyang + GI4 + F3.

Modelul clinic 122

Spasmul facial

[Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor și Ficatului]

Simptome

spasm facial; dureri lombare și în hipocondru; senzație de căldură în "cinci inimi", transpirații nocturne; insomnie; gură și gât uscate; tulburări de vedere. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – rapid, filiform sau întins și fin.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi, armonizarea Ficatului și Rinichilor:

- Shu – R3 Taixi, F3 Taichong, GI4 Hegu;
Lo – MC6 Neiguan, P7 Lieque;
& – VG20 Baihui, VB20 Fengchi.

Formule

- R3 + F8;

- R3 + F3 + GI4 + VB20 + E7 + E6 + E4 + Taiyang.

Modelul clinic 123

Spasmul facial

[Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor]

Simptome

spasm facial; corp și membre reci; facies tumefiat și palid; dureri lombare; astenie. *Limba* – palidă, cu depozit alb. *Pulsul* – profund și slab.

Tratamentul

fortificarea Yang-Qi și armonizarea Rinichilor:

Shu – IG3 Houxi;

Shu-post. – V23 Shenshu;

& – VG20 Baihui, VG16 Fengfu, VG15 Yamen, VG14 Dazhui, VG4 Mingmen.

Formula

VG4 + VC4 + R7.

VII

Acupunctura în tratamentul algiilor musculo-osteo-articulare

- VII.1. Algiile cervico-brahiale**
- VII.2. Torticolisul**
- VII.3. Algiile scapulo-humerale**
- VII.4. Algiile în regiunea cotului**
- VII.5. Algiile radio-carpiene și carpo-metacarpene**
- VII.6. Algiile coxo-femorale**
- VII.7. Algiile în regiunea genunchiului**
- VII.8. Algiile tibio-tarsiene și tarso-metatarsiene**
- VII.9. Lombalgia**
- VII.10. Sciatica**

VII.1. Algiile cervico-brahiale

Modelul clinic 124

Algiile cervico-brahiale

[Obstrucția Qi și Xue / Frig / Umiditate / Vânt / Căldură]

Simptome

cervicalgie, cervico-brahialgie, mialgie, contracturi musculare, dureri spontane sau la mobilizarea umărului și mișcarea sau rotirea capului și a gâtului, redoare matinală; tulburări trofice musculare și cutanate; tulburarea sensibilității cutanate; cefalee; sunt posibile tulburări vizuale, crize sincopale, tulburări psihice și vegetative. *Limba și pulsul* – schimbările depind de factorii patogeni (Vânt, Umiditate, Frig, Căldură) și de reacția organismului.

Tratamentul

Înlăturarea obstrucției în circulația Qi și Xue, combaterea durerii și restabilirea funcțiilor motore.

- *Puncte specifice antialgice*
P5 Chize, R4 Dazhong.
- *Puncte de accelerare a vitezei de circulație Qi în meridiane (puncte Xi)*
GI7 Wenliu, E34 Liangqiu, IG6 Yanglao, V63 Jinmen, TR7 Hui-zong, VB36 Waigui.
- *Puncte distale antiobstructive în acord cu meridianele afectate*
P7 Lieque, GI4 Hegu, E40 Fenglong, IG3 Houxi, V60 Kunlun, TR5 Waiguan, VB41 Zhenqiu.
- *Puncte distale în acord cu zona afectată*
E40 Fenglong, MC6 Neiguan, TR5 Waiguan, TR8 Sanyangluo; suprafața posterioară a gâtului: IG3 Houxi, V60 Kunlun, R4 Dazhong; suprafața laterală a gâtului: TR5 Waiguan, VB39 Xuan-zhong.
- *Puncte locale și adiacente*
IG11 Tianzong, IG13 Quyuan, IG15 Jianzhongshu, V10 Tianzhu, V11 Dazhu, VB20 Fengchi, VB21 Jianjing, VG14 Dazhui VG16 Fengfu, Huatuojiagi (Extra).

Punctele Huatuojiagi sunt selectate mai sus și mai jos de vertebra afectată (în sumă a câte 4 puncte), în funcție de localizarea algiiilor: occipitale (C3,4); ceafă, cu iradierea durerii spre partea laterală a brațului și suprafața radială a antebrățului (C4,5); ceafă, cu iradierea durerii spre degetul mare și arătător (C5,6); ceafă, cu iradierea durerii spre arătător și medius (C6,7); suprafața medială

a membrelor superioare, degetele IV și V ale mâinii (C7, Th1).

Pentru punctarea punctelor Ashi se folosește "tehnica Hegu" (la început acul este inserat perpendicular, apoi același ac se extrage până la stratul subdermal și se introduce sub un unghi ascuțit în stânga, după aceasta acul se extrage din nou incomplet și se înțeapă iarăși sub un unghi ascuțit în dreapta).

- *Puncte corespondente "sus-jos", "dreapta-stânga":*

Plămânii	P2 Yunmen	– RP12 Chongmen;
Intestin Gros	GI15 Jianyu	– E31 Biguan;
Inimă	C1 Jiquan	– R11 Henggu;
Intestin Subțire	IG10 Naoshu	– V36 Chengfu;
Pericard	MC2 Tianquan	– F11 Yinlian;
Trei Focare	TR14 Jianliao	– VB30 Huantiao.

De exemplu, în cervicalgie cu localizarea algiei de-a lungul meridianului Intestin Subțire puncția punctului IG10 Naoshu în zona dureroasă se asociază cu puncția punctului V36 Chengfu din partea opusă (sănătoasă). În așa fel se respectă principiul "sus-jos" și "dreapta-stânga", aplicarea căruia este mult mai eficace în comparație cu folosirea simetrică a acestor puncte.

- *Puncte cu acțiune generală:*

- RP3 Taibai, RP6 Sanyinjiao, R3 Taixi, VB34 Yanglingquan, VB37 Guangming, VB39 Xuanzhong, VB40 Qiuxu, F3 Taichong, F5 Ligou, F8 Ququan, VC6 Qihai (puncte cu efect de armonizare a funcției tendoanelor mușchilor și oaselor).
- V10 Tianzhu (punct specific vagotonic – tonifierea punctului tonifică vagusul; punct important în algii psihogene).
- VB20 Fengchi (punct specific simpaticotonic – tonifierea punctului tonifică simpaticusul).
- C7 Shenmen, MC6 Neiguan, VG20 Baihui (puncte specifice pentru armonizarea psihică).
- R6(tonifiere) + V62(dispersie) – formula indicată în algii cu acutizare noaptea; V62(tonifiere) + R6(dispersie) – algii cu acutizare ziua.
- TR5 Waiguan (punct efectiv în reacțiile meteopatice).
- *Puncte indicate în sindromul Vânt (tulburările apar sub influența factorului patogen Vânt; algii fără localizare precisă, migratoare)*
P5 Chize, V12 Fengmen, VB31 Fengshi, VB38 Yangfu, VB39 Xuanzhong, TR6 Zhigou, VG14 Dazhui.

Formule

- F3 + GI4; F3 + VB34;
- VG14 + VB20 + GI11;
- VG16 + VG14;
- TR5 + GI5 + VB40 + V60 + R6 + RP10 + V17.

- *Puncte indicate în sindromul Umiditate (tulburările apar sub influența factorului patogen Umiditate; algii cu localizare precisă, fixă)*

ența factorului patogen Umiditate; durere localizată în asociere cu tumefiere, senzație de greutate, jenă; starea bolnavului se agravează sub influența factorilor meteo cu component de umiditate)
E40 Fenglong, E36 Zusanli, RP6 Sanyinjiao, RP9 Yinlingquan, V20 Pishu.

Formule

- RP9 + RP6;
 - V28 + V23;
 - RP9 + RP6 + V28 + VC3;
 - RP9 + RP6 + TR6 + V20;
 - E36 + E39 + RP7 + V21;
 - E34 + E35 + RP9 + E36 + RP5.
- *Puncte indicate în sindromul Frig (tulburările se instalează după acțiunea factorului patogen Frig; durerile sunt severe, cu limitarea mișcărilor, de obicei unilaterale)*
P7 Lieque, E36 Zusanli, RP5 Shangqiu, IG5 Yanggu, V10 Tianzhu, V23 Shenshu, VB41 Zulinqi, F4 Zhongfeng, VG3 Yaoyangguan, VG14 Dazhui, VC4 Guanyuan, VC6 Qihai (este efectivă moxibustia).

Formule

- TR4 + E42;
 - VC12 + V20 + puncte Jing-prox.;
 - VG14 + E36 + GI4;
 - VG4 + VC8;
 - VC4 + R3 + F3 + RP6;
 - E36 + R3 + VG4;
 - V23 + V40 + VB34 + VG3 + V26.
- *Puncte indicate în sindromul Căldură (acest sindrom apare ca rezultat al acțiunii factorilor patogeni exogeni cu formarea Căldurii Interne; algiiile se asociază cu senzațiile subiective de căldură sau piele caldă; sunt prezente simptomele clasice ale inflamației – dolor, tumor, calor, rubor)*
GI11 Quchi, E43 Xiangu, VG14 Dazhui.

Formule

- GI11 + GI4; GI11 + RP10;
- GI4 + GI11 + VG14 + E36;
- VG14 + GI11 + E34 + RP10 + RP9.

VII.2. Torticolisul

Modelul clinic 125

Torticolisul

[Stagnarea Qi și Xue]

Simptome

spasm al mușchilor cu producerea răsucirii gâtului (apare în urma traumelor, expoziție la frig etc.); dureri fixe cu înclinarea capului spre partea dureroasă; durerile la mișcare iradiază spre regiunea scapulo-humerală și membrele superioare. *Limba* – normală sau puțin cianotic-purpurie (în cazuri cronice). *Pulsul* – rugos.

Tratamentul

dinamizarea și armonizarea Qi și Xue, normalizarea tonusului muscular, diminuarea durerii:

- Shu – IG3 Houxi, TR3 Zhongzhu;
& – VC24 Chengjiang, VG14 Dazhui.

Formule

- Laozhen* (punctare bilaterală) + VB39 (punctare pe partea afectată);
- Ashi + VC24 (durere în regiunea liniei mediane posterioare);
- Ashi + IG3 (durere în regiunea *m.trapezius*);
- Ashi + TR3 (durere în regiunea *m.sternocleidomastoideus*);
- IG1 + IG6 (diminuarea mișcărilor dreapta-stânga);
- IG7 + VB34 + F3 + V58 + Ashi (formulă miorelaxantă);
- IG7 + GI4 + V60 + Ashi (folmulă antialgică);
- IG7 + VB20 + V10 + C7 + Ashi (formulă neurosedativă);
- IG7 + VG14 + VG15 + V11 + VB20 + TR15 + Ashi (formulă antialgică și decontracturantă);
- IG1 + IG3 + IG15 + V66;
- IG3 + TR3; IG3 + V62;
- IG6 + VB20;
- V10 + IG3 + VB39;
- VC24 + VG16 + IG3.

* Laozhen – pe suprafața dorsală a labeli mâinii, între oasele metacarpiene II și III, la 0,5 cm proximal de articulația metacarpofalangiană.

VII.3. Algiile scapulo-humerale

Modelul clinic 126

Algiile scapulo-humerale

[Obstrucția Qi și Xue / Frig / Umiditate / Vânt / Căldură]

Simptome

dureri spontane sau la mobilizarea umărului, mialgie, spasme musculare, redoare matinală, tulburări trofice musculare, tulburări de sensibilitate cutanată, umăr blocat; durere și contracturi la nivelul mușchilor din fosele supraspinoasă, subspinoasă etc.; tulburări vegetative. *Limba și pulsul* – tabloul depinde de sindromul instalat.

Tratamentul

Înlăturarea obstrucției în circulația Qi și Xue, combaterea durerii și restabilirea funcțiilor motore.

- *Puncte specifice antialgice*
P5 Chize, GI15 Jianyu, E37 Shangjuxu, R4 Dazhong.
- *Puncte de accelerare a vitezei de circulație a Energiei în meridianele (puncte Xi)*
P6 Kongzui, GI7 Wenliu, C6 Yinxi, IG6 Yanglao, MC4 Ximen, TR7 Huizong.
- *Puncte distale antiobstructive în acord cu meridianele afectate*
P7 Lieque, GI4 Hegu, C5 Tongli, IG3 Houxi, MC6 Neiguan, TR5 Waiguan.
- *Puncte distale în acord cu zona afectată*
E38 Tiaokou (punct principal), IG3 Houxi, V58 Feiyang (indicat în durere de-a lungul meridianului Intestin Subțire); GI1 Shangyang, GI4 Hegu (pentru Intestin Gros), P7 Lieque (pentru Plămân), TR5 Waiguan (pentru Trei Focare).
- *Puncte locale și adiacente*
GI15 Jianyu, GI14 Binao, IG9 Jianzhen, IG10 Naoshu, IG11 Tianzong, IG13 Quyuan, IG14 Jianwaishu, IG15 Jianzhongshu, TR14 Jianliao, TR13 Naohui, TR15 Tianliao, VB21 Jianjing, Jianneiling* (Extra).
- *Puncte corespondente "sus-jos", "dreapta-stânga"* (sunt indicate în compartimentul "Algiile cervico-brahiale").
- *Puncte cu acțiune generală și puncte indicate în sindromul Vânt, Umiditate, Frig, Căldură* (sunt indicate în compartimentul "Algiile

* Jianneiling – la mijlocul distanței dintre articulația acromio-claviculară și marginea anterioară a pliului axilar.

VII.4. Algiile în regiunea cotului

Modelul clinic 127

Algiile în regiunea cotului

[Obstrucția Qi și Xue / Frig / Umiditate / Vânt / Căldură]

Simptome

dureri spontane sau la mișcare, redoare matinală, edem local, grad diferit de impotență funcțională, tulburări de sensibilitate. *Limba și pulsul* – semnele sunt în funcție de sindromul apărut.

Tratamentul

restabilirea circulației normale a Qi și Xue, combaterea durerii și normalizarea funcției motore.

- *Puncte specifice antialgice*
P5 Chize, GI11 Quchi, GI8 Xialian, MC3 Quze, TR5 Waiguan.
- *Puncte de accelerare a vitezei de circulație Qi în meridiane (puncte Xi)*
P6 Kongzui, GI7 Wenliu, C6 Yinxi, IG6 Yanglao, MC4 Ximen, TR7 Huizong.
- *Puncte distale antiobstructive în acord cu meridianele afectate*
P7 Lieque, GI4 Hegu, C5 Tongli, IG3 Houxi, MC6 Neiguan, TR5 Waiguan.
- *Puncte distale în acord cu aria afectată*
GI1 Shangyang, GI4 Hegu, (pentru Intestin Gros), TR5 Waiguan (pentru Trei Focare), TR8 Sanyangluo (pentru meridianele Yang).
- *Puncte locale și adiacente*
P5 Chize (punct important în imposibilitatea ridicării mâinii spre cap), GI10 Shousanli, GI11 Quchi, GI12 Zhouliao, GI13 Wuli, GI14 Binao, IG8 Xiaohai, TR10 Tianjing, Qu Yang Wei (Extra).
- *Puncte corespondente "sus-jos", "dreapta-stânga":*

Plămân	P5 Chize	– RP9 Yinlingquan;
Intestin Gros	GI11 Quchi	– E36 Zusanli;
Inimă	C3 Shaohai	– R10 Yingu;
Intestin Subțire	IG8 Xiaohai	– V40 Weizhong;
Pericard	MC3 Quze	– F8 Ququan;
Trei Focare	TR10 Tianjing	– VB34 Yanglingquan.

Qu Yang Wei – localizat imediat sub epicondiliul lateral, când mâna este flectată la 90 grade (este efectivă puncția cu acul fierbinte).

- *Puncte cu acțiune generală, puncte indicate în sindroamele Vânt, Umiditate, Frig, Căldură (sunt indicate în compartimentul "Algiile cervico-brahiale").*

VII.5. Algiile radio-carpene și carpo-metacarpene

Modelul clinic 128

Algiile radio-carpene și carpo-metacarpene

[Obstrucția Qi și Xue / Frig / Umiditate / Vânt / Căldură]

Simptome

dureri spontane sau la mișcare, diminuarea mobilității segmentelor afectate, redoare matinală, edem local, tulburări trofice musculare și cutanate, tulburarea sensibilității cutanate, diminuarea puterii musculare în degetele mâinii. *Limba și pulsul* – tablou specific în funcție de sindrom (Vânt, Umiditate, Frig, Căldură).

Tratamentul

restabilirea circulației normale a Qi și Xue, combaterea sindromului algic și ameliorarea funcțiilor motore.

- *Puncte specifice antialgice*
P6 Kongzui, P10 Yuji, IG4 Wangu, MC8 Laogong.
- *Puncte de accelerare a vitezei de circulație Qi în meridiane (puncte Xi)*
P6 Kongzui, GI7 Wenliu, C6 Yinxi, IG6 Yanglao, MC4 Ximen, TR7 Huizong.
- *Puncte distale (relativ) antiobstructive în acord cu meridianele afectate*
P7 Lieque, GI4 Hegu, C5 Tongli, IG3 Houxi, MC6 Neiguan, TR5 Waiguan.
- *Puncte distale (relativ) în acord cu aria afectată*
E41 Jiexi, RP5 Shangqiu, VB40 Qixu.
- *Puncte locale și adiacente*
GI3 Sanjian, IG3 Houxi, TR3 Zhongzhu, TR5 Waiguan, P7 Lieque (puncția spre articulația radio-carpiană), IG5 Yanggu.
- *Puncte corespondente "sus-jos", "dreapta-stânga":*

Plămân	P9 Taiyuan	– RP5 Shangqiu;
Intestin Gros	GI5 Yangxi	– E41 Jiexi;
Inimă	C6 Yinxi	– R5 Shuiquan;
Intestin Subțire	IG5 Yanggu	– V60 Kunlun;
Pericard	MC7 Daling	– F4 Zhongfeng;

Trei Focare TR4 Yangchi – VB40 Qiuxu.

- *Puncte cu acțiune generală și puncte indicate în sindromul Vânt, Umiditate, Frig, Căldură* (sunt indicate în compartimentul "Algiile cervico-brahiale").

VII.6. Algiile coxo-femorale

Modelul clinic 129

Algiile coxo-femorale

[Obstrucția Qi și Xue / Frig / Umiditate / Vânt / Căldură]

Simptome

durere insidioasă cu diferite localizări (regiunea inghinală, trohanteriană etc.), durere spontană sau la inițierea mersului, limitarea mobilității șoldului; hipotrofii și contracturi musculare, tulburări de mers (rotația internă și obstrucția sunt primele mișcări limitate); diminuare a forței musculare (fesleri, quadriceps). *Limba și pulsul* – semnele diagnostice esențiale depind de factorii patogeni exogeni și forțele de apărare ale organismului.

Tratamentul

restabilirea circulației Qi și Xue, diminuarea durerii, ameliorarea funcțiilor locomotore.

- *Puncte specifice antialgice*
E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan, VB30 Huantiao, F12 Jimai.
- *Puncte de accelerare a vitezei de circulație Qi în meridiane (puncte Xi)*
E34 Liangqiu, RP8 Diji, V63 Jinmen, R5 Shuliquan, VB36 Waiqiu, F6 Zhongdu.
- *Puncte distale antiobstructive în acord cu meridianele afectate*
E40 Fenglong, RP5 Shangqiu, V60 Kunlun, R4 Dazhong, VB41 Zulinqi, F5 Ligou.
- *Puncte distale în acord cu aria afectată*
RP3 Taibai, V62 Shenmai, VB40 Qiuxu, VB41 Zulinqi.
- *Puncte locale și adiacente*
RP12 Chongmen, VB29 Juliao, VB31 Fengshi, VB30 Huantiao (punctarea cu ac fierbinte).
- *Puncte corespondente "sus-jos", "dreapta-stânga":*

Stomac	E31 Biguan	–	GI15 Jianyu;
Splină	RP12 Chongmen	–	P2 Yunmen;
Vezică	V36 Chengfu	–	IG10 Naoshu;
Rinichi	R11 Henggu	–	C1 Jiquan;

Veziculă Biliară	VB30 Huantiao	– TR14 Jianliao;
Ficat	F11 Yinlian	– MC2 Tianquan.

- *Puncte cu acțiune generală, puncte indicate în sindroamele Vânt, Umiditate, Frig, Căldură (sunt expuse în compartimentul "Algiile cervico-brahiale").*

VII.7. Algiile în regiunea genunchiului

Modelul clinic 130

Algiile în regiunea genunchiului

[Obstrucția Qi și Xue / Frig / Umiditate / Vânt / Căldură]

Simptome

durere spontană (în special inilaterală) sau la inițierea mersului (localizarea durerii este diferită, cu iradiere spre coapsă și gambă); mers instabil și nesigur (în cazuri grave), semne de inflamație, modificări de volum ale genunchiului; hipotrofia mușchilor (în special a cuadricepsului); meteosensibilitate pronunțată. *Limba și pulsul* – semnele diagnostice sunt în funcție de particularitățile sindromului de obstrucție Qi și Xue.

Tratamentul

Înlăturarea obstrucției Qi și Xue, diminuarea durerii și a tulburărilor locomotore.

- *Puncte specifice antialgice*
E35 Dubi, V40 Weizhong, V58 Feiyang, VB30 Huantiao, VB34 Yanglingquan, F8 Ququan.
- *Puncte de accelerare a vitezei de circulație Qi în meridiane (puncte Xi)*
E34 Liangqiu, RP8 Dijī, V63 Jinmen, R5 Shuiquan, VB36 Waiqiu, F6 Zhongdu.
- *Puncte distale antiobstructive în acord cu meridianele afectate*
E40 Fenglong, RP5 Shangqiu, V60 Kunlun, R4 Dazhong, VB41 Zulinqi, F5 Ligou.
- *Puncte distale în acord cu aria afectată*
E41 Jiexi, RP5 Shangqiu, VB40 Qiuxu.
- *Puncte locale și adiacente*
E34 Liangqiu, E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan, RP10 Xuehai, F7 Xiguan, F8 Ququan, R10 Yingu, VB33 Xiyangguan, VB34 Yanglingquan, V40 Weizhong.
- *Puncte corespondente "sus-jos", "dreapta-stânga":*
Stomac E36 Zusanli – GI11 Quchi;

Splină	RP9 Yinlingquan	– P5 Chize;
Vezică	V40 Weizhong	– IG8 Xiaohai;
Rinichi	R10 Yingu	– C3 Shaohai;
Veziculă Biliară	VB34 Yanglingquan	– TR10 Tianjing;
Ficat	F8 Ququan	– MC3 Quze.

- *Puncte cu acțiune generală, puncte indicate în sindroamele Vânt, Umiditate, Frig, Căldură (sunt indicate în compartimentul "Algiile cervico-brahiale").*

VII.8. Algiile tibio-tarsiene și tarso-metatarsiene

Modelul clinic 131

Algiile tibio-tarsiene și tarso-metatarsiene

[Obstrucția Qi și Xue / Frig / Umiditate / Vânt / Căldură]

Simptome

durere spontană sau la mișcare, semne inflamatorii neinfecțioase interesând tendoanele și bursele periarticulare, tumefiere, crepitații la palpare (tenosinovite), grad diferit de impotență funcțională, redoare articulară. *Limba și pulsul* – caracteristica depinde de factorii exogeni patogeni și forțele de apărare ale organismului.

Tratamentul

normalizarea circulației Qi și Xue, ameliorarea funcțiilor locomotore și diminuarea algiilor.

- *Puncte specifice antialgice*
E43 Xiangshu, V57 Chengshan, F2 Xingjian, F3 Taichong.
- *Puncte de accelerare a vitezei de circulație Qi în meridiane (puncte Xi)*
E34 Liangqiu, RP8 Diji, V63 Jinmen, R5 Shuiquan, VB36 Waiqiu, F6 Zhongdu.
- *Puncte distale antiobstructive în acord cu meridianele afectate*
E40 Fenglong, RP5 Shangqiu, V60 Kunlun, R4 Dazhong, VB41 Zulinqi, F5 Ligou.
- *Punct distal în acord cu aria afectată*
GI4 Hegu.
- *Puncte locale și adiacente*
pentru regiunea tibio-tarsiană: E36 Zusanli, E41 Jiexi, RP5 Shangqiu, V60 Kunlun, R7 Fuli, VB40 Qixu, VB34 Yanglingquan; pentru degete: E41 Jiexi, RP3 Taibai, RP4 Gongsun,

Bafeng (Extra).

- *Puncte corespondente "sus-jos", "dreapta-stânga":*

Stomac	E41 Jiexi	–	GI5 Yangxi;
Splină	RP5 Shangqiu	–	P9 Taiyuan;
Vezică	V60 Kunlun	–	IG5 Yanggu;
Rinichi	R5 Shuiquan	–	C6 Yinxi;
Veziculă Biliară	VB40 Qiuxu	–	TR4 Yangchi;
Ficat	F4 Zhongfeng	–	MC7 Daling.
- *Puncte cu acțiune generală, puncte indicate în sindroamele Vânt, Umiditate, Frig, Căldură (sunt indicate în compartimentul "Algiile cervico-brahiale").*

VII.9. Lombalgia

Modelul clinic 132

Lombalgia acută

[Umiditatea-Frig / Stagnarea Qi și Xue]

Simptome

dureri lombare (acute, puternice) spontane sau la mișcare, dureri mai puternice în orele de dimineață (diminuează după exerciții fizice sau aplicarea căldurii și se agravează după aplicarea frigului și în repaus); senzație de greutate în regiunea lombară, tulburări vasculare (tumeferie); tulburări de statică, contractura paravertebrelor lombari, limitarea mobilității coloanei, parestezii; focare de miogeloză; iritabilitate, anxietate. *Limba* – umedă, cu depozit alb. *Pulsul* – încordat (regiunea lombară se reflectă în poziția Chi din stânga).

Tratamentul

Înlăturarea stagnării Qi și Xue, eliminarea Umidității și Frigului, diminuarea durerii, ameliorarea funcțiilor locomotore.

- *Puncte specifice antialgice*
P10 Yuji, V32 Ciliao, V40 Weizhong, VG1 Changqiang, VG4 Mingmen, VG9 Zhiyang, VG26 Renzhong.
- *Puncte de accelerare a vitezei de circulație Qi în meridiane (puncte Xi)*
V59 Fuyang, V63 Jinmen, VB36 Waiqiu.
- *Puncte distale în acord cu zona afectată:*
 - VG26 Renzhong, V10 Tianzhu (linia mediană a regiunii lombare;

* Bafeng – pe dosul piciorului, la joncțiunea dintre degete, la 0,5 cun posterior de plică (câte 4 la fiecare picior).

limitarea mobilității coloanei vertebrale).

- V40 Weizhong (partea inferioară a regiunii lombare, imediat deasupra fesierilor; durere unilaterală sau bilaterală, simetrică; durere, edem și parestezii în regiunea lombară și membrele inferioare).
- IG3 Houxi (regiunea lombară la nivelul ombilicului; durere unilaterală).
- Yaotongxue (Extra; regiunea lombară, superior de linia ombilicală; dureri unilaterale).
- V62 Shenmai (regiunea lombară; dureri unilaterale cu iradiere în picior).
- V59 Fuyang (regiunea lombară; dureri unilaterale cu tulburări locomotore).
- *Puncte locale*
V25 Dachangshu, V26 Guanyuanshu, V32 Ciliao, V36 Chengfu, V54 Zhibian, VG3 Yaoyangguan, VG4 Mingmen, VG8 Jinsuo.
- *Puncte cu acțiune generală* (sunt enumerate în compartimentul "Agiile cervico-brahiale").

Modelul clinic 133

Lombalgia cronică

[Umiditate-Frig]

Simptome

dureri lombare cu senzație de greutate și rece (aggravare în timpul umed și frig; ameliorare la cald); durerea se intensifică după ce bolnavul stă culcat în poziție orizontală; tulburări de statică. *Limba* – cu depozit alb-suriu. *Pulsul* – încordat, lent.

Tratamentul

diminuarea Frigului și Umidității, încălzirea meridianelor și colateralelor, diminuarea durerii.

- *Puncte specifice antialgice*
P10 Yuji, V32 Ciliao, V40 Weizhong, VG1 Changqiang, VG4 Mingmen, VG9 Zhiyang, VG26 Renzhong; punctele meridianului Vezică și Stomac sunt indicate în lombalgie cu senzație de frig; punctele meridianului Veziculă Biliară sunt indicate în lombalgie cu diminuarea flexiei și extensiei.
- *Puncte de accelerare a vitezei de circulație Qi în meridiane (puncte Xi)*
V59 Fuyang, V63 Jinmen, VB36 Waiguo.
- *Puncte distale în acord cu aria afectată*
 - IG3 Houxi – regiunea lombară. Stimularea punctului fortifică coloana vertebrală, punct specific cu acțiune spasmolitică asupra mușchilor netezi și striati (în asociere cu F2 Xingjian). În calitate de punct cheie al meridianului curios este efectiv în lombalgie: la

bărbați IG3 Houxi (din stânga) + V62 Shenmai (din dreapta). La femei, invers, P7 Lieque (din stânga) + R6 Zhaohai (din dreapta). Extragerea acelor se face în mod invers;

- V62 Shenmai – regiunea lombară cu iradierea durerii în picior. La bărbați lombalgia se tratează prin punctarea V62 Shenmai din stânga și IG3 Houxi din dreapta; la femei se punctează invers;
- V60 Kunlun – regiunea lombară, spatele, suprafața posterioară a gâtului (punct specific în agravare la mișcare);
- C7 Shenmen – regiunea lombară (dureri cu spasme). Asocierea de puncte IG3 Houxi (din stânga) + V62 Shenmai (din dreapta); C7 Shenmen (din dreapta) + RP3 Taibai (din stânga) este efectivă în tratamentul lombalgiei la bărbați. La femei se punctează în mod invers;
- R4 Dazhong – regiunea lombară;
- RP3 Taibai – regiunea lombară, coloana vertebrală (dureri asociate cu contracturi și spasme; indicat în lombalgie cu dureri în oase);
- VG20 Baihui – partea inferioară a regiunii lombare.

- *Puncte locale și adiacente*

V23 Shenshu, V25 Dachangshu, VG3 Yaoyangguan, V26 Guanyuanshu, V54 Zhibian, Tunzhong (Extra), Jiaji (Extra), VB30 Huantiao, Yaoyan (Extra), puncte Ashi.

- *Puncte cu acțiune generală* (sunt indicate în compartimentul "Algiile cervico-brahiale").

Modelul clinic 134

Lombalgia cronică

[Stagnarea Xue]

Simptome

dureri lombare (după diferite traume fizice) cu o localizare precisă (fixă) și agravare la presare; durerile diminuează în cursul zilei și se intensifică noaptea; tulburări de statică, spasme musculare locale. *Limba* – roșie-închis, purpurie, cu echimoze. *Pulsul* – adânc.

Tratamentul

Înlăturarea stărnării Xue, ameliorarea circulației Qi și Xue în meridiene și colaterale:

- | | | |
|-----------|---|--|
| Shu | - | V40 Weizhong, TR6 Zhigou, VB34 Yanglingquan; |
| Shu-post. | - | V23 Shenshu, V17 Geshu; |
| Xi | - | IG6 Yanglao; |
| & | - | VG26 Renzhong, VG3 Yaoyangguan, V32 Ciliao, Jiaji (Extra), Yaotongdian (Extra), puncte Ashi. |

* Tunzhong – localizat la mijlocul distanței dintre linia mediană a trunchiului și marginea laterală a fesierului, lateral de punctul V54 Zhibian.

** Yaotongdian – pe dosul mâinii în unghiul dintre metacarpienele 2-3 și 4-5.

Formula

V23 + VG3 + V26 + V40 + VG26.

Modelul clinic 135

Lombalgia cronică

[Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor]

Simptome

dureri lombare cu senzație de rece (agravare la efort fizic minimal și ameliorare după repaus; durerea diminuează la presare); slăbiciune în regiunea lombară și genunchi; spermatooree; urină clară. *Limba* – palidă, cu depozit alb și subțire. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Yang-Qi a Rinichilor, ameliorarea circulației Qi și Xue în meridiane și colaterale:

Shu – V40 Weizhong;
Shu-post. – V23 Shenshu, V17 Geshu;
Lo – V58 Feiyang;
& – V32 Ciliao, VG4 Mingmen, Yaoyan (Extra), VG3 Yaoyangguan, puncte Ashi.

Formula

V23 + VG3 + V26 + V40 + VG4 + V52.

Modelul clinic 136

Lombalgia cronică

[Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor]

Simptome

dureri lombare; slăbiciune în genunchi (ameliorare după repaus); insomnie, iritabilitate; gură și gât uscate; senzație de căldură în "cinci inimi"; urină galbenă. *Limba* – roșie, cu depozit neînsemnat. *Pulsul* – subțire și încordat sau slab.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi a Rinichilor, ameliorarea circulației Qi și Xue în meridiane și colaterale:

Shu – V40 Weizhong, R3 Taixi;
Shu-post. – V23 Shenshu, V17 Geshu;
& – V32 Ciliao, V52 Zhishi, VG3 Yaoyangguan, puncte Ashi.

Formula

V23 + VG3 + V26 + V40 + R3.

VII.10. Sciatică

Modelul clinic 137

Sciatica

[Umiditate-Frig / Umiditate-Căldură / Stagnarea Qi și Xue]

Simptome

dureri lombare cu iradiere în picior (pe partea posterioară, laterală sau medială); în Umiditate-Frig – senzație de rece în regiunea lombară și membrele inferioare, agravare la rece; în Umiditate-Căldură – senzație de arsură în regiunea lombară și membrele inferioare; în stagnarea Xue – agravare a durerii la presare (la început durerea apare în punctul de presare, apoi iriază spre picioare), în timpul tusei, defecației și a mersului, durerea diminuează în repaus; tulburări de statică, contracturi și dezechilibre musculare, limitarea mobilității coloanei vertebrale, parestezii în membrele inferioare, deficit motor; tulburări vegeto-vasculare și psihice (iritabilitate, anxietate etc.); senzație de greutate în abdomen. *Limba* – roșie, cu depozit galben (Căldură); palidă, cu depozit alb (Frig); roșie-închis, cu echimoze (stagnarea Xue); la rădăcină pot apărea puncte roșii. *Pulsul* – rapid, alunecos (Umiditate-Căldură), adânc, tensionat și lent (Frig).

Tratamentul

diminuarea Umidității și a Căldurii, încălzirea Frigului, ameliorarea funcțiilor locomotore, suprimarea durerii.

- *Puncte specifice antialgice*

V31 Shangliao, V36 Chengfu, V54 Zhibian, V60 Kunlun, VB30 Huantiao.

- *Puncte distale în acord cu aria afectată*

- V40 Weizhong (regiunea lombară, membrele inferioare, sciatică acută și cronică). Stimularea punctului fortifică regiunea lombară și genunchii. Acest punct este contraindicat la bolnavii cu Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor, reieșind din efectul de refrigerare a Căldurii;
- V57 Chengshan (regiunea lombară, membrele inferioare; toate formele de sciatică; punct specific în crampe musculare);
- V58 Feiyang (zonele între traseul meridianului Vezică și Vezicula Biliară în regiunea coapsei; punct important în patologia articulațiilor membrelor inferioare);
- V60 Kunlun (regiunea lombară, spatule, membrele inferioare; punct specific în agravare la mișcare);
- V62 Shenmai (dureri de-a lungul traseului meridianului Vezică; punct important cu efect de relaxare a mușchilor);
- R4 Dazhong (regiunea lombară, membrele inferioare);
- VB41 Zulinqi (zona de-a lungul traseului meridianului Veziculă

Biliară; punct specific în algii migrante, fără localizare precisă; indicat în slăbiciune și parestezii în membrele inferioare).

- *Puncte locale și adiacente*
V36 Chengfu, V37 Yinmen, VB30 Huantiao, VB31 Fengshi, VB34 Yanglingquan, Tunzhong (Extra).
- *Puncte cu acțiune generală* (sunt enumerate în compartimentul "Algiile cervico-brahiale").

VIII

Acupunctura în tratamentul bolilor aparaturii respirator

- VIII.1. Infecțiile respiratorii virale acute
(I.R.V.A.). Răceala**
- VIII.2. Bronșita acută și cronică**
- VIII.3. Astmul bronșic**

VIII.1. Infecțiile respiratorii virale acute (I.R.V.A.). Răceala

Modelul clinic 138

I.R.V.A. Răceala

[Vânt-Frig]

Simptome

dureri neînsemnate în gât, absența tusei, obstrucție nazală cu eliminări transparente, strănut, voce răgușită; frison, absența febrei (sau febră mică), absența transpirației (predominarea Frigului) sau transpirației (predominarea Vântului); cefalee occipitală; dureri cu diferită localizare; aversiune față de vânt și frig. *Limba* – normală sau palidă, cu depozit alb, subțire și umed. *Pulsul* – superficial.

Tratamentul

eliminarea Vântului și a Frigului, eliberarea căilor respiratorii:

Shu – GI4 Hegu;
Shu-post. – V13 Feishu;
Lo – P7 Lieque;
& – GI20 Yingxiang, V12 Fengmen, VB20 Fengchi,
VG16 Fengfu, VG23 Shangxing.

Formule

- VB20 + V10 (dispersie), apoi GI1 + TR1 + TR2 (punctare superficială cu stimulare 1–3 minute și lăsarea acelor în țesuturi timp de 20 minute; formula antică cu efect de sudorație);
- P7 + GI4 + V12 + V13 + VB20 (acupunctura 20–30 minute) + V12 + V13 (moxibustie + ventuze);
- GI4 (dispersie) + R7 (tonifiere; formulă indicată în absența transpirației);
- GI4 (tonifiere) + R7 (dispersie; formulă indicată în transpirație profundă);
- VG14 (dispersie în febră cu transpirații spontane și tonifiere în aversiune față de frig fără transpirații);
- VG13 + V10 + GI4;
- VG14 + GI4 + E36;
- P7 + VB20.

Modelul clinic 139

I.R.V.A. Răceala

[Vânt-Căldură]

Simptome

frison, febră, transpirații; obstrucție nazală cu eliminări galbene,

tuse, gât uscat, sete; dureri cu diferită localizare, cefalee. *Limba* – roșie (în special la margini și la vârf), cu depozit galben și subțire. *Pulsul* – superficial, rapid.

Tratamentul

eliminarea Vântului, diminuarea Căldurii, eliberarea căilor respiratorii:

- Shu – GI11 Quchi, GI4 Hegu, P10 Yuji;
- Lo – TR5 Waiguan, P7 Lieque;
- & – VG14 Dazhui, VC22 Tiantu.

Formule

- P11 + GI1 + MC9 + TR1 + IG1 ("cinci puncte de dispersie a Căldurii", dispersie 15 minute; formulă antică în febră fără transpirație);
- VG14 (extragerea acelor după 2 minute de stimulare, apoi aplicarea ventuzei) + Taiyang + P11 (sângerare, 2–3 picături de sânge din fiecare punct) + GI11 + TR5 + GI4 (acupunctura 10 minute, cu stimulare la fiecare 5 minute);
- VB20 + VG14 + VG13 + VG12 + GI4 + P11;
- P10 + GI4 + V13;
- TR5 + VG14 + GI11 + V12.

Modelul clinic 140

I.R.V.A. Răceala

[Vânt-Umiditate-Căldură / Căldură-Umiditate în Splină și Stomac]

Simptome

frison, febră, aversiune față de rece; senzație de greutate în corp, regiunea cefalică și extremități; greață, vomă, scaune moi; cefalee; senzație de opresiune în piept sau epigastru, gust amar, salivă lipicioasă; obstrucție nazală cu eliminări galbene. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – alunecos, rapid.

Tratamentul

eliminarea Vântului, diminuarea Umidității și Căldurii, eliberarea căilor respiratorii, restabilirea funcției de difuzie Qi a Plămânilor:

- Shu – E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan, GI11 Quchi, GI4 Hegu;
- Shu-post. – V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, TR5 Waiguan, P7 Lieque;
- & – VG14 Dazhui, VC22 Tiantu, VC10 Xiawan, VC13 Shangwan.

Formule

- P7 + V13 + VC12 + P5 + VC22 + E40 (la bolnavi cu spută abundentă);
- VG14 + TR5 + E36 + V12.

Modelul clinic 141

I.R.V.A. Răceala

[Vânt-Uscăciune-Căldură / Căldură în Plămâni]

Simptome

dispnee, tuse seacă, expectorații cu spută galbenă sau uscăciune a gurii, nasului și a gâtului, afonie; sete; aversiune față de rece, febră, transpirații; urină galbenă. *Limba* – roșie, cu depozit galben, uscată. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

eliminarea Vântului, diminuarea Căldurii, umectarea Plămânilor și normalizarea funcției de difuzie Qi a Plămânilor:

Shu – P5 Chize, P9 Taiyuan, P10 Yuji, R7 Fuliu;

Shu-post. – V13 Feishu;

Mu-ant. – P1 Zhongfu;

Lo – P7 Lieque;

& – V12 Fengmen, VC22 Tiantu, VG14 Dazhui.

Formule

– V11 + P1 + E12 + V12;

– V12 + P9 + R7;

– P7 + V13 + VC12 + P6 + P10 + V17 (la bolnavii cu tuse și hemoptizie).

Modelul clinic 142

I.R.V.A. Răceala

[Flegmă-Căldură în Plămâni]

Simptome

tuse cu dureri în piept, dispnee, spută de culoare galbenă, senzație de opresiune în cutia toracică; febră sau senzație de căldură, sete; fatigabilitate; vomă după ingerarea lichidelor. *Limba* – roșie, cu depozit galben, lipicios. *Pulsul* – alunecos, rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, eliminarea Flegmei, normalizarea funcției de difuzie Qi a Plămânilor.

Shu – P5 Chize;

Mu-ant. – P1 Zhongfu;

Lo – RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong, MC6 Neiguan, P7 Lieque;

& – VG14 Dazhui, VC22 Tiantu.

Formula

V13 + E36 + E40 + P7.

Modelul clinic 143

I.R.V.A. Răceala

[Căldură-Uscăciune în Stomac și Intestine]

Simptome

febră; uscăciune a mucoasei nazale, gât uscat, sete; scaune uscate, constipații, senzație de arsură în anus, durere în abdomen cu agravare la presare; iritabilitate, delir; oligurie. *Limba* – roșie, cu depozit uscat de culoare galbenă sau cenușie. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

refrigerarea Căldurii, umectarea Stomacului și Intestinilor, normalizarea funcției de difuzie Qi a Plămânilor:

Shu – GI11 Quchi, E44 Neiting, E45 Lidui;
Shu-post. – V25 Dachangshu;
Mu-ant. – E25 Tianshu;
Lo – P7 Lieque;
& – RP15 Daheng, R6 Zhaohai.

Formula

GI11 + VC12 + E25 + E36 + E44.

Modelul clinic 144

I.R.V.A. Răceala

[Căldură în Vezicula Biliară]

Simptome

uscăciune în gât, gust amar, greață, senzație de plenitudine în hipocondru, dureri epigastrice; alternarea senzației de căldură și rece (mai mult rece); apatie, iritabilitate; cefalee (tâmpile, regiunea parietală). *Limba* – roșie, cu depozit galben pe marginea dreaptă. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, armonizarea Veziculei Biliare, restabilirea funcției de difuzie Qi a Plămânilor:

Shu – VB41 Zulinqi, VB43 Xiashi, F3 Taichong;
Shu-post. – V19 Danshu;
Lo – TR5 Waiguan, P7 Lieque;
& – VB20 Fengchi, VG14 Dazhui.

Formula

VG14 + VB41.

Modelul clinic 145

I.R.V.A. Răceala

[Insuficiența Qi]

Simptome

febră; obstrucție nazală, tuse cu spută transparentă, respirație scurtă (dispnee la eforturi mici); aversiune față de frig; cefalee; astenie; transpirații spontane; inapetență. *Limba* – palidă, cu

depozit alb. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Qi și restabilirea funcției de difuzie Qi a Plămânilor:

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V13 Feishu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – P7 Lieque;
- & – V12 Fengmen, VB20 Fengchi, VC6 Qihai.

Formule

- E36 + V13 + V20 + V23 + P9 + R3 (formula antică în predispu-
nere la răceală; acupunctura + moxibustie);
- E36 + V13 + VC6.

VIII.2. Bronșita acută și cronică

Modelul clinic 146

Bronșita acută

[Vânt-Frig al Plămânilor]

Simptome

tuse cu spută mucoidă, obstrucție nazală cu eliminări apoase; ab-
sență a senzației de sete; absență a transpirației, febră și frisoane
posibile, aversiune față de frig și vânt; senzație de greutate în
cap, cefalee; urină clară. *Limba* – palidă, umedă și puțin tumefiată
în zonele anterioare. Depozit lingual alb și subțire, mai pronunțat
în zonele anterioare. *Pulsul* – superficial și încordat.

Tratamentul

Înlăturarea Vântului și a Frigului, armonizarea funcției Plămânilor:

- Shu – GI4 Hegu, GI11 Quchi;
- Shu-post. – V13 Feishu;
- Lo – P7 Lieque;
- Xi – P6 Kongzui;
- & – V12 Fengmen, VG16 Fengfu, E11 Qishe.

Formule

- V13 + TR5;
- GI11 + V43;
- V12 + TR5 + V13;
- VG16 + V12 + P7.

Modelul clinic 147

Bronșita acută

[Vânt-Căldură a Plămânilor]

Simptome

tuse seacă sau cu spută galbenă, corp fierbinte, sete, dureri în

gât și retrosternale, eliminări nazale de culoare galbenă; cefalee; urină galbenă. *Limba* – aspectul limbii depinde de stadiul maladiei. În debutul maladiei limba devine roșie în zonele anterioare și marginale (în aceste regiuni ar putea apărea puncte roșii), uscată, cu depozit alb și subțire în zonele anterioare. Mai târziu, în dreapta și stânga de centrul limbii apar puncte roșii. În urma unei acțiuni de lungă durată a factorilor patogeni, limba devine roșie (punctele au o tendință de răspândire spre centrul limbii), uscată. Apare un depozit alb (are o poziție difuză, în special în zonele anterioare) și galben (are o poziție în zona centrală a limbii). *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

refrigerarea Căldurii, eliminarea Vântului și armonizarea funcției Plămânilor;

Shu – GI4 Hegu, GI11 Quchi, P10 Yuji, P11 Shaoshang;
 Shu-post. – 13 Feishu;
 Mu-ant. – P1 Zhongfu;
 Lo – TR5 Waiguan, P7 Lieque;
 & – V12 Fengmen, V45 Yixi, VC22 Tiantu, VG14 Dazhui.

Formule

- VG14 + Dingchuan* + V12 + V13;
- P5 + P6 + GI4 + MC6;
- P7 + P5 + VG14;
- P1 + RP6 + VC22;
- V12 + V13 + TR5 + P10.

Modelul clinic 148

Bronșita acută

[Căldură în Plămâni]

Simptome

tuse, dureri în piept, senzație de disconfort în cutia toracică, dispnee; febră, sete, transpirație. *Limba* – roșie, uscată, cu depozit galben. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

eliminarea Căldurii, restabilirea funcției de difuzie Qi a Plămânilor;

Shu – P5 Chize, GI11 Quchi;
 Mu-ant. – P1 Zhongfu;
 Lo – P7 Lieque;
 Xi – P6 Kongzui;
 & – V12 Fengmen, VG14 Dazhui.

Formule

- P6 + P10 + V13 (dispersie) + R6 (tonifiere; formula antică);
- P5 + VC17 + V13 + E40 + P11 (formulă cu efect de dispersie a

* Dingchuan – 0,5 cun lateral de punctul VG14 Dazhui.

Căldurii și ameliorare a funcției Plămânilor);

P5 + GI11.

Modelul clinic 149

Bronșita cronică

[Insuficiența Qi a Plămânilor]

Simptome

tuse atenuată (de intensitate mică), spută limpede diluată, sindrom bronho-spastic (tuse astmatică de intensitate mică cu expectorarea sputei transparente) de proveniență nonalergică, dispnee la efort fizic mic; voce diminuată; slăbiciune, apatie, fatigabilitate, transpirație spontană; aversiune față de vânt; predispunere la răceală repetată. *Limba* – palidă, atonă, zonele anterioare puțin tumefiate (este afectat plămânul amplasat ipsilateral de zona tumefiată), cu depozit alb, subțire. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

tonifierea Qi a Plămânilor, armonizarea Focarului Superior:

Shu – P9 Taiyuan, E36 Zusanli;

Shu-post. – V13 Feishu;

Mu-ant. – VC17 Shanzhong;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – VC6 Qihai, V43 Gaohuangshu, VC20 Huagai, RP18 Tianxi.

Formule

- P9 + VC17 + V13 + V20 (formulă cu efect de fortificare Qi a Plămânilor);
- V13 (ace intradermale) + E36 + V23 (acupunctura + moxibustie) + V12 + V11 + VG14 (ventuze). Această formulă este indicată cu scop de profilaxie de 1–2 ori pe săptămână timp de 1–2 luni;
- VC17 + VC4 + R3 + E36 + P9;
- V43 + V13 + V23 + E36.

Modelul clinic 150

Bronșita cronică

[Flegmă-Căldură în Plămâni]

Simptome

respirație astmatică, tuse cu expectorație a sputei filante de culoare galbenă, senzație de opresiune în piept, hemoptizie, dureri în gât; senzație de căldură, sete; hiperemia feței; neliniște, iritabilitate, uneori accese de nebunie (bolnavul nu-i cunoaște pe cei din jur, este dezorientat în spațiu) sau somnolență și oboseală; inapetență, constipație; urină galbenă. *Limba* – roșie, cu depozit galben, lipicios. *Pulsul* – alunecos, rapid.

Tratamentul

dispersarea Căldurii, dizolvarea Flegmei și normalizarea funcției

de difuzie Qi a Plămânilor:

- Shu – P5 Chize, GI11 Quchi, P10 Yuji;
Shu-post. – V20 Pishu, V13 Feishu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
Lo – E40 Fenglong, RP6 Sanyinjiao, P7 Lieque;
& – VG14 Dazhui, P2 Yunmen, E13 Qihu, E16 Yingchuang.

Formule

- VG14 + V13 + P10 + P1 + GI4 + E40;
- VC17 + VC22 + P6 + E40 + P5;
- MC6 + V13;
- V13 + E36 + E40 + P7 + GI11.

Modelul clinic 151

Bronșita cronică

[Excesul Focului în Ficat cu invadarea Plămânilor]

Simptome

senzație de căldură în piept, dureri în piept și partea inferioară a cutiei toracice; scaune uscate, dureri și senzație de arsură în hipocondru; gât uscat, tuse paroxistică (uneori hemoptizie); iritabilitate, vertij, oboseală; sclere hiperemiate; febră; gust amar, urină galbenă. *Limba* – roșie (în special la margini), cu depozit galben, subțire. *Pulsul* – rapid, încordat.

Tratamentul

normalizarea și armonizarea Plămânilor și Ficatului:

- Shu – P5 Shize, P10 Yuji, GI11 Quchi, VB34 Yanglingquan, F2 Xingjian;
Mu-ant. – P1 Zhongfu, VC17 Shanzhong;
& – C22 Tiantu, E13 Qihu, E16 Yingchuang, VG14 Dazhui, VB21 Jianjing.

Formule

- V13 + V18 + P5 + P8 (armonizare) + VB34 + F3 (dispersie);
- VC22 (dispersie timp de 2 minute) + P6 + P7 + F3 (dispersie timp de 20 minute) + F4 + R7 (tonifiere);
- F2 + P10 + VG14.

Modelul clinic 152

Bronșita cronică

[Insuficiența Yin-Qi a Plămânilor și a Rinichilor]

Simptome

tuse seacă, inefficientă, gât și gură uscate, afonie, expectorarea posibilă a unei cantități mici de spută filantă și sangvinolentă; transpirații nocturne, pomeți roșii, senzație de căldură în cele "cinci inimi" (palme, tălpi și regiunea sternală), hipertermie în orele serii; dureri lombare și la nivelul genunchilor; pierderi

seminale nocturne. *Limba* – în caz de predominare a Insuficienței Plămânilor este uscată și roșie, depozitul poate lipsi ("limbă cheală"). Uneori apar una sau două fisuri în zonele anterioare ale limbii (amplasate oblic față de linia mediană a limbii). La bolnavii cu predominarea Insuficienței Rinichilor limba este roșie, uneori cu fisuri transversale. *Pulsul* – filiform și rapid.

Tratamentul

alimentarea Yin, diminuarea Insuficienței-Căldurii, umectarea Plămânilor și normalizarea funcției de difuzie Qi a Plămânilor:

Shu – P5 Chize, P10 Yuji, R3 Taixi;

Shu-post. – V13 Feishu, V23 Shenshu;

Lo – P7 Lieque, RP6 Sanyinjiao;

& – R6 Zhaohai, E13 Qihu.

Formule

- P5 + C6 + R6 + RP6 (tonifiere) + P10 (dispersie; formula antică);
- P7 + R6; P5 + R6;
- R6 + P7 + V13 + P1;
- VC22 + R3;
- V13 + V23 + R3;
- RP6 + E36 + VC12.

Modelul clinic 153

Bronșita cronică

[Vânt-Uscăciune a Plămânilor / Uscăciune în Plămâni / Insuficiența Yin-Qi a Stomacului]

Simptome

tuse seacă, spută densă și cleioasă (se expectorează greu, uneori cu striuri de sânge), uscăciune a nasului, afonie; uscăciune și dureri în gât, gură uscată; scaune uscate, dureri cu senzație de arsuri în epigastru, greață. *Limba* – uscată (uneori hiperemiată la vârf), posibil cu fisuri scurte, de diverse dimensiuni și forme. *Pulsul* – filiform, rapid.

Tratamentul

eliminarea Vântului, umectarea Plămânilor, normalizarea funcției de difuzie Qi a Plămânilor, armonizarea Focarelor Superior și Mediu:

Shu – P9 Taiyuan, E36 Zusanli;

Shu-post. – V13 Feishu;

Mu-ant. – P1 Zhongfu, VC12 Zhongwan;

Lo – RP6 Sanyinjiao, P7 Lieque;

& – E13 Qihu, R6 Zhaohai, V12 Fengmen, VC22 Tiantu, VG16 Fengfu, VC13 Shangwan.

Formula

V12 + V13 + P9 + R6.

Modelul clinic 154

Bronșita cronică

[Umiditate-Flegmă în Plămâni / Insuficiența Qi sau Yang-Qi a Splinei / Flegmă-Frig în Plămâni]

Simptome

accese de tuse, expectorații profuze cu spută densă de culoare deschisă, dispnee (agravare după mâncare și dimineața), senzație de opresiune în cutia toracică; senzație de plenitudine în epigastriu, greață, inapetență, scaune moi; oboseală cu senzație de greutate; aversiune față de frig și ameliorare la cald, răcire pronunțată a corpului. *Limba* – palidă, umedă, cu depozit gros de culoare albă. *Pulsul* – alunecos.

Tratamentul

normalizarea funcției Splinei și a Plămânilor, uscarea Umidității și diminuarea Flegmei, încălzirea Frigului, normalizarea funcției de difuzie Qi a Plămânilor:

- Shu – P5 Chize, E36 Zusanli, VB38 Yangfu;
- Shu-post. – V13 Feishu, V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan, VC4 Guanyuan, P1 Zhongfu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong, P7 Lieque;
- & – VC22 Tiantu, VC6 Qihai, E13 Qihu.

Formule

- P1 + E40 (dispersie) + P9 + E36 + V20 (tonifiere) + VC12 (armonizare); după extragerea acelor se aplică moxibustia;
- VC17 + MC6 + P6 + E40 + VC22;
- V13 + V20 + RP3 + P9 + P6 + E40;
- V13 + V43 + E36 + VC6 (în bronșita cronică se va aplica moxibustia toamna târziu cu scop de profilaxie a recidivelor).

VIII.3. Astmul bronșic

Modelul clinic 155

Astmul bronșic

[Astm de tip Insuficiență]

Insuficiența Qi a Plămânilor

respirație superficială, tuse slabă, tahipnee, tuse astmatică, spută limpede diluată; timbru jos al vocii; apatie, lipsă a dorinței de a vorbi; senzație de frig; scădere ponderală; predispunere la răceală, aversiune față de vânt. Maladia are o evoluție cronică. *Limba* – palidă, atonă, cu depozit alb, subțire; zonele anterioare puțin tumefiate. *Pulsul* – slab.

Insuficiența Qi a Plămânilor și a Splinei

tuse astmatică cu expectorații diluate, de culoare albă, spută profuză; edeme ale feței și picioarelor; abdomen balonat, scaune

moi, inapetență; astenie, apatie. *Limba* – palidă, cu depozit alb, amprente dentare pe margini (Vid de Qi a Splinei) și tumefiere în zonele anterioare (Vid de Qi a Plămânilor). *Pulsul* – slab.

Insuficiența Qi a Plămânilor și a Rinichilor

dispnee astmatiformă cu expirație prelungită (agravată la efort), voce slabă; anxietate; transpirații spontane; incontinență urinară după efort de tuse puternică, strănut sau efort fizic; extremități reci; facies palid cu ten albăstriu. *Limba* – palidă, umedă, cu depozit alb în cantitate redusă, uneori tumefiată. *Pulsul* – slab.

Insuficiența Qi a Plămânilor și a Inimii

tuse astmatică, respirație diminuată; astenie; palpitații; transpirații spontane; facies palid. *Limba* – palidă, tumefiată la vârf. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

tonifierea Qi (în funcție de organul afectat), normalizarea funcției de difuzie Qi a Plămânilor, armonizarea psihică:

- Shu – P9 Taiyuan, E36 Zusanli, RP2 Dadu, C7 Shenmen;
- Shu-post. – V13 Feishu, V20 Pishu, V21 Weishu, V15 Xinshu, V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC17 Shanzhong, VC4 Guanyuan, VC12 Zhongwan;
- Lo – P7 Lieque, E40 Fenglong;
- & – E14 Kufang, V42 Pohan, V49 Yishe, V52 Zhishi, V43 Gaohuangshu, VC6 Qihai, VC8 Shenque, Dingchuan (Extra).

Formule

- P10 + VG14 + VC6 + VC4 + E36 (punctul P10 Yuji este stimulat puternic timp de 2 minute cu o frecvență de 1–2 pe secundă; restul punctelor se stimulează moderat timp de 1 minut cu aceeași frecvență, însă cu lăsarea acelor în țesuturi timp de 30 minute; cursul de tratament durează 2 săptămâni);
- E36 + MC6 + P7 + VC17 + VB20; VG14 + V12 + V13 + P5 + P9 (acele se rețin timp de 20 minute, cu stimulare de 2–3 ori; formule indicate în Insuficiența Qi a Plămânilor);
- R3 + V23 + P9 + V13 + E36 (formulă indicată în Insuficiența Qi a Rinichilor);
- VG14 + V12 + V13 + VC12 + E36; P7 + E36 + MC6 + VC17 + VB20 + RP3 + RP6 (formule indicate în Insuficiența Qi a Plămânilor și a Splinei);
- VC17 + VC6; VG14 + V13 (formule indicate în Insuficiența Qi a Plămânilor și Rinichilor).

Modelul clinic 156

Astmul bronșic

[Astm de tip Frig]

Simptome

tuse astmatică și accese provocate și agravate de frig, aversiune față de frig, membre reci; spută clară; absența setei; rinoree cu lichid clar. *Limba* – cu depozit albicios. *Pulsul* – lent, încordat.

Tratamentul

Încălzirea meridianelor și colateralelor, armonizarea Plămânilor:

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V13 Feishu, V20 Pishu, V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC17 Shanzhong, VC4 Guanyuan;
- Lo – E40 Fenglong, RP6 Sanyinjiao;
- & – VG14 Dazhui, VG13 Taodao, VG12 Shenzhu, V12 Fengmen, V43 Gaohuang, Dingchuan (Extra).

Formule antice

- VC6 + E36 (moxibustie);
- VC12 + RP6 (moxibustie);
- V13 + VG4 (moxibustie).

Modelul clinic 157

Astmul bronșic

[Astm de tip Căldură-Insuficiență]

Insuficiența Yin-Qi a Plămânilor

tuse fără expectorație sau cu expectorație a unor cantități mici de spută lipicioasă sau sangvinolentă; senzație de slăbiciune în membre; transpirații nocturne; gură și gât uscate; senzație de căldură după amiază, senzație de căldură în "cinci inimi" (palme, tălpi, piept). *Limba* – roșie, uscată, fără depozit (limbă "cheală"), uneori pe limbă apar 2–3 fisuri în zona anterioară. *Pulsul* – rapid, filiform.

Insuficiența Yin-Qi a Plămânilor și a Rinichilor

astm bronșic cronic, tuse uscată sau cu expectorație a unor cantități mici de spută; transpirații nocturne, gură și gât uscate, senzație de căldură în "cinci inimi"; dureri lombare și la nivelul genunchilor; tinitus. *Limba* – roșie, uscată, fără depozit. *Pulsul* – filiform, rapid.

Insuficiența Yin-Qi a Ficatului

accesele de astm apar mai des noaptea; gât și gură uscate, tuse seacă; ochi uscați; senzație de distensie în hipocondru; transpirații nocturne. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – filiform, rapid.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi, normalizarea funcției Plămânilor:

- Shu – P5 Chize, P9 Taiyuan, R1 Yongquan, R3 Taixi, F8 Quguan;

- Shu-post. – V13 Feishu, V23 Shenshu;
 Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
 Lo – RP6 Sanyinjiao, P7 Lieque;
 & – Dingchuan (Extra).

Formula

V23 + V52 + R3 + P7.

Modelul clinic 158

Astmul bronșic

[Astm de tip Exces]

Stagnarea Qi a Ficatului

astm cu senzație de distensie, greutate sau disconfort în regiunea hipocondrului și cutia toracică (cu acutizare după emoții negative, consumarea alimentelor grase, băuturilor alcoolice); regurgitație; depresie psihică cu irascibilitate. *Limba* – palidă. *Pulsul* – întins.

Excesul Focului în Ficat cu invadarea Plămânilor

senzație de căldură (arsură) și durere în hipocondru, tuse și accese paroxistice; gust amar, sete; iritabilitate; vertij; acutizarea stării bolnavului are loc sub influența emoțiilor negative. *Limba* – roșie (uneori marginile sunt mai roșii), cu depozit galben. *Pulsul* – rapid, întins.

Tratamentul

normalizarea și armonizarea Plămânilor și Ficatului, calmarea psihicului:

- Shu – P5 Chize, P10 Yuji, F2 Xingjian, TR6 Zhigou;
 Shu-post. – V18 Ganshu;
 Mu-ant. – F14 Qimen, VC17 Shanzhong;
 Lo – P7 Lieque, MC6 Neiguan, RP4 Gongsun.

Formule

- Dingchuan + V12 + V13 + P6 + MC6;
- VC17 + VC22 + P7 + P10.

Modelul clinic 159

Astmul bronșic

[Astm de tip Căldură-Exces]

Simptome

tuse și accese de astm agravate la căldură, dispnee cu senzație de plenitudine și distensie în cutia toracică; sete cu dorința de lichide reci; constipație; urină galbenă-închis. *Limba* – cu depozit galben. *Pulsul* – rapid, mare.

Tratamentul

diminuarea Căldurii și armonizarea Plămânilor:

- Shu – P5 Chize, P11 Shaoshang (sângerare), GI11
 Quichi, GI4 Hegu, P9 Taiyuan;
 Shu-post. – V13 Feishu;

- Mu-ant. – VC17 Shanzhong, VC12 Zhongwan;
- Lo – P7 Lieque;
- & – VG14 Dazhui, V12 Fengmen, Dingchuan (Extra), VC22 Tiantu.

Formule

- P10 + VG14 + E36 (în astmul bronșic de tip Flegmă-Căldură); punctele P10 Yuji sunt stimulate prin rotire timp de 2 minute cu o frecvență de 100 pe minut, apoi acele sunt lăsate în țesuturi timp de 30 minute (cu stimulare repetată încă de 2 ori); punctele VG14 + E36 sunt stimulate la început timp de 1 minut cu o frecvență de 80 pe minut, apoi acele rămân în țesuturi timp de 30 minute;
- V13 + P5 + P10 + E40 + Dingchuan;
- V13 + E36 + E40 + P7 (în astm de tip Flegmă-Căldură).

Modelul clinic 160

Criza de astm bronșic

[Vânt-Frig]

Simptome

accese de astm, dispnee; senzație de rece în membre; absență a transpirației (uneori cu transpirație); absență a senzației de sete; cefalee; față palidă; criza de astm apare sub influența frigului. *Limba* – cu depozit alb, subțire. *Pulsul* – superficial, încordat.

Tratamentul

înlăturarea Vântului și a Frigului, calmarea crizei de astm:

- Shu – E36 Zusanli, C7 Shenmen;
- Shu-post. – V13 Feishu;
- Mu-ant. – VC15 Jiuwei;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, P7 Lieque;
- Xi – P6 Kongzui;
- & – V12 Fengmen, VB20 Fengchi, VB21 Jianjing, VC22 Tiantu, Dingchuan (Extra).

Formule

- E36 + RP6;
- VC15 + C7;
- V12 + VC22 + P7;
- Dingchuan + VC22 + P5;

Formule antice pentru profilaxia crizelor astmului bronșic

- V13 + VG12 + V43 (sfârșitul lunii august, moxibustie);
- V23 + VC4 + R16 (sfârșitul lunii octombrie, moxibustie).

Modelul clinic 161

Criza de astm bronșic

[Vânt-Căldură]

Simptome

corp fierbinte, aversiune față de frig, sete; cefalee; dispnee, tuse,

sufocare. *Limba* – roșie în zonele anterioare și marginale. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

eliminarea Căldurii și Vântului, calmarea crizei de astm:

Shu – P5 Chize, P11 Shaoshang, C7 Shenmen;

Shu-post. – V13 Feishu;

Mu-ant. – P1 Zhongfu, VC15 Jiuwei;

Lo – P7 Lieque;

Xi – P6 Kongzui;

& – Dingchuan (Extra), VC22 Tiantu.

Formula

V13 + VG14 + TR5 + VB20 + P5 + P7.

IX

Acupunctura în tratamentul bolilor digestive

- IX.1. Gastrita. Ulcerul gastric și duodenal**
- IX.2. Colecistita. Dischinezia căilor biliare.
Litiaza biliară**
- IX.3. Hepatita**
- IX.4. Ciroza hepatică**
- IX.5. Intestinul iritabil. Rectocolita
ulcerohemoragică**
- IX.6. Apendicita cronică**
- IX.7. Hemoroizii. Prolapsul rectal**
- IX.8. Alergia alimentară**
- IX.9. Sughițul**

IX.1. Gastrita. Ulcerul gastric și duodenal

Modelul clinic 162

Gastrita. Ulcerul gastric și duodenal

[Stagnarea Qi și a hranei în stomac / Pervertirea fluxului Qi a Stomacului]

Simptome

anorexie, greață, vomă, plenitudine și dureri în abdomen (în special în epigastru), eructație fetidă, gust neplăcut, regurgitație acidă, garguiment intestinal, meteorism. Starea se agravează în cazul alimentației excesive, în urma meselor neregulate, alimentației cu hrană greu digerabilă. *Limba* – cu depozit lipicios și gros sau depozit de culoare murdară. *Pulsul* – alunecos sau încordat.

Tratamentul

restabilirea fluxului normal al Energiei (Qi), armonizarea organelor digestive:

- Shu – E36 Zusanli, MC5 Jianshi;
- Shu-post. – V15 Xinshu;
- Mu-ant. – E25 Tianshu, VC12 Zhongwan, VC17 Shanzhong;
- Lo – RP4 Gongsun;
- Xi – E34 Liangqiu;
- & – R20 Tonggu, VC10 Xiawan, Lineiting* (Extra).

Formule

- VC12 + MC6 + VC17 + E36 + F3 (formulă cu efect de armonizare a circulației Qi a Stomacului);
- F1 + F3 + TR10 (tonifiere; formulă indicată în aerofagie);
- VC10 + VC21 + E36 + MC6 + RP14;
- VC12 + MC6 + E36 + E20 + RP4;
- VC10 + VC13 + E21 + E37 + MC6;
- E21 + VC11 + E36;
- E36 + VC12 + E25.

Modelul clinic 163

Gastrita. Ulcerul gastric și duodenal

[Hiperactivitatea Focului în Stomac / Flegmă-Foc în Stomac]

Simptome

dureri și senzație de arsură în epigastru, greață, eructație, halenă fetidă, posibile vome postprandiale (cu conținut fierbinte, cu miros acru și fetid, cu sânge), senzație de greutate sau opresiune în epigastru, pirozis, stomatită, gingivită, ulcerație și tumefiere a gingiilor, constipație, sete, preferință de băuturi reci; urină galbenă în

* Lineiting – pe fața plantară a piciorului, simetric cu punctul E44 Neiting

cantitate mică sau urină tulbure. Starea bolnavului se agravează după alimentație picantă, consum de mâncare fierbinte, alcool, emoții negative. *Limba* – roșie, cu depozit galben și uscat sau cu depozit galben și alunecos. *Pulsul* – mare, rapid sau alunecos.

Tratamentul

refrigerarea Stomacului, dispersarea Focului, armonizarea Focarului Mediu și ameliorarea digestiei:

- Shu – E36 Zusanli, E45 Lidui, F2 Xingjian, MC8 Laogong;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
- Lo – MC6 Neiguan;
- & – VC11 Jianli, E21 Liangmen, VC13 Shangwan.

Formule

- E44 + GI11 + MC6 + VC12 + E21;
- E45 + MC6;
- MC6 + RP4 + GI11;
- R21 + RP4 (în pilorospasm).

Modelul clinic 164

Gastrita. Ulcerul gastric și duodenal

[Umiditate-Căldură în Stomac și Splină]

Simptome

lipsa poftei de mâncare, vărsături, scaune moi, gust amar, salivă lipicioasă, balonare în epigastru și abdomen; senzație de greutate în corp; apatie; icter (ochi și piele galbenă, urină galbenă). *Limba* – roșie, cu depozit gălbui, lipicios. *Pulsul* – rapid și alunecos.

Tratamentul

refrigerarea Căldurii, eliminarea Umidității și armonizarea organelor digestive:

- Shu – E36 Zusanli, GI11 Quchi, RP9 Yinlingquan;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan, F13 Zhangmen;
- & – E37 Shangjuxu.

Formule

- RP4 + RP5 + RP6 + E36 + V20 (formulă cu efect de diminuare a Căldurii și eliminare a Umidității);
- RP4 + MC6 + E21;
- VC12 + MC6.

Modelul clinic 165

Gastrita. Ulcerul gastric și duodenal

[Stagnarea Xue în Stomac]

Simptome

dureri localizate (fixe) în epigastru (cu agravare noaptea, la presare și după mâncare), vome cu sânge, scaun negru (cu sânge); astenie. *Limba* – purpurie (în special în centru) sau cu peteșii. *Pulsul* – scurt, rugos.

Tratamentul

eliminarea stazării Xue, diminuarea durerii și armonizarea organelor digestive:

- Shu – F3 Taichong;
- Shu-post. – V17 Geshu, V18 Ganshu;
- Lo – RP4 Gongsun, MC6 Neiguan;
- Xi – E34 Liangqiu;
- & – RP10 Xuehai, VC10 Xiawan.

Formule

- RP4 + MC6 + VC12;
- F3 + GI4;
- RP6 + V18 + V20 + E36;
- V17 + RP10 + V18 + V20 + E36.

Modelul clinic 166

Gastrita. Ulcerul gastric și duodenal
[Dezarmonia Ficat-Stomac]

Simptome

jenă sau senzație de greutate în regiunea stomacului (ameliorare la ingerarea unei cantități mici de alimente), balonare și dureri în epigastriu și hipocondru, eructație, regurgitație cu suc gastric, senzații de gol și disconfort în stomac; depresie, iritabilitate. *Limba* – cu depozit subțire, gălbui, uneori roșie la margini. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

armonizarea Ficatului și Stomacului:

- Shu – E36 Zusanli, F3 Taichong, VB34 Yanglingquan;
- Mu-ant. – F13 Zhangmen, F14 Qimen, VC12 Zhongwan;
- Lo – MC6 Neiguan;
- Xi – E34 Liangqiu;
- & – VG7 Zhongshu, VG8 Jinsuo, V47 Hunmen, VC13 Shangwan, R20 Tonggu.

Formule

- F3 + MC6 + RP4(dispersie) + E36(tonifiere) + VC12(armonizare);
- E21 + E34 + MC6 + F3 + F13;
- MC6 + RP4;
- V18 + F3 + E36;
- F3 + MC6 + V19;
- VC12 + MC6 + E36 + F3 + VB34 + RP4;
- V19 + V21 + E36;
- V18 + V20 + MC6;
- VC12 + E44 + E21;
- F14 + F3 + VC12;
- V18 + VC12 + E36.

Modelul clinic 167

Gastrita. Ulcerul gastric și duodenal
[Insuficiența Qi a Stomacului și a Splinei]

Simptome

abdomen balonat (în special după masă), scăderea apetitului, scaune moi, vomă, greață; astenie pronunțată, apatie, absența dorinței de a vorbi; paloare cu nuanță pământie a feței; semne de ptoză viscerală. *Limba* – palidă, cu depozit alb, subțire. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

normalizarea Qi a Stomacului și a Splinei, ameliorarea digestiei:

- Shu – E36 Zusanli, RP2 Dadu;
- Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan, VC12 Zhongwan, F13 Zhangmen;
- Lo – RP4 Gongsun, RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
- & – E21 Liangmen, VG6 Jizhong, V49 Yishe.

Formule

- RP2 + RP3 + E36 + V20 + F13 (formulă cu efect de fortificare și armonizare a Splinei);
- VC4 + VC12 + E21 + E36 + R7 + VG20;
- MC6 + E36 + RP4 + VC12;
- VC12 + V20 + V21;
- V20 + MC6 + E36.

Modelul clinic 168

Gastrita. Ulcerul gastric și duodenal
[Frig al Stomacului]

Simptome

scădere a poftei de mâncare, balonare, plenitudine și dureri în partea superioară a abdomenului (aggravare la frig și ameliorare la cald), regurgitație cu suc gastric pur, greață, vome postprandiale; absență a setei; urini de culoare deschisă; extremități reci. *Limba* – palidă, cu depozit alb; pot apărea puncte albe în jurul zonei centrale a limbii. *Pulsul* – profund, lent.

Tratamentul

dispersarea Frigului, încălzirea Focarului Mediu, ameliorarea digestiei:

- Shu – E36 Zusanli, RP5 Shangqiu;
- Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan, VC4 Guanyuan;
- Lo – RP4 Gongsun;
- Xi – E34 Liangqiu;
- & – VG9 Zhiyang, VC8 Shenque (moxibustie prin sare).

Formule

- E36 + MC6 + V20 + V21 + RP4 + VC12 (acupunctura + moxibus-

tie; formulă cu efect de încălzire a Stomacului și dispersie a Frigului);

- VC12 + E21 + E40 + GI10 + RP4;
- VC12 + VC4 + E36 + V21;
- VC12 + E19 + V43;
- V20 + V21 + E36 + VC12 + RP4.

Modelul clinic 169

Gastrita. Ulcerul gastric și duodenal
[Insuficiența Yin-Qi a Stomacului]

Simptome

dureri cu senzație de arsuri în epigastriu, senzație de gol și disconfort în stomac în asociere cu senzația de foame fără dorință de a mânca, uscăciune în cavitatea bucală și în gât, greață, vomă, constipație; anxietate. Acest model corespunde gastritei atroifice și ulcerului gastric de lungă durată. *Limba* – roșie, fără depozit. Uneori pe limbă sunt mai multe fisuri scurte de diverse dimensiuni și forme sau o fisură mare în centru. *Pulsul* – rapid, filiform.

Tratamentul

alimentarea Yin a Stomacului și armonizarea organelor digestive:

- | | | |
|-----------|---|-------------------------|
| Shu | - | E36 Zusanli, R3 Taixi; |
| Shu-post. | - | V21 Weishu, V13 Feishu; |
| Mu-ant. | - | VC12 Zhongwan; |
| Lo | - | RP6 Sanyinjiao; |
| & | - | VG7 Zhongshu. |

Formule

- VC12 + R6 + RP6 (tonifiere) + E44 (dispersie; formula antică);
- RP6 + E21 + R3 + E36 (tonifiere) + E44 (dispersie);
- VC12 + MC6 + E36;
- V18 + V21 + RP6;
- R3 + V17 + VC12 + E36.

IX.2. Colecistita. Dischinezia căilor biliare. Litiaza biliară*

Modelul clinic 170

Colecistita. Litiaza biliară
[Stagnarea Qi a Ficatului]

Simptome

durere și senzație de distensie în hipocondriu (cu iradiere în umăr și spate); depresie, iritabilitate; starea se agravează la emoții

* Acupunctura se aplică la bolnavii care au calculi în diametru mai mici de 1 cm.

negative; gust amar, inapetență; litiaza biliară este confirmată la examenul obiectiv. *Limba* – cu depozit în cantitate mică (albicios sau gălbui). *Pulsul* – întins.

Tratamentul

normalizarea circulației Qi a Ficatului:

- Shu – VB34 Yanglingquan, VB40 Qiuxu, F3 Taichong;
- Shu-post. – V18 Ganshu, V19 Danshu;
- Mu-ant. – F14 Qimen;
- & – Dannangxue (Extra).

Formule

- F14 + VB34 + F3 + VB24 (în litiaza biliară – acele sunt lăsate în țesut mai mult de 40 minute cu stimularea lor la fiecare 5–10 minute);
- F2 + F3 + F14 + V18 + VB40 + TR6 (formulă cu efect de dinamizare Qi și armonizare a Ficatului);
- F14 + TR6 + VB34 + F3 + VB43.

Modelul clinic 171

Colecistita. Litiaza biliară

[Umiditate-Căldură în Ficat și Veziculă Biliară]

Simptome

durere și senzație de plenitudine în hipocondru și epigastru, gust amar, inapetență, greață, vomă, dezgust pentru alimente; posibilă febră; icter; urină galbenă-închis; litiaza biliară este confirmată la examenul obiectiv. *Limba* – roșie, cu depozit galben și gros. *Pulsul* – alunecos și rapid.

Tratamentul

diminuarea Umidității și a Căldurii, normalizarea circulației Qi a Ficatului:

- Shu – E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan, VB34 Yanglingquan, F3 Taichong;
- Shu-post. – V18 Ganshu, V19 Danshu;
- Mu-ant. – F14 Qimen, VB24 Riyue;
- & – VG9 Zhiyang, Dannangxue (Extra).

Formule

- VG8 + V18 + VB25 + VB34;
- F14 + TR6 + VB34 + F2 + V18 + VB24.

Modelul clinic 172

Colecistita. Dischinezia căilor biliare

[Dezarmonia Ficat-Stomac]

Simptome

dureri sau senzații de disconfort în epigastru și hipocondru (cu

* Dannangxue – aproximativ la 1 cun mai jos de punctul VB34 Yanglingquan.

agravare la emoții negative), eructație, regurgitație cu suc gastric; nervozitate, depresie, iritabilitate, insomnie, oftat. *Limba* – normală sau puțin roșie la margini, cu depozit subțire, albui. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

armonizarea Ficatului și Stomacului, normalizarea proceselor psihice:

- Shu – C7 Shenmen, F3 Taichong, VB34 Yanglingquan;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan, F14 Qimen, VC17 Shanzhong;
- Lo – MC6 Neiguan.

Formule

- F14 + VB34 (dispersie) + E36 + V21 (tonifiere; formula antică);
- VC12 + E36 + MC6 + RP4 + F3 + F14.

Modelul clinic 173

Colecistita. Dischinezia căilor biliare

[Dezarmonia Ficat-Splină]

Simptome

distensie abdominală, scaune moi sau constipație, inapetență, senzație de plenitudine, disconfort sau dureri în epigastru și hipocondru (cu agravare la emoții negative); nervozitate, iritabilitate, depresie, insomnie. *Limba* – palidă, cu depozit alb. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

armonizarea Ficatului și Splinei, normalizarea proceselor psihice:

- Shu – E36 Zusanli, F3 Taichong, C7 Shenmen;
- Mu-ant. – E25 Tianshu, F14 Qimen, VC17 Shanzhong;
- Lo – MC6 Neiguan, RP6 Sanyinjiao.

Formula antică

F14 + VB34 (dispersie) + E36 + RP6 (tonifiere).

IX.3. Hepatita

Modelul clinic 174

Hepatita

[Stagnarea Qi a Ficatului]

Simptome

dureri difuze și senzație de distensie, greutate în regiunea hipocondrului drept, iradiată în partea dreaptă a cutiei toracice și gât (senzațiile de greutate și disconfort în hipocondru apar după consumarea alimentelor grase, băuturilor alcoolice sau după emoții negative), balonarea abdomenului, scaune decolorate, regurgitație; icter; depresie, irascibilitate. *Limba* – palidă, cu depozit subțire, alb. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

Înlăturarea stagnării Qi a Ficatului, armonizarea organelor digestive:

- Shu – TR6 Zhigou, VB40 Qiuxu, VB34 Yanglingquan, F8 Ququan;
- Shu-post. – V18 Ganshu, V19 Danshu;
- Mu-ant. – F14 Qimen, VC12 Zhongwan;
- Lo – MC6 Neiguan, RP6 Sanyinjiao, F5 Ligou;
- & – E21 Liangmen, Ganyan (Extra).

Formule

- F2 + F3 + F14 + V18 + VB40 + TR6 (formulă cu efect de dinamizare Qi și armonizare a Ficatului);
- E36 + VB34 + F2 + F14 + TR6 (acele se rețin în țesuturi timp de 30 minute cu stimulare la fiecare 10 minute; cursul de tratament constituie 30 de zile).

Modelul clinic 175

Hepatita

[Stagnarea Xue a Ficatului]

Simptome

dureri acute în hipocondrul drept (bolnavii indică exact localizarea durerii), palparea hipocondrului drept provoacă dureri locale acute, durerile se intensifică după efort fizic minimal. Acutizarea maladiei poate să apară după o traumă fizică în regiunea hipocondrului drept (apar dureri surde, mai puternice noaptea și mai puțin pronunțate ziua); icter. *Limba* – palidă sau cianotică, purpurie. *Pulsul* – întins și rugos.

Tratamentul

Înlăturarea stagnării Qi și Xue, armonizarea organelor digestive:

- Shu – TR6 Zhigou, VB34 Yanglingquan, VB40 Qiuxu, F3 Taichong;
- Shu-post. – V17 Geshu, V18 Ganshu, V19 Danshu, V20 Pishu;
- Mu-ant. – F14 Qimen;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
- & – RP10 Xuehai.

Formule

- F14 + TR6 + VB34 + V17 + RP21 + RP6;
- VB34 + F3 + V17 + RP10 + RP6 + TR6.

* Ganyan – la 2 cun sub punctul RP6 Sanyinjiao.

Modelul clinic 176

Hepatita

[Umiditate-Căldură cu predominarea Căldurii / Icter de tip Yang]

Simptome

astenie; icter (culoare oranj); dureri și senzații de distensie în hipocondru, anorexie, greață, vomă, gust amar, sete, abdomen balonat, scaune neregulate, constipație; micțiuni rare cu urină galbenă; periodic febră; eczemă la nivelul scrotului, dureri în testicule, prurit vulvar, leucoree impură, de culoare galbenă. *Limba* – roșie, cu depozit galben, lipicios, gros. Se depistează fâșii galbene pe ambele părți ale liniei mediane. *Pulsul* – rapid, alunecos.

Tratamentul

refrigerarea Căldurii, eliminarea Umidității și armonizarea organelor digestive:

- Shu – VB34 Yanglingquan, F3 Taichong, IG4 Wangu, RP9 Yinlingquan;
Shu-post. – V18 Ganshu, V19 Danshu, V20 Pishu;
Mu-ant. – F13 Zhangmen, E25 Tianshu;
Lo – C5 Tongli;
& – E21 Liangmen, VC10 Xiawan, VG7 Zhongshu, VG14 Dazhui.

Formule

- RP9 + V18 + V19 + VG9 + VB34 + F3 + E44;
- F3 + V43 + V53 + VB34 + VC11 + V19;
- V19 + VB34 + RP9 + E44 + VG14;
- GI1 + GI4 + IG5 + VB43 + E45 + MC8 + IG4.

Modelul clinic 177

Hepatita

[Umiditate-Căldură cu predominarea Umidității / Icter de tip Yang]

Simptome

scăderea poftelor de mâncare, senzație de opresiune, balonare în epigastriu și abdomen, greață, vomă, gust amar, scaune moi, diaree; piele și ochi de culoare galbenă cu ten deschis; prurit, hiperhidroză; febră intermitentă; senzație de greutate în tot corpul, fatigabilitate, apatie; oligurie. Agravare a stării în urma nerespectării normelor igienice de alimentare, a abuzului de alcool și alimente cu conținut mare de grăsimi. *Limba* – cu depozit galben și gras. *Pulsul* – alunecos.

Tratamentul

refrigerarea Căldurii, dizolvarea Umidității, armonizarea organelor digestive:

- Shu – E36 Zusanli, RP2 Dadu, RP3 Taibai, VB34 Yanglingquan;

- Shu-post. – V19 Danshu, V20 Pishu, V21 Weishu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan, F13 Zhangmen;
- Lo – MC6 Neiguan, RP6 Sanyinjiao, C5 Tongli, RP4
Gongsun;
- & – VC10 Xiawan, E21 Liangmen, V48 Yanggang.

Formule

- V20 + V21 (tonifiere), apoi RP4 + VG9 (dispersie; formula antică);
- VB34 + VG9 + V18 + V19.

Modelul clinic 178

Hepatita

[Umiditate-Frig; icter de tip Yin]

Simptome

senzație de greutate în tot corpul, astenie, membre reci; somnolență, bolnavul mai mult stă culcat; senzație de balonare în epigastriu și abdomen, poftă redusă de mâncare, greață, scaune moi, diaree, meteorism; oligurie; ten gălbui. Starea bolnavului se agravează la umezeală și la rece, mai ales în asocieri cu consumarea hranei reci și crude. *Limba* – palidă, umedă, cu depozit alb sau gri, lipicios. *Pulsul* – lent, alunecos.

Tratamentul

încălzirea Frigului, eliminarea Umidității și armonizarea organelor digestive:

- Shu – TR6 Zhigou, E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan;
- Shu-post. – V19 Danshu, V20 Pishu, V21 Weishu;
- Mu-ant. – F13 Zhangmen, VC4 Guanyuan, VC12 Zhongwan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VC6 Qihai, V48 Yanggang.

Formule

- VG9 + V20 + V19 + V18 + E36 + RP6 + RP9;
- VC12 + E36 + VC6 (moxibustie).

Modelul clinic 179

Hepatita

[Insuficiența Xue în Ficat]

Simptome

ten palid; vertij, "ceață în fața ochilor", uscăciune a ochilor; senzație de amorțire a membrelor, spasm muscular; oligomenoree sau amenoree; icter. Acest model clinic se manifestă în caz de hemoragie abundentă și maladii cronice epuizante. *Limba* – palidă, în special la margini. *Pulsul* – filiform.

Tratamentul

fortificarea Xue a Ficatului și armonizarea organelor digestive:

- Shu – E36 Zusanli, F8 Ququan;
- Shu-post. – V17 Geshu, V18 Ganshu, V20 Pishu;

- Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – RP10 Xuehai, VG4 Mingmen.

Formula antică

V20 + V17 + F8 + VC4 (moxibustie).

Modelul clinic 180

Hepatita

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului și a Rinichilor]

Simptome

senzație de slăbiciune, greutate sau durere în regiunea lombară și în membrele inferioare; senzație de căldură în regiunea celor "cinci inimi" (palme, tălpi, stern), roșeață malară; transpirații nocturne; vertij, zgomote în urechi; scăderea memoriei, insomnie; gură uscată, gât uscat; pierderi seminale nocturne; oligomenoree, ciclu menstrual la intervale mari (mai mari de 28 zile). *Limba* – roșie, cu depozit neînsemnat. *Pulsul* – întins și filiform.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi a Ficatului și a Rinichilor, armonizarea organelor digestive:

- Shu – F8 Ququan, R3 Taixi;
Shu-post. – V18 Ganshu, V23 Shenshu;
Mu-ant. – VC4 Guanyuan, VC5 Shimen;
Lo – RP6 Sanyinjiao.

Formula

F3 + R3 + VC4.

IX.4. Ciroza hepatică

Modelul clinic 181

Ciroza hepatică

[Stagnarea Qi]

Simptome

abdomen meteorizat (după presarea peretelui abdominal nu rămâne depresiunea), distensie abdominală (cu agravare după emoții negative și ameliorare după eructații); senzație de plenitudine în cutia toracică și epigastriu, scaune dificile, constipație; subicter; steluțe vasculare, teleangiectazii faciale și toracice; iritabilitate, nervozitate. *Limba* – cu depozit alb și subțire. *Pulsul* – profund și dur (ferm).

Tratamentul

armonizarea circulației Qi și a organelor digestive:

- Shu – E36 Zusanli, F3 Taichong, R3 Taixi;
Mu-ant. – VC17 Shanzhong, VC12 Zhongwan;
Lo – MC6 Neiguan;

& – VC6 Qihai.

Formula antică

VC6 + VC17 + V20 + V21 (moxibustie).

Modelul clinic 182

Ciroza hepatică

[Retenția Lichidelor]

Simptome

volum mărit al abdomenului (după presarea peretelui abdominal rămâne depresiunea); edeme ale membrelor (edeme perimaleolare albe și moi); senzație de plenitudine pronunțată în abdomen; aversiune față de frig; astenie, fatigabilitate; subicter. *Limba* – cu depozit alb, alunecos sau cenușiu. *Pulsul* – profund și încetinit.

Tratamentul

fortificarea Splinei, Rinichilor, armonizarea circulației Qi și a Lichidelor, intensificarea diurezei:

Shu – RP9 Yinlingquan, R3 Taixi, R7 Fuliu;

Shu-post. – V20 Pishu, V23 Shenshu;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – VC9 Shuifen, VC11 Jianli, VG26 Renzhong.

Formule

- RP6 + RP9 + VB39 (acupunctură 2–3 minute); apoi VC9 + RP6 + R6 (moxibustie; formula antică);
- E25 + VC12 + R3;
- VC9 + VG26 + VC8.

Modelul clinic 183

Ciroza hepatică

[Stagnarea Xue]

Simptome

volum mărit al abdomenului, durere la palpare în hipocondru; circulația venoasă superficială (mai des peri- și supraombilicală); pete purpurii, echimoze, steluțe vasculare, teleangiectazii; subicter; piele uscată, cu descuamări; facies pământiu. *Limba* – purpurie, cu echimoze. *Pulsul* – scurt, înnodat sau rugos.

Tratamentul

armonizarea circulației Qi și Xue și a organelor digestive:

Shu – F4 Zhongfeng;

Shu-post. – V18 Ganshu, V20 Pishu, V17 Geshu;

Mu-ant. – F13 Zhangmen, F14 Qimen;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – VC9 Shuifen.

Formula

RP6 + V17 + V18.

IX.5. Intestinul iritabil. Rectocolita ulcerohemoragică

Modelul clinic 184

Intestinul iritabil. Rectocolita ulcerohemoragică

[Căldură]

Simptome

dureri în abdomen, în special în părțile laterale și inferioară (aggravate după ingerarea alimentelor), anorexie, eructație, gust amar, ulceratie a mucoasei bucale, scaune uscate, dure, constipații; facies roșu; halenă fetidă; iritabilitate; sete. *Limba* – uscată, cu depozit galben. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

refrigerarea Căldurii, umectarea intestinului și ameliorarea procesului de digestie:

- Shu – GI4 Hegu, GI11 Quchi, MC3 Quze, TR6 Zhigou;
- Shu-post. – V25 Dachangshu;
- Mu-ant. – E25 Tianshu;
- & – E30 Qichong, E37 Shangjuxu.

Formule

- E44 + GI1 + IG1 (sângerare);
- E25 + E37 + TR6 + GI11.

Modelul clinic 185

Intestinul iritabil

[Umiditate-Căldură în Splină]

Simptome

senzație de balonare în epigastru și abdomen, dureri în abdomen, scaune moi, senzație de arsură în anus, pierdere a apetitului, greață, vărsături, gust amar, sete (fără dorința de a bea) sau sete cu consumarea lichidelor în cantități mici, salivă lipicioasă; oligurie, urină galbenă; apatie, cefalee, senzație de corp greu. Dereglările se agravează în urma consumului excesiv de grăsimi, dulciuri sau băuturi alcoolice. *Limba* – roșie, cu depozit gălbui, lipicios. *Pulsul* – alunecos, rapid.

Tratamentul

refrigerarea Căldurii, eliminarea Umidității și armonizarea organelor digestive:

- Shu – E36 Zusanli, GI11 Quchi, RP9 Yinlingquan;
- Shu-post. – V25 Dachangshu, V20 Pishu;
- Mu-ant. – E25 Tianshu, VC12 Zhongwan, F13 Zhangmen;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – E37 Shangjuxu, E39 Xiajuxu.

Formule

- RP4 + RP5 + RP6 + E36 + V20;
- GI11 + GI2 + E25 + V25 + E37;
- GI11 + VC12 + RP15 + RP9 + VB34;
- RP9 + RP6 + VG9 + V20.

Modelul clinic 186

Intestinul iritabil

[Stagnarea Qi]

Simptome

senzație de plenitudine în abdomen, scaune uscate și dure cu miros fetid, senzații de defecare inefficientă, meteorism, scădere a apetitului, regurgitație cu miros de hrană; iritabilitate. *Limba* – cu depozit gras, marginile limbii pot fi de culoare roșie. *Pulsul* – dur sau scurt.

Tratamentul

înlăturarea stagnării Qi, ameliorarea procesului de digestie:

- Shu – E36 Zusanli, TR6 Zhigou, F3 Taichong, VB34 Yanglingquan;
Shu-post. – V25 Dachangshu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan, E25 Tianshu;
Lo – F5 Ligou;
& – VC6 Qihai, RP15 Daheng.

Formule

- VC12 + F3 + TR6 + V25 + E25;
- V18 + V20 + V27 + F3 + GI4 + E39;
- E25 + E37 + TR6 + VC12 + F3;
- TR6 + V25 + F3;
- VC6 + F3 + F13 + GI4 + RP15 + E39;
- E25 + F3 + GI4.

Modelul clinic 187

Intestinul iritabil

[Dezarmonia Ficat-Stomac / Dezarmonia Ficat-Splină]

Simptome

dureri și senzație de plenitudine sau disconfort în abdomen, epigastru și hipocondru, regurgitații acide, greață, inapetență, scaune neregulate (alternarea constipațiilor și diareii); depresie, iritabilitate. Dereglările se agravează în urma solicitărilor nervoase, stresurilor repetate și alimentației neregulate. *Limba* – cu depozit subțire, marginile limbii pot fi de culoare roșie. *Pulsul* – întins (în special din stânga).

Tratamentul

normalizarea funcției Ficatului și armonizarea organelor digestive:

- Shu – E36 Zusanli, F3 Taichong, VB40 Qiuxu, VB34

	Yanglingquan;
Shu-post.	– V18 Ganshu, V21 Weishu;
Mu-ant.	– F13 Zhangmen, F14 Qimen, VC12 Zhongwan, E25 Tianshu;
Lo	– RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
&	– VC6 Qihai, E37 Shangjuxu, VC13 Shangwan, VC10 Xiawan.

Formule

- F14 + VB34 (dispersie) + E36 + RP6 + V21 (tonifiere; formula antică);
- VC17 + VC12 + MC6 + VB34 + F3 + F14;
- F3 + F13 + RP15 + E25 + E37 + MC6.

Modelul clinic 188

Intestinul iritabil

[Insuficiența Qi a Splinei / Hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului]

Simptome

diaree, care apare îndată după emoții negative (ameliorare la calmarea bolnavului), dureri în abdomen, epigastru și hipocondru, inapetență; iritabilitate. *Limba* – cu depozit albicios și subțire. *Pulsul* – întins și subțire.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Splinei și Ficatului, ameliorarea procesului de digestie:

Shu	– F2 Xingjian;
Shu-post.	– V18 Ganshu, V20 Pishu;
Mu-ant.	– VC12 Zhongwan, E25 Tianshu;
&	– E37 Shangjuxu, V26 Guanyuanshu.

Formule

- F2 (dispersie) + V20 (tonifiere; formula antică);
- RP4 + MC6 + RP15;
- VC6 + F13.

Modelul clinic 189

Intestinul iritabil

[Insuficiența Qi a Splinei și a Stomacului / Insuficiența Yang-Qi a Splinei]

Simptome

scădere a apetitului, distensie sau balonare a abdomenului (în special după masă), scaune moi, semne de ptoză a organelor; edeme; extremități reci; fatigabilitate, slăbiciune în membre; paloare cu nuanță pământie a feței; absență a dorinței de a vorbi. Un semn de diagnostic diferențial – diminuarea durerilor în abdomen la presare și cald. Starea se agravează în caz de alimentație insuficientă, abuz de alimente reci, crude și necalitative. *Limba* –

palidă, puțin tumefiată, cu depozit alb, subțire; pot apărea fisuri transversale în mijlocul părților laterale. *Pulsul* – slab și încetinit.

Tratamentul

potențarea Qi, fortificarea Splinei și a Stomacului, armonizarea organelor digestive:

- Shu – E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan, RP3 Taibai;
- Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan, VC12 Zhongwan, F13 Zhangmen, E25 Tianshu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – E28 Shuidao.

Formule

- RP2 + RP3 + V20 + E36 + V13 + VC4 + VG4 (formulă cu efect de fortificare Qi și Yang-Qi a Splinei);
- RP6 + E25 + VC6;
- V20 + V21 + VC12 + F13 + E36 + VC6 + VC4;
- GI3 + E25 + E36;
- GI10 + E36;
- RP2 + RP5 + RP9.

Modelul clinic 190

Intestinul iritabil

[Insuficiența Qi / Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor]

Simptome

facies palid sau pământiu; alternare a constipațiilor și diareii, diaree matinală, scădere ponderală, abdomen balonat; senzație de frig în regiunea lombară și în picioare, astenie, transpirații; neliniște; cefalee surdă; diminuarea auzului; poliurie. *Limba* – palidă, atonă sau puțin tumefiată în părțile laterale. *Pulsul* – profund, slab și lent.

Tratamentul

fortificarea Qi și ameliorarea procesului de digestie:

- Shu – E36 Zusanli, TR6 Zhigou, R7 Fuliu;
- Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu, V23 Shenshu;
- Mu-ant. – E25 Tianshu, VC4 Guanyuan, VC12 Zhongwan;
- Lo – RP4 Gongsun;
- & – VC6 Qihai, E37 Shangjuxu, VG4 Mingmen, V26 Guanyuanshu.

Formule

- E25 + E37 + TR6 + V20 + V23 + VC4;
- VG4 + E37.

Modelul clinic 191

Rectocolita ulcerohemoragică

[Insuficiența Qi a Splinei și a Rinichilor cu acumulare de Umiditate-Căldură în Intestine]

Simptome

dureri în abdomen (mai pronunțate în flancul și fosa iliacă stângă), scaune apoase frecvente, scaune mucosangvinolente și tenesme rectale; indispoziție, astenie; scădere ponderală; ten palid, aspect bolnăvicios al feței; sângerare a mucoasei bucale, glosită. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab, alunecos.

Tratamentul

normalizarea Splinei și a Rinichilor, eliminarea Umidității și a Căldurii, ameliorarea procesului de digestie:

- Shu – GI11 Quchi, E36 Zusanli, R3 Taixi, RP2 Dadu, RP9 Yinlingquan;
Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu, V22 Sanjiaoshu, V23 Shenshu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan, E25 Tianshu, F13 Zhangmen;
Xi – RP8 Diji;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – VC6 Qihai, VG4 Mingmen, E30 Qichong, E37 Shangjuxu.

Formule antice

- E25 + VC12 + VC6 + VC4 + V25 + E36 (armonizare);
- E36 + RP1 + F3 (armonizare) + VG20 (moxibustie; formulă indicată în hemoragie intestinală);
- VG4 + VG19 + GI10 + R7 (tonifiere; formulă indicată în diaree mucosangvinolentă).

Modelul clinic 192

Intestinul iritabil

[Insuficiența Yang-Qi a Splinei și a Rinichilor]

Simptome

ten palid; membre inferioare reci, edem al membrelor inferioare; scădere ponderală; senzații de rece, slăbiciune și greutate în regiunea lombară și membrele inferioare; dorință de a sta culcat; facies tumefiat; abdomen balonat (în special în a doua jumătate a zilei); inapetență, diaree cu alimente nedigerate, diaree matinală; impotență, infertilitate. Acest sindrom apare la bolnavii cu maladii cronice, de vârstă înaintată. *Limba* – palidă, puțin umedă, tumefiată, cu depozit neînsemnat. *Pulsul* – profund, slab și lent.

Tratamentul

fortificarea Splinei și a Rinichilor, armonizarea organelor digestive:

- Shu – E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan, RP3 Taibai, R7 Fuli;

- Shu-post. – V23 Shenshu, V20 Pishu, V25 Dachangshu;
 Mu-ant. – VC4 Guanyuan, VC12 Zhongwan, E25 Tianshu,
 F13 Zhangmen;
 Lo – RP6 Sanyinjiao, R4 Dazhong;
 & – VC6 Qihai, VG4 Mingmen, E28 Shuidao, E37
 Shangjuxu.

Formule

- V20 + V23 + V27 + E36 + E39;
- VC6 + VC12 + E25 + E36 + E39;
- VC12 + VC8 + E36 + E25 + RP4 + GI4;
- V20 + V24 + V25 + VC6;
- VG4 + V23 + V24;
- R3 + E25 + VC6.

Modelul clinic 193

Intestinul iritabil

[Frig]

Simptome

extremități reci, senzație de frig în regiunea lombară și abdominală (ameliorare la cald), dureri în abdomen, constipații; poliurie.
 Limba – palidă, umedă, cu depozit alb. Pulsul – profund, lent.

Tratamentul

Încălzirea Frigului, ameliorarea procesului de digestie:

- Shu – E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan, TR6 Zhigou;
 Shu-post. – V25 Dachangshu;
 Mu-ant. – E25 Tianshu;
 & – VC6 Qihai, VC8 Shenque (moxibustie prin sare),
 RP15 Daheng, E26 Wailing, V26 Guanyuanshu.

Formule

- E39 + IG3 + VC4 (acupunctura + moxibustie; formulă cu efect de încălzire a Focarului Mijlociu și dispersie a Frigului);
- E25 + E37 + TR6 + VC8 + VC6;
- E25 + VC12 + E36 + VC6 (moxibustie).

Modelul clinic 194

Intestinul iritabil

[Frig-Umiditate]

Simptome

scădere a apetitului, scădere ponderală, greață, dureri în abdomen (în special în regiunea epigastrică și periombilicală), senzație de rece în epigastru, scaune moi, balonare a abdomenului cu senzație de plenitudine și distensie, garguiment, modificarea sau absența senzației de gust; senzație de greutate în regiunea cefalică și tot corpul. Starea se agravează după abuz de alimente reci și crude, după răcire intensă sau aflare îndelungată în local umed.

Limba – palidă, cu depozit alb sau cenușiu, lipicios. *Pulsul* – alunecos, lent.

Tratamentul

diminuarea Frigului și a Umidității, armonizarea organelor digestive:

- Shu – E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan;
- Shu-post. – V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan, VC12 Zhongwan, E25 Tianshu, F13 Zhangmen;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – E26 Wailing, VC6 Qihai, VC8 Shenque (moxibustie prin sare), E8 Touwei.

Formule

- RP15 + E25 + VC12 + VC4 + E36;
- RP9 + V20 + VC9;
- RP6 + E25 + VC6;
- E25 + E37 + E36;
- E25 + E36 + VC12 + VC8 (moxibustie prin sare).

Modelul clinic 195

Intestinul iritabil

[Insuficiența Yin-Qi]

Simptome

scaune uscate, sete, gură și gât uscate (în special în orele de seară); dureri lombare și în regiunea genunchilor; tinitus; transpirații nocturne, senzație de căldură în "cinci inimi". *Limba* – roșie, fără depozit sau cu depozit cenușiu (în cazuri de predominare a Uscăciunii). *Pulsul* – filiform, rapid.

Tratamentul

alimentarea Yin-Qi a Rinichilor, armonizarea organelor digestive:

- Shu – E36 Zusanli, R3 Taixi;
- Shu-post. – V23 Shenshu, V25 Dachangshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – RP15 Daheng, R6 Zhaohai, E28 Shuidao (din stânga), E29 Guilai (din dreapta), V57 Shengshan.

Formula

R3 + VB25.

Modelul clinic 196

Intestinul iritabil

[Insuficiența Xue]

Simptome

vertij; palpitații; buze și facies palide; constipații, oboseală pronunțată după defecație; slăbiciune. *Limba* – palidă și subțire.

Pulsul – subțire și slab.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Qi și Xue, ameliorarea procesului de digestie:

- Shu – E36 Zusanli, TR6 Zhigou;
- Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu, V25 Dachangshu, V17 Geshu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – E39 Xiajuxu.

Formula

V17 + V20 + V25 + E39.

IX.6. Apendicita cronică

Modelul clinic 197

Apendicita cronică

[Umiditate-Căldură în Intestine / Stagnarea Qi și Xue]

Simptome

dureri periodice în abdomen (în special din dreapta și periombilical), greață, inapetență. *Limba* – roșie, cu depozit galben, lipicios sau limbă cianotic-purpurie. *Pulsul* – rapid, alunecos sau rugos.

Tratamentul

diminuarea Umidității-Căldurii, dinamizarea Qi și Xue, armonizarea Intestinelor:

- Shu – E36 Zusanli, GI11 Quchi;
- Mu-ant. – E25 Tianshu;
- Lo – MC6 Neiguan;
- & – Lanwei (Extra), RP14 Fugie.

Formule

- E25 + Lanwei + E37 + E36 + RP8;
- RP3 + E43 + V25 + Lanwei.

IX.7. Hemoroizii. Prolapsul rectal

Modelul clinic 198

Hemoroizii. Prolapsul rectal

[Umiditate-Căldură]

Simptome

dureri sau senzație de arsură în regiunea anusului, dureri în

* Lanwei – la 2 cun inferior de punctul E36 Zusanli.

abdomen, balonare, tenesme, constipație, hemoragii periodice (mase fecale cu urme de sânge); ten palid; urină de culoare galbenă. *Limba* – roșie, cu depozit gras, gălbui. *Pulsul* – rapid, alunecos.

Tratamentul

eliminarea Căldurii și a Umidității, armonizarea organelor digestive:

- Shu – GI11 Quchi, V40 Weizhong, RP1 Yinbai;
- Shu-post. – V25 Dachangshu, V27 Xiaochangshu;
- & – E37 Shangjuxu, V57 Chengshan, V54 Zhibian, VG1 Changqiang, VG6 Jizhong, V30 Baihuanshu, Erbai (Extra).

Formule

- VG1 + V35 + V32 + V57 + Erbai (reținerea acelor timp de 30 minute și stimulare la fiecare 10 minute);
- V32 + V35 + V57 + VG1 + RP10;
- V30 + V57;
- VG20 + VG1 + V57 + V40 + RP9 + Erbai;
- P6 + MC4 + V57 + GI4 + GI11 + Erbai;
- V25 + E44 + GI4.

Modelul clinic 199

Hemoroizii. Prolapsul rectal.

[Stagnarea Xue]

Simptome

prurit, dureri sau senzație de greutate și plenitudine în regiunea anală, constipații; menstrue neregulate și dureroase; labilitate emoțională, depresie; buze, vârf al nasului sau față cianotice. *Limba* – puțin tumefiată, cianotică. *Pulsul* – rugos.

Tratamentul

înlăturarea stagnării Xue și armonizarea organelor digestive:

- Shu – TR6 Zhigou, RP1 Yinbai, V40 Weizhong;
- Shu-post. – V25 Dachangshu, V17 Geshu, V15 Xinshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan, E25 Tianshu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – E37 Shangjuxu, RP10 Xuehai, V33 Zhongliao, V30 Baihuanshu, Erbai (Extra).

Formula

Erbai + V17 + V15.

* Erbai – la 4 cun deasupra punctului MC7 Daling; un punct localizat la marginea medială a marelui palmar, al 2-lea punct – la marginea laterală *m. flexor carpi radialis*.

Modelul clinic 200

Hemorolizii. Prolapsul rectal

[Insuficiența Qi a Rinichilor / Insuficiența Qi a Splinei]

Simptome

dureri lombare; dureri la nivelul articulațiilor genunchilor; poliurie, micțiuni frecvente cu urină clară, nicturie; scaune moi, alternând cu constipații, poftă redusă de mâncare, abdomen balonat; leucoree clară la femei, spermatooree și ejaculare precoce la bărbați; paloare; oboseală, respirație superficială, transpirații spontane. *Limba* – palidă, cu depozit subțire și alb. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Rinichilor și a Splinei, armonizarea organelor digestive:

- Shu – E36 Zusanli, RP5 Shangqiu, R7 Fuliu, V40 Weizhong;
Shu-post. – V20 Pishu, V23 Shenshu, V25 Dachangshu;
& – V57 Chengshan, VG1 Changqiang, VC6 Qihai, V30 Baihuanshu, Erbai (Extra), VG20 Baihui (moxibustie).

Formule antice

- VG1 + V26 (armonizare) + VG20 + V46 + VC4 + E36 (acupunctura, tonifiere + moxibustie);
- E36 + GI4 + VG1 + VG20 (acupunctura + moxibustie);
- VG20 (moxibustie 10–15 minute) + VC8 (moxibustie prin sare);
- V57 + VG1 (armonizare) + V17 (tonifiere) + VG20 (moxibustie; formulă indicată în hemoragii hemoroidale);
- VG20 + VC6 + V30 + V57 + P6 + MC4 (tonifiere 20–30 minute) + VC6 + VG20 (moxibustie 30–40 minute).

IX.8. Alergia alimentară

Modelul clinic 201

Alergia alimentară

[Umiditate-Căldură în Intestine]

Simptome

diaree cu miros fetid, mase fecale cu mucus sau sânge, durere abdominală, senzație de arsură în anus; sete fără dorință de a bea. *Limba* – roșie, cu depozit galben, lipicios. *Pulsul* – rapid, alunecos.

Tratamentul

eliminarea Umidității și Căldurii, normalizarea digestiei și reactivității imunologice:

- Shu – RP9 Yinlingquan, GI11 Quchi;
Shu-post. – V20 Pishu, V22 Sanjiaoshu, V25 Dachangshu;

- Mu-ant. – E25 Tianshu, VC3 Zhongji;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – E39 Xiajuxu.

Formule

- GI11 + GI2 + E25 + V25 + E37 (formulă cu efect de diminuare a Căldurii și eliminare a Umidității);
- VC6 + E25 + E39 + RP6 + RP9 + GI11;
- E25 + E39 + RP9.

Modelul clinic 202

Alergia alimentară

[Umiditate-Flegmă în Plămâni]

Simptome

rinoree, tuse, dispnee, respirație astmatică în asociere cu tulburări digestive. *Limba* – cu depozit alb, lipicios. *Pulsul* – alunecos.

Tratamentul

eliminarea Umidității și Flegmei, normalizarea digestiei și a reactivității imunologice:

- Shu – P9 Taiyuan, RP9 Yinlingquan;
- Shu-post. – V13 Feishu;
- Mu-ant. – P1 Zhongfu, VC17 Shanzhong;
- Lo – E40 Fenglong;
- Xi – P6 Kongzui;
- & – E2 Sibai, V2 Zanzhu, VB20 Fengchi, VC22 Tiantu.

Formule

- V13 + VC12 + E40 + P6;
- E40 + VC12.

Modelul clinic 203

Alergia alimentară

[Hiperactivitatea Focului în Stomac]

Simptome

greață, vomă, sete (cu preferință de băuturi reci), senzație de arsură și durere în epigastru, constipație, ulceratii ale mucoasei gurii; respirație cu miros neplăcut. *Limba* – roșie, cu depozit galben și uscat. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

diminuarea Focului, normalizarea digestiei și reactivității imunologice:

- Shu – GI11 Quchi, E44 Neiting, E45 Lidui, V40 Weizhong;
- Mu-ant. – E25 Tianshu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong;
- & – E21 Liangmen, RP10 Xuehai, VC13 Shangwan.

Formule

- GI11 + E45 + GI4 + E36 + VC12 (formulă cu efect de diminuare a

- Focului și armonizare a Stomacului);
- VC13 + E21 + E44 + MC3 + RP6;
- RP10 + GI11 + V40.

Modelul clinic 204

Alergia alimentară

[Excesul Focului în Ficat]

Simptome

cefalee, iritabilitate; conjunctivită alergică, eczemă; senzație de arsură în hipocondru. *Limba* – roșie (în special la margini), cu depozit galben uscat. *Pulsul* – rapid și întins.

Tratamentul

eliminarea Focului din Ficat, normalizarea digestiei și reactivității imunologice:

- | | | |
|-----|---|--|
| Shu | - | GI11 Quchi, E44 Neiting, VB38 Yangfu, F2 Xingjian; |
| Lo | - | RP6 Sanyinjiao; |
| & | - | E21 Liangmen, VB1 Tongziliao, VB20 Fengchi, VG20 Baihui. |

Formule

- VC13 + E21 + E44 + F2 + VB38 + RP6;
- VG20 + VB20.

Modelul clinic 205

Alergia alimentară

[Excesul lojei energetice Foc]

Simptome

anxietate, insomnie, hiperemotivitate; ten roșietic al feței, dureri în regiunea precordială, palpitații; dureri în abdomen (în special periombilicale), diaree sau constipație, ulceratie a mucoasei bucale, gust amar. *Limba* – roșie (în special vârful). *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

restabilirea echilibrului în loja energetică Foc, normalizarea digestiei și reactivității imunologice:

- | | | |
|-----|---|--|
| Shu | - | E45 Lidui, C3 Shaohai, C8 Shaofu, IG2 Qiangui; |
| Lo | - | RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong; |
| & | - | E21 Liangmen, E39 Xiajuxu, VC13 Shangwan. |

Formule

- VC13 + E21 + E44 + C3 + MC3 + RP6;
- C8 + E39.

Modelul clinic 206

Alergia alimentară

[Insuficiența Qi în Intestine / Stagnarea Qi în Intestine]

Simptome

distensie abdominală, inapetență, diaree, barborigme; astenie, depresie. *Limba* – palidă, cu depozit alb sau pete purpurii. *Pulsul* – gol sau dur, lent sau alunecos, scurt.

Tratamentul

fortificarea și dinamizarea Qi și Xue, normalizarea digestiei și reactivității imunologice:

- Shu – RP1 Yinbai, RP9 Yinlingquan;
Shu-post. – V20 Pishu, V22 Sanjiaoshu, V25 Dachangshu, V27 Xiaochangshu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan, E25 Tianshu;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – GI10 Shousanli, E39 Xiajuxu.

Formule

- VC6 + VC12 + E25 + E39 + RP6;
- V20 + V25 + V27 + GI10 + E39.

Modelul clinic 207

Alergia alimentară

[Insuficiența Qi a Splinei / Umiditate]

Simptome

astenie, slăbiciune în membre; alternare a constipațiilor și diareii, greață, scădere ponderală, abdomen balonat; senzație de greutate în picioare; erupții cutanate. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab, alunecos.

Tratamentul

fortificarea Qi a Splinei, normalizarea digestiei și reactivității imunologice:

- Shu – E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan, RP1 Yinbai;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan, VC17 Shanzhong;
Lo – RP4 Gongsun, RP6 Sanyinjiao;
& – E21 Liangmen.

Formula

VC12 + VC6 + E21 + E36 + RP6 + RP9.

IX.9. Sughițul

Modelul clinic 208

Sughițul

[Stagnarea Qi și a hranei în Stomac / Acumularea Umidității în Focarul Mediu]

Simptome

sughiț; senzație de distensie în piept, expectorație abundentă, spută și mucus; dureri în abdomen, scaune neformate, balonare și durere în epigastriu și abdomen, anorexie, pirozis și eructație; frică; vertij. Sughițul apare ca urmare a meselor neregulate (mai ales a consumului de alimente greu digerabile) și după consumul iacom al alimentelor. *Limba* – cu depozit gros, lipicios. *Pulsul* – dur, glisant.

Tratamentul

normalizarea circulației Qi, dispersia Umidității, înlăturarea stagnerii alimentelor, armonizarea organelor digestive:

- | | | |
|-----------|---|---|
| Shu | – | E36 Zusanli, E44 Neiting; |
| Shu-post. | – | V21 Weishu, V20 Pishu, V17 Geshu; |
| Mu-ant. | – | E25 Tianshu, VC12 Zhongwan, VC17 Shanzhong, VC14 Jique; |
| Lo | – | RP6 Sanyinjiao, RP4 Gongsun; |
| & | – | VC13 Shangwan, VC10 Xiawan, E21 Liangmen. |

Formule

- V2 + TR17 (presopunctura); dacă nu se obține rezultatul dorit, se punctează MC6 + VC12 + VC22;
- V20 + V17 + VC12 + RP4;
- V17 + VC12 + MC6 + E36.

Modelul clinic 209

Sughițul

[Căldură în Stomac]

Simptome

sughiț sonor; fațes roșu; sete, constipație, eructație fetidă; urină galbenă-roșietică. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, normalizarea circulației Qi:

- | | | |
|-----------|---|--|
| Shu | – | E36 Zusanli, F2 Xingjian, E45 Lidui, GI4 Hegu; |
| Shu-post. | – | V17 Geshu; |
| Lo | – | MC6 Neiguan. |

Formule

- GI11 + E45 + GI4 + E36 + VC12 (formulă cu efect de diminuare a Căldurii și armonizare a Stomacului);

- V17 + VC12 + MC6 + E36 + E45;
- V17 + VC12 + E45.

Modelul clinic 210

Sughițul

[Dezarmonie Ficat-Stomac]

Simptome

sughițul apare în urma emoțiilor, situațiilor stresante. Senzații neplăcute în epigastriu și hipocondru, eructație acidă; scădere a apetitului, gust amar; dereglări ale somnului, iritabilitate. *Limba* – puțin tumefiată, roșie la margini sau palidă. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

restabilirea circulației Qi a Stomacului și Ficatului, armonizarea organelor digestive:

- | | | |
|-----------|---|--|
| Shu | - | E36 Zusanli, F3 Taichong, P9 Taiyuan, VB34 Yanglingquan; |
| Shu-post. | - | V18 Ganshu, V17 Geshu, V21 Weishu; |
| Mu-ant. | - | VC17 Shanzhong, VC12 Zhongwan, F14 Qimen; |
| Lo | - | MC6 Neiguan; |
| & | - | VC22 Tiantu, VC13 Shangwan, VC10 Xiawan. |

Formule

- V17 + VC12 + F3 + VB34;
- V17 + VC12 + MC6 + E36 + F3;
- F14 + VC17 + VC12 + F3.

Modelul clinic 211

Sughițul

[Insuficiența Yang-Qi a Splinei și a Stomacului]

Simptome

sughiț surd; astenie; poftă de mâncare scăzută, diaree sau scaune moi cu alimente nedigerate, abdomen balonat (mai ales după ingerarea alimentelor). *Limba* – palidă, umedă, cu depozit alb. *Pulsul* – profund, slab.

Tratamentul

potențarea Yang-Qi a Splinei și a Stomacului, armonizarea organelor digestive:

- | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|
| Shu | - | E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan; |
| Shu-post. | - | V20 Pishu, V21 Weishu, V17 Geshu; |
| Mu-ant. | - | VC12 Zhongwan; |
| Lo | - | MC6 Neiguan, RP6 Sanyinjiao; |
| & | - | VC6 Qihai. |

Formule

- V17 + VC12 + MC6 + E36;
- V20 + V21 + V17 + VC12.

Modelul clinic 212

Sughițul

[Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor]

Simptome

sughiț surd; astenie fizică; dureri sau senzații neplăcute în regiunea lombară și la nivelul articulațiilor genunchilor; depresie psihică; respirație superficială; extremități reci. Sughițul apare în urma oboselii sau a stresului. *Limba* – palidă, cu depozit subțire și alb. *Pulsul* – slab, gol.

Tratamentul

potențarea Yang-Qi a Rinichilor, normalizarea circulației Qi:

- Shu – R3 Taixi;
- Shu-post. – V23 Shenshu, V17 Geshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- & – VC6 Qihai, VG4 Mingmen.

Formule

- V17 + VC12 + MC6 + E36 + V23;
- V17 + VC12 + VG4.

Modelul clinic 213

Sughițul

[Frig în Stomac]

Simptome

sughiț (cu diminuare la cald); inapetență, absență a setei, senzație de rece în epigastriu, scaune moi; membre reci; urini clare. *Limba* – cu depozit alb și umed. *Pulsul* – lent sau încordat.

Tratamentul

încălzirea și normalizarea Stomacului, normalizarea circulației Qi:

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V17 Geshu, V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
- Lo – MC6 Neiguan;
- & – VC22 Tiantu, VC13 Shangwan, VC8 Shenque (moxibustie prin sare).

Formule

- VC12 + E36 + V20 + V21 + MC6 + RP4 (acupunctura + moxibustie; formulă cu efect de încălzire a Stomacului și dispersie a Frigului);
- V17 + VC12 + MC6 + E36 + V20;
- V17 + VC12 + VC8.

Modelul clinic 214

Sughițul

[Insuficiența Yin-Qi a Stomacului]

Simptome

sughițul apare la bolnavi pe fondul unui sindrom dispeptic gastric specific (inapetență, dureri sau arsură în epigastru, senzație de sete fără dorință de a bea, senzație de gol în stomac sau disconfort pronunțat după mâncare, senzație de vomă), constipație, uscăciune a gurii. *Limba* – roșie. *Pulsul* – rapid, filiform.

Tratamentul

potențarea Yin-Qi al Stomacului și armonizarea organelor digestive:

- | | | |
|-----------|---|------------------------------|
| Shu | – | E36 Zusanli; |
| Shu-post. | – | V17 Geshu; |
| Mu-ant. | – | VC12 Zhongwan; |
| Lo | – | RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan; |
| & | – | VC22 Tiantu. |

Formule

- V17 + VC12 + MC6 + E36;
- V17 + VC12.

X

Acupunctura în tratamentul bolilor cardiovasculare

- X.1. Hipertensiunea arterială**
- X.2. Insuficiența circulatorie periferică**
- X.3. Cardiopatia ischemică dureroasă**
- X.4. Aritmiile cardiace**
- X.5. Arteriopatiile periferice**

X.1. Hipertensiunea arterială

Modelul clinic 215

Hipertensiunea arterială

[Excesul Focului în Ficat / Ascendența Yang-Qi a Ficatului]

Simptome

cefalee, vertij (agravare la mișcare), tinitus; hiperemie a feței și ochilor; gust amar, gât și gură uscate; disconfort, dureri sau senzație de arsură sub coaste; constipație; urină galbenă; hemoptizii, epistaxis; nervozitate, furie, iritabilitate, tulburări de somn, coșmaruri. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – rapid, întins.

Tratamentul

dispersia Focului, armonizarea Ficatului și Veziculei Biliare, normalizarea tonusului vascular, calmarea psihicului;

- Shu – TR10 Tianjing, GI11 Quchi, VB34 Yanglingquan,
VB43 Xiashi, F2 Xingjian, E36 Zusanli;
& – VB13 Benshen, VB20 Fengchi, Taiyang (Extra).

Formule

- V18 + VB34 + F3 + F2 + GI11;
- F2 + VB20 + VB38;
- F2 + MC9;
- E9 + MC6 + R1;
- E9 + GI4 + E36 + GI11 + F3;
- E36 + GI11; E36 + VB39;
- F2 + GI11 + E36 + IG17.

Modelul clinic 216

Hipertensiunea arterială

[Vânt al Ficatului]

Simptome

vertij, cefalee, tulburări de echilibru, tremurături, tulburări de vorbire. *Limba* – roșie, tremurândă. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

calmarea Ficatului, diminuarea Vântului, normalizarea tonusului vascular;

- Shu – R3 Taixi, GI4 Hegu, GI11 Quchi;
Lo – RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
& – VB12 Wangu, VB20 Fengchi, GI15 Jianyu, E8
Touwei.

Formule

- GI11 + E36;
- VB20 + GI11 + E36 + IG17;

- MC6 + VB38.

Modelul clinic 217

Hipertensiunea arterială

[Insuficiența Yin-Qi și Excesul Yang-Qi]

Simptome

cefalee, vertij, tinitus; ceață în fața ochilor; neliniște, insomnie; amorțire și furnicături în membre. *Limba* – roșie. *Pulsul* – subțire, lung. Hipertensiunea de tip C (disconfort și senzație de căldură în regiunea precordială și a cordului, palpitații; excitație emoțională; facies roșu; epistaxis, hematurie; gât și gură uscate, limbă uscată cu vârful roșu); hipertensiunea de tip MC (agitație psihomotorie, logoree, hipersexualitate, nimfomanie; dureri sau senzație de plenitudine în cutia toracică; semne de hipergonodism și hiperfuncție a suprarenalelor); hipertensiunea de tip R (algii precordiale; vertij, tinitus; edeme; dureri lombare)

Tratamentul

armonizarea Yin-Yang, normalizarea tonusului vascular:

- | | | |
|-----|---|--|
| Shu | - | GI11 Quchi, E36 Zusanli, R3 Taixi, C7 Shenmen, F3 Taichong, TR10 Tianjing; |
| Lo | - | RP6 Sanyinjiao; |
| & | - | VB20 Fengchi. |

Formule

- C7 + C4 + E12 + E36 + VG15 (formula indicată în hipertensiunea de tip C)
- TR3 + TR10 + MC6 + MC4 + E36 (formula indicată în hipertensiunea de tip MC)
- R1 + R3 + R7 + V7 + V23 + V24 + GI11 (formula indicată în hipertensiunea de tip R)
- RP6 + F3 + VB34 + VB20 + GI4;
- VC17 + RP6;
- R3 + GI11 + E36 + VB20 + IG17;
- RP6 + F3 + R3.

Modelul clinic 218

Hipertensiunea arterială

[Umiditate-Flegmă]

Simptome

cefalee cu senzație de greutate (agravare la mișcare), vertij; senzație de distensie și greutate în cutia toracică și abdomen; palpitații; grețuri, vomă; senzație de greutate în corp și membre; gust amar. *Limba* – cu depozit gros, lipicios. *Pulsul* – alunecos.

Tratamentul

diminuarea Umidității, dizolvarea Flegmei, normalizarea tonusului vascular;

- Shu – GI11 Quchi, E36 Zusanli;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
- Lo – MC6 Neiguan, E40 Fenglong;
- & – E8 Touwei, VB20 Fengchi.

Formule

- E40 + E36 + GI11 + IG17;
- VC12 + E36 + E40.

Modelul clinic 219

Hipertensiunea arterială

[Insuficiența Yin-Qi și Yang-Qi]

Simptome

cefalee, vertij, tinitus; dispnee; facies obosit, depresie psihică, astenie; amorțire a mâinilor și picioarelor, slăbiciune în membre; poliurie sau micțiuni frecvente în cursul nopții; impotență, poluții. *Limba* – palidă. *Pulsul* – profund, subțire.

Tratamentul

armonizarea Yin și Yang, normalizarea tonusului arterial:

- Shu – E36 Zusanli, GI11 Quchi;
- Shu-post. – V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VB20 Fengchi.

Formula

VC4 + E36 + GI11 + RP6 + IG17.

X.2. Insuficiența circulatorie periferică

Modelul clinic 220

Insuficiența circulatorie periferică

[Căldură]

Simptome

febră; cefalee; iritabilitate; dispnee; hiperhidroză, piele fierbinte; gură uscată, sete, buze crispate, constipații; uneori convulsii, delir; scădere predominantă a tensiunii arteriale sistolice. Această stare de șoc hipertermic se manifestă pe timp cald, după o expunere de lungă durată la soare. *Limba* – roșie, uscată. *Pulsul* – rapid și slab.

Tratamentul

eliminarea Căldurii, înlăturarea intoxicației sângelui, armonizarea Qi și Xue, normalizarea homeostaziei termice:

- Shu – MC7 Daling, MC8 Laogong, V40 Weizhong, R1 Yongquan, GI11 Quchi, E42 Chongyang;
- Shu-post. – V13 Feishu;
- Xi – R9 Zhubin;
- & – VG26 Renzhong, VG14 Dazhui.

Formula

VG14 + MC7 + V40.

Modelul clinic 221

Insuficiența circulatorie periferică

[Frig]

Simptome

lipotimie sau stare prelipotimică; dureri în abdomen, diaree, abdomen balonat, greață pronunțată; dureri constrictive în piept; extremități reci. Această stare de șoc hipertermic apare pe timp de arșiță, când pacientul se află la umbră, aproape de apă, la curent (de aer) sau face abuz de alimente și băuturi reci. *Limba* – palidă. *Pulsul* – profund, lent.

Tratamentul

diminuarea Frigului, armonizarea Qi și Xue:

- Shu – E36 Zusanli, P9 Taiyuan, R1 Yongquan, R7 Fuliu, GI11 Quchi;
- Shu-post. – V28 Pangguangshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan, VC12 Zhongwan;
- Lo – MC6 Neiguan;
- & – VC8 Shenque (moxibustie prin sare), VC10 Xiawan, VG26 Renzhong.

Formula

VG26 + VC4.

Modelul clinic 222

Insuficiența circulatorie periferică

[Insuficiența Qi și Xue]

Simptome

lipotimii, vertij, ceață în fața ochilor; scădere predominantă a tensiunii arteriale sistolice; senzații neplăcute în regiunea precordială, palpitații; dispnee; transpirații spontane, tegumente palide, cianotice sau ten palid-cadaveric cu nuanță palid-gălbuie, piele rece și umedă; epuizare, insomnie. *Limba* – palidă, subțire. *Pulsul* – slab, filiform.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Qi și Xue:

- Shu – E36 Zusanli, R3 Taixi;
- Shu-post. – V17 Geshu, V20 Pishu, V23 Shenshu;
- Mu-ant. – F13 Zhangmen, VC4 Guanyuan, VC14 Jueque;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – RP10 Xuehai, V43 Gaohuangshu, VB20 Fengchi, VG4 Mingmen, VG20 Baihui, VC8 Shenque.

Formule

- V23 + MC5 + C9;
- VG20 + VG26 + MC6.

X.3. Cardiopatia ischemică dureroasă

Modelul clinic 223

Cardiopatia ischemică dureroasă

[Stagnarea Qi a Inimii și a Ficatului]

Simptome

dureri intermitente și fără localizare precisă în regiunea cutiei toracice (durerile diminuează după mișcare) și în hipocondru; senzație de distensie în hipocondru, gust amar, inapetență; iritabilitate. Starea se agravează după consumarea alcoolului și după emoții negative, stresuri. *Limba* – normală sau cu depozit albicios. *Pulsul* – întins, înnodat, dur.

Tratamentul

înlăturarea stagnării Qi a Inimii și Ficatului, armonizarea psihicului:

- Shu – MC5 Jianshi, VB34 Yanglingquan, TR6 Zhigou, F3 Taichong;
- Shu-post. – V17 Geshu, V15 Xinshu, V18 Ganshu, V14 Jueyinshu;
- Mu-ant. – F14 Qimen, VC17 Shanzhong;
- Lo – MC6 Neiguan.

Formule

- MC4 + RP21;
- MC6 + V15 + V14 + V17 + RP10 + VC17 + F3;
- VC17 + MC6 + F3 + F14;
- VC17 + R9; VC17 + RP4;
- MC6 + F3.

Modelul clinic 224

Cardiopatia ischemică dureroasă

[Focul Ficatului și al Inimii]

Simptome

dureri cu senzație de opresiune toracică, palpitații; față hiperemiată; vertij și senzație de distensie în regiunea cefalică; insomnie, iritabilitate; gust amar, uscăciune în gură. *Limba* – roșie, cu depozit galben și uscat. *Pulsul* – întins și rapid.

Tratamentul

diminuarea Focului și armonizarea psihicului:

Shu – F2 Xingjian, R7 Fuliu, F3 Taichong;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – VB20 Fengchi.

Formula

F2 + C8 + VC15.

Modelul clinic 225

Cardiopatia ischemică dureroasă

[Stagnarea Xue în Inimă]

Simptome

palpitații, dureri în regiunea precordială, senzație de opresiune în cutia toracică, dureri cu iradieri spre partea internă a brațului stâng (dureri cu caracter intermitent); extremități reci; buze, vârf al nasului sau față cianotice, transpirații spontane. *Limba* – roșie-închis, cu puncte violete sau limbă cianotică. *Pulsul* – profund sau rugos.

Tratamentul

accelerarea circulației Qi și înlăturarea stagnării Xue, armonizarea psihicului:

Shu – E36 Zusanli;

Shu-post. – V15 Xinshu, V14 Jueyinshu, V17 Geshu;

Mu-ant. – VC14 Juque, VC17 Shanzhong;

Lo – MC6 Neiguan, RP6 Sanyinjiao, C5 Tongli;

& – VC6 Qihai, VG26 Renzhong, RP21 Dabao.

Formule

– MC6 + MC4 + VC17 + RP4 + RP21;

– V17 + RP10.

Modelul clinic 226

Cardiopatia ischemică dureroasă

[Insuficiența Yang-Qi]

Simptome

senzație de constricție în cutia toracică, dispnee (agravare la efort fizic neînsemnat); dureri în regiunea precordială, fatigabilitate, amețeli, tinitus; insomnie; palpitații; inapetență, greață, balonări

abdominale, scaune moi; cianoză a buzelor, tegumente palide; transpirație spontană, senzație de rece în membre; disconfort sau durere în regiunea lombară și genunchi; scădere concordantă a tensiunii arteriale sistolice și diastolice; edeme, facies tumefiat. *Limba* – palidă, tumefiată. *Pulsul* – profund, slab, lent.

Tratamentul

potențarea Yang-Qi (Inimă, Splină, Rinichi), armonizarea Yin-Yang, diminuarea durerii și calmarea psihicului:

- Shu – E36 Zusanli, R7 Fuliu, MC5 Jianshi;
Shu-post. – V13 Feishu, V14 Jueyinshu, V15 Xinshu, V20 Pishu, V23 Shenshu;
Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
Lo – C5 Tongli, MC6 Neiguan;
Xi – MC4 Ximen, P6 Kongzui;
& – R25 Shencang, VG4 Mingmen, VG20 Baihui, VC6 Qihai.

Formula

C7 + V15 + P9 + MC6 + V23 + VC4 (formulă cu efect de fortificare Yang-Qi).

Modelul clinic 227

Cardiopatia ischemică dureroasă

[Flegma care tulbură Inima]

Simptome

senzație de opresiune și greutate în cutia toracică, dureri precordiale; respirație cu raluri, dispnee, ortopnee, spută abundentă de culoare albă, salivație abundentă; fatigabilitate, vertij. În acest sindrom senzația de opresiune și greutate predomină asupra durerilor precordiale. *Limba* – tumefiată, umedă, cu depozit alb, lipicios. *Pulsul* – alunecos.

Tratamentul

diluarea Flegmei, armonizarea Inimii, diminuarea durerii, calmarea psihicului:

- Shu – P9 Taiyuan;
Shu-post. – V13 Feishu, V15 Xinshu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan, VC14 Jueque, VC17 Shanzhong;
Lo – E40 Fenglong, RP6 Sanyinjiao, C5 Tongli;
& – VC9 Shuifen.

Formule

- VG26 + VG16 + E40 + C7 + Jing-distale (formulă cu efect de diminuare a Flegmei și calmare mentală);
- E40 + MC6.

Modelul clinic 228

Cardiopatia ischemică dureroasă

[Insuficiența Qi / Stagnarea Xue / Acumularea Flegmei-Umidității]

Simptome

senzații de durere, constricție sau opresiune în piept, mai des retrosternale (durerea poate apărea după ingerarea alimentelor sau după efort fizic); tuse cu eliminarea sputei, dispnee, hemoptizie sau eliminare a sputei ruginii; senzație de greutate în cap, vertij; palpitații; scădere a activității motorii, transpirații spontane; inapetență, abdomen balonat; tegumente palide, buze cianotice. *Limba* – cu depozit alb și gros sau întunecat, cu puncte sau pete violete. *Pulsul* – moale, profund și rugos sau înnodat.

Tratamentul

fortificarea Qi, dizolvarea Flegmei și Umidității, recuperarea circulației Xue, calmarea psihicului:

Shu – E36 Zusanli, VB38 Yangfu, C4 Lingdao;
Shu-post. – V17 Geshu, V14 Jueyinshu, V22 Sanjiaoshu;
Mu-ant. – VC17 Shanzhong;
Lo – MC6 Neiguan, E40 Fenglong;
& – VG9 Zhiyang, V47 Hunmen, R24 Lingxu.

Formula

MC6 + VC17 + RP10 + C7.

Modelul clinic 229

Cardiopatia ischemică dureroasă

[Insuficiența Yin-Qi]

Simptome

senzație de opresiune și durere în regiunea toracică și precordială (durerile apar și dispar în diferite regiuni), palpitații; dispnee, tuse seacă; fatigabilitate; tegumente palide, pomeți hiperemiați. Starea bolnavului se agravează la efort fizic sau emoțional și spre seară. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – rapid, filiform.

Tratamentul

fortificarea Qi, alimentarea Yin-Qi, dinamizarea Xue, armonizarea psihicului:

Shu – P9 Taiyuan, E36 Zusanli, C7 Shenmen, R3 Taixi;
Shu-post. – V13 Feishu, V15 Xinshu, V23 Shenshu;
Lo – C5 Tongli, RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
Xi – C6 Yinxi;
& – R25 Shencang.

Formule

- VC14 + R6;
- C7 + MC6 + VC17 + R3.

X.4. Aritmiile cardiace

Modelul clinic 230

Aritmia

[Tulburarea Shen]

Simptome

aritmii pronunțate periodice cu senzație de neliniște, fobii, anxietate, somn neliniștit cu trezire repetată în cursul nopții; inapetență. Simptomele apar după șoc emoțional sau spaimă pronunțată. *Limba* – normală. *Pulsul* – agitat sau intermitent.

Tratamentul

normalizarea psihicului și activității Inimii:

- Shu – C4 Lingdao, TR10 Tianjing;
- Shu-post. – V15 Xinshu;
- Mu-ant. – VC14 Jueque;
- Lo – C5 Tongli;
- & – VG20 Baihui, V44 Shentang.

Formule

- VB20 (tonifiere) + V10 (dispersie, la bolnavii cu puls lent);
- VB20 (dispersie) + V10 (tonifiere, la bolnavii cu puls rapid);
- V15 + VC14 + C7 + MC6.

Modelul clinic 231

Aritmia

[Dezarmonia Inimă-Rinichi]

Simptome

palpitații; neliniște, vertij, insomnie, slăbire a memoriei, astenie intelectuală, zgomote în urechi; slăbiciune în regiunea lombară și membre; poluții nocturne; gât și gură uscate; transpirații nocturne; tulburări menstruale. Aritmia apare în urma suprasolicitării intelectuale, stresului, activității sexuale excesive sau poate fi consecința unor boli. *Limba* – roșie, cu depozit în cantitate redusă. *Pulsul* – rapid, filiform.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea funcției Inimii și a Rinichilor, calmarea psihicului:

- Shu – C7 Shenmen, MC8 Laogong, MC5 Jianshi, R3
Taixi;
- Shu-post. – V15 Xinshu, V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC14 Jueque;
- & – VG20 Baihui.

Formule

- V15 + VC14 + C7 + MC6 + R3;
- V23 + R3;

- C7 + MC6;
- MC5 + VB41.

Modelul clinic 232

Aritmia

[Retenția Lichidelor în organism]

Simptome

aritmie, palpitații; respirație scurtă; aversiune față de frig; dureri precordiale cu senzație de greutate. *Limba* – umedă ("plutește"). *Pulsul* – încordat și glisant.

Tratamentul

eliminarea Lichidelor și armonizarea proceselor psihice:

- Shu – C7 Senmen;
- Shu-post. – V23 Shenshu (moxibustie);
- Mu-ant. – VC14 Juque (moxibustie);
- Lo – E40 Fenglong, P7 Lieque.

Formule

- VC9 + VC4 + RP9;
- V15 + VC14 + C7 + MC6;
- E40 + P5 + VC14 (moxibustie).

Modelul clinic 233

Aritmia

[Flegmă-Foc]

Simptome

aritmie periodică; nervozitate pronunțată; senzație de opresiune și greutate în cutia toracică; vertij, cefalee cu senzație de greutate; somn neliniștit cu trezire repetată; gust amar; tuse cu spută cleioasă și galbenă. *Limba* – cu depozit lipicios și galben. *Pulsul* – rapid, alunecos.

Tratamentul

diminuarea Flegmei și a Focului, armonizarea Inimii și proceselor psihice:

- Shu – P5 Chize;
- Mu-ant. – VC14 Juque;
- Lo – E40 Fenglong, C5 Tongli;
- Xi – MC4 Ximen, C6 Yinxi.

Formule

- V15 + VC14 + C7 + MC6 + E40;
- MC4 + C7 + VC14 + V15 + P5 + E40 + MC6;
- P5 + E40.

Modelul clinic 234

Aritmia

[Stagnarea Xue]

Simptome

aritmie; dureri în regiunea precordială cu senzație de opresiune; fața, vârful nasului și buzele cianotice; membre reci. *Limba* – roșie-închis, cu puncte violete sau limbă cianotică. *Pulsul* – filiform.

Tratamentul

Înlăturarea stagnării Xue, armonizarea Inimii și proceselor psihice:

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V17 Geshu;
- Mu-ant. – VC17 Shanzhong;
- & – VC6 Qihai, RP10 Xuehai.

Formule

- V17 + RP10;
- V15 + VC14 + C7 + MC6 + V17;
- MC4 + C7 + VC14 + V15 + VC6 + RP10;
- VC17 + MC4.

Modelul clinic 235

Aritmia

[Insuficiența Qi a Inimii]

Simptome

palpitații, senzații de pulsație în regiunea periombilicală; transpirații spontane; dispnee (se agravează la efort fizic neînsemnat); inhibiție psihomotorie, frică, timiditate, depresie, uitucie, fatigabilitate; facies palid sau de o paloare cadaverică; timbru jos al vocii; extremități reci; urini de culoare deschisă. *Limba* – palidă (în special vârful), cu depozit alb. *Pulsul* – profund și gol.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Qi a Inimii, calmarea psihicului:

- Shu – E36 Zusanli, C7 Shenmen, C9 Shaochong;
- Shu-post. – V15 Xinshu, V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan, VC14 Jueque.

Formule

- E36 + VG25;
- V15 + VC14 + C7 + MC6;
- V15 + MC6 + E36 (armonizare 10 minute);
- MC6 + C7 + V14 + V15 + VC17 + P7 + E36.

Modelul clinic 236

Aritmia

[Insuficiența Qi a Inimii și Splinei]

Simptome

palpitații; aspect epuizat, astenie, față de o paloare cu nuanță pământie; insomnie sau coșmaruri; capacitate de memorare redusă; scădere a apetitului, abdomen balonat, scaune moi; dismenoree, amenoree sau metroragie. Aritmia apare după boli cronice, stresuri puternice repetate. *Limba* – palidă, cu depozit albicios, subțire. *Pulsul* – gol, slab.

Tratamentul

fortificarea Inimii și a Splinei, armonizarea lor, calmarea psihi-
cului:

Shu – C7 Shenmen, RP3 Taibai;
Shu-post. – V15 Xinshu, V20 Pishu;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – VC6 Qihai.

Formule

- E9 + MC6;
- V15 + V20 + VC14 + C7 + MC6;
- MC6 + C7 + Jiaji (Extra, Th4,5) + E36.

Modelul clinic 237

Aritmia

[Insuficiența Qi a Inimii și a Plămânilor]

Simptome

palpitații, senzații de constricție în piept; tuse, respirație diminuată; transpirații spontane, astenie; facies palid. *Limba* – palidă și flască. *Pulsul* – gol și slab.

Tratamentul

fortificarea Inimii și a Plămânilor, armonizarea lor, calmarea psihi-
cului:

Shu – P9 Taiyuan, C7 Shenmen;
Shu-post. – V13 Feishu, V15 Xinshu;
Xi – C6 Yinxi;

Formule

- V13 + V15 + VC14 + C7 + MC6;
- C7 + V13.

Modelul clinici 238

Aritmia

[Insuficiența Xue]

Simptome

aritmie; vertij, cefalee, zgomote în urechi; piele palidă; insomnie,

amnezii; buze palide. *Limba* – palidă, subțire. *Pulsul* – slab, filiform.

Tratamentul

alimentarea Xue, armonizarea Inimii și funcțiilor psihice:

- Shu – E36 Zusanli, C7 Shenmen;
- Shu-post. – V15 Xinshu, V17 Geshu, V18 Ganshu, V20 Pishu;
- Lo – C5 Tongli, MC6 Neiguan;
- & – V44 Shentang.

Formule

- MC4 + C7 + VC14 + V15 + V20 + V17 + E36;
- V15 + V17 + VC14 + C7 + MC6;
- V17 + C5 + V20 + E36.

Modelul clinic 239

Tahicardia paroxistică supraventriculară

[Insuficiența Qi și Xue]

Simptome

creștere a frecvenței cardiace peste 150 pe minut, cu început și sfârșit brusc, ritm regulat în cadrul paroxismului. Paroxismele au durată de câteva minute sau ore și tendința spre repetare. Amețeli, stări lipotimice și crize anghinoase; slăbiciune generală; buze palide. *Limba* – palidă, cu depozit alb. *Pulsul* – profund, subțire și slab.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Qi și Xue, calmarea psihicului:

- Shu – C7 Shenmen, E36 Zusanli;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
- & – VC6 Qihai.

Formule

- VC17 + RP6;
- V15 + VC14 + C7 + MC6 + VC6;
- MC6 + C7 + VG14 + RP6.

Modelul clinic 240

Aritmia

[Insuficiența Yin-Qi a Inimii]

Simptome

aritmie, palitații; anxietate, insomnie, diminuarea memoriei; senzație de căldură în "cinci inimi"; hiperhidroză nocturnă; uscăciune a gâtului. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – rapid și fin.

Tratamentul

alimentarea Yin-Qi a Inimii și armonizarea proceselor psihice:

- Shu – C7 Shenmen;
- Shu-post. – V14 Jueyinshu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;

& – Anmian (Extra).

Formule

- C7 + V15 + P9 + R3 + RP6 + MC6 + E36 (formulă cu efect de alimentare Yin-Qi);
- V15 + VC14 + C7 + MC6 + R3;
- MC6 + C7 + V15 + V14 + VC17 + RP6;
- C7 + R3.

Modelul clinic 241

Aritmia cardiacă în cazurile defectului septal interventricular
[Insuficiența Yin-Qi și Xue a Inimii cu pierderea controlului
asupra Yang-Qi și acumularea Căldurii Interne]

Simptome

cardiopatie congenitală, determinată de dezvoltarea incompletă a septului interventricular. Astenie cu dispnee la efort, palpitații, suflu sistolic aspru în spațiul III–IV intercostal parasternal stâng; dereglări ale somnului; transpirații nocturne, senzații de căldură în regiunile celor "cinci inimi" (tălpi, palme, piept); constipații. *Limba* – roșie și uscată (în special vârful), cu fisuri în zona anterioară sau cu o fisură lungă și adâncă pe linia mediană. *Pulsul* – subțire, slab și rapid.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Qi și Xue a Inimii, calmarea psihicului:

- Shu – C7 Shenmen, R3 Taixi;
- Shu-post. – V14 Jueyinshu, V15 Xinshu, V17 Geshu, V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC17 Shanzhong;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
- & – VC6 Qihai, R6 Zhaohai.

Formule

- V15 + VC14 + C7 + MC6;
- V15 + MC7 + VB20;
- MC6 + C7 + V14 + V15 + RP6 + R3 + F3.

X.5. Arteriopatiile periferice

Modelul clinic 242

Sindromul de ischemie periferică cronică
[Stagnarea Qi și Xue în meridiane]

Simptome

în etapele inițiale ale maladiei bolnavii acuză: picioare sensibile la frig, senzație de amorteală, parestezii. Mai târziu apar în timpul mersului dureri în mușchii gastrocnemieni, care dispar la staționare și apar din nou în timpul mersului (claudicație intermitentă).

În cazuri grave durerile persistă și în repaus. Când bolnavul stă mult timp în picioare, piciorul afectat devine cianotic. Un simptom caracteristic este paloarea bruscă a regiunii plantare la ridicarea piciorului. Hipotermie cutanată a membrelor, diminuarea sau dispariția pulsației arterei dorsale a labei piciorului. Pulsația vaselor în punctele de acupunctură E42 Chongyang, V57 Chengshan, V40 Weizhong, R10 Yingu este diminuată sau lipsește. *Limba* – cu depozit alb, uneori cleios; în cazuri cronice – cu depozit galben. *Pulsul* – subțire, profund și rugos.

Tratamentul

normalizarea circulației Qi și Xue în meridiane:

- | | | |
|-----------|---|--|
| Shu | – | P9 Taiyuan, E44 Neiting, RP2 Dadu, RP5 Shangqiu, R7 Fulu, VB34 Yanglingquan; |
| Shu-post. | – | V15 Xinshu; |
| Lo | – | RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong, MC6 Neiguan; |
| & | – | RP10 Xuehai, VB32 Zhongdu, E32 Futu, E33 Yinshi. |

Formule

- V17 + V20 + V18 + RP4;
- RP1 + RP4 + RP8 + RP10;
- VC6 + RP8;
- P9 + MC6;
- RP4 + MC6 + RP1 + E30;
- VB34 + VB39 + RP6.

Modelul clinic 243

Boala Takayasu

[Stagnarea Qi și Xue în meridiane / Insuficiența Yang-Qi / Frig Intern]

Simptome

cefalee, vertij, zgomote în urechi; scăderea capacității de memorare; lipotimii, palpitații; insomnie; tulburarea vederii; dureri în mâini (agravare la efectuarea lucrului fizic sau ridicarea mâinilor); durerile au un caracter intermitent); dilatarea venelor superficiale pe piept. *Limba* – palidă. *Pulsul* – subțire sau nu poate fi determinat pe partea afectată, profund și lent.

Tratamentul

recuperarea circulației Qi și Xue, amplificarea Yang, eliminarea Frigului:

- | | | |
|-----------|---|--|
| Shu | – | P9 Taiyuan, TR2 Yemen, C7 Shenmen; |
| Shu-post. | – | V17 Geshu; |
| Lo | – | IG7 Zhizheng, RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan; |
| & | – | C1 Jiquan, IG14 Jianwaishu. |

Formule

- E9 + P9 + MC6;
- GI4 + F3 + RP6 + V17.

Modelul clinic 244

Boala Raynaud

[Frig / Dereglările circulației Qi și Xue în meridiane]

Simptome

accese de dureri și senzații de arsură în degetele ambelor mâini, degetele devin palide și reci (degete "moarte"). Accesele se manifestă după o hipotermie generală sau locală, la scufundarea mâinilor în apă rece sau în timpul emoțiilor. Accesele durează de la câteva minute până la câteva ore. În cazuri grave pot apare ulceratii. Maladia apare mai des la femei tinere. *Limba* – palidă, puțin tumefiată. *Pulsul* – încordat imediat după hipotermie generală și slab în perioada cronică.

Tratamentul

eliminarea Frigului și normalizarea circulației Qi și Xue în meridiane:

- Shu – E36 Zusanli, C7 Shenmen, TR2 Yemen;
- Shu-post. – V17 Geshu, V13 Feishu;
- Lo – IG7 Zhizheng, RP6 Sanyinjiao, TR5 Waiguan;
- & – C1 Jiquan, IG9 Jianzhen, V11 Dazhu, IG14 Jianwaishu, RP10 Xuehai.

Formule

- E9 + P9 + MC6;
- MC8 + MC6 + RP4 + VC4;
- VC6 + VC17 + MC6 + MC4 + C6 (stagnarea Qi în meridianul Înălmă);
- VC6 + VC17 + MC6 + MC4 + P1 + P6 (stagnarea Qi în meridianul Plămân);
- VC6 + VC17 + MC6 + MC4 + MC8 + MC9 (acupunctura + moxibustie, formulă indicată în mâini reci);
- E12 + Shixuan (sângerare); în funcție de manifestările locale această formulă se asociază cu alte puncte – index, degetul mare (GI10 Shousanli); mediusul (MC6 Neiguan); inelarul și auricularul (IG8 Xiaohai).

Modelul clinic 245

Eritromelalgia

[Acumularea Căldurii / Stagnarea Xue / Stagnarea Qi]

Simptome

accese de dureri și hiperemie a pielii pe mână, distal de articulația cotului (durerile se agravează la căldură și diminuează la frig), amorțire neînsemnată a mâinilor, mai jos de cot. *Limba* – roșie (Căldură), puțin tumefiată (stagnarea Qi). În manifestările pronunțate ale stagnării Xue limba devine purpurie și violetă. *Pulsul* – rapid, profund și rugos.

Shixuan – pe vârful celor 10 degete.

Tratamentul

eliminarea Căldurii și a stagnării Xue, recuperarea circulației Qi în meridiane:

- Shu – P9 Taiyuan, GI11 Quchi, IG8 Xiaohai, R1 Yongquan, MC9 Zhongchong, GI3 Sanjian;
- Lo – TR5 Waiguan;
- & – VG14 Dazhui, punctele Shixuan (Extra, sângerare), GI8 Xialian, RP10 Xuehai.

Formule

- E9 + P9 + MC6;
- GI11 + GI4 + F3 + RP10 + VG14.

XI

Acupunctura în tratamentul bolilor urogenitale

- XI.1. Cistita**
- XI.2. Prostatita cronică**
- XI.3. Retenția de urină**
- XI.4. Nefrita acută și cronică**
- XI.5. Urolitiază**
- XI.6. Insuficiența renală acută**
- XI.7. Tulburările de dinamică sexuală la bărbați**
- XI.8. Spermatoreea**
- XI.9. Sterilitatea masculină**

XI.1. Cistita

Modelul clinic 246

Cistita

[Vânt-Frig]

Simptome

dureri în abdomenul inferior, micțiuni dificile; strănut, frison, aversiune față de frig, febră; cefalee; dureri în tot corpul. *Limba* – cu depozit alb, subțire. *Pulsul* – superficial.

Tratamentul

expulzarea Vântului și Frigului, armonizarea Vezicii Urinare:

Shu	–	GI4 Hegu, GI11 Quchi;
Mu-ant.	–	VC3 Zhongji;
Lo	–	P7 Lieque;
Xi	–	V63 Jinmen;
&	–	V66 Tonggu.

Formula

VC3 + R6 + MC6.

Modelul clinic 247

Cistita

[Căldură-Umiditate / Căldură-Umiditate în Vezica Urinară cu afectarea Xue]

Simptome

dureri în abdomenul inferior cu micțiuni dificile, balonare a abdomenului inferior cu senzația de plin, urini tulburi de culoare galben-închis, urină cu sânge; constipații; lombalgie; hiperemie și dureri în comisura palpebrală internă. *Limba* – roșie, cu depozit galben (în special la rădăcină) și lipicios. *Pulsul* – rapid, alunecos.

Tratamentul

diminuarea Căldurii și a Umidității, armonizarea Vezicii Urinare:

Shu	–	RP9 Yinlingquan, R7 Fuli, V40 Weizhong;
Shu-post.	–	V22 Sanjiaoshu, V28 Pangguangshu, V17 Geshu;
Mu-ant.	–	VC5 Shimen;
Xi	–	V63 Jinmen;
&	–	R15 Zhongzhu, RP10 Xuehai.

Formule

- VC3 + VC6 + RP6 + RP9 + F3 + MC6;
- V17 + V28 + R2 + C8 + RP6;
- V28 + V23 + V40 + V60;
- VC3 + R7; VC3 + F5;
- VC3 + V23 + V28 + RP6.

Modelul clinic 248

Cistita

[Excesul Focului în Ficat]

Simptome

dureri în abdomenul inferior, micțiuni dificile; vertij, tinitus, cefalee; iritabilitate; senzație de disconfort sau arsură în hipocondru, gust amar în gură. *Limba* – roșie (în special la margini). *Pulsul* – întins și rapid.

Tratamentul

diminuarea Focului în Ficat, armonizarea Vezicii Urinare:

Shu – GI11 Quchi, F1 Dadun, F2 Xingjian;

Mu-ant. – VC3 Zhongji;

Xi – V63 Jinmen.

Formula

F1 + R6 + VC2.

Modelul clinic 249

Cistita

[Excesul Focului în Inimă]

Simptome

dureri în abdomenul inferior, disurie, senzație de arsură la urinare; sete; fatigabilitate mentală, insomnie, nervozitate; ulceratie a mucoasei bucale și a limbii. *Limba* – roșie (în special vârful). *Pulsul* – rapid, mare.

Tratamentul

diminuarea Focului în Inimă, armonizarea Vezicii Urinare:

Shu – GI11 Quchi, C8 Shaofu;

Mu-ant. – VC3 Zhongji, VC15 Jiuwei;

Xi – V63 Jinmen,

& – V66 Tonggu.

Formule

- C7 + V15 + MC8 + E36 + C6 (formulă cu efect de diminuare a Focului și armonizare a Inimii);
- VC3 + C8.

Modelul clinic 250

Cistita

[Insuficiența Qi a Rinichilor și a Vezicii Urinare]

Simptome

dureri în abdomenul inferior; slăbiciuni sau dureri în regiunea lombară și membrele inferioare (în special la nivelul articulațiilor genunchilor), fatigabilitate, senzație de frig în regiunea lombară; disurie; spermatooree nocturnă în lipsa visurilor. *Limba* – palidă, cu depozit subțire și alb. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Rinichilor și a Vezicii Urinare:

Shu – R2 Rangu, R3 Taixi;

Shu-post. – V23 Shenshu, V28 Pangguangshu;

Mu-ant. – VC4 Guanyuan;

& – VC2 Qugu, VC6 Qihai, VG4 Mingmen, V52 Zhishi

Formula

V52 + V23 + R3.

Modelul clinic 251

Cistita

[Insuficiența Yang a Splinei și a Rinichilor]

Simptome

slăbiciune în membrele inferioare și regiunea lombară, dureri lombare, membre inferioare reci, edem al membrelor inferioare; aversiune față de rece; senzații neplăcute în abdomenul inferior; dureri în uretră; diaree cronică, inapetență, vomă; ten palid, aspect buhăit al feței, epuizare, dorință de a sta culcat. *Limba* – palidă, umflată. *Pulsul* – profund, de amplitudine mică.

Tratamentul

fortificarea și normalizarea Splinei și a Rinichilor, încălzirea Yang-Qi, armonizarea Focarelor Inferior și Mediu:

Shu – R7 Fuliu, E36 Zusanli;

Shu-post. – V23 Shenshu, V20 Pishu, V28 Pangguangshu;

Mu-ant. – VC4 Guanyuan, E25 Tianshu;

Lo – R4 Dazhong;

& – RP11 Jimen, VC6 Qihai, VC2 Qugu, VG4 Mingmen.

Formula

VG4 + VC4 + V28 + E36.

XI.2. Prostatita cronică

Modelul clinic 252

Prostatita cronică

[Căldură-Umiditate în Focarul Inferior]

Simptome

retenție de urină, la finele micțiunii poate apărea sânge; senzații neplăcute în regiunea osului sacral, în perineu și în partea medială a coapselor; senzație de greutate în abdomenul inferior; sete cu dorință de a bea puțin lichid. *Limba* – cu depozit alb sau galben. *Pulsul* – rapid și alunecos.

Tratamentul

dispersia Umidității și a Căldurii, armonizarea Focarelor Mediu și Inferior:

- Shu – RP9 Yinlingquan, R7 Fuliu, R10 Yingu, V40 Weizhong;
- Mu-ant. – VC5 Shimen;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – V35 Huiyang, V32 Ciliao.

Formule

- V63 + V40 + V28 + RP6 + RP9 + VC3 (formulă cu efect de diminuare a Căldurii și Umidității în Focarul Inferior);
- VC3 + RP9;
- V32 + V30 + VC3 + RP9 + E28.

Modelul clinic 253

Prostatita cronică

[Stagnarea Qi și Xue]

Simptome

retenție de urină; dureri fixe în perineu cu parestezii. *Limba* – roșie la rădăcină sau cianotic-purpurie. *Pulsul* – dur sau rugos.

Tratamentul

dinamizarea Qi și Xue, armonizarea funcției Trei Focare:

- Shu – RP9 Yinlingquan;
- Shu-post. – V17 Geshu, V23 Shenshu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – V32 Ciliao, V30 Baihuanshu, V33 Zhongliao, RP10 Xuehai, VC1 Huiyin.

Formula

RP6 + VC4 + V17.

Modelul clinic 254

Prostatita cronică

[Insuficiența Qi a Rinichilor și a Vezicii Urinare]

Simptome

dureri surde în regiunea lombară și perineu, slăbiciune în regiunea lombară; retenția de urină apare adesea după un efort fizic; după ce porția principală de urină se elimină, urina mai picură, eliminări frecvente din uretră; balonare în abdomenul inferior; respirație superficială; impotență, poluții; depresie, astenie; paviliioane auriculare atone; aversiune față de frig. *Limba* – atonă, palidă, cu depozit albicios, uneori cu amprente dentare. *Pulsul* – slab și subțire.

Tratamentul

fortificarea Qi a Vezicii Urinare și a Rinichilor, armonizarea Focului Inferior:

- Shu – V40 Weizhong, R2 Rangu, R3 Taixi, R7 Fuliu;
- Shu-post. – V23 Shenshu, V28 Pangguangshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan, VC3 Zhongji;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – V52 Zhishi, R13 Qixue, R14 Siman, VG4 Mingmen.

Formule

- VC4 + VC3 + R3 + F3 (acupunctură 30 minute);
- VC4 + R3 + VC1 (moxibustie 15–30 minute; formula antică);
- E36 + V23 + VG4 (acupunctură, tonifiere + moxibustie) + R8 + RP9 (armonizare);
- V23 + V32 + V52 + V60 + R7 + VG4 + VG20;
- VC4 + VG20 + R7 + RP6 + MC6.

XI.3. Retenția de urină

Modelul clinic 255

Retenția de urină

[Stagnarea Qi și Xue în uretră]

Simptome

retenție de urină cu senzație de plenitudine în abdomenul inferior în urma unei traume sau în perioada postoperatorie. *Limba* – purpurie, e posibilă apariția unor puncte roșii la rădăcină. *Pulsul* – dur sau rugos.

Tratamentul

normalizarea circulației Qi și dispersarea acumulărilor Xue:

- Shu – RP9 Yinlingquan;
- Shu-post. – V22 Sanjiaoshu, V28 Pangguangshu, V17 Geshu;
- Mu-ant. – VC3 Zhongji;
- Xi – R5 Shuiquan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – E28 Shuidao, RP10 Xuehai.

Formule

- V39 + VC3 + RP6 + RP9;
- VC3 + RP6 + V17 + V23.

Modelul clinic 256

Retenția de urină

[Stagnarea Qi cauzată de Frig / Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor]

Simptome

bolnavul nu poate urina; respirație diminuată; bolnavul e culcat

"strâns ghem"; amețeli, cefalee; aversiune față de frig și ameliorare la cald; răcire pronunțată a corpului. *Limba* – umedă, alunecoasă, cu multă salivă. *Pulsul* – profund, încordat sau slab.

Tratamentul

Încălzirea, potențarea Energiei Yang și normalizarea circulației Lichidului;

- Shu – RP9 Yinlingquan;
- Shu-post. – V23 Shenshu, V28 Pangguangshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan, VC5 Shimen;
- Xi – R5 Shuiquan;
- & – VG2 Yaoshu, VG4 Mingmen, E28 Shuidao.

Formule

- VC4 + E28 + RP6 (tonifiere) + VG4 (moxibustie; formula antică);
- E28 + V23 + V54 + RP6;
- V39 + VC3 + RP6 + VC6 + V23.

Modelul clinic 257

Retenția de urină

[Stagnarea Qi cauzată de Căldură în Plămâni]

Simptome

bolnavul nu poate urina, disurie; gât uscat, sete, tuse; anxietate, tristețe. *Limba* – roșie, uscată. *Pulsul* – rapid sau dur.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, normalizarea funcției de difuzie Qi a Plămânilor; armonizarea a Trei Focare:

- Shu – P5 Chize, GI11 Quchi, RP9 Yinlingquan;
- Mu-ant. – VC3 Zhongji;
- Lo – P7 Lieque;
- Xi – R5 Shuiquan;
- & – E28 Shuidao.

Formule

- P7 + V42;
- P7 + R6 + R8.

Modelul clinic 258

Retenția de urină

[Stagnarea Qi cauzată de Căldură în Inimă]

Simptome

difficultate la urinare, hematurie; insomnie. *Limba* – roșie (în special vârful). *Pulsul* – rapid sau dur.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, armonizarea a Trei Focare:

- Shu – RP9 Yinlingquan, C8 Shaofu, R2 Rangu;
- Shu-post. – V28 Pangguangshu;
- Mu-ant. – VC3 Zhongji;

- Xi – R5 Shuiquan.
- & – E28 Shuidao.

Formula

RP9 + P7.

Modelul clinic 259

Retenția de urină

[Umiditate-Căldură în Focarul Mediu]

Simptome

dificultate la urinare, urină tulbure; senzație de opresiune în epigastru; senzație de greutate în corp. *Limba* – cu depozit gros, galben. *Pulsul* – alunecos.

Tratamentul

diminuarea Umidității și a Căldurii, armonizarea a Trei Focare:

- Shu – E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan;
- Shu-post. – V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan, VC3 Zhongji;
- Xi – R5 Shuiquan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – E28 Shuidao.

Formule

- RP4 + RP5 + RP6 + E36 + V20 (formulă cu efect de diminuare a Căldurii și eliminare a Umidității);
- E36 + RP6;
- E28 + VC3 + RP6 + VC12.

Modelul clinic 260

Retenția de urină

[Umiditate-Căldură în Focarul Inferior]

Simptome

dificultate și senzație de arsură la urinare; senzație de distensie și greutate în abdomenul inferior. *Limba* – cu depozit gros, galben. *Pulsul* – rapid, alunecos.

Tratamentul

diminuarea Umidității și Căldurii, armonizarea a Trei Focare:

- Shu – RP9 Yinlingquan, V40 Weizhong;
- Shu-post. – V28 Pangguangshu, V22 Sanjiaoshu;
- Mu-ant. – VC3 Zhongji;
- Xi – R5 Shuiquan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – V32 Ciliao, E28 Shuidao.

Formule

- RP9 + P7;
- VC3 + VC4 + RP6 + RP9.

Modelul clinic 261

Retenția de urină

[Insuficiența Qi]

Simptome

dificultate la urinare; astenie, respirație scurtă, facies palid. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

forticarea Qi, armonizarea a Trei Focare;

Shu – RP9 Yinlingquan, E36 Zusanli;

Shu-post. – V20 Pishu, V28 Pangguangshu;

Mu-ant. – VC12 Zhongwan, VC3 Zhongji;

Xi – R5 Shuiquan;

& – VG20 Baihui, VC6 Qihai, E28 Shuidao.

Formule

– RP9 + P7;

– VC3 + VC4 + E36;

– V23 + VC4 + VG4 + V22.

XI.4. Nefrita acută și cronică

Modelul clinic 262

Nefrita acută

[Vânt-Frig]

Simptome

edeme, care repede progresează; aversiune față de frig, febră, gât uscat; dureri în tot corpul; tuse; piele lucioasă; cefalee. *Limba* – cu depozit alb, subțire. *Pulsul* – superficial.

Tratamentul

eliminarea Vântului-Frig, armonizarea a Trei Focare:

Shu – GI4 Hegu, E36 Zusanli;

Shu-post. – V13 Feishu;

Mu-ant. – VC17 Shanzhong;

Lo – P7 Lieque, TR5 Waiguan;

& – V12 Fengmen, VC9 Shuifen.

Formula

GI4 + P7 + V12.

Modelul clinic 263

Nefrita acută

[Foc-Intoxicație]

Simptome

edeme; hematurie, la urinare senzație de arsură în uretră; febră, gât uscat, tuse. Acest sindrom corespunde nefritei acute în urma

infecției. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – rapid, alunecos.

Tratamentul

diminuarea Focului, dezintoxicare, refrigerarea Xue, armonizarea a Trei Focare:

- Shu – RP9 Yinlingquan, GI11 Quchi;
- Shu-post. – V20 Pishu, V22 Sanjiaoshu, V13 Feishu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
- Lo – P7 Lieque;
- & – E28 Shuidao, VC9 Shuifen.

Formula

GI11 + VC9,

Modelul clinic 264

Nefrita acută și cronică

[Căldură-Umiditate în Focarul Inferior]

Simptome

senzații de distensie în abdomenul inferior; greutate și dureri surde în regiunea lombară, abdomenul inferior și suprafața medială a coapsei; sete cu dorința de a bea puțin lichid; senzații de micțiuni frecvente sau retenție de urină, disurie, urină tulbure galbenă-închis; edeme ale membrelor; constipație. *Limba* – roșie, cu depozit galben (în special la rădăcină). *Pulsul* – rapid, alunecos.

Tratamentul

refrigerarea Căldurii, dispersarea Umidității, armonizarea Focarelor Mediu și Inferior:

- Shu – V40 Weizhong, R7 Fuliu, RP9 Yinlingquan;
- Shu-post. – V23 Shenshu, V28 Pangguangshu, V22 Sanjiaoshu;
- Mu-ant. – VC3 Zhongji, VC5 Shimen;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – E28 Shuidao.

Formule

- V63 + V40 + V28 + RP6 + RP9 + VC3 (formulă cu efect de diminuare a Căldurii și Umidității în Focarul Inferior);
- VC3 + E28 + R2 + F8 + RP6;
- P7 + R9 + E29 + V58;
- V40 + V34 + RP9 + V65 + GI11.

Modelul clinic 265

Nefrita cronică

[Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor]

Simptome

corp și extremități reci, cu ameliorare la cald, aversiune față de

frig; edeme progresive, facies tumefiat și palid, edeme și dureri în regiunea lombară (edemele au o consistență moale); bolnavul vorbește puțin, mănâncă puțin; mase fecale cleioase, vâscoase; oligurie; palpitații; dispnee, tuse astmatică; amețeli, tinitus; impotență, poluții, sterilitate la femei. *Limba* – tumefiată, palidă, cu depozit alb, alunecos. *Pulsul* – profund, slab, lent.

Tratamentul

potențarea Yang-Qi a Rinichilor, armonizarea Focarelor Superior, Mediu și Inferior:

- Shu – R7 Fuliu, RP9 Yinlingquan;
- Shu-post. – V20 Pishu, V23 Shenshu, V15 Xinshu;
- Mu-ant. – VC3 Zhongji, VC4 Guanyuan;
- & – VG4 Mingmen, VC8 Shenque (moxa prin sare), VC9 Shuifen.

Formula

V23 + E36 + VC9.

Modelul clinic 266

Nefrita cronică

[Insuficiența Yang-Qi a Splinei și a Rinichilor]

Simptome

ten palid, aspect buhăit al feței; membre reci; senzație de slăbiciune și greutate în regiunea lombară și membrele inferioare; dorința de a sta culcat; facies tumefiat, pleoape și față tumefiate după somn; diaree cu alimente nedigerate, scaune moi, diaree cronică; retenție urinară sau oligurie, edem al membrelor inferioare, ascită, anasarcă (edeme de consistență moale). *Limba* – palidă, tumefiată, umedă, cu depozit alb neînsemnat. *Pulsul* – profund și slab.

Tratamentul

fortificarea Splinei și a Rinichilor, încălzirea Yang-Qi:

- Shu – R3 Taixi, R7 Fuliu, E36 Zusanli, VB34 Yanglingquan;
- Shu-post. – V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan, E25 Tianshu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – V52 Zhishi.

Formule antice

- V40 + R10 + R7 + R3 + V23;
- VC9 + R2;
- R3 + R7 + V23 + RP6 (formulă indicată în retenția lichidelor);
- E36 + E25 + VC6 (moxibustie, formulă indicată în diaree).

Modelul clinic 267

Nefrita cronică

[Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor și a Inimii / Stagnarea Xue]

Simptome

dureri lombare, slăbiciune în picioare (genunchi); tinitus, vertij; poliurie nocturnă; palpitații; dispnee; cefalee surdă; dureri în membre, parestezii; edeme. *Limba* – purpurie sau palidă. *Pulsul* – slab și adânc sau rugos.

Tratamentul

fortificarea Rinichilor și a Inimii, dinamizarea Xue:

- Shu – E36 Zusanli, R7 Fuliu, RP9 Yinlingquan;
Shu-post. – V20 Pishu, V23 Shenshu, V15 Xinshu, V22 Sanjiaoshu;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – E28 Shuidao, VC9 Shuifen.

Formula

V23 + VC9 + V15.

Modelul clinic 268

Nefrita cronică

[Insuficiența Qi și Xue a Splinei și Rinichilor]

Simptome

edeme puțin pronunțate; dureri sau slăbiciune în regiunea lombară; facies palid; astenie, insomnie; inapetență, distensie abdominală după ingerarea alimentelor, scaune moi. *Limba* – cu depozit subțire. *Pulsul* – slab, gol.

Tratamentul

fortificarea Qi și Xue, armonizarea Focarului Mediu și Inferior:

- Shu – E36 Zusanli, RP3 Taibai;
Shu-post. – V20 Pishu, V23 Shenshu, V17 Geshu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – RP10 Xuehai.

Formula

V20 + V23 + E36.

Modelul clinic 269

Nefrita cronică

[Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor și Ficatului / Ascendența Yang-Qi a Ficatului]

Simptome

senzație de greutate și slăbiciune sau durere în regiunea lombară; edeme puțin pronunțate; spermatooree; insomnie; cefalee, vertij; palpitații; senzație de căldură în regiunea celor "cinci inimi", pomeți roșii, transpirații nocturne, gât și ochi uscați. *Limba* – roșie

cu depozit neînsemnat. *Pulsul* – filiform, rapid sau întins și fin.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi a Ficatului și Rinichilor, normalizarea circulației Yang-Qi;

Shu – R3 Taixi, F8 Ququan, F3 Taichong, VB38 Yangfu, VB43 Xiashi;

Shu-post. – V23 Shenshu, V18 Ganshu;

Mu-ant. – VC4 Guanyuan;

& – R6 Zhaohai, VB20 Fengchi.

Formula

R3 + F8 + VB20.

XI.5. Urolitiaza*

Modelul clinic 270

Urolitiaza

[Căldură-Umiditate în Focarul Inferior]

Simptome

dureri lancinante spastice în abdomenul inferior, în regiunea spatelui, iradiate spre regiunea ombilicală sau partea medială a coapsei, senzație de greutate în abdomenul inferior, dereglări de micțiune, hematurie, urină cu sediment de nisip; ten palid, transpirații; vomă sau greață. *Limba* – cu depozit galben sau alb, la rădăcina ei pot apărea puncte roșii. *Pulsul* – rapid și alunecos.

Tratamentul

diminuarea Umidității și a Căldurii, armonizarea Focarului Inferior:

Shu – R10 Yingu, R7 Fuli, V60 Kunlun;

Mu-ant. – VC3 Zhongji, VC5 Shimen;

Lo – R4 Dazhong;

& – V26 Guanyuanshu, V32 Ciliao, V35 Huiyang.

Formule

- V63 + V40 + V28 + RP6 + RP9 + VC3 (formulă cu efect de diminuare a Căldurii și Umidității în Focarul Inferior);
- V23 + E25 + RP9 + R3 + F3 (formulă indicată în colica nefritică – acele sunt lăsate în țesuturi mai mult de o oră cu stimulare repetată și obținerea senzației de acupunctură pronunțată);
- V23 + VB25 + V52 + R5 (calculi în rinichi);
- RP8 + V23 + E25 + RP15 (calculi în ureter, segmentul superior);
- V26 + E28 + RP8 (calculi în ureter, segmentul mediu);
- V32 + V28 + VC2 + RP8 + V63 (calculi în ureter, segmentul inferior și în vezică).

* Acupunctura poate provoca eliminarea calculilor de dimensiuni mici (aproximativ 1 cm) și forma rotundă, nezugrunturoasă.

Modelul clinic 271

Urolitiază

[Insuficiența Qi a Splinei și a Rinichilor]

Simptome

dureri în regiunea lombară, în abdomenul inferior, cu senzație pronunțată de distensie; slăbiciune; micțiuni dureroase și dificile; scaune rău formate; agravare a stării după efort fizic. *Limba* – palidă, atonă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Rinichilor și a Splinei, armonizarea Focarelor Inferior și Mediu:

Shu – R7 Fuliu, V60 Kunlun;
Shu-post. – V23 Shenshu, V28 Pangguangshu, V21 Weishu;
Mu-ant. – VC4 Guanyuan, VC3 Zhongji, F13 Zhangmen;
Lo – RP6 Sanyinjiao, R4 Dazhong;
& – V31 Shangliao, V33 Zhongliao, VG4 Mingmen.

Formula

V23 + V28 + V39 + VG4 + RP8.

XI.6. Insuficiența renală acută

Modelul clinic 272

Insuficiența renală acută

[Stagnarea Qi și Xue în Rinichi]

Simptome

scădere bruscă a diurezei, anurie (secretorie); edem; anorexie, greață, vărsături, absență a setei; cefalee, vertij, astenie; parestezii; crize convulsive, delir, somnolență, comă. *Limba* – roșie la rădăcină. *Pulsul* – profund și rugos.

Tratamentul

normalizarea funcției Rinichilor și armonizarea a Trei Focare:

Shu – R3 Taixi, E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan;
Shu-post. – V23 Shenshu;
Mu-ant. – VC5 Shimen;
Lo – R4 Dazhong, RP6 Sanyinjiao;
& – VG4 Mingmen.

Formule

- RP9 + R7; RP9 + P7;
- VC5 + RP6 (moxibustie).

XI.7. Tulburările de dinamică sexuală la bărbați

Modelul clinic 273

Priapismul

[Excesul Focului în Ficat]

Simptome

erecții peniene de lungă durată (ore, zile, luni), adeseori asociate de dureri în penis, act sexual fără orgasm și ușurare; urinare fără dificultăți, urină galbenă; posibile dificultăți ale actului de defecare cauzate de spasmul mușchilor perineului și al sfincterului anal; cefalee (tâmpile), vertij, tinitus; gust amar în gură, buze roșii, gură uscată; iritabilitate; senzație de disconfort sau arsură în hipocondru. *Limba* – roșie (în special la margini), cu depozit galben. *Pulsul* – întins și rapid.

Tratamentul

diminuarea Focului în Ficat, normalizarea funcțiilor sexuale:

- Shu – F1 Dadun, F2 Xingjian, F3 Taichong, R2 Rangu, F8 Ququan;
& – F11 Yinlian, F12 Jimai, VC2 Qugu, E30 Qichong.

Formule

- E30 + F2;
- VC2 + F3.

Modelul clinic 274

Impotența

[Stagnarea Qi a Ficatului]

Simptome

impotență cu iritabilitate, stări subdepressive pe fond de probleme emoționale în familie; hiposexualitate; disconfort sau durere în hipocondru; oftat. *Limba* – normală sau cu depozit subțire și alb. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

înlăturarea stagnării Qi, armonizarea Ficatului și a funcțiilor psihi-
ce:

- Shu – VB34 Yanglingquan, F3 Taichong;
Shu-post. – V18 Ganshu, V19 Danshu;
Lo – RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
& – V35 Huiyang.

Formule

- F3 + F5 + F8 + "programul Chong Mai" (R4 + R3 + VC2 + VC4 + VC22 + MC6; formulă indicată în absența dorinței sexuale);
- F2 + F3 + TR6 + VB40 + F14 + V18 (formulă cu efect de dinamizare Qi și armonizare a Ficatului);

- VC3 + VC6 + VB13 + VB41 + RP6;
- F3 + "formula celor șase puncte ale impotenței" (distanța dintre punctele VC8 Shenque și VC2 Qugu se dividează în trei porțiuni egale; primul punct se localizează la granița 1/3 superioare și 2/3 inferioare, alte două puncte se localizează bilateral de acest punct, la o distanță de 1 cun de linia mediană; al patrulea punct se află la granița 1/3 inferioare și 2/3 superioare a distanței dintre punctele VC8 Shenque și VC2 Qugu; al cincilea și al șaselea punct se localizează la 2,5 cun mai sus de punctul V23 Shenshu și la 1 cun lateral de linia mediană. Aceste puncte se aplică alternativ în asociere cu alte puncte).

Modelul clinic 275

Impotența

[Stagnarea Qi și Xue]

Simptome

impotență care apare în urma intervențiilor chirurgicale în regiunea bazinului mic sau după traume fizice, în diabet și ateroscleroză. *Limba* – cu echimoze. *Pulsul* – profund și rugos.

Tratamentul

Înlăturarea stagnării Qi și Xue, armonizarea funcțiilor sexuale:

- | | | |
|-----------|---|---------------------------------------|
| Shu | - | F8 Ququan; |
| Shu-post. | - | V17 Geshu, V15 Xinshu; |
| Mu-ant. | - | VC4 Guanyuan; |
| Lo | - | RP6 Sanyinjiao; |
| & | - | RP10 Xuehai, V35 Huiyang, RP21 Dabao. |

Formula

V17 + RP6 + "formula celor șase puncte ale impotenței".

Modelul clinic 276

Impotența

[Căldură-Umiditate în Focarul Inferior]

Simptome

erecții peniene insuficiente, ejaculare precoce; senzație de disconfort sau greutate în abdomen, constipație, sete cu dorința de a bea puțin lichid; slăbiciune în membrele inferioare; urină galbenă, scrot umed (eczemă). *Limba* – cu depozit galben și gros, în special la rădăcină. *Pulsul* – rapid și alunecos.

Tratamentul

eliminarea Umidității-Căldurii, armonizarea Focarului Inferior și normalizarea funcțiilor sexuale:

- | | | |
|-----------|---|---|
| Shu | - | F2 Xingjian, R3 Taixi, R7 Fuli, E44 Neiting, RP9 Yinlingquan; |
| Shu-post. | - | V23 Shenshu; |
| Mu-ant. | - | VC5 Shimen, VC3 Zhongji; |
| Lo | - | RP6 Sanyinjiao; |

& – V32 Ciliao, V35 Huiyang, E28 Shuidao, V52 Zhishi.

Formule

- RP9 + E28 + "formula celor șase puncte ale impotenței";
- V28 + V32 + V23 + VC4 + VG3.

Modelul clinic 277

Impotența

[Umiditate-Căldură în Ficat și Veziculă Biliară]

Simptome

erecție moale, scrot umed, cu miros fetid; senzații de distensie și greutate în abdomenul inferior; gust amar; slăbiciune în membre; disconfort în hipocondru, grețuri, icter slab pronunțat; urină galbenă. *Limba* – cu depozit galben, gros și lipicios (se pot observa fâșii galbene pe ambele părți ale liniei mediane). *Pulsul* – întins, rapid sau moale.

Tratamentul

refrigerarea Căldurii, eliminarea Umidității, armonizarea funcțiilor sexuale:

- Shu – VB34 Yanglingquan;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, F5 Ligou;
- & – V35 Huiyang.

Formule

- VB34 + VB37 + VB38 + "programul Chong Mai" (formulă indicată în absența dorinței sexuale);
- VB34 + F5 + "formula celor șase puncte ale impotenței";
- VB34 + VG9 + RP9 + VG4.

Modelul clinic 278

Impotența

[Declinul Focului "Porții Vitale" / Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor]

Simptome

spermatoree, ejaculare precoce, erecții peniene insuficiente, posibilă azoospermia; senzații neplăcute sau dureri în regiunea lombară, slăbiciune sau dureri în articulațiile genunchilor; micțiuni frecvente (mai ales noaptea) cu urină clară; astenie, membre reci. Tulburările de dinamică sexuală apar la o vârstă înaintată sau după oboseală, stresuri, boli prelungite. *Limba* – palidă. *Pulsul* – profund și slab sau dispersat.

Tratamentul

fortificarea Energiei Vitale și a Rinichilor, revigorarea Yang-Qi și normalizarea funcțiilor sexuale:

- Shu – E36 Zusanli, R3 Taixi, R7 Fuliu;
- Shu-post. – V23 Shenshu, V13 Feishu;

- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
 Xi – R5 Shuiquan;
 & – V52 Zhishi, VG4 Mingmen, VC6 Qihai, E17
 Ruzhong (presopunctură ușoară), E29 Guilai.

Formule

- R4 + R7 + R10 + E36 + "programul Chong Mai" (formulă indicată în absența dorinței sexuale);
- R3 + "formula celor șase puncte ale impotenței";
- P7 + R6 + VC4;
- IG3 + V62 + VG4;
- V23 + VG4 + V52;
- VC4 + VC6 + RP6;
- VC2 + VC4 + VG20 + R7 + V60 + E36 + R1;
- VC4 + R3 + Yintang;
- VC3 + VC14 + VG20 + R8 + R13.

Modelul clinic 279

Impotență

[Insuficiența Qi a Splinei și Inimii]

Simptome

impotență cu tulburări emoționale și digestive; apatie, insomnie sau somn cu coșmaruri, capacitate redusă de memorare; slăbiciune generală; palpitații. *Limba* – palidă, cu depozit subțire, albicios. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Qi, armonizarea Inimii, Splinei și funcțiilor sexuale:

- Shu – C7 Shenmen;
 Shu-post. – V15 Xinshu, V25 Dachangshu;
 Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
 Lo – RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
 & – VC6 Qihai, V35 Huiyang.

Formule

- MC6 + MC7 + C5 + V15 + "programul Chong Mai" (formulă indicată în absența dorinței sexuale);
- VG24 + VG20 (formula antică a calmării mentale; acele sunt introduse de la un punct spre altul și sunt lăsate 30 de minute, cu stimulare la fiecare 10 minute);
- C7 + "formula celor șase puncte ale impotenței";
- VC3 + VC17 + VC14 + C5 + RP6;
- VC3 + VC12 + RP1 + RP4 + E29 + E36 + Yintang.

Modelul clinic 280

Impotența

[Insuficiența Qi și Xue]

Simptome

astenie, vertij, buze palide; respirație scurtă; semne de ptoză a organelor interne. Tulburările de dinamică sexuală apar la o vârstă înaintată sau la tineri după maladii cronice epuizante, alimentație insuficientă de lungă durată. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab și filiform.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Qi și Xue, normalizarea funcțiilor sexuale:

- Shu – E36 Zusanli, R3 Taixi;
- Shu-post. – V20 Pishu, V23 Shenshu;
- Mu-ant. – F13 Zhangmen;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – V43 Gaohuangshu, VC6 Qihai, VG20 Baihui, VG4 Mingmen, E17 Ruzhong (presopunctură ușoară), V35 Huiyang.

Formule

- F3 + F8 + RP3 + RP6 + "programul Chong Mai" (formulă indicată în absența dorinței sexuale);
- E36 + VC6 + "formula celor șase puncte ale impotenței";
- V43 + VC6 + VG20 + VG4.

Modelul clinic 281

Impotența

[Dezarmonia Inimă-Rinichi]

Simptome

tulburare a ejaculării și erecției peniene; insomnie, transpirații nocturne; uscăciune în gură și gât; palpitații și amețeli, tinitus, astenie intelectuală; scădere a memoriei; senzații neplăcute sau dureri în regiunea lombară. Tulburările de dinamică sexuală apar după suprasolicitări intelectuale, stresuri emoționale sau activitate sexuală excesivă. *Limba* – roșie, cu depozit neînsemnat. *Pulsul* – rapid și filiform.

Tratamentul

restabilirea armoniei energetice Inimă-Rinichi și normalizarea funcțiilor sexuale:

- Shu – C8 Shaofu, MC8 Laogong, R3 Taixi, C7 Shenmen;
- Shu-post. – V15 Xinshu, V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- & – VG4 Mingmen, E17 Ruzhong (presopunctura ușoară), V35 Huiyang.

Formule

- R3 + C8 + "formula celor șase puncte ale impotenței";
- Yintang + VB13 + VG24 + R3 + C5 + VG4.

XI.8. Spermatoreea

Modelul clinic 282

Spermatoreea

[Afectarea Esenței de Umiditate-Căldură]

Simptome

emisii seminale frecvente, cantități mici de spermă în urină, urină tulbure, urinare dificilă (uneori cu durere); gust amar; iritabilitate, insomnie; scaune moi cu miros fetid, tenesme; senzație de plenitudine în cutia toracică și abdomen. *Limba* – roșie cu depozit galben. *Pulsul* – moale și rapid sau dispersat.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, eliminarea Umidității, armonizarea Focarului Mediu și restabilirea controlului asupra Esenței:

- Shu – E36 Zusanli, C7 Shenmen, F3 Taichong, VB43 Xiayi;
Shu-post. – V20 Pishu, V27 Xiaochangshu, V28 Pangguangshu, V23 Shenshu;
Mu-ant. – VC3 Zhongji;
Lo – C5 Tongli, RP6 Sanyinjiao.

Formule

- V15 + V23 + VC4 + F4;
- RP6 + VC6.

Modelul clinic 283

Spermatoreea

[Dezarmonia Inimă-Rinichi]

Simptome

emisii seminale în cursul nopții; insomnie cu visuri; căldură în "cinci inimi"; tinitus; palpitații; astenie; diminuarea memoriei, frică; gură uscată; urină roșietică. *Limba* – roșie. *Pulsul* – subțire, rapid.

Tratamentul

armonizarea Rinichilor și Inimii, restabilirea controlului asupra Esenței:

- Shu – F4 Zhongfeng, C7 Shenmen;
Shu-post. – V15 Xinshu, V23 Shenshu (moxa);
Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
& – V30 Baihuanshu.

Formule

- VC4 + R12 + V52 + V15 + C7 + MC6;
- V15 + V23 + V52 + R3;
- VC4 + R12 + C7 + R3.

Modelul clinic 284

Spermatoreea

[Insuficiența Rinichilor cu pierderea controlului asupra "Porții Esenței"]

Simptome

emisii seminale frecvente în timpul somnului (în absența visurilor); slăbiciuni și dureri în regiunea lombară și genunchi; uscăciune în gât; iritabilitate; tinitus, diminuarea memoriei; astenie, epuizare. *Limba* – roșie cu depozit neînsemnat. *Pulsul* – profund și subțire sau dispersat.

Tratamentul

fortificarea Rinichilor și restabilirea controlului asupra Esenței:

- Shu – R3 Taixi, C7 Shenmen;
- Shu-post. – V23 Shenshu (moxibustie);
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
- Xi – C6 Yinxi;
- & – V52 Zhishi, V43 Gaohuangshu, VG20 Baihui.

Formule

- V15 + V30 + V23 (acupunctură 2 minute) + VC4 + RP6 (moxibustie 3–5 conuri; formula antică);
- V23 + V52 + VC6 + RP6 + VG1;
- RP6 + VC6;
- VC4 + R12 + V52 + V23 + R3 + E36;
- V23 + VG4 + E36;
- RP9 + R2 + VG4 + V52.

Modelul clinic 285

Spermatoreea

[Insuficiența Qi a Inimii și Splinei cu pierderea controlului asupra Esenței]

Simptome

emisii seminale după oboseală fizică sau mintală; palpitații; insomnie, diminuarea memoriei; piele palidă; slăbiciune în membre; inapetență, scaune moi. *Limba* – palidă cu depozit subțire. *Pulsul* – slab sau dispersat.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Inimii și a Splinei, restabilirea controlului asupra Esenței:

- Shu – C7 Shenmen, E36 Zusanli;

- Shu-post. – V15 Xinshu, V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan, E25 Tianshu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VC6 Qihai, VG20 Baihui.

Formule

- V15 + V30 + V43 + VC4;
- VC6 + RP6;
- VG4 + VG3 + V23 + V52 + R3;
- VC6 + RP6 + VC4 + R12 + R3.

XI.9. Sterilitatea masculină

Modelul clinic 286

Sterilitatea

[Insuficiența Esenței Rinichilor /Insuficiența Qi a Splinei /
Disfuncția meridianelor Ren Mai și Chong Mai]

Simptome

sterilitatea se asociază cu semne de Insuficiență Yang-Qi sau Yin-Qi a Rinichilor; dureri lombare, slăbiciune în genunchi; senzație de greutate în corp; tulburări digestive; astenie. *Limba și pulsul* sunt în funcție de sindromul predominant.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Rinichilor, Splinei și a meridianelor Ren Mai, Chong Mai:

- Shu – R3 Taixi, E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan;
- Shu-post. – V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – V52 Zhishi, V32 Ciliao, VC6 Qihai.

Formule

- R12 + VC2 + RP6 (acupunctura) + VC4 (moxibustie; formula antică);
- VG4 + VC4 + RP6 + V23 + R3 (tonifiere; formulă indicată în oligospermie);
- V23 + V52 + V32 + R3;
- VC4 + R12 + E36 + RP6;
- P7 + R6 + VC4;
- VC4 + RP4.

XII

Acupunctura în obstetrică și ginecologie

- XII.1. Menstrele neregulate**
- XII.2. Dismenoreea**
- XII.3. Amenoreea**
- XII.4. Sterilitatea**
- XII.5. Sindromul premenstrual**
- XII.6. Leucoreea**
- XII.7. Pruritul vulvar**
- XII.8. Malpoziția fetală**
- XII.9. Gestozele precoc**
- XII.10. Amenințarea de avort**
- XII.11. Eclampsia**
- XII.12. Retenția placentei**
- XII.13. Patologia lohiilor**
- XII.14. Durerile abdominale în postpartum**
- XII.15. Vertijul în postpartum**
- XII.16. Hipogalactia**
- XII.17. Mastita**
- XII.18. Mastopatia fibrochistică**
- XII.19. Prolapsul uterin**
- XII.20. Fibromul uterin**
- XII.21. Diminuarea libidoului**

XII.1. Menstrele neregulate

Modelul clinic 287

Menstrele în avans

[Căldura Xue]

Simptome

senzație de căldură, față roșie, gură uscată, buze roșii; irascibilitate, neliniște, agitație psihomotorie, insomnie, fatigabilitate, amețeli; menstrre în avans, dureroase, abundente, sânge menstrual roșu-închis cu miros neplăcut; sunt posibile hematuria, hematemeza, hemoragiile nazale și alte hemoragii; urină galbenă-închis. *Limba* – roșie-purpurie, cu depozit galben și uscat. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, armonizarea Xue, reglarea funcției meridianelor Chong Mai și Ren Mai, normalizarea ciclului menstrual:

Shu – GI11 Quchi, RP1 Yinbai;
Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – RP10 Xuehai.

Formule

- GI11 + RP6 + VC6 + E36 (acupunctura 20 minute) + RP1 (moxibustie 30 minute);
- VC3 + GI11 + RP10;
- F2 + VC3 + GI11.

Modelul clinic 288

Menstrele în avans

[Stagnarea Qi a Ficatului cu transformarea în Foc]

Simptome

menstre în avans (abundente sau în cantitate mică); senzație de distensie sau durere în hipocondru, glandele mamare sau abdomenul inferior; senzație de arsură în hipocondru, constipație, gust amar; amețeli, cefalee; facies și ochi hiperemiați; iritabilitate; urină galbenă. *Limba* – roșie, uscată, cu depozit galben. *Pulsul* – întins, rapid.

Tratamentul

Înlăturarea Stagnării Qi a Ficatului, diminuarea Focului, reglarea funcției meridianelor Chong Mai și Ren Mai, normalizarea ciclului menstrual:

Shu – F2 Xingjian;
Mu-ant. – F14 Qimen, VC4 Guanyuan;
Lo – MC6 Neiguan, RP6 Sanyinjiao;
Xi – RP8 Diji;

& – RP10 Xuehai.

Formule

- F2 + RP6 + VC6 + E36 (acupunctura 20 minute) + RP1 (moxibustie 30 minute);
- F2 + VC6 + TR6 + E29 + RP8 + F13.

Modelul clinic 289

Menstrele în avans

[Insuficiența Qi]

Simptome

menstre în avans, profuze (sânge de culoare deschisă); respirație scurtă; fatigabilitate, fațes palid; palpitații; senzație de gol sau greutate în abdomenul inferior. *Limba* – palidă, cu depozit subțire și umed. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Qi, reglarea meridianelor Chong Mai și Ren Mai, normalizarea ciclului menstrual:

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – RP10 Xuehai, VC6 Qihai.

Formule

- VG20 + RP6 + VC6 + E36 (acupunctura 20 minute) + RP1 (moxibustie 30 minute);
- VG20 + VC4 + R8 + R10 + E36.

Modelul clinic 290

Menstrele în avans

[Insuficiența Yin-Qi / Căldură Internă]

Simptome

menstre în avans, în cantitate mică; fațes palid cu pomeți hiperemizați, senzație de căldură în a doua jumătate a zilei și noaptea, uscăciune în gură și gât, sete; insomnie, amețeli. *Limba* – roșie, cu depozit subțire sau fără depozit ("limbă cheală"). *Pulsul* – filiform și rapid.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi, diminuarea Căldurii Interne, reglarea funcției meridianelor Chong Mai și Ren Mai, normalizarea ciclului menstrual:

- Shu – R2 Rangu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – RP10 Xuehai.

Formule

- R2 + RP6 + VC6 + E36 (acupunctura 20 minute) + RP1 (moxibustie 30 minute);
- VC3 + GI11 + RP6 + RP10 + R2 (dispersie) + R10 (tonifiere; formula antică).

Modelul clinic 291

Menstrele tardive

[Stagnarea Qi a Ficatului / Stagnarea Xue]

Simptome

menstre tardive, sânge în cantitate mică, de culoare normală; dureri cu senzație de distensie în abdomenul inferior, senzație de greutate, distensie, durere sau disconfort în hipocondru (ameliorare după oftat); depresie psihică. *Limba* – palidă sau cianotică. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

dinamizarea Qi și Xue, reglarea meridianelor Chong Mai și Ren Mai, normalizarea ciclului menstrual:

- | | | |
|---------|---|---------------------------|
| Shu | - | F1 Dadun, F3 Taichong; |
| Mu-ant. | - | VC4 Guanyuan; |
| Lo | - | RP6 Sanyinjiao, F5 Ligou; |
| Xi | - | R8 Jiaoxin; |
| & | - | VC6 Qihai, RP10 Xuehai. |

Formule

- F3 + RP6 + GI4 + V17 (acupunctura 30 minute) + VC4 (moxibustie 30 minute);
- VC6 + TR6 + E29 + RP8 + F3 + VB20 + F13;
- RP8 V17 + VC4;
- VC6 + R13.

Modelul clinic 292

Menstrele tardive

[Excesul de Frig]

Simptome

dureri intense și senzații de frig în regiunea inferioară a abdomenului; extremități reci, frison, ameliorare la cald; facies palid; depresie psihică, pacientele dorm ghemuite; menstre tardive, sânge menstrual roșu, în cantitate mică. *Limba* – cu depozit alb, subțire. *Pulsul* – profund, încordat.

Tratamentul

încălzirea organismului, înlăturarea Frigului, reglarea meridianelor Chong Mai și Ren Mai, normalizarea ciclului menstrual:

- | | | |
|---------|---|----------------------------|
| Shu | - | E36 Zusanli; |
| Mu-ant. | - | E25 Tianshu, VC4 Guanyuan; |
| Lo | - | RP6 Sanyinjiao; |

& – VC6 Qihai, E29 Guilai.

Formule

- VC6 + RP6 + GI4 + V17 (acupunctura 30 minute) + VC4 (moxibustie 30 minute);
- V25 + V20 + VC6 + V23;
- E29 + E25;
- E36 + VC4;
- VC6 + R13.

Modelul clinic 293

Menstrele tardive

[Insuficiența Yang-Qi; Frig Intern]

Simptome

menstre tardive, sânge de culoare deschisă, în cantități mici; dureri surde abdominale (cu ameliorare la presare); respirație scurtă; ten palid; membre reci; senzație de slăbiciune și greutate în regiunea lombară; pleoape și față tumefiate după somn; edem al membrelor inferioare; diaree. *Limba* – palidă, tumefiată, umedă, cu depozit alb neînsemnat. *Pulsul* – profund, lent și slab.

Tratamentul

fortificarea Yang-Qi, încălzirea organismului, reglarea meridianelor Chong Mai și Ren Mai, normalizarea ciclului menstrual:

- Shu – R3 Taixi;
- Shu-post. – V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VC6 Qihai, VG4 Mingmen.

Formule

- VG4 + RP6 + GI4 + V17 (acupunctura 30 minute) + VC4 (moxibustie 30 minute);
- VC4 + VC6 + E29 + E36 + RP4;
- VC6 + R13.

Modelul clinic 294

Menstrele tardive

[Insuficiența Qi a Splinei / Insuficiența Xue]

Simptome

sânge menstrual roșu-pal, în cantitate mică; astenie, ten palid, buze palide; apetit scăzut, dureri surde în abdomen, senzație de gol în abdomenul inferior, scaune moi; palpitații. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab și filiform.

Tratamentul

potențarea Qi a Splinei, fortificarea Xue, reglarea meridianelor Chong Mai și Ren Mai, normalizarea ciclului menstrual:

- Shu – E36 Zusanli, RP3 Taibai;

- Shu-post. – V20 Pishu, V17 Geshu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan, VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VC6 Qihai, RP10 Xuehai.

Formule

- E36 + V20 + RP6 + GI4 + V17 (acupunctura 30 minute) + VC4 (moxibustie 30 minute);
- VC4 + VC12 + RP6 + E36 + VG20;
- VC6 + R13.

Modelul clinic 295

Menstrele tardive

[Insuficiența Xue în Ficat]

Simptome

menstre cu dureri surde de lungă durată, scurgeri menstruale rare sau amenoree; amețeli, paloare, lipotimie, senzație de vâl în fața ochilor; ochi uscați; palpitații; depresie psihică, lipsa poftei de mâncare; membre amorțite, senzații de furnicături. Dereglările pot apărea după pierderi excesive de sânge, după boli cronice. *Limba* – palidă, fără depozit sau cu depozit subțire. *Pulsul* – gol, subțire, slab.

Tratamentul

producerea Xue, reglarea meridianelor Chong Mai și Ren Mai, normalizarea ciclului menstrual;

- Shu – E36 Zusanli, F8 Ququan;
- Shu-post. – V17 Geshu, V18 Ganshu, V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – RP10 Xuehai.

Formule

- F8 + V20 + RP6 + GI4 + V17 (acupunctura 30 minute) + VC4 (moxibustie 30 minute);
- VC4 + RP6 + RP10 + E36;
- V17 + V20 + V43.

Modelul clinic 296

Alternarea menstrelor tardive cu cele în avans

[Stagnarea Qi a Ficatului]

Simptome

depresie, irascibilitate; dureri și senzație de distensie în hipochondru și regiunea costală, balonare în abdomen, senzație de distensie în glandele mamare și abdomenul inferior; senzație de corp străin în gât, regurgitații, inapetență. Dereglările se instalează după emoții negative pronunțate, la femei cu depresie, frustrație. *Limba* – normală, cu depozit neînsemnat. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

restabilirea circulației Qi, reglarea meridianelor Ren Mai și Chong Mai, normalizarea ciclului menstrual:

- Shu – TR6 Zhigou, F3 Taichong;
- Shu-post. – V18 Ganshu, V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan, F14 Qimen, E25 Tianshu;
- Xi – R8 Jiaoxin;
- Lo – RP6 Sanyinjiao.

Formule

- TR6 + F3 + RP6 + VC3 + V18 (armonizare 15–20 minute);
- VC6 + R14;
- F5 + VC3 + Zigong^{*};
- VC6 + TR6 + E29 + RP8 + F3 + VB20 + F13;
- RP6 + VC6 + MC6 + F3 + F14.

Modelul clinic 297

Alternarea menstrelor tardive cu cele în avans
[Insuficiența Qi a Inimii și a Splinei]

Simptome

astenie, apatie, aspect epuizat; menstreregulate; ten pământiu al feței; palpitații; insomnie sau somn tulburat de coșmaruri, capacitate redusă de memorare; apetit scăzut, abdomen balonat, scaune moi. *Limba* – palidă, cu depozit subțire, albicios. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

potențarea Qi, armonizarea Inimii și a Splinei, reglarea meridianelor Chong Mai și Ren Mai, normalizarea ciclului menstrual:

- Shu – MC5 Jianshi;
- Shu-post. – V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, RP4 Gongsun;
- & – RP10 Xuehai, V43 Gaohuangshu.

Formule

- V15 + V20 + F3 + RP6 + VC3 + V18 (armonizare 15–20 minute);
- VC4 + VC12 + RP6 + E36 + Yintang;
- V15 + V20 + V43.

Modelul clinic 298

Alternarea menstrelor tardive cu cele în avans
[Insuficiența Qi a Rinichilor]

Simptome

menstre neregulate cu senzație de frig în regiunea lombară și în picioare; sânge în cantitate mică, de culoare roșie-deschis; aste-

^{*} Zigong – la 2 cun lateral de punctul VC3 Zhongji.

nie; dureri lombare; facies palid; atonia mușchilor părții inferioare a peretelui abdominal; diminuarea auzului, tinitus; urinare frecventă în cursul nopții; scaune moi. *Limba* – palidă, cu depozit alb, subțire. *Pulsul* – profund și gol.

Tratamentul

fortificarea Rinichilor, reglarea meridianelor Chong Mai și Ren Mai, normalizarea ciclului menstrual:

- Shu – R3 Taixi;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Shu-post. – V23 Shenshu;
- Xi – R5 Shuiquan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VG4 Mingmen, VC6 Qihai.

Formule

- V23 + F3 + RP6 + VC3 + V18 (armonizare 15–20 minute);
- VG20 + VC4 + R8 + R10 + E36;
- VG4 + VG20 + V23 + V32.

XII.2. Dismenoreea

Modelul clinic 299

Dismenoreea

[Stagnarea Qi a Ficatului]

Simptome

dureri cu senzație de distensie în abdomenul inferior, hipocondru, glandele mamare; culoarea și cantitatea sângelui menstrual pot fi normale. Această variantă a dismenoreei este tipică pentru femei tinere, necăsătorite, care sunt expuse la stresuri emoționale cronice. *Limba* – cu depozit gros sau normal. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

dinamizarea Qi, armonizarea Ficatului și a proceselor psihice:

- Shu – F3 Taichong, VB34 Yanglingquan;
- Mu-ant. – E25 Tianshi;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
- Xi – RP8 Diji;
- & – VC6 Qihai.

Formule antice

- VC3 + RP6 + RP10 (reținerea acelor 30 de minute; în toate punctele acele se introduc oblic, sub un unghi de 15°: în punctul VC3 Zhongji vârful acului este orientat în jos, în punctele RP6 Sanyinjiao și RP10 Xuehai – în sus);
- VC6 + VC3 + E29 + GI4 + RP6 + MC6 + F3 (înaintea menstruelor sau în timpul durerilor);
- V18 + V25 + V32 + GI4 + RP6 (după terminarea menstruelor).

Modelul clinic 300

Dismenoreea

[Stagnarea Qi a Ficatului / Stagnarea Xue]

Simptome

dureri și balonare în abdomenul inferior, la palpare uneori se determină indurații în această regiune; menstr. dureroase neregulate, senzație de distensie abdominală și durere în abdomenul inferior înainte și în timpul menstr.elor; sânge menstrual roșu-închis cu cheaguri, după eliminarea acestor cheaguri durerile diminuează; senzație de distensie sau durere în hipocondru și glandele mamare. *Limba* – groasă, cu depozit galben sau alb, uneori limbă purpurie, cu echimoze la margini. *Pulsul* – întins, profund și rugos.

Tratamentul

Înlăturarea stărnării Qi și Xue, normalizarea ciclului menstrual:

- Shu – F3 Taichong;
- Shu-post. – V17 Geshu, V20 Pishu;
- Xi – RP8 Diji;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – RP10 Xuehai, VB26 Daimai, VC6 Qihai.

Formule

- E29 + VC3 + RP10 + V32 + V18 + V24 (tratamentul se începe cu 7 zile înainte de ciclul menstrual și continuă până la sfârșitul ciclului);
- RP4 + MC6 + VC3;
- VC6 + F3 + F14 + MC6 + RP6;
- RP8 + E30 + GI4 + VC3;
- V24 + V32 + V60 + RP6 + GI4;
- V17 + V26 + V32.

Modelul clinic 301

Dismenoreea

[Stagnarea Umidității-Frigului]

Simptome

dureri severe înainte sau în timpul ciclului menstrual cu senzație de rece în abdomenul inferior (durerea diminuează la aplicarea căldurii și se intensifică la rece și umiditate); sânge în cantitate mică de culoare roșie-deschis, cu cheaguri; senzație de greutate în corp și membre; greață, scaune moi. *Limba* – umedă, cu depozit albicios. *Pulsul* – încordat și adânc.

Tratamentul

eliminarea Umidității, încălzirea organismului, normalizarea ciclului menstrual:

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V20 Pishu, V23 Shenshu;

- Mu-ant. – VC3 Zhongji, VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, RP4 Gongsun;
- Xi – RP8 Diji;
- & – E28 Shuidai, E29 Guilai, VG4 Mingmen.

Formule antice

- VC3 + VC4 + RP4 (înaintea menstrelor sau în timpul durerii);
- VG4 + V20 + V23 + V32 + GI4 + RP6 (după terminarea menstrelor);
- VC4 + E28 + RP8 + VG4 + V23 (ace fierbinți);
- VG4 + VB26 + VC4 (acupunctura + moxibustia).

Modelul clinic 302

Dismenoreea

[Insuficiența Qi și Xue]

Simptome

menstre dureroase (durere surdă, care diminuează la presare, în special la finele ciclului), sânge de culoare roșie-deschis; fatigabilitate, astenie; piele și buze palide; vertij, diminuarea memoriei. Menstrele dureroase apar după maladii cronice, hemoragii, alimentație insuficientă. *Limba* – palidă și subțire, cu depozit subțire. *Pulsul* – filiform și slab.

Tratamentul

fortificarea Qi și Xue, normalizarea ciclului menstrual;

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V21 Weishu, V17 Geshu, V20 Pishu, V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC3 Zhongji, VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – E29 Guilai, RP10 Xuehai, V43 Gaohuangshu.

Formule antice

- VC3 + E29 + GI4 + RP6 + VC4 + E36 + RP10 (înaintea menstrelor sau în timpul durerii);
- V18 + V20 + V23 + V43 + GI4 + E36 + RP6 (după terminarea menstrelor);
- E36 + RP6 + VC6 + V20 + V21;
- E36 + VC6 + VC4.

Modelul clinic 303

Dismenoreea

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului și a Rinichilor]

Simptome

dureri în abdomenul inferior în timpul sau după ciclul menstrual (durerea diminuează la presare), sânge de culoare roz; senzație de căldură în "cinci inimi"; amețeli, tinitus; uscăciune în gât; dureri lombare și la nivelul genunchilor; transpirații nocturne; oboseală. *Limba* – roșie cu depozit neînsemnat. *Pulsul* – rapid, filiform.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi, normalizarea ciclului menstrual:

- Shu – E36 Zusanli, R3 Taixi;
- Shu-post. – V18 Ganshu, V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – R6 Zhaohai.

Formule

- V18 + V23 + VC4 + E36 + R6;
- V23 + VC4 + F3.

XII.3. Amenoreea

Modelul clinic 304

Amenoreea

[Stagnarea Qi și Xue]

Simptome

absența menstruelor după vârsta de 18 ani sau dispariția menstruelor mai mult de 3 luni; amenoree cu depresie psihică, frustrație, senzație de singurătate, frică, iritabilitate, senzație de disconfort sau distensie în cutia toracică, epigastru, hipocondru sau abdomen, greață. *Limba* – aspect diferit, poate fi cu pete purpurii. *Pulsul* – profund și rugos, întins.

Tratamentul

Înlăturarea stagnării Qi și Xue, normalizarea ciclului menstrual:

- Shu – GI4 Hegu, F1 Dadun, F3 Taichong, TR6 Zhigou;
- Mu-ant. – F14 Qimen, VC3 Zhongji, VC4 Guanyuan, VC17 Shanzhong;
- Lo – MC6 Neiguan, RP6 Sanyinjiao, RP4 Gongsun;
- Xi – RP8 Diji, R8 Jiaoxin;
- & – E29 Guilai, RP10 Xuehai.

Formule

- VC3 + R8;
- VC3 + P7 + R6 + VC6 + R8 + R13;
- VC3 + E29 + RP10 + F3 + GI4 + RP6;
- GI4 + E36; F3 + GI4;
- F1 + F14;
- Xuefu* + VC4 + E36 + RP6 + VC12 + F3 + V32;
- GI11 + TR6 + E36 + RP6.

* Xuefu – la 4 cun lateral de apofiza spinoasă L2.

Modelul clinic 305

Amenoreea

[Stagnarea Xue / Frig]

Simptome

absența menstruelor după vârsta de 18 ani; dispariția menstruelor mai mult de 3 luni; frison, senzație de rece în membre, abdomenul inferior; durere în abdomenul inferior (ameliorare la cald). Tulburările apar în urma consumului exagerat de alimente crude în asociere cu răcirea organismului. *Limba* – cu depozit alb. *Pulsul* – lent, încordat.

Tratamentul

Înlăturarea Frigului, dinamizarea Xue și normalizarea ciclului menstrual:

- | | | |
|---------|---|---|
| Shu | – | GI4 Hegu, F3 Taichong; |
| Mu-ant. | – | VC4 Guanyuan; |
| Xi | – | RP8 Diji; |
| Lo | – | RP6 Sanyinjiao; |
| & | – | VC2 Qugu, RP10 Xuehai, E29 Guilai, VG4 Mingmen. |

Formule

- E29 + VC3 + RP6;
- F3 + GI4;
- GI4 + RP6 + RP10 + E30;
- Xuefu + VC4 + E36 + RP6 + GI4 + V54 + VC3;
- VC3 + GI4 + RP6;
- V32 + E29 + RP10.

Modelul clinic 306

Amenoreea

[Stagnarea Xue / Umiditate-Flegmă]

Simptome

absența menstruelor după vârsta de 18 ani; dispariția menstruelor mai mult de 3 luni; amenoree la femei obeze; catar respirator cronic, somnolență; leucoree profuză; senzație de greutate în corp și membre. *Limba* – cu depozit alb sau galben, gras. *Pulsul* – alunecos sau profund și rugos.

Tratamentul

eliminarea Umidității și Flegmei, normalizarea ciclului menstrual:

- | | | |
|-----------|---|--|
| Shu | – | RP9 Yinlingquan, TR6 Zhigou, GI4 Hegu; |
| Shu-post. | – | V20 Pishu, V22 Sanjiaoshu; |
| Mu-ant. | – | VC3 Zhongji; |
| Lo | – | RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong; |
| Xi | – | RP8 Diji; |
| & | – | E30 Qichong, VC6 Qihai. |

Formule

- E40 + E30;
- GI4 + F3;
- VC3 + GI4 + RP6 + V21 + E40;
- V32 + E29 + RP10 + V20 + VC12 + E36;
- Xuefu + VC4 + E36 + RP6 + VC12 + V20 + E40.

Modelul clinic 307

Amenoreea

[Insuficiența Qi a Splinei / Insuficiența Qi și Xue / Insuficiența Esenței]

Simptome

absența menstruelor după vârsta de 18 ani sau dispariția menstruelor mai mult de 3 luni; amenoree cu astenie pronunțată (în special în cazul unei alimentații insuficiente, anorexiei, maladiilor cronice, depresiei psihice de lungă durată, hemoragiilor după naștere); vertij, buze și facies palid; scaune moi, inapetență; piele uscată; scădere în greutate; uitucie; tinitus. *Limba* – palidă și subțire. *Pulsul* – gol și subțire.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Qi și Xue, normalizarea ciclului menstrual;

- | | | |
|-----------|---|------------------------------------|
| Shu | - | E36 Zusanli, RP3 Taibai; |
| Shu-post. | - | V17 Geshu, V20 Pishu, V23 Shenshu; |
| Mu-ant. | - | VC4 Guanyuan, VC12 Zhongwan; |
| Lo | - | RP6 Sanyinjiao; |
| & | - | E29 Guilai, V43 Gaohuangshu. |

Formule

- V17 + V20 + RP3;
- V20 + E36 + RP3;
- V43 + V17;
- E29 + VC3;
- E36 + GI4 + RP6 + RP10 + V43;
- Xuefu + VC4 + E36 + RP6 + V20 + V21 + VC12 + E25;
- VC3 + GI4 + RP6 + MC6 + F3;
- V32 + E29 + RP10 + VC12 + F2;
- VC12 + VC4 + RP6;
- E25 + VC6 + E36;
- VC3 + V23 + VC6 + RP6.

Modelul clinic 308

Amenoreea

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului și a Rinichilor]

Simptome

absența menstruelor după vârsta de 18 ani sau dispariția menstruelor

lor mai mult de 3 luni; dureri lombare și dureri în articulațiile genunchilor; facies palid cu pomeți hiperemiați, subfebrilitate în a doua jumătate a zilei și noaptea; uscăciune în gură și gât, sete; insomnie; frigiditate; hipoacuzie, tinitus, amețeli; astenie, slăbire a capacității de memorare, transpirații nocturne; constipații. *Limba* – roșie, uscată, cu depozit subțire sau fără depozit ("limba cheală"); adesea pe linia mediană a limbii se formează o fisură adâncă, ce ajunge până la vârful limbii. *Pulsul* – filiform și întins.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi, armonizarea Ficatului și a Rinichilor, normalizarea ciclului menstrual:

- Shu – E36 Zusanli, R2 Rangu, R3 Taixi;
- Shu-post. – V17 Geshu, V18 Ganshu, V20 Pishu, V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – E29 Guilai, RP10 Xuehai, VC1 Huiyin.

Formula

Xuefu + VC4 + E36 + RP6 + V23 + VG4 + R3 + Zigong.

XII.4. Sterilitatea*

Modelul clinic 309

Sterilitatea

[Stagnarea Qi a Ficatului]

Simptome

sterilitate cu cicluri menstruale neregulate (alternând menstruații reduse cu cele abundente), dismenoree; senzație de disconfort și distensie dureroasă în hipocondru; depresie psihică, iritabilitate. *Limba* – normală. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

înlăturarea stăgnării Qi a Ficatului, armonizarea Qi și Xue:

- Shu – F3 Taichong;
- Mu-ant. – VC3 Zhongji, F14 Qimen;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – Zigong (Extra).

Formula

VC3 + VC6 + E29 + RP8 + F3 + GI4 + F14.

* Pentru tratamentul acupunctiv este necesar de exclus cauza masculină și cauzele locale (obstrucții tubare, malformații uterine etc.). Tratamentul acupunctiv se începe cu 12 zile înainte de a se începe ciclul menstrual.

Modelul clinic 310

Sterilitatea

[Stagnarea Qi a Ficatului / Stagnarea Xue]

Simptome

dureri în abdomenul inferior; menstrue dureroase și neregulate, sânge menstrual roșu-închis; senzație de distensie sau durere în hipocondru și glandele mamare. *Limba* – normală sau roșie-închis. *Pulsul* – întins, înnodat sau profund și rugos.

Tratamentul

Înlăturarea stagnării Qi și Xue:

Shu – F3 Taichong, GI4 Hegu;

Shu-post. – V18 Ganshu;

& – E29 Guilai, RP10 Xuehai.

Formule

– VC4 + Zigong + RP6 + GI4 + F3;

– R12 + V32 + E36.

Modelul clinic 311

Sterilitatea

[Flegmă și Stagnarea Xue]

Simptome

menstrue tardive, sânge menstrual cu cheaguri; leucoree profuză; senzație de plenitudine sau distensie în piept și hipocondru; iritabilitate; palpitații; sterilitatea apare la femei obeze sau care preferă mâncare picantă, adeseori pe fond de emoții negative pronunțate. *Limba* – roșie-închis, cianotică, cu depozit alb și lipicios. *Pulsul* – alunecos sau profund și rugos.

Tratamentul

dizolvarea Flegmei, înlăturarea Stagnării Xue:

Shu – E36 Zusanli, F3 Taichong;

Mu-ant. – VC3 Zhongji;

Lo – RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong;

Xi – RP8 Diji;

& – E30 Qichong, V33 Zhongliao, Zigong (Extra).

Formule

– F3 + MC6;

– VC3 + E30 + R14.

Modelul clinic 312

Sterilitatea

[Căldura Xue]

Simptome

sterilitate la femei cu cicluri scurte și flux menstrual abundent; agitație psihică, insomnii; uscăciune a gurii fără dorința de a bea; sunt posibile diferite hemoragii (epistaxis, hematurie, metroragie

etc.); hiperemie a feței. *Limba* – roșie. *Pulsul* – mare, rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii Xue:

- | | | |
|---------|---|------------------------------|
| Shu | – | F2 Xingjian; |
| Mu-ant. | – | VC3 Zhongji; |
| Lo | – | RP6 Sanyinjiao; |
| & | – | RP10 Xuehai, Zigong (Extra). |

Formula

VC3 + RP6.

Modelul clinic 313

Sterilitatea

[Insuficiența Qi a Splinei]

Simptome

sterilitate cu cicluri lungi și flux menstrual redus; leucoree profuză; astenie; inapetență, distensie abdominală, scaune moi. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

tonifierea Qi a Splinei:

- | | | |
|-----------|---|---------------------------|
| Shu | – | E36 Zusanli, RP3 Taibai; |
| Shu-post. | – | V21 Weishu, V20 Pishu; |
| Lo | – | RP6 Sanyinjiao; |
| & | – | Zigong (Extra), E13 Qihu. |

Formule

- RP4 + MC6 + R13;
- VC4 + VC12 + E29 + E36 + RP6 + GI4;
- V17 + V20 + V23 + V43 + V32.

Modelul clinic 314

Sterilitatea

[Insuficiența Qi a Rinichilor / Insuficiența Esenței]

Simptome

senzații neplăcute sau dureri în regiunea lombară, slăbiciune sau dureri în articulațiile genunchilor; micțiuni frecvente (mai ales noaptea) cu urină clară; astenie, membre reci; menstrre neregulate sau în cantitate mică, cicluri lungi cu flux menstrual redus, sânge de culoare roșie-deschis. Sterilitatea apare după o activitate sexuală excesivă sau la femei cu constituție ereditară slabă. *Limba* – palidă, cu depozit subțire și alb. *Pulsul* – adânc și slab sau dispersat.

Tratamentul

fortificarea Rinichilor, reglarea meridianelor Ren Mai și Chong Mai:

- | | | |
|-----------|---|------------------------|
| Shu | – | R2 Rangu, E36 Zusanli; |
| Shu-post. | – | V23 Shenshu; |

- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – R13 Qixue, Zigong (Extra), VG4 Mingmen, E30 Qichong.

Formule

- VC2 + E29 + R12 + RP10;
- RP6 + VC4 + RP8 + E28;
- E29 + R12 + VC2 + RP10;
- V23 + VG4 + RP6 + R3;
- VC3 + E28 + E29 + RP6.

Modelul clinic 315

Sterilitatea

[Retenția Frigului în Uter]

Simptome

menstre tardive, sânge de culoare roz-închis în cantitate mică; senzație de rece și dureri în abdomenul inferior, membre reci; urină clară în cantitate mare; sterilitatea apare în urma răcirii (în special în timpul menstruelor). *Limba* – palidă, cu depozit alb și subțire. *Pulsul* – lent și profund, încordat.

Tratamentul

dispersia Frigului, încălzirea uterului:

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC3 Zhongji;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VC2 Qugu, VG4 Mingmen, VC6 Qihai, E29 Guilai, E30 Qichong, Zigong (Extra), VC8 Shenque (moxibustie).

Formule

- VC4 + Zigong + RP6 + VG4 + V23 + E36;
- R12 + VC8;
- V23 + VG4 + V52 + VC4.

Modelul clinic 316

Sterilitatea

[Insuficiența Xue]

Simptome

sânge menstrual în cantitate mică, de culoare roz-pal; sterilitatea apare la femei cu o constituție ereditară slabă, în urma hemoragiilor masive, maladiilor grave cronice; astenie fizică și psihică, cefalee, tinitus, vertij, uitucie; diverse ceneștopatii; piele și buze palide. *Limba* – palidă și subțire, cu depozit alb și subțire. *Pulsul* – filiform și slab.

Tratamentul

fortificarea Xue, reglarea meridianelor Ren Mai și Chong Mai:

- Shu – E36 Zusanli;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – E13 Qihu, E30 Qichong, Zigong (Extra), RP10 Xuehai.

Formule

- VC4 + Zigong + RP6 + V18 + E36;
- R12 + RP10 + V23 + R6.

XII.5. Sindromul premenstrual

Modelul clinic 317

Sindromul premenstrual

[Stagnarea Qi a Ficatului]

Simptome

durere și senzație de distensie în abdomen și hipocondru, tumefiere a sânilor; iritabilitate, depresie psihică, frustrație. *Limba* – roșie (în special la margini). *Pulsul* – întins.

Tratamentul

restabilirea circulației Qi a Ficatului, normalizarea funcțiilor psiho-endocrine:

- Shu – TR6 Zhigou, VB34 Yanglingquan, VB41 Zulinqi, F3 Taichong;
- Shu-post. – V18 Ganshu;
- Mu-ant. – E25 Tianshu, VC17 Shanzhong, F14 Qimen;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
- & – VC2 Qugu, VC6 Qihai.

Formule

- F2 + F3 + VB40 + TR6 + F14 + V18 (formulă cu efect de dinamizare Qi și armonizare a Ficatului);
- F1 + F14;
- VB34 + F3; MC6 + F3;
- F3 + F14 + MC6.

Modelul clinic 318

Sindromul premenstrual

[Flegma-Foc]

Simptome

nelinește, iritabilitate, accese de nebunie cu dezorientare în spațiu sau somnolență, depresie psihică, agresivitate; senzație de căldură, fațes roșu; senzație de opresiune în cutia toracică; constipație; urină galbenă. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – rapid

și alunecos.

Tratamentul

diminuarea Flegmei și a Focului, armonizarea Qi și Xue, normalizarea funcțiilor psiho-endocrine:

Shu – GI11 Quchi, RP9 Yinlingquan, MC7 Daling;
Shu-post. – V20 Pishu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
Lo – E40 Fenglong, RP4 Gongsun, MC6 Neiguan;
& – VG14 Dazhui, VG24 Shenting.

Formula

E40 + MC7 + GI11.

Modelul clinic 319

Sindromul premenstrual

[Insuficiența Yang-Qi a Splinei și a Rinichilor]

Simptome

ciclu menstrual lung, cu sânge fără cheaguri, în cantitate redusă; depresie psihică, astenie; senzație de slăbiciune și greutate în regiunea lombară și membrele inferioare; facies tumefiat, ten palid; membre reci; diaree matinală; diminuarea dorinței sexuale. *Limba* – palidă, tumefiată. *Pulsul* – profund și slab.

Tratamentul

fortificarea Yang-Qi, armonizarea Splinei și a Rinichilor, normalizarea funcțiilor psiho-endocrine:

Shu – E36 Zusanli, R3 Taixi, F3 Taichong;
Shu-post. – V20 Pishu, V23 Shenshu;
Mu-ant. – VC4 Guanyuan, VC12 Zhongwan, E25 Tianshu;
Lo – RP6 Sanyinjiao, P7 Lieque;
& – R6 Zhaohai.

Formula

R6 + P7.

Modelul clinic 320

Sindromul premenstrual

[Insuficiența Qi a Rinichilor / Hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului]

Simptome

hipersensibilitate emoțională, iritabilitate, cu agravare la oboseală sau stres, cefalee; vertij, tinitus; dureri lombare; posibile edeme. *Limba* – palidă, cu marginile roșii. *Pulsul* – subțire și întins.

Tratamentul

fortificarea Rinichilor, diminuarea Yang-Qi a Ficatului și normalizarea funcțiilor psiho-endocrine:

Shu – VB34 Yanglingquan, R3 Taixi, TR6 Zhigou;
Mu-ant. – VC4 Guanyuan;

- Lo – RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
& – VB1 Tongzilliao, VB20 Fengchi, VG20 Baihui.

Formula

VB34 + VB20 + MC6.

Modelul clinic 321

Sindromul premenstrual

[Insuficiența Qi a Splinei / Hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului]

Simptome

dispoziție depresivă, iritabilitate, cefalee cu ameliorare după mâncare și agravare la foame; posibile edeme; preferință de gust dulce. *Limba* – palidă, cu depozit alb. *Pulsul* – întins sau gol, posibil alunecos.

Tratamentul

fortificarea Splinei, diminuarea Yang-Qi a Ficatului, normalizarea funcțiilor psiho-endocrine:

- Shu – E36 Zusanli, F3 Taichong;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
Lo – RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong;
& – VB20 Fengchi.

Formule

- VB20 + VB14 + Taiyang;
- E40 + VC6;
- VC12 + E36;
- F3 + RP6;
- E36 + RP6 + VB41 + VB21.

Modelul clinic 322

Sindromul premenstrual

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului și a Rinichilor / Focul Ficatului]

Simptome

senzație ușoară de distensie a sânilor și iritabilitate înainte de ciclul menstrual; dureri lombare și la nivelul genunchilor; amețeli, tinitus, tulburări de vedere; diminuarea memoriei, insomnie; uscăciune a ochilor și a gâtului, senzație de căldură în "cinci inimi". *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – întins, fin și rapid.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi, armonizarea Ficatului și a Rinichilor, normalizarea funcțiilor psiho-endocrine:

- Shu – R3 Taixi, F3 Taichong, F8 Ququan, F2 Xingjian;
Mu-ant. – VC4 Guanyuan, VC5 Shimen;
Xi – R5 Shuiquan;
Lo – RP6 Sanyinjiao.

Formule

- F2 + MC6 + MC8 (dispersie) + R6 (tonifiere; formula antică);

- F3 + MC6.

Modelul clinic 323

Sindromul premenstrual

[Insuficiența Xue în Ficat / Hiperactivitatea Yang-Qi a Ficatului]

Simptome

ciclu menstrual scurt; dureri în jurul mameloanelor; labilitate emoțională (indispoziție, depresie psihică, iritabilitate), insomnie; membre amorțite, senzații de furnicături; amețeli, senzație de vâi în fața ochilor, ochi uscați. *Limba* – palidă, subțire. *Pulsul* – subțire sau întins, profund, fin și rapid.

Tratamentul

fortificarea Xue, armonizarea Qi și Xue, normalizarea funcțiilor psiho-endocrine:

- | | | |
|-----------|---|---|
| Shu | - | E36 Zusanli, VB34 Yanglingquan, F8 Ququan, F3 Taichong; |
| Shu-post. | - | V18 Ganshu, V20 Pishu, V23 Shenshu, V17 Geshu; |
| Mu-ant. | - | VC4 Guanyuan; |
| Lo | - | P7 Lieque, RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan; |
| Xi | - | C6 Yinxi; |
| & | - | R6 Zhaohai. |

Formule

- VB34 + F3 (armonizare) + VC4 + RP6 + F8 (tonifiere; formula antică);
- V20 + VC12 + E36.

XII.6. Leucoreea

Modelul clinic 324

Leucoreea

[Stagnarea Qi a Ficatului]

Simptome

secreție vaginală de culoare albă; ciclu menstrual neregulat și dismenoree; durere sau senzație de distensie în hipocondru; gust amar, constipație; depresie, iritabilitate. *Limba* – cu depozit alb. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

Înlăturarea stagnării Qi a Ficatului; reglarea meridianelor Ren Mai și Dai Mai:

- | | | |
|---------|---|---------------------------|
| Shu | - | TR6 Zhigou, F3 Taichong; |
| Mu-ant. | - | VC3 Zhongji; |
| Lo | - | RP6 Sanyinjiao, F5 Ligou; |
| Xi | - | F6 Zhongdu; |
| & | - | VB26 Daimai, VC6 Qihai. |

Formula

TR6 + F3 + GI4 + VB26.

Modelul clinic 325

Leucoreea

[Umiditate-Căldură]

Simptome

leucoree abundentă, groasă, de culoare gălbuie, cu miros fetid; anxietate, neliniște, insomnie; sete, fără dorință de a bea; hematurie; prurit vulvar. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – moale și rapid.

Tratamentul

dispersarea Căldurii, eliminarea Umidității și armonizarea meridianelor Ren Mai și Dai Mai:

Shu – RP9 Yinlingquan, F2 Xingjian;

Mu-ant. – VC3 Zhongji, VC4 Guanyuan;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – RP10 Xuehai, V32 Ciliao, VB26 Daimai, VC6 Qihai.

Formule

- VC6 + R7;
- V32 + V26 + VB34 + RP6 + RP9;
- VC3 + F5 + RP6 + MC6;
- VC3 + VB26 + E29 + RP6 + RP9;
- F2 + F8 + VC3 + MC5;
- F1 + VB26 + VB41.

Modelul clinic 326

Leucoreea

[Flegmă-Umiditate]

Simptome

leucoree abundentă (în special la femei obeze); astenie, senzație de greutate în corp, abdomen, torace și regiunea cefalică; absența gustului, inapetență. *Limba* – cu depozit lipicios, gros. *Pulsul* – moale sau alunecos.

Tratamentul

fortificarea Splinei, dispersarea Umidității și Flegmei, reglarea meridianelor Ren Mai și Dai Mai:

Shu – E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan;

Mu-ant. – VC12 Zhongwan, VC3 Zhongji;

Lo – RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong;

& – VB26 Daimai, VC6 Qihai, V32 Ciliao.

Formula

E40 + VB26 + VC3.

Modelul clinic 327

Leucoreea

[Insuficiența Qi a Splinei]

Simptome

secreție vaginală sporită, de culoare albă, apoasă, fără miros; astenie; membre reci; scaune moi, inapetență; edeme ale membrilor inferioare, piele palidă. *Limba* – palidă, cu amprente dentare. *Pulsul* – slab și gol.

Tratamentul

fortificarea Splinei și armonizarea meridianelor curioase Ren Mai și Dai Mai:

- | | | |
|-----------|---|------------------------------|
| Shu | – | E36 Zusanli; |
| Shu-post. | – | V20 Pishu; |
| Mu-ant. | – | VC12 Zhongwan, VC4 Guanyuan; |
| Lo | – | RP6 Sanyinjiao; |
| & | – | VB26 Daimai, VC6 Qihai. |

Formule

- VB26 + V30 + VC6 + RP6 + E36;
- VC6 + VC3 + RP6 + RP9 + E36 + VB26.

Modelul clinic 328

Leucoreea

[Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor]

Simptome

secreție vaginală de culoare albă, apoasă; piele palidă; membre reci, senzație de rece în abdomenul inferior; lombalgie, slăbiciune a genunchilor; scaune moi. *Limba* – palidă, cu depozit alb și subțire. *Pulsul* – profund și slab.

Tratamentul

potențarea Yang-Qi a Rinichilor și reglarea meridianelor Ren Mai, Chong Mai și Dai Mai:

- | | | |
|-----------|---|--|
| Shu | – | R2 Rangu; |
| Shu-post. | – | V23 Shenshu; |
| Mu-ant. | – | VC4 Guanyuan; |
| Lo | – | RP6 Sanyinjiao; |
| & | – | VB26 Daimai, VC6 Qihai, VG4 Mingmen, V32 Ciliao. |

Formule

- VC4 + VB26 + V23 + V32 + R6;
- VG20 + VC4 + E28 + E36 + R7;
- VG20 + VG4 + V20 + V23 + V32.

XII.7. Pruritul vulvar

Modelul clinic 329

Pruritul vulvar

[Umiditate-Căldură]

Simptome

secreție vaginală spumoasă, de culoare galbenă, miros fetid; prurit vaginal; micțiuni frecvente cu senzație de arsură în uretră; gust amar, sete; agitație, nervozitate. *Limba* – roșie, cu depozit galben și gros. *Pulsul* – moale și rapid.

Tratamentul

eliminarea Umidității și a Căldurii, înlăturarea pruritului:

- | | | |
|---------|---|--|
| Shu | – | C8 Shaofu, F8 Ququan, RP9 Yinlingquan, V40 Weizhong; |
| Mu-ant. | – | VC3 Zhongji; |
| Lo | – | RP6 Sanyinjiao, F5 Ligou; |
| & | – | VC1 Huiyin, VC6 Qihai, VG1 Changqiang, F11 Yinlian, V34 Xialiao. |

Formule

- E30 + VC3 + VC1 + RP9 + RP6 + R6 + F3 (reținerea acelor timp de 30 minute; două proceduri pe săptămână);
- VC1 + P7 + R6 + VC6;
- V32 + V26 + VB34 + RP6 + RP9;
- VB26 + VB41 + VC3 + RP6 + TR5;
- F2 + F5.

Modelul clinic 330

Pruritul vulvar

[Căldura Xue]

Simptome

prurit vaginal cu senzație de uscăciune și arsură în vagin, pruritul se agravează în orele de seară; tegumente uscate cu scărpinat care determină apariția escoriațiilor; vagin atrofiat (cu absența pliurilor); sete; iritabilitate, insomnie. *Limba* – roșie. *Pulsul* – rapid, vast.

Tratamentul

refrigerarea Xue și înlăturarea pruritului:

- | | | |
|---------|---|---------------------------|
| Shu | – | C8 Shaofu, V40 Weizhong; |
| Mu-ant. | – | VC3 Zhongji; |
| Lo | – | F5 Ligou, RP6 Sanyinjiao; |
| & | – | RP10 Xuehai. |

Formule

- VC3 + RP1;
- C5 + C8 + VC2 + VC3 + F5;

- VC3 + RP6 + F8 + C8;
- RP10 + V57.

Modelul clinic 331

Pruritul vulvar

[Insuficiența Yin]

Simptome

uscăciune și prurit vaginal (fără leucoree), fluxul menstrual este redus, slăbiciune și dureri lombare sau la nivelul genunchilor; căldură în "cinci inimi" (în special în orele de seară); transpirații nocturne; insomnie, anxietate. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – filiform și rapid.

Tratamentul

alimentarea Yin-Qi și înlăturarea pruritului:

- | | | |
|---------|---|----------------------------|
| Shu | - | R3 Taixi; |
| Mu-ant. | - | VC3 Zhongji, VC4 Guanyuan; |
| Lo | - | F5 Ligou, RP6 Sanyinjiao; |
| & | - | VC1 Huiyin, R6 Zhaohai. |

Formule

- E29 + F5 + R3;
- VC1 + R3 + F8.

XII.8. Malpoziția fetală*

Modelul clinic 332

Malpoziția fetală

[Stagnarea Qi]

Simptome

malpoziție fetală la femeii cu depresii psihice; senzație de plenitudine în piept, hipocondru și abdomen; căscat frecvent. *Limba* – normală. *Pulsul* – dur sau alunecos.

Tratamentul

înlăturarea stagnării Qi, restabilirea poziției normale a fătului:

- | | | |
|-----|---|--------------------------|
| Shu | - | V67 Zhiyin, F3 Taichong; |
| Lo | - | MC6 Neiguan; |
| & | - | VC6 Qihai. |

Formula

F3 + V67 (moxibustie 15–20 minute).

* Acupunctura se aplică în malpoziția fetală la un termen al gravidității mai mare de 30 săptămâni. Înaintea tratamentului acupunctiv se exclude deformarea uterului și alte patologii.

Modelul clinic 333

Malpoziția fetală

[Retenția Lichidelor / Stagnarea Xue]

Simptome

malpoziție fetală la femei cu senzație de distensie și durere în abdomen; oligurie, edeme ale membrilor inferioare. *Limba* – palidă sau de culoare roșie-închis (cianotică). *Pulsul* – profund, rugos sau alunecos.

Tratamentul

promovarea circulației Lichidelor și Xue, restabilirea poziției normale a fătului:

Shu – V67 Zhiyin, RP9 Yinlingquan;

Lo – RP6 Sanyinjiao.

Formula

RP9 + V67 (moxibustie 15–20 minute).

Modelul clinic 334

Malpoziția fetală

[Insuficiența Qi și Xue]

Simptome

malpoziție fetală; astenie, slăbiciune în membre; piele și buze palide; palpitații; respirație scurtă. *Limba* – palidă. *Pulsul* – alunecos, slab și filiform.

Tratamentul

fortificarea Qi și Xue, restabilirea poziției normale a fătului:

Shu – V67 Zhiyin, E36 Zusanli;

Mu-ant. – VC4 Guanyuan.

Formula

E36 + V67 (moxibustie 15–20 minute).

Modelul clinic 335

Malpoziția fetală

[Slăbiciune a peretelui abdominal]

Simptome

malpoziție fetală. *Limba* – normală. *Pulsul* – alunecos.

Tratamentul

restabilirea poziției normale a fătului:

Shu – V67 Zhiyin (moxibustie 15–20 min.).

XII.9. Gestozele precoce*

Modelul clinic 336

Gestozele precoce

[Hiperactivitatea Focului în Stomac]

Simptome

vomă, greață, arsuri și durere în epigastru, sete, senzație frecventă de foame, dorință de băuturi și mâncare rece, constipație; respirație cu miros neplăcut; urină galbenă în cantitate mică. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – rapid, alunecos.

Tratamentul

normalizarea funcției stomacului, reglarea meridianului Chong Mai:
Shu – E44 Neiting, E41 Jiexi;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
Lo – MC6 Neiguan;
& – R20 Tonggu.

Formule

- MC6 + Jinjin-Yue;
- MC6 + E36 + RP4 + VC12 + E44.

Modelul clinic 337

Gestozele precoce

[Căldură-Umiditate în Splină și Stomac]

Simptome

vărsături (cu spută și salivă), greață, gust amar, salivă lipicioasă, schimbare a preferințelor gustative (gravida are poftă de alimente picante, sărate), anorexie, schimbare a senzațiilor olfactive; balonare în epigastru și abdomen; apatie; edeme. *Limba* – cu depozit galben, lipicios. *Pulsul* – rapid și alunecos.

Tratamentul

eliminarea Căldurii și Umidității, armonizarea meridianului Chong Mai:
Shu – E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
Lo – MC6 Neiguan, E40 Fenglong;
& – R20 Tonggu.

Formula

E40 + E36 + MC6.

* În tratamentul gestozelor precoce se folosesc puține puncte de acupunctură, se aplică o stimulare ușoară (pentru a evita afectarea Qi a fătului); pacienta va evita abuzul de alimente crude, grase, reci și va consuma o cantitate redusă de alimente, însă de multe ori pe zi.

Modelul clinic 338

Gestozele precoce

[Dezarmonia Ficat-Stomac]

Simptome

vomă, greață, regurgitații acide, dureri și senzație de plenitudine în epigastru, hipocondru și abdomen, gust amar; iritabilitate, depresie. *Limba* – palidă, cu depozit alb și subțire. *Pulsul* – întins sau alunecos.

Tratamentul

armonizarea Ficatului și a Stomacului, reglarea meridianului Chong Mai;

Shu – F3 Taichong, E36 Zusanli;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
Lo – MC6 Neiguan;
& – R20 Tonggu.

Formula

F3 + E36 + RP9.

Modelul clinic 339

Gestozele precoce

[Insuficiența Qi a Splinei și Stomacului]

Simptome

după 2–3 luni de graviditate apar vărsături (imediat după mâncare, vomă cu lichide), greață, aversiune față de miros de alimente; astenie, respirație scurtă, nedorința de a vorbi; scaune moi. *Limba* – palidă, cu depozit alb. *Pulsul* – slab și alunecos.

Tratamentul

fortificarea Qi a Splinei și Stomacului, reglarea meridianului Chong Mai;

Shu – E36 Zusanli;
Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
Lo – RP4 Gongsun, MC6 Neiguan;
& – R20 Tonggu.

Formula

E36 + F3 + VC12 + MC6.

XII.10. Amenințarea de avort

Modelul clinic 340

Amenințarea de avort

[Căldura Xue]

Simptome

senzații de mișcări anormale în regiunea plasării fătului; posibile diferite hemoragii, pierderi vaginale de sânge; neliniște, iritabilitate; uscăciune a gurii fără dorința de a bea; constipație; urină galbenă. *Limba* – roșie-închis. *Pulsul* – rapid, mare și alunecos.

Tratamentul

diminuarea Căldurii Xue, armonizarea circulației Qi și Xue:

Shu	–	F2 Xingjian;
Mu-ant.	–	VC5 Shimen;
Xi	–	R9 Zhubin;
&	–	R6 Zhaohai.

Formula

F2 + VC5.

Modelul clinic 341

Amenințarea de avort

[Insuficiența Qi și Xue / Dezechilibrul Qi-Xue cu predominarea activității Qi]

Simptome

senzații de mișcări anormale în regiunea plasării fătului; astenie, fatigabilitate; piele și buze palide; paretezii în diferite regiuni ale corpului; amețeli; palpitații. *Limba* – palidă, subțire. *Pulsul* – slab, filiform și alunecos.

Tratamentul

tonifierea și armonizarea Qi și Xue:

Shu	–	E36 Zusanli, C7 Shenmen;
&	–	VC6 Qihai.

Formula

E36 + VC6.

Modelul clinic 342

Amenințarea de avort

[Insuficiența Qi a Rinichilor]

Simptome

senzații de mișcări anormale în regiunea plasării fătului în asocieră cu slăbiciune lombară sau a genunchilor, atonie a mușchilor părții inferioare a peretelui abdominal; astenie, amețeli, insomnie; fațes palid sau pământiu; urină de culoare deschisă, poliurie. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab și alunecos.

Tratamentul

fortificarea Rinichilor, armonizarea circulației Qi și Xue:

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V23 Shenshu, V28 Pangguangshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- & – VG4 Mingmen.

Formula

E36 + VG4.

XII.11. Eclampsia

Modelul clinic 343

Eclampsia

[Stagnarea Qi a Ficatului / Stagnarea Qi a Ficatului cu transformare în Foc / Vânt Intern]

Simptome

crize eclamptice (pierderi de cunoștință, opistotonus, convulsii);
puseu hipertensiv; disconfort sau durere în epigastru și hipocondru;
depresie psihică, iritabilitate, insomnie; greață, vome, gust amar;
facies și ochi roșii; cefalee (regiunea temporală); sete.
Limba – roșie (în special la margini), cu depozit galben, uscat.
Pulsul – întins (în special din stânga), rapid sau alunecos.

Tratamentul

înlăturarea stărnării Qi, diminuarea Focului, calmarea Vântului Intern:

- Shu – F2 Xingjian, F3 Taichong, TR6 Zhigou;
- Lo – MC6 Neiguan, RP6 Sanyinjiao;
- & – VB20 Fengchi, Taiyang (Extra), VB13 Benshen, VG26 Renzhong.

Formula

F3 + GI4 + TR6 + TR17 + VB20 + VG16.

Modelul clinic 344

Eclampsia

[Insuficiența Qi și Xue / Acumularea Flegmei / Vânt Intern]

Simptome

crize eclamptice (pierdere de cunoștință, convulsii, opistotonus);
astenie pronunțată, vertij; palpitații; respirație scurtă; oligurie;
edeme cu diferită localizare. *Limba* – palidă, cu depozit subțire,
tremurândă. *Pulsul* – filiform, alunecos.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Qi și Xue, calmarea Vântului Intern:

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V20 Pishu, V23 Shenshu;

- Lo – MC6 Neiguan, RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong;
 & – VG26 Renzhong, Yintang (Extra), VB20 Fengchi,
 VC13 Shangwan, VC22 Tiantu.

Formula

TR17 + VB20 + VG16 (trei puncte ale Vântului Intern).

Modelul clinic 345

Eclampsia

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului și Rinichilor / Ascendența Yang-Qi a Ficatului / Vânt Intern]

Simptome

crize eclamptice (pierderea de cunoștință, convulsii, opistotonus); vertij, roșeață malară; spasme musculare, slăbiciune, greutate sau dureri în regiunea lombară și membrele inferioare; insomnie; gură și gât uscate; tulburări de vedere. *Limba* – roșie, cu depozit neînsemnat, tremurândă. *Pulsul* – rapid, întins și fin sau alunecos.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi, armonizarea Ficatului și Rinichilor, calmarea Vântului Intern:

- Shu – R3 Taixi, F3 Taichong, VB34 Yanglingquan, F8 Ququan;
 Lo – RP6 Sanyinjiao;
 & – VG26 Renzhong, VB20 Fengchi;

Formule

- VB39 + R3 (formula antică în convulsii recidivante la gravide);
 – F3 + F8 + TR17 + VB20 + VG16.

XII.12. Retenția placentei

Modelul clinic 346

Retenția placentei

[Stagnarea Xue]

Simptome

decolarea incompletă a placentei; durere în abdomen (cu agravare la presare); senzație de rece în abdomen; mase tumorale de consistență dură în abdomen; lohii în cantități mici de culoare roșie-închis. *Limba* – roșie-închis, posibil cu peteșii. *Pulsul* – profund, rugos.

Tratamentul

dinamizarea Xue, armonizarea Qi și Xue, coborârea placentei:

- Shu – GI4 Hegu;
 Mu-ant. – VC3 Zhongji;
 Lo – RP6 Sanyinjiao;

- & – VC6 Qihai (moxibustie), Duyin* (Extra), VB21 Jianjing.

Formule

- VC3 + RP8;
- VC3 + E29 + R6 + VB21;
- GI4 + RP6.

Modelul clinic 347

Retenția placentei

[Insuficiența Qi]

Simptome

retenția placentei, decolarea incompletă a placentei (în special la femeii cu constituție slabă, cu Insuficiența Yuan-Qi), cu hemoragie profuză (sânge de culoare deschisă); dureri în abdomen cu ameliorare la presare; în abdomen mase tumorale de consistență moale; piele palidă; astenie, transpirații spontane; palpitații; respirație scurtă. *Limba* – palidă, cu depozit alb și subțire. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Qi, coborârea placentei:

- Shu – GI4 Hegu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan, VC3 Zhongji;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – Duyin (Extra).

Formule

- V60 + V67 + VC2 (dispersie) + VC4 (tonifiere; formula antică);
- GI4 + RP6;
- VC3 + VB21.

Modelul clinic 348

Retenția placentei

[Invazia Vântului-Frig pe fond de Insuficiență Qi]

Simptome

retenția placentei însoțită de dureri surde în abdomenul inferior și senzație de rece; hemoragii reduse; astenie. Această variantă a maladiei apare la femeii cu Insuficiența Yuan-Qi, ce creează condiții pentru atacul Vântului și Frigului patogen. *Limba* - palidă, cu depozit alb. *Pulsul* – încordat.

Tratamentul

eliminarea Vântului, încălzirea Frigului, fortificarea și armonizarea Qi și Xue, coborârea placentei:

- Shu – GI4 Hegu, V60 Kunlun;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;

* Duyin – pe fața plantară a piciorului, pe plica articulației interfalangiene a degetului II.

- Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – RP10 Xuehai, Duiyin (Extra).

Formula antică

V60 + GI4 + VB21 + VC3 + RP6.

XII.13. Patologia lohiilor

Modelul clinic 349

Lohiometria

[Stagnarea Qi / Stagnarea Xue]

Simptome

retenția lohiilor în uter cu senzație de distensie dureroasă și plinitudine în abdomenul inferior; distensie în hipocondru și cutia toracică; durerea se agravează la presiune; depresie psihică. *Limba* – roșie-închis, cu depozit alb și subțire. *Pulsul* – dur, profund și rugos.

Tratamentul

armonizarea și dinamizarea Qi și Xue:

- Shu – F3 Taichong, F8 Ququan;
Mu-ant. – VC3 Zhongji;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – VC6 Qihai.

Formula

F3 + GI4 + RP6.

Modelul clinic 350

Lohiometria

[Frig patogen / Stagnarea Xue]

Simptome

retenția lohiilor în uter; senzație de durere și rece în abdomenul inferior cu agravare la presare; senzație de rece în membre. Această patologie apare sub influența factorului patogen Frig (răcire a organismului, consumarea excesivă a alimentelor reci). *Limba* – roșie-purpurie, cu echimoze. *Pulsul* – profund, încordat și lent sau subțire și superficial (posibil profund și rugos).

Tratamentul

încălzirea uterului, dispersia Frigului, armonizarea și dinamizarea Qi și Xue:

- Mu-ant. – VC4 Guanyuan (moxibustie), VC7 Yinjiao;
Xi – RP8 Diji;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – E30 Qichong (moxibustie).

Formule

RP8 + RP6; RP6 + VC6.

Modelul clinic 351

Lohiometria

[Insuficiența Xue]

Simptome

retenția lohiilor în uter; piele și buze palide; amețeli, vertij; insomnie; palpitații. *Limba* – palidă și subțire. *Pulsul* – filiform, slab.

Tratamentul

fortificarea Xue, armonizarea și dinamizarea Qi și Xue:

Shu – E36 Zusanli;
Shu-post. – V23 Shenshu;
Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – VC6 Qihai.

Formula

V23 + V20.

Modelul clinic 352

Lohioragia

[Căldura Xue cu afectarea meridianelor Ren Mai și Chong Mai]

Simptome

lohiile abundente persistente, de culoare roșie-închis, groase și cu miros fetid; uscăciunea gurii și gâtului, cu lipsa dorinței de a bea, constipații; urină galbenă; agitație psihică. *Limba* – roșie-închis. *Pulsul* – rapid și vast.

Tratamentul

diminuarea Căldurii Xue, armonizarea Qi și Xue:

Shu – R10 Yingu;
Mu-ant. – VC3 Zhongji;
Xi – F6 Zhongdu;
& – VC6 Qihai, RP10 Xuehai.

Formula

VC3 + RP10.

Modelul clinic 353

Lohioragia

[Slăbirea Qi-ului antipatogen / Insuficiența Splinei cu pierderea controlului asupra Xue / Slăbirea meridianelor Ren Mai și Chong Mai]

Simptome

lohiile abundente, de culoare roșie-deschis, subțiri și fără miros; piele palidă; slăbiciune, hiperhidroză spontană; respirație scurtă, nedorința de a vorbi, voce slabă. Această variantă de patologie

apare în urma hemoragiilor masive în timpul nașterii sau la suprasolicitări fizice îndată după naștere, în special la femei cu constituție slabă. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab, superficial.

Tratamentul

fortificarea Qi, restabilirea controlului asupra Xue, armonizarea Qi și Xue:

- Shu – E36 Zusanli;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan.

Modelul clinic 354

Lohioragia

[Refrigerarea uterului cu stagnarea Xue și obstrucția colateralelor]

Simptome

lohii de lungă durată, în cantități mici, de culoare închisă, cu cheaguri; dureri în abdomenul inferior (cu agravare la presare); depistarea în abdomen a maselor tumorale. *Limba* – roșie-închis, purpurie cu echimoze. *Pulsul* – profund, încordat sau superficial.

Tratamentul

încălzirea uterului și colateralelor, armonizarea Qi și Xue:

- Mu-ant. – VC3 Zhongji (moxibustie), VC5 Shimen (moxibustie);
- Xi – RP8 Diji;
- Lo – RP6 Sanyinjiao.

Formula

VC4 + R8.

XII.14. Durerile abdominale în postpartum

Modelul clinic 355

Durerea abdominală în postpartum

[Stagnarea Qi / Stagnarea Xue]

Simptome

dureri cu senzație de distensie în abdomen (apar ca urmare a retenției lohiilor în uter și emoțiilor negative); disconfort sau durere în hipocondru; iritabilitate. *Limba* – roșie cu nuanțe purpurii-cianotice și depozit gălbui. *Pulsul* – profund, rugos, încordat (indică durerea) sau superficial.

Tratamentul

dinamizarea și armonizarea circulației Qi și Xue, diminuarea durerii:

- Shu – F3 Taichong;
- Shu-post. – V17 Geshu;
- Mu-ant. – VC3 Zhongji;

& – RP10 Xuehai, E29 Guilai.

Formule

- VC6 + RP6;
- VC3 + E30 + RP6;
- VC4 + VC6 + RP6 + F3 + E29 + RP10;
- F3 + GI4 + E29.

Modelul clinic 356

Durerea abdominală în postpartum

[Insuficiența Xue]

Simptome

dureri surde în abdomenul inferior (ameliorare la presare), abdomen moale; eliminarea lohiilor în cantități mici, de culoare pală; tinitus, vertij; piele și buze palide; palpitații; respirații scurte; scaune uscate. *Limba* – palidă, cu depozit albicios și subțire. *Pulsul* – filiform, încordat (indică durerea).

Tratamentul

fortificarea Xue, armonizarea Qi și Xue, reglarea meridianelor Chong Mai și Ren Mai, diminuarea durerilor:

- Shu – E36 Zusanli;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VC6 Qihai.

Formula

E36 + VC4 + VC6.

Modelul clinic 357

Durerea abdominală în postpartum

[Acumulare de Frig]

Simptome

dureri în abdomen, apărute după expunere la rece (agravare la presare și la rece); față palidă; membre reci; greață, vome. *Limba* – palidă, cu depozit alb și alunecos. *Pulsul* – profund și încordat (indică durerea și Frigul).

Tratamentul

dispersia Frigului, încălzirea uterului, armonizarea circulației Qi și Xue, diminuarea durerii:

- Shu-post. – V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VC6 Qihai.

Formula

VC4 + R8 + RP6.

XII.15. Vertijul în postpartum

Modelul clinic 358

Vertijul în postpartum

[Acumularea Frigului cu Stagnarea Xue]

Simptome

vertij (apare după expunere la rece în timpul nașterii); retenție a lohiilor în uter cu senzație de durere și rece în abdomenul inferior; pierderi de cunoștință; dispnee; trismus. *Limba* – roșie-purpurie, cu nuanță cianotică. *Pulsul* – superficial sau profund și încordat.

Tratamentul

încălzirea organismului, armonizarea Qi și Xue:

- Shu – TR6 Zhigou, E36 Zusanli;
- Mu-ant. – VC3 Zhongji (moxibustie), VC7 Yinjiao (moxibustie);
- Lo – RP6 Sanyinjiao, RP4 Gongsun;
- & – VG26 Renzhong.

Formula

RP6 + RP4 + TR6.

Modelul clinic 359

Vertijul în postpartum

[Epuizarea Qi cu Insuficiența Xue]

Simptome

vertij (apare în urma hemoragiilor masive în timpul nașterii și la persoanele anemice); pierderi de cunoștință; piele și buze palide, hiperhidroză profuză rece, membre reci. *Limba* – palidă. *Pulsul* – filiform și slab.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Qi și Xue:

- Shu – E36 Zusanli;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan (moxibustie);
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VC6 Qihai (moxibustie), VG26 Renzhong.

Formula

E36 + VC6.

XII.16. Hipogalactia

Modelul clinic 360

Hipogalactia

[Stagnarea Qi și Xue]

Simptome

consistență dură și durere a sânilor, lipsă a laptelui, senzație de distensie în piept; dureri în hipocondru, abdomen balonat, constipații; corp fierbinte. Adesea aceste tulburări apar la femei ca urmare a unor emoții negative îndelungate, depresilor psihice. *Limba* – cu depozit galben, subțire. *Pulsul* – profund și rugos sau scurt și dur.

Tratamentul

Înlăturarea stagnării, armonizarea Qi și Xue, normalizarea lactației:

- | | | |
|---------|---|--------------------------------------|
| Shu | – | IG1 Shaoze (sângerare), F3 Taichong; |
| Mu-ant. | – | F14 Qimen, VC17 Shanzhong; |
| Lo | – | MC6 Neiguan, RP6 Sanyinjiao; |
| & | – | E18 Rugen, GI16 Jugu. |

Formule

- F3 + E39 + E18 + IG1;
- VC17 + IG1 + E18 + MC6 + F14;
- IG1 + F3 + F14 + VC17.

Modelul clinic 361

Hipogalactia

[Insuficiența Qi și Xue]

Simptome

adesea apare la femei ca urmare a unei pierderi importante de sânge în timpul nașterii. Lipsa senzației de plenitudine în sâni; sâni moi, atoni (la stoarcere laptele nu apare sau apare câte o picătură). Față palidă; depresie psihică, amețeli; palpitații; respirație superficială; dureri surde în regiunea lombară, slăbiciuni în picioare; piele uscată; inapetență, scaune moi. *Limba* – palidă. *Pulsul* – filiform, slab.

Tratamentul

fortificarea Qi și Xue, normalizarea lactației:

- | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|
| Shu | – | IG1 Shaoze, E36 Zusanli; |
| Mu-ant. | – | VC17 Shanzhong; |
| Shu-post. | – | V18 Ganshu, V17 Geshu, V20 Pishu; |
| Lo | – | RP6 Sanyinjiao; |
| & | – | E18 Rugen. |

Formule

- VC17 + IG1 + E18 + V20 + E36;

- IG1 + E36 + VC17.

XII.17. Mastita

Modelul clinic 362

Mastita

[Vânt-Frig]

Simptome

apare în perioada alăptării ca urmare a acțiunii vântului atmosferic; sensibilitate la durere, consistență dură a glandei mamare; cefalee; artralгии; tuse, obstrucție nazală cu eliminări apoase; absența transpirației. *Limba* – palidă, cu depozit alb și subțire. *Pulsul* – superficial și încordat.

Tratamentul

Înlăturarea Vântului și a Frigului, armonizarea Focarului Superior și Mediu:

- | | |
|-----|---|
| Shu | – P5 Chize, VB41 Zulinqi, E36 Zusanli; |
| Lo | – TR5 Waiguan; |
| & | – E15 Wuyi, VB21 Jianjing, V12 Fengmen. |

Formula

VB21 + E18 + E14 + VC17 (dispersie pe partea afectată), moxibustie în jurul glandei mamare afectate și presopunctura ușoară în punctul E17 Ruzhong. Este efectivă moxibustia printr-un strat de usturoi (timp de 10–20 minute) a zonei afectate, de 1–2 ori pe zi.

Modelul clinic 363

Mastita

[Excesul de Căldură]

Simptome

apare mai des la femeile ce fac abuz de alimente picante. Consistență dură, tumefiere, sensibilitate și durere a glandei mamare; febră, cefalee; sete (cu preferință pentru băuturi reci), greață, vomă, senzație de arsură sau durere în epigastru, regurgitații acide, uneori ulceratii și sângerare a gingiilor, constipație; urină galbenă. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – rapid și vast.

Tratamentul

diminuarea Căldurii și armonizarea Focarului Mediu:

- | | |
|-----|--|
| Shu | – P10 Yuji, E45 Lidui, GI11 Quchi, IG1 Shaoze; |
| Lo | – MC6 Neiguan; |
| Xi | – E34 Liangqiu; |
| & | – VB21 Jianjing, E16 Yingchuang, V43 Gaohuangshu (sângerare cu aplicarea ventuzelor timp de 20 minute), VG14 Dazhui, V51 Huangmen, E15 Wuyi. |

Formule

- VB21 + punctele antebrațului (distanța dintre punctele MC7 Daling și MC3 Quze de-a lungul meridianului Pericard este divizată în 7 părți egale; se efectuează sângerarea în puncte la granița acestor segmente cu un ac triunghiular, câte 1-3 picături de sânge; formula antică);
- P10 + E36 + VB41;
- E39 + E36 + E34 + VB43;
- VB21 + MC6 + VG14 + E36;
- E18 + E16 + IG1 + E36 + E34 + E44 + VC17;
- V40 (sângerare) + IG1 + VC17 + R27 + MC7.

Modelul clinic 364

Mastita

[Stagnarea Qi a Ficatului]

Simptome

apare cu o frecvență mai mare, ca urmare a unor trăiri emoționale negative de o durată lungă, depresii psihice. Consistență dură, tumefiere, sensibilitate la durere a glandei mamare; iritabilitate; dureri difuze în hipocondru, balonare în abdomen. *Limba* – cu depozit alb în cantitate mică. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

normalizarea circulației Qi a Ficatului:

- | | | |
|---------|---|--|
| Shu | - | VB41 Zulingi, F3 Taichong, E36 Zusanli, IG1 Shaoze; |
| Mu-ant. | - | F14 Qimen; |
| Lo | - | MC6 Neiguan; |
| & | - | VB21 Jianjing, E15 Wuyi, E18 Rugen, V43 Gaohuangshu. |

Formule

- F2 + F3 + VB40 + TR6 + F14 + V18 (formulă cu efect de dinamizare Qi și armonizare a Ficatului);
- F3 + E34;
- V43 + V42 + V41 (sângerare; în afectarea zonei superioare a sânului);
- V43 + V42 + V44 (sângerare; în afectarea zonei centrale a sânului);
- V43 + V44 + V45 (sângerare; în afectarea zonei inferioare a sânului).
- VC17 + MC6 + E18 + IG1 + F3;
- VB41 + VB21 + F14 + MC6.

Modelul clinic 365

Mastita

[Stagnarea Qi și a laptelui]

Simptome

apare în cazurile când glanda mamară nu e scursă suficient după alăptare. Consistență mai dură, sensibilitate la durere a glandei mamare; cefalee, febră. *Limba* – roșie. *Pulsul* – dur sau scurt.

Tratamentul

Înlăturarea stazei de lapte:

- Shu – E36 Zusanli, IG1 Shaoze, VB41 Zulingqi;
- Mu-ant. – VC17 Shanzhong;
- Lo – MC6 Neiguan;
- & – E18 Rugen, VB21 Jianjing, E15 Wuyi.

Formule

- VB21 + VB41 + F3 + VC17 + TR6;
- GI4 + GI10 + IG1 + E18 + E36 + VC17;
- MC1 + F14;
- VC17 + IG1.

XII.18. Mastopatia fibrochistică

Modelul clinic 366

Mastopatia fibrochistică

[Stagnarea Qi a Ficatului]

Simptome

ciclu menstrual neregulat, dismenoree; senzație de plenitudine și durere în glandele mamare (la palpare se vor depista noduri în glandele mamare); labilitate emoțională, iritabilitate; senzație de plenitudine și constricție în cutia toracică (ameliorare la oftat profund și frecvent), dureri difuze în hipocondru și regiunea costală; balonare în abdomen, regurgitații. *Limba* – cu depozit alb în cantitate redusă, uneori cu accent cianotic. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

Înlăturarea stagnării Qi, armonizarea Ficatului și resorbția nodurilor din glandele mamare:

- Shu – E36 Zusanli, IG1 Shaoze, F3 Taichong, VB41 Zulingqi;
- Mu-ant. – VC17 Shanzhong, F14 Qimen;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VB21 Jianjing, E15 Wuyi, E18 Rugen.

Formule

- E15 + VC17 + E36 + VB21 + V18 + F3;
- F3 + F14 + VB21.

Modelul clinic 367

Mastopatia fibrochistică

[Ascendența Yang-Qi a Ficatului / Excesul Focului în Ficat]

Simptome

senzație de căldură și hipertensiune în regiunea glandelor mamare (la palparea glandelor mamare se depistează noduri); gust amar, gât uscat; hiperemie a sclerelor, prurit ocular; excitabilitate crescută, amețeli, tinitus; senzație de arsură în hipocondru, constipație; urină de culoare galbenă, oligurie. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – întins și rapid.

Tratamentul

diminuarea Focului, normalizarea Ficatului și resorbția nodurilor din glandele mamare:

Shu – E36 Zusanli, IG1 Shaoze, F3 Taichong, VB41 Zulinqi, VB43 Xiashi;
Mu-ant. – VC17 Shanzhong, F14 Qimen;
Lo – MC6 Neiguan;
& – VB21 Jianjing, V51 Huangmen, E15 Wuyi, E18 Rugen.

Formule

- E15 + VC17 + F3;
- VB21 + VG14 + IG11 + V18.

Modelul clinic 368

Mastopatia fibrochistică

[Insuficiența Qi și Xue]

Simptome

ciclu menstrual lung cu sânge în cantitate mică, de culoare roșie-deschis, dismenoree (cu ameliorare la presare și căldură); piele și buze palide; apetit scăzut; astenie, amețeli, epuizare; dispnee; palpitații; insomnie. La palpare se vor depista în glandele mamare nodozități sau zone de o consistență mai dură. *Limba* – palidă și subțire. *Pulsul* – filiform și slab.

Tratamentul

fortificarea Qi și Xue, armonizarea lor, resorbția nodurilor din glandele mamare:

Shu – E36 Zusanli, IG1 Shaoze;
Shu-post. – V20 Pishu;
Mu-ant. – VC17 Shanzhong;
& – V43 Gaohuangshu, RP10 Xuehai, VB21 Jianjing, VC6 Qihai, E15 Wuyi, E18 Rugen.

Formule

- E15 + VC17 + E36;
- E15 + VC17 + E36 + VB21 + V23 + RP10 + RP6;
- VB21 + VG14 + IG11 + V20.

Modelul clinic 369

Mastopatia fibrochistică

[Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor și a Ficatului]

Simptome

tulburări ale ciclului menstrual, cu flux menstrual redus; la palparea glandelor mamare se vor depista nodozități; amețeli; conjunctivă uscată, uscăciune în gură și în gât; senzație de slăbiciune și durere în regiunea lombară, slăbiciuni în picioare (în special în articulațiile genunchiului); senzație de căldură în regiunea "celor cinci inimi" (palme, tălpi, regiunea sternului); transpirații nocturne; insomnie. *Limba* – roșie, cu depozit subțire sau fără depozit. *Pulsul* – întins și fin.

Tratamentul

fortificarea Yin, armonizarea Ficatului și a Rinichilor, resorbția nodurilor din glandele mamare:

Shu – IG1 Shaoze, F8 Ququan, R2 Rangu, R3 Taixi;
Mu-ant. – VC17 Shanzhong;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – VB21 Jianjing, E15 Wuyi, E18 Rugen.

Formule

- E15 + VC17 + GI4;
- VB21 + VG14 + IG11 + R3.

XII.19. Prolapsul uterin

Modelul clinic 370

Prolapsul uterin

[Umiditate-Căldură]

Simptome

dureri și senzație de arsură în regiunea uterului prolabat; dureri în abdomen, tenesme, constipație; urină de culoare galbenă. *Limba* – roșie, cu depozit gălbui. *Pulsul* – rapid, alunecos.

Tratamentul

răcorirea Căldurii, eliminarea Umidității, ascendența Qi:

Shu – RP9 Yinlingquan, F3 Taichong, GI11 Quchi;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – VG20 Baihui, Weibao* (Extra), Zigong (Extra), VC2 Qugu, VB28 Weidao.

Formule

- F3 + E29;
- VG20 + Weibao + Zigong + RP6 + VC2 + RP9 + F3;

* Weibao – la nivelul punctului VC4 Guanyuan, la 4 cun lateral de el, în șanțul inghinal.

- VB28 + Weibao + R12.

Modelul clinic 371

Prolapsul uterin

[Insuficiența Qi a Rinichilor / Insuficiența Qi a Splinei
/Prăbușirea Qi]

Simptome

prolaps uterin cu dureri lombare (agravare la ortostatism prelungit) și senzație de tracțiune în jos; poliurie; scaune moi alternând cu constipații, inapetență, abdomen balonat; leucoree clară; piele palidă; fatigabilitate, transpirații spontane; respirație superficială, agravare a stării la eforturi fizice neînsemnate. *Limba* – palidă, cu depozit alb și subțire. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Qi a Rinichilor și Splinei, ascendența Qi:

Shu – E36 Zusanli, R3 Taixi;

Shu-post. – V20 Pishu, V23 Shenshu;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – VG20 Baihui (moxibustie), Weibao (Extra), Zigong (Extra), VC2 Qugu, VC6 Qihai.

Formule

- P7 + R6 + VC1;
- VC4 + F1;
- F1 + F8 + E29 + VC4 + E36 + VG20;
- VC6 + E36 + VG20;
- VG20 + VC6 + VB28 + E29 + E36 + RP6;
- VB20 + Weibao + Zigong + RP6 + VC6 + E36 + R3.

XII.20. Fibromul uterin*

Modelul clinic 372

Fibromul uterin

[Stagnarea Xue]

Simptome

fibrom uterin (la palpare abdominală se depistează o masă de consistență dură, fixă și dureroasă); dismenoree, leucoree. Apare la femei după hemoragii în timpul nașterii, după emoții negative de lungă durată (afectare a Ficatului sau a Splinei), în urma bolilor cronice epuizante și a practicării actului sexual în timpul menstruelor. *Limba* – violetă (purpurie) sau cianotică, *Pulsul* – profund și rugos.

* Tratamentul acupunctic este mai efektiv în cazurile când fibromul nu depășește mărimea de 2 cm în diametru.

Tratamentul

dinamizarea Xue și micșorarea fibromiomului:

- Shu – F3 Taichong;
- Shu-post. – V17 Geshu, V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC3 Zhongji;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, RP4 Gongsun;
- & – E29 Guilai, RP10 Xuehai, R6 Zhaohai.

Formule

- RP4 + E30 + VC3 + MC6;
- MC6 + R6 + VC3 + E29 + RP6 + F3;
- R6 + P7;
- RP4 + MC6.

Modelul clinic 373

Fibromul uterin

[Stagnarea Flegmei]

Simptome

fibromiom uterin (masele abdominale la palpare sunt moi, fixe și dureroase); dismenoree, leucoree albă și vâscoasă; senzație de plenitudine sau greutate în cutia toracică, abdomen și regiunea cefalică; greață, obezitate. *Limba* – cu depozit alb sau cu tentă gri, gros și lipicios. *Pulsul* – alunecos.

Tratamentul

eliminarea Flegmei, diminuarea fibromului:

- Shu – F3 Taichong, E36 Zusanli;
- Mu-ant. – VC3 Zhongji;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong;
- & – E29 Guilai, E28 Shuidao, R6 Zhaohai, V32 Ciliao.

Formule

- VC3 + E29 + RP6 + F3 + E40 + Zigong;
- R6 + P7.

Modelul clinic 374

Fibromul uterin

[Insuficiența Xue / Stagnarea Xue]

Simptome

fibrom uterin (la palpare se evidențiază o masă abdominală dură și dureroasă); piele și buze palide, piele uscată; tulburări de vedere; palpitații; insomnie; vertij, acufene. *Limba* – roșie-închis. *Pulsul* – filiform, rugos.

Tratamentul

fortificarea și dinamizarea Xue:

- Shu – F3 Taichong;
- Shu-post. – V17 Geshu, V20 Pishu;
- Mu-ant. – F14 Qimen, VC3 Zhongji;

- Xi – RP8 Diji;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – E29 Guilai, RP10 Xuehai.

Formula

VC3 + E29 + F3 + F14 + RP10 + Zigong.

Modelul clinic 375

Fibromul uterin

[Insuficiența Qi / Stagnarea Xue]

Simptome

fibrom uterin (la palpare se evidențiază o masă de consistență dură, dureroasă); apatie, astenie, vertij, nedorința de a vorbi; transpirații; poliurie. *Limba* – palidă, albăstrie, cu depozit subțire. *Pulsul* – slab și rugos.

Tratamentul

fortificarea Qi, dinamizarea Xue, armonizarea Qi și Xue:

- Shu – E36 Zusanli, F3 Taichong;
- Shu-post. – V23 Shenshu, V17 Geshu, V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC3 Zhongji, VC4 Guanyuan;
- Xi – R8 Jiaoxin;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – R13 Qixue, V43 Gaohuangshu, RP10 Xuehai.

Formula

VC3 + E29 + F3 + E36 + Zigong.

Modelul clinic 376

Fibromul uterin

[Frig / Stagnarea Xue]

Simptome

fibrom uterin (la palpare se evidențiază o masă de consistență dură, dureroasă); menstrre neregulate cu sânge închis și cheaguri; dismenoree sau amenoree; corp și extremități reci (ameliorare la căldură). *Limba* – palidă cu nuanțe albastrii, depozit alb. *Pulsul* – profund, rugos.

Tratamentul

încălzirea Frigului, dinamizarea și armonizarea Qi și Xue:

- Shu – F3 Taichong;
- Shu-post. – V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan (moxibustie);
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VG3 Yaoyangguan (moxibustie), V31 Shangliao.

Formula

VC3 + E29 + F3 + VC4 + VG3.

XII.21. Diminuarea libidoului

Modelul clinic 377

Diminuarea libidoului

[Insuficiența Qi a Inimii / Insuficiența Yang-Qi a Inimii]

Simptome

astenie psihică și sexuală, nervozitate; palpitații; transpirații spontane; mâini reci. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Qi a Inimii, armonizarea proceselor psihice:

Shu – C3 Shaohai, C9 Shaochong;

Shu-post. – V15 Xinshu, V18 Ganshu;

Mu-ant. – VC4 Guanyuan;

Lo – C5 Tongli;

& – VG1 Changqiang, E15 Wuyi, E17 Ruzhong (presopunctura).

Formule

- VG20 + GI4 + E15 + E30 + "programul Chong Mai" (formulă indicată în diminuarea libidoului);
- V26 + RP6 + R7 (din dreapta) + VC6 + TR5.

Modelul clinic 378

Diminuarea libidoului

[Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor]

Simptome

astenie, extremități reci cu aversiune față de rece; disconfort, slăbiciune sau durere în regiunea lombară și genunchi; depresie psihică; edeme ale membrelor inferioare. Diminuarea libidoului apare după boli cronice, activitate sexuală excesivă. *Limba* – palidă, cu depozit alb, subțire. *Pulsul* – profund și slab.

Tratamentul

fortificarea Yang-Qi a Rinichilor și armonizarea proceselor psihice:

Shu-post. – V23 Shenshu, V18 Ganshu;

Mu-ant. – VC4 Guanyuan;

& – V43 Gaohuangshu, R12 Dahe, VC8 Shenque, E15 Wuyi, E17 Ruzhong.

Formule

- VG20 + V23 + "programul Chong Mai" (formulă indicată în diminuarea libidoului);
- VC8 (moxibustie) + E17 (presopunctură; formula antică);
- VC3 + R2;
- P7 + R6 + R1 + VC4 + VC17 + VG20.

Modelul clinic 379

Diminuarea libidoului

[Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor]

Simptome

astenie cu insomnie și tulburări de memorie; bufeuri de căldură, transpirații nocturne; posibil uscăciunea mucoasei vaginale; disconfort în regiunea lombară. Diminuarea libidoului apare după afecțiuni cronice, cu vârsta, în convalescența bolilor febrile. *Limba* – roșie, cu depozit redus. *Pulsul* – filiform și rapid.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi a Rinichilor și armonizarea proceselor psihice:

Shu – R3 Taixi, R2 Rangu;

Shu-post. – V23 Shenshu, V18 Ganshu;

Mu-ant. – VC4 Guanyuan;

Xi – C6 Yinxi;

& – E15 Wuyi, E17 Ruzhong.

Formule

- "programul Chong Mai" (RP4 + R3 + VC2 + VC4 + VC22 + MC6; formulă indicată în diminuarea libidoului);
- E17 (presopunctura) + R3 + VC4 (formulă antică).

XIII

Acupunctura în tratamentul bolilor endocrino-metabolice

- XIII.1. Diabetul zaharat**
- XIII.2. Obezitatea**
- XIII.3. Hiperlipoproteinemiiile
(dislipidemiile)**
- XIII.4. Cașexia**
- XIII.5. Disfuncția glandei tiroide**
- XIII.6. Disfuncția glandei paratiroide**
- XIII.7. Tulburările de menopauză**

XIII.1. Diabetul zaharat*

Modelul clinic 380

Diabetul zaharat

[Afectarea Focarului Superior]

Simptome

predominare în tabloul clinic a polidipsiei, uscăciune a gurii și a limbii; poliurie; anorexie. *Limba* – roșie la vârf, cu depozit subțire, gălbui. *Pulsul* – rapid și mare.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, umectarea Plămânilor, producerea Lichidelor, diminuarea setei, armonizarea Focarului Superior:

Shu – P9 Taiyuan, P10 Yuji, C8 Shaofu, GI4 Hegu;

Shu-post. – V13 Feishu, V15 Xinshu, Yishu^{**} (Extra).

& – VC23 Lianquan.

Formule

- IG4 + E36 + V20 + V13;
- Yishu + V13 + P11 + P10 + RP6 + E36;
- P3 + P10 + P11 + P9 + VC24 + F2;
- VC24 + V49 + TR1 + R2 + P11 + P10 + V17.

Modelul clinic 381

Diabetul zaharat

[Afectarea Focarului Mijlociu]

Simptome

predominare în tabloul clinic a polifagiei, senzație de disconfort în stomac, scaune uscate, constipație; corp fierbinte; poliurie, polidipsie. *Limba* – uscată, cu depozit gălbui. *Pulsul* – alunecos și rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii în Stomac, armonizarea Focarului Mijlociu:

Shu – E36 Zusanli, E44 Neiting, RP9 Yinlingquan, GI11 Quchi;

Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu, Yishu (Extra);

Lo – RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;

& – Pi Re^{***} (Extra).

* Acupunctura în calitate de monoterapie este contraindicată diabeticilor insulinodependenți.

** Yishu (punct de asentiment al pancreasului) – la 1,5 cun lateral de apofiza spinoasă Th8.

*** Pi Re – la 3 cun în afara marginii inferioare a apofizei spinosase Th6.

Formule

- $IG4 + E36 + V20 + V13 + V21$;
- $Yishu + V13 + V20 + VC12 + E44 + RP6$;
- $MC6 + VC12$;
- $VG26 + E45 + VC12 + V21$;
- $VC24 + V49 + TR1 + R2 + V20 + V21 + VC12$.

Modelul clinic 382

Diabetul zaharat

[Afectarea Focarului Inferior]

Simptome

poliurie pronunțată (urină dulce la gust); uscăciune a gurii; vertij, tinitus; polidipsie; senzație permanentă de foame fără dorința de a mânca (pacientul consumă cantități mici de alimente); impotență, amenoree; lombalgie; ten pământiu al feței; roșeață malară; aversiune față de rece, extremități reci. *Limba* – roșie și uscată. *Pulsul* – filiform și rapid. În caz de Insuficiență Yin-Qi și Yang-Qi este posibilă apariția depozitului alb pe limbă și a pulsului slab și profund.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, fortificarea Yin-Qi a Rinichilor și a Ficatului, armonizarea Focarului Inferior:

Shu – R3 Taixi, R7 Fuliu, F3 Taichong;

Shu-post. – V18 Ganshu, V23 Shenshu, Yishu (Extra);

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – VG4 Mingmen.

Formule

- $IG4 + E36 + V20 + V13 + V23$;
- $Yishu + V13 + V20 + V23 + VC4 + R3 + RP6$;
- $VC24 + V49 + TR1 + R2 + VC4 + R7 + R5$;
- $VG26 + RP2$ (tonifiere; formulă indicată în coma hiperglicemică);
- $RP5 + RP3$ (dispersie; formulă indicată în coma hipoglicemică).

XIII.2. Obezitatea*

Modelul clinic 383

Obezitatea

[Obezitatea de genul RP]

Simptome

obezitate; senzație de distensie în abdomen, balonări abdominale

* Greutatea normală se calculează după formula $GN = 50 + 0,75 (I - 150) + (V - 20) : 4$, unde GN – greutate normală, I – înălțimea, cm, V – vârsta, ani (Metropolitan Life Insurance Company).

(în special după ingerarea alimentelor), scaune moi; extremități reci cu senzație de greutate; îngrijorare, senzație de insecuritate ("izolare de mediul extern prin stratul de grăsime"); consum exagerat de alimente. *Limba* – palidă, puțin tumefiată sau umedă. *Pulsul* – profund, slab, alunecos sau moale.

Tratamentul

normalizarea funcției Splinei, armonizarea organelor digestive și normalizarea metabolismului;

Shu – E36 Zusanli, E44 Neiting, TR6 Zhigou, RP1 Yinbai;
Shu-post. – V20 Pishu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan, E25 Tianshu, F13 Zhangmen;
& – GI10 Shousanli, E39 Xiajuxu, VC6 Qihai, E28 Shuidao.

Formule

- V20 + VG6 + RP3 + E36 + GI4;
- V20 + V21 + V49 + V50 + RP3 + E40;
- RP1 + RP4 + E36 + F1 + F3 + F13 + VC12 + GI4 (formulă indicată în bulimie cu preferință de dulciuri);
- E44 + VC12 + GI10.

Modelul clinic 384

Obezitatea

[Insuficiența Qi a Splinei și a Plămânilor]

Simptome

obezitate; senzație de distensie în abdomen; vertij, astenie; oligurie, edeme ale membrelor. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Qi a Plămânilor și Splinei, armonizarea organelor digestive și normalizarea metabolismului;

Shu – RP3 Taibai, RP9 Yinlingquan, E44 Neiting;
Shu-post. – V13 Feishu, V20 Pishu.

Formula

RP9 + VG28.

Modelul clinic 385

Obezitatea

[Insuficiența Qi a Splinei și a Rinichilor]

Simptome

obezitate; slăbiciune în picioare și regiunea lombară; impotență; fatigabilitate; edeme. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Qi a Splinei și Rinichilor, armonizarea organelor digestive și normalizarea metabolismului;

Shu – RP3 Taibai, E44 Neiting;
Shu-post. – V20 Pishu, V23 Shenshu.

Formula

E44 + V23.

Modelul clinic 386

Obezitatea

[Insuficiența Qi a Splinei și a Inimii]

Simptome

obezitate; palpitații; diminuarea memoriei, insomnie, somn cu coșmaruri, insecuritate psihologică, astenie; scaune moi, senzație de plenitudine în abdomen după ingerarea alimentelor. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Qi a Splinei și a Inimii, armonizarea organelor digestive și normalizarea metabolismului:

Shu – C7 Shenmen, RP1 Yinbai, E44 Neiting;

Shu-post. – V20 Pishu, V15 Xinshu.

Formula

E44 + C7.

Modelul clinic 387

Obezitatea

[Căldura în Stomac]

Simptome

obezitate; sete și apetit pronunțate. *Limba* – cu depozit galben. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii în Stomac, armonizarea organelor digestive și a metabolismului;

Shu – E44 Neiting, GI11 Quchi;

& – E37 Shangjuxu.

Formule

- E45 + GI11 + GI4 + VC12 + E36 (formulă cu efect de diminuare a Căldurii și armonizare a Stomacului);
- E21 + E39 + E44 + GI4 + GI10 + MC3 + VC14;
- E44 + GI10 + V28 (formulă indicată în bulemie).

Modelul clinic 388

Obezitatea

[Obezitatea de genul C]

Simptome

obezitate cu alimentație exagerată, tulburări nevrotice, participarea la fenomenele interpersonale este substituită prin consumul excesiv al alimentelor ("foame de viață"). *Limba* – roșie (în special vârful), tremurândă. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

normalizarea funcției Inimii, armonizarea organelor digestive și a metabolismului:

- Shu – E36 Zusanli, MC8 Laogong;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan, VC14 Jueque, VC17 Shanzhong;
- Lo – R4 Dazhong, C5 Tongli;
- & – E39 Xiajuxu, VC23 Lianquan.

Formula

E44 + MC8 + VC23.

Modelul clinic 389

Obezitatea

[Insuficiența Qi a Inimii și a Plămânilor]

Simptome

obezitate; palpitații; respirație scurtă, tinitus, fatigabilitate. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Qi a Inimii și a Plămânilor, armonizarea organelor digestive și a metabolismului:

- Shu – C7 Shenmen, P9 Taiyuan, E44 Neiting;
- Shu-post. – V13 Feishu, V15 Xinshu.

Formula

E44 + C7 + P9.

Modelul clinic 390

Obezitatea

[Uscăciune a Intestinelor]

Simptome

obezitate; constipații, scaune uscate, senzație de distensie în abdomen. *Limba* – cu depozit galben. *Pulsul* – fin sau mic.

Tratamentul

umectarea Intestinelor, armonizarea organelor digestive și a metabolismului:

- Shu – E44 Neiting, GI11 Quchi, TR6 Zhigou;
- Mu-ant. – E25 Tianshu.

Formule

- R7 + R6 + TR6 + RP6 + E36 + V25 (formulă cu efect de umectare și armonizare a intestinelor);
- E44 + E25.

Modelul clinic 391

Obezitatea

[Obezitatea de genul F]

Simptome

obezitate cu alimentație excesivă pe fond de depresie, iritabilitate și frustrație, disconfort sau durere în hipocondru; cefalee, vertij.
Limba – roșie. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

restabilirea circulației Qi, normalizarea digestiei și a metabolismului:

- Shu – E36 Zusanli, E44 Neiting, RP1 Yinbai, RP2 Dadu, F1 Dadun, GI11 Quchi, F2 Xingjian, VB43 Xiaxi;
Mu-ant. – F13 Zhangmen, VC12 Zhongwan, VC17 Shanzhong;
& – E39 Xiajuxu.

Formula

E44 + F1 + F13.

Modelul clinic 392

Obezitatea

[Obezitatea de genul R]

Simptome

obezitate; corp și extremități reci; edeme, facies tumefiat; tinitus; senzație de disconfort sau durere în regiunea lombară. *Limba* – palidă, tumefiată, cu depozit alb. *Pulsul* – profund și lent.

Tratamentul

normalizarea funcției Rinichilor, armonizarea organelor digestive și normalizarea metabolismului:

- Shu – RP9 Yinlingquan, TR6 Zhiqiu;
Shu-post. – V23 Shenshu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – E39 Xiajuxu, VC6 Qihai, VG4 Mingmen, VG20 Baihui.

Formula

E44 + V23 + VG4.

Modelul clinic 393

Obezitatea

[Insuficiența Yin-Qi / Insuficiența Lichidelor]

Simptome

obezitate (tensionare nervoasă și hiperactivitate cu consum exagerat de alimente); constipații, scaune uscate, gură și gât uscate; neliniște, anxietate. *Limba* – roșie (în special vârful și marginile), fără depozit. *Pulsul* – rapid și subțire.

Tratamentul

alimentarea Yin-Qi, armonizarea organelor digestive și a metabolismului:

- | | | |
|---------|---|--|
| Shu | – | E36 Zusanli, E44 Neiting, GI4 Hegu, R7 Fuliu, GI11 Quchi, R2 Rangu, F2 Xingjian; |
| Mu-ant. | – | VC12 Zhongwan, E25 Tianshu; |
| Lo | – | RP6 Sanyinjiao; |
| & | – | R6 Zhaohai. |

Formule

- R7 + R6 + TR6 + RP6 + E36 + V25 (formulă cu efect de umectare și armonizare a intestinelor);
- E25 + TR6.

XIII.3. Hiperlipoproteinemiiile (dislipidemiile)

Modelul clinic 394

Dislipidemia

[Stagnarea Qi și Xue]

Simptome

senzație de amorțire sau furnicături în membre; dureri precordiale, palpitații; anorexie, senzație de distensie abdominală, eructație, tulburări de defecație; iritabilitate. La examenul de laborator se depistează concentrația sporită a lipidelor în plasma sanguină, *Limba* – cu pete purpurii sau cu echimoze. *Pulsul* – profund și rugos.

Tratamentul

înlăturarea stagnării Qi și Xue, armonizarea metabolismului lipidic:

- | | | |
|-----------|---|---|
| Shu | – | GI4 Hegu, F3 Taichong; |
| Shu-post. | – | V18 Ganshu, V17 Geshu; |
| Mu-ant. | – | VC17 Shanzhong; |
| Lo | – | C5 Tongli, RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan; |
| Xi | – | RP8 Diji, MC4 Ximen; |
| & | – | RP10 Xuehai. |

Formula

MC6 + E40 + RP4 + RP6.

Modelul clinic 395

Dislipidemia

[Insuficiența Qi a Splinei]

Simptome

astenie, nedorința de a vorbi; inapetență, abdomen balonat sau

senzație de distensie în abdomen, scaune moi. La examenul de laborator se depistează concentrația sporită a lipidelor în plasma sanguină. *Limba* – palidă, cu amprente dentare. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Qi a Splinei, armonizarea metabolismului lipidic:

Shu – RP3 Taibai, RP9 Yinlingquan, E36 Zusanli;

Shu-post. – V20 Pishu;

Mu-ant. – E25 Tianshu, VC12 Zhongwan;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – VC6 Qihai.

Formule

- RP2 + RP3 + E36 + V20 + F13 (formulă cu efect de fortificare Qi și armonizare a Splinei);
- E25 + E37;
- RP6 + RP4 + E40 + MC6;
- VC12 + MC6.

Modelul clinic 396

Dislipidemia

[Umiditate / Umiditate-Flegmă a Focarului Mijlociu]

Simptome

senzație de plenitudine, greutate și distensie în epigastru și abdomen, grețuri, anorexie, preferință pentru alimente picante; obezitate; senzație de greutate în regiunea cefalică, cutia toracică sau membre; expectorații frecvente. La examenul de laborator se depistează concentrația sporită a lipidelor în plasma sanguină. *Limba* – cu depozit murdar, lipicios sau gras. *Pulsul* – alunecos sau moale.

Tratamentul

eliminarea Umidității-Flegmă, armonizarea Focarului Mijlociu și a metabolismului lipidic:

Shu – RP3 Taibai, E36 Zusanli, TR6 Zhigou;

Mu-ant. – VC12 Zhongwan, VC17 Shanzhong;

Lo – E40 Fenglong.

Formula

VC12 + E37.

XIII.4. Cașexia

Modelul clinic 397

Cașexia

[Insuficiența Qi a Splinei și Stomacului]

Simptome

cașexie progresivă, astenie, dispnee la efort minimal, slăbiciune a mușchilor; piele palidă; inapetență, scaune moi. *Limba* – palidă, cu depozit alb. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Qi a Splinei și Stomacului, armonizarea organelor digestive și a metabolismului;

Shu – E36 Zusanli;

Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu;

Mu-ant. – VC12 Zhongwan.

Formule

- RP2 + RP3 + E36 + V20 + F13 (formulă cu efect de fortificare Qi și armonizare a Splinei);
- E36 + RP6 + VB39 + RP10.

Modelul clinic 398

Cașexia

[Insuficiența Yin-Qi cu Excesul Focului]

Simptome

cașexie progresivă; sete, senzație de căldură în "cinci inimi"; tinitus; insomnie. *Limba* – roșie, cu depozit neînsemnat. *Pulsul* – subțire, rapid.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi, diminuarea Focului, armonizarea organelor digestive și a metabolismului;

Shu – E36 Zusanli, F3 Taichong, R3 Taixi, E44 Neiting;

Shu-post. – V23 Shenshu;

Lo – RP6 Sanyinjiao.

XIII.5. Disfuncția glandei tiroide

Modelul clinic 399

Hipertiroidismul

[Stagnarea Qi a Ficatului cu transformarea în Foc]

Simptome

facies și ochi hiperemiați; palpitații; respirație scurtă; transpirație abundentă; sete cu preferință de băuturi reci; foame cu o alimentație excesivă, scădere în greutate; iritabilitate; amețeli, cefalee, tinitus; dereglări ale somnului, coșmaruri; hipertrofia difuză a glandei tiroide; tremor al membrelor superioare; exoftalm. *Limba* – uscată, roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – întins și rapid.

Tratamentul

înlăturarea stagnării Qi, eliminarea Focului, fortificarea Yin-ului:

- Shu – GI4 Hegu, GI11 Quchi, E36 Zusanli, R3 Taixi, R7 Fuliu, MC5 Jianshi, F3 Taichong;
Lo – E40 Fenglong, RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
& – E10 Shuitu, V2 Zanzhu, V10 Tianzhu, R6 Zhaohai, VB1 Tongziliao, VC22 Tiantu, GI18 Futu.

Formule

- R3 + MC5 + E10 + V10 + V2;
- R7 + E36 + VC22 + MC6 + VB1;
- R6 + RP6 + GI4 + GI11 + E10;
- R3 + F3 + E40 + E10 + V10;
- R7 + E36 + MC5 + V2 + VC22;
- R6 + MC6 + F3 + E10 + V10;
- R3 + RP6 + GI4 + E40 + VC22.

După autorii chinezi, aceste puncte se folosesc în fiecare zi în decurs de șapte zile, conform prescripției.

Modelul clinic 400

Hipertiroidismul

[Insuficiența Yin-Qi și Xue a Inimii cu pierderea controlului asupra Yang-Qi și acumularea Căldurii Interne / Căldură în Focarul Superior]

Simptome

astenie cu dispnee la efort; palpitații; dereglări ale somnului; transpirații nocturne, polidipsie; senzație de căldură în regiunea celor "cinci inimi" (tâlpă, palme, piept); nervozitate, anxietate, agitație (posibil, pe fond de astenie psihică); tremor al mâinilor. Sindromul apare după maladii cronice, epuizante, pe fond de stresuri puternice repetate sau după maladii cu pierderi considerabile de lichide (hipertermie). *Limba* – roșie. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Yin-Qi și Xue a Inimii, diminuarea Căldurii, armonizarea Focarului Superior:

- Shu – C7 Shenmen, TR2 Yemen, GI11 Quchi, MC5 Jianshi;
Shu-post. – V15 Xinshu, V17 Geshu, V20 Pishu;
Mu-ant. – VC17 Shanzhong;
Lo – RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
& – E10 Shuitu, VC6 Qihai, VC22 Tiantu, V10 Tianzhu.

Formula

E36 + VC22 + GI17 + GI4 + MC5 + R3.

Modelul clinic 401

Hipotiroidismul

[Frig al Focarului Superior]

Simptome

apatie, astenie, insomnie noaptea cu somnolență ziua; bradipnee; piele rece și palidă (senzație de rece în regiunea punctului VC17 Shanzhong); constipație; urină de culoare deschisă. *Limba* – palidă, umedă, cu depozit alb. *Pulsul* – lent.

Tratamentul

dispersarea Frigului, încălzirea Focarului Superior:

- Shu – TR2 Yemen, TR3 Zhongzhu;
Mu-ant. – VC17 Shanzhong;
& – V10 Tianzhu, V11 Dazhu, VC22 Tiantu.

Formula

MC6 + MC8 + V43 + V17.

XIII.6. Disfuncția glandei paratiroide

Modelul clinic 402

Hipoparatiroidismul

[Insuficiența Xue în Ficat: Vânt Intern]

Simptome

contracții involuntare frecvente în formă de criză (degetele mâinii în extensie, policele lipit de palmă), picioarele în flexie, tremor al capului, fălci încheștate, crampe musculare; iritabilitate, apatie; ten palid. Diagnosticul se confirmă prin examenul de laborator (hipocalciemie). *Limba* – palidă, cu depozit subțire. *Pulsul* – întins și subțire.

Tratamentul

fortificarea Xue a Ficatului, armonizarea Qi și Xue, calmarea Vântului:

- Shu – E36 Zusanli, IG3 Houxi, MC9 Zhongchong, TR10

- Tianjing, F3 Taichong;
 Lo – RP6 Sanyinjiao, P7 Lieque;
 & – V11 Dazhu, VB20 Fengchi, VG13 Taodao, VG26 Renzhong.

Formula antică

TR17 + VB20 + VG16 (trei puncte ale Vântului Intern).

XIII.7. Tulburările de menopauză

Modelul clinic 403

Menopauza

[Dezarmonia Inimă-Rinichi]

Simptome

facies roșu, gură uscată, ulceratii pe mucoasa bucală sau limbă; neliniște, insomnie, astenie intelectuală, amețeli; palpitații, dureri sau senzație neplăcută în regiunea precordială; transpirații nocturne; slăbiciune sau durere în regiunea lombară și membrele inferioare; urini hiperchrome. *Limba* – roșie (în special vârful), uscată. *Pulsul* – rapid și filiform.

Tratamentul

armonizarea funcției Inimii și a Rinichilor:

- Shu – C7 Shenmen, R3 Taixi, R7 Fuliu;
 Shu-post. – V15 Xinshu, V23 Shenshu;
 Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
 Lo – RP6 Sanyinjiao;
 & – VB20 Fengchi.

Formule

- VC4 + RP6 + R6 (tonifiere) + C8 (dispersie; formula antică);
 – VC6 + RP6.

Modelul clinic 404

Menopauza

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului și a Rinichilor]

Simptome

senzație de slăbiciune, greutate sau dureri în regiunea lombară și în membrele inferioare (în special în articulațiile genunchilor); senzație de căldură în regiunea celor "cinci inimi" (palme, tălpi, piept), roșeață malară, transpirații nocturne; vertij, scăderea memoriei, insomnie; zgomote în urechi; gură uscată, gât uscat; tulburări de vedere, conjunctivă uscată. *Limba* – roșie, cu depozit neînsemnat. *Pulsul* – întins și fin.

Tratamentul

alimentarea Yin-Qi, armonizarea Ficatului și a Rinichilor:

- Shu – E36 Zusanli, R3 Taixi, F3 Taichong;

- Shu-post. – V18 Ganshu, V23 Shenshu;
- Mu-ant. – F14 Qimen;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VC6 Qihai.

Formule

- R3 + R6 + F8 (tonifiere) + F2 (dispersie; formula antică);
- R6 + R10 + RP6 + C6;
- E36 + V10.

Modelul clinic 405

Menopauza

[Insuficiența Yang-Qi a Splinei și a Rinichilor]

Simptome

ten palid, aspect buhăit al feței; membre reci, senzație de slăbiciune și greutate în regiunea lombară și membrele inferioare; diaree cu alimente nedigerate, abdomen balonat, diaree matinală; oligurie; edem al membrelor inferioare; scădere ponderală. *Limba* – palidă, tumefiată, umedă, cu depozit alb. *Pulsul* – profund și slab.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Splinei și a Rinichilor:

- Shu – E36 Zusanli, C7 Shenmen, RP9 Yinlingquan, R7 Fuli;
- Shu-post. – V20 Pishu, V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC3 Zhongji, VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VB20 Fengchi.

Formula antică

VG20 + VC4 + R7 + E36 + VC12 + RP2 (acupunctura + moxibustie).

Modelul clinic 406

Menopauza

[Insuficiența Xue în Ficat]

Simptome

ten palid, buze palide; amețeli, lipotimie; ochi uscați; palpitații; depresie psihică; membre amorțite, senzație de furnicături; spasme musculare. Amenoreea apare după pierderi excesive de sânge, după boli cronice epuizante. *Limba* – palidă. *Pulsul* – gol, slab sau filiform.

Tratamentul

fortificarea Xue, armonizarea Qi și Xue:

- Shu – E36 Zusanli, RP1 Yinbai, F1 Dadun, F8 Ququan;
- Shu-post. – V17 Geshu, V18 Ganshu, V20 Pishu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;

& - RP10 Xuehai, VG4 Mingmen, VC6 Qihai.

Formule

- V17 + V20 + V43;
- VC4 + VC12 + E36 + RP6 + RP10.

XIV

Acupunctura în oftalmologie

- XIV.1. Hordeolumul**
- XIV.2. Conjunctivita**
- XIV.3. Dacrioreea**
- XIV.4. Cheratita**
- XIV.5. Sindromul Bao Mang**
- XIV.6. Hemeralopia**
- XIV.7. Miopia**
- XIV.8. Blefaroptoza**
- XIV.9. Strabismul**

XIV.1. Hordeolumul

Modelul clinic 407

Hordeolumul

[Vânt-Căldură / Căldură în Yang Ming]

Simptome

edem palpebral cu un punct mai dureros; peste 2–3 zile apare un punct gălbui, care se dezvoltă repede, transformându-se într-o pustulă ce se sparge; sunt posibile cefaleea, temperatura subfebrilă; adenopatia preauriculară sau submaxilară. *Limba* – roșie. *Pulsul* – rapid sau alunecos.

Tratamentul

eliminarea Vântului și a Căldurii, diminuarea Căldurii în Yang Ming, armonizarea circulației Qi și Xue în regiunea ochilor:

- | | | |
|-----|---|---|
| Shu | – | E44 Neiting, IG1 Shaoze (sângerare), GI4 Hegu, GI11 Quchi; |
| Lo | – | TR5 Waiguan; |
| & | – | TR23 Sizhukong, VB1 Tongziliao, E1 Chengqi, VG14 Dazhui, Taiyang (Extra). |

Formule

- Taiyang (sângerare, 2–3 picături) + VG14 (sângerare, 2–3 picături, apoi aplicarea ventuzelor pe o durată de 5–10 minute) + punctul localizat la vârful degetului III (sângerare, 3–5 picături; formula antică);
- GI4 + GI11 + MC9 + P5 + Taiyang + VG14;
- TR23 + VB1 (afectarea unghiului extern al pleoapelor);
- V1 + V2 (afectarea unghiului intern al pleoapelor);
- VB14 + Yuyao (afectarea pleoapei superioare);
- E1 + E2 (afectarea pleoapei inferioare);
- GI4 + E36 + E1 + V20 + V21 + V10 (în caz de recidivare se efectuează un curs profilactic, 5–8 ședințe).

XIV.2. Conjunctivita

Modelul clinic 408

Conjunctivita acută

[Vânt-Căldură]

Simptome

hiperemie, durere și edem al conjunctivei, jenă oculară, usturime,

* Yuyao – în mijlocul sprâncenei pe verticala pupilei.

lăcrimare, fotofobie moderată, ochi injectați, senzație de corp străin în ochi; cefalee. *Limba* – normală sau roșie, cu puncte roșii pe partea dreaptă sau stângă. *Pulsul* – normal sau superficial și rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, eliminarea Vântului și normalizarea circulației Qi și Xue în regiunea ochilor:

- Shu – GI4 Hegu, P11 Shaoshang, F3 Taichong;
- Xi – IG6 Yanglao;
- & – VB20 Fengchi, Taiyang (Extra), V1 Jingming, Yuyao (Extra).

Formule

- IG1 + V2 + V67 + TR3 + VB1;
- V2 + V18;
- E43 + R1;
- GI14 + VB37;
- VG23 + P11 + Taiyang (sângerare) + V1 + VB1 + GI4;
- TR1 + VB44;
- P11 + Taiyang (sângerare);

Modelul clinic 409

Conjunctivita acută

[Hiperactivitatea Focului în Ficat și Vezicula Biliară / Ascendența Yang-Qi a Ficatului]

Simptome

hiperemie și durere pronunțată a conjunctivei, usturime, prurit, senzație de arsură, fotofobie, lăcrimare; cefalee; senzație de disconfort în hipocondru; sete cu preferință de băuturi reci; gust amar, constipație; senzație de căldură în tot corpul; iritabilitate; vertij, cefalee. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – întins și rapid.

Tratamentul

diminuarea Focului și armonizarea circulației Qi și Xue în regiunea ochilor:

- Shu – GI4 Hegu, F3 Taichong, F2 Xingjian, VB43 Xiapi, VB38 Yangfu;
- Xi – IG6 Yanglao;
- & – V1 Jingming, Taiyang (Extra), VB20 Fengchi, VB1 Tongziliao, Yuyao (Extra).

Formule

- Taiyang + VB1 + GI4 + VB20 + VB43;
- V1 + Taiyang + GI4 + VB20 + F2 + IG6.

Modelul clinic 410

Conjunctivita acută

[Focul Stomacului în ascendență]

Simptome

hiperemie, tumefiere și senzație de corp străin sub pleoape, senzație de arsură, usturime; iritabilitate; arsuri și durere în epigastriu, regurgitații acide. *Limba* – cu depozit gros, galben, uneori cu nuanțe cenușii. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

diminuarea Focului din Stomac și normalizarea circulației Qi și Xue în regiunea ochilor:

Shu – E36 Zusanli, F3 Taichong, E44 Neiting, GI4 Hegu;
& – V1 Jingming, Taiyang (Extra), E8 Touwei, E1 Chengqi, Yuyao (Extra), VB20 Fengchi.

Formule

- V2 + GI3;
- GI14 + VB37;
- V1 + Taiyang + GI4 + VB20 + E44 + E8 + IG6.

Modelul clinic 411

Conjunctivita cronică

[Hiperactivitatea Focului în Ficat și Stomac]

Simptome

senzație de corp străin în ochi, prurit și senzație de arsură slab pronunțate, hiperemie moderată a conjunctivei palpebrale, care prezintă o hiperplazie papilară sau foliculară. *Limba* – cu depozit subțire și galben. *Pulsul* – întins și rapid.

Tratamentul

diminuarea Focului din Ficat și Stomac, armonizarea circulației Qi și Xue în regiunea ochilor:

Shu – GI4 Hegu, F3 Taichong, F2 Xingjian, VB43 Xiaxi, VB38 Yangfu;
Lo – E40 Fenglong;
& – V1 Jingming, Taiyang (Extra), E1 Chengqi, Yuyao (Extra), VB20 Fengchi.

Formula antică

E36 + V18 + V23 + V17 + VC6 (moxibustie, primăvara devreme și vara târziu cu scop profilactic).

Modelul clinic 412

Conjunctivita cronică

[Căldură în Plămâni și Inimă]

Simptome

prurit pronunțat, senzație de corp străin, fotofobie, hiperemie a conjunctivei palpebrale (în special în regiunea unghiului intern al

pleoapelor cu semne de macerare), care prezintă o hiperplazie papilară sau foliculi. *Limba* – roșie, cu depozit suriu. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii și armonizarea circulației Qi și Xue în regiunea ochilor:

- Shu – GI4 Hegu, F3 Taichong, C7 Shenmen, MC7 Daling;
- Shu-post. – V13 Feishu, V18 Ganshu;
- Lo – P7 Lieque;
- & – V1 Jingming, Taiyang (Extra); Yuyao (Extra), VB20 Fengchi.

Formule

- VG24 + VG23 + VG22 + VG21 + VG20 (formula antică; în toate punctele se aplică tehnica de sângerare);
- V1 + Taiyang + GI4 + VB20 + P7 + C7 + IG6.

Modelul clinic 413

Conjunctivita nodulară cronică (trahomul – stadiul I și II)

[Căldură în Vezicula Biliară și Stomac / Hiperactivitatea Focului în Ficat / Căldură-Flegmă]

Simptome

hiperemie a conjunctivei, senzație de corp străin, fotofobie moderată, greutate palpebrală, conjunctivă palpebrală îngroșată, cu foliculi de culoare gri și galbenă-roșietică (situate paralel cu marginea pleoapelor). *Limba* – roșie. *Pulsul* – moale sau întins, rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii și a Focului, expulzarea Flegmei și armonizarea circulației Qi și Xue în regiunea ochilor:

- Shu – GI4 Hegu, GI11 Quchi, F3 Taichong, VB43 Xiashi;
- Lo – TR5 Waiguan;
- punct Xi – IG6 Yanglao;
- & – VB20 Fengchi, TR23 Sizhukong, E2 Sibai, Yuyao (Extra), V11 Dazhu, Taiyang (Extra).

Formule

- F2 + F8;
- F1 + VB1 + VB38 + VB44;
- TR3 + VB37;
- V1 + Taiyang + GI4 + VB20 + VB43 + GI11.

Modelul clinic 414

Conjunctivita nodulară cronică (trahomul – stadiul III și IV)

[Blocajul meridianelor E, IG, V și VB în regiunea ochilor]

Simptome

cicatrice stelate albicioase în regiunea conjunctivei, foliculii și infiltrația treptat dispar, rămân numai cicatricile liniare albe; tarsul

se curbează cu marginea ciliară spre corneă; micșorarea acuității vizuale. *Limba* și *pulsul* sunt diferite, în funcție de afectarea meridianelor.

Tratamentul

restabilirea și armonizarea circulației Qi și Xue în regiunea ochilor:

- Shu – GI4 Hegu, E36 Zusanli, F3 Taichong;
- Shu-post. – V18 Ganshu;
- Lo – TR5 Waiguan;
- Xi – IG6 Yanglao;
- & – VC6 Qihai, VG4 Mingmen, VB20 Fengchi, TR23 Sizhukong, E2 Sibai, Yuyao (Extra), V11 Dazhu, Taiyang (Extra). În caz de absență a semnelor de inflamare se aplică și moxibustia.

Formule

- TR3 + VB37;
- V1 + Taiyang + GI4 + F3 + VB20 + IG6.

XIV.3. Dacrioreea

Modelul clinic 415

Dacrioreea

[Invazia Vântului și a Frigului patogen pe fond de Insuficiență a Rinichilor și Ficatului]

Simptome

lăcrimare cronică, care se amplifică la vânt și frig (este absentă hiperemia conjunctivei și edemul), uneori apare senzația de durere în regiunea unghiului intern al ochiului. Este posibilă apariția semnelor de Insuficiență a Rinichilor (Esența) și a Ficatului. Dacrioreea apare mai des la persoane de vârstă înaintată, cu acutizare iarna și ameliorare vara. *Limba* și *pulsul* sunt diferite, în funcție de predominarea patologiei. Mai frecvent limba este cu depozit alb și subțire; *pulsul* – subțire și încordat sau superficial și încordat.

Tratamentul

tonifierea Rinichilor și a Ficatului, expulzarea Vântului și a Frigului patogen, armonizarea circulației Qi și Xue în regiunea ochilor:

- Shu – GI4 Hegu, F3 Taichong, R3 Taixi;
- Shu-post. – V18 Ganshu, V23 Shenshu;
- & – V1 Jingming, VB20 Fengchi, VB15 Linqi, VB12 Wangu, VG4 Mingmen.

Formule

- TR3 + VB37;
- VB12 + GI11 + V18;

XIV.4. Cheratita

Modelul clinic 416

Cheratita

[Invazia Vântului-Căldurii cu afectarea Plămânilor și a Ficatului pe fond de Insuficiență Wei-Qi în regiunea ochilor]

Simptome

semne subiective: lăcrimarea, fotofobia, blefarospasmul, durerile de ochi, scăderea vederii; semne obiective: congestia pericorneeană și conjunctivală; leziunile corneene (inflamații, eroziuni) etc. Manifestările clinice sunt în funcție de etiopatogeneza bolii: herpesul ocular (simptomatologie polimorfă în asociere cu alte manifestări herpetice – pleoape, nas etc.); cheratita scrofuloasă (are o incidență mai mare la copii, fiind de etiologie alergico-microbiană); cheratita ulceroasă (se caracterizează prin defect corneean care trece prin 3 faze: de infiltrație, de supurație și de cicatrizare); cheratita neuoparalitică (prezintă o afecțiune unilaterală, care se manifestă printr-o ulceratie, ce se formează pe o cornee insensibilă, datorită unei leziuni a nervului trigemen, asociată cu lezarea nervului simpatic). Tabloul lingval și caracteristicile pulsului sunt în funcție de etiopatogeneza maladii.

Tratamentul

Înlăturarea Vântului și a Căldurii din meridiane și organe, armonizarea Plămânilor și a Ficatului, fortificarea Wei-Qi și ameliorarea circulației Qi și Xue în regiunea ochilor:

- | | | |
|-----------|---|---|
| Shu | – | GI4 Hegu, GI5 Yangxi, MC7 Daling, E36 Zusanli; |
| Shu-post. | – | V18 Ganshu, V13 Feishu, V19 Danshu, V23 Shenshu; |
| Lo | – | VB37 Guangming; |
| & | – | V1 Jingming, V2 Zanzhu, E2 Sibai, E3 Juliao, E4 Dicang, VG14 Dazhui, Taiyang (Extra), VB14 Yangbai, VB20 Fengchi, TR17 Yifeng, V43 Gaohuangshu, VB1 Tongziliau. |

Formule

- GI4 + V1 + GI5 (moxibustie printr-o felie de usturoi, câte 6–7 conuri de mărimea boabei de fasole, 1–2 ori pe zi; se folosește punctul contralateral de ochiul afectat sau bilateral în afectarea ambilor ochi);
- TR3 + VB37 + Taiyang;
- VB41 + TR5 + VB1.

XIV.5. Sindromul Bao Mang*

Modelul clinic 417

Sindromul Bao Mang

[Stagnarea Qi a Ficatului cu transformare în Foc]

Simptome

scădere progresivă a acuității vizuale sub influența emoțiilor negative; senzație de distensie în globii oculari; iritabilitate, depresie psihică; vertij; facies și ochi hiperemiați; gust amar, disconfort în regiunea hipocondrului. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – întins, rapid.

Tratamentul

diminuarea Focului, normalizarea circulației Qi a Ficatului, armonizarea circulației Qi și Xue în regiunea ochilor.

- Shu – E36 Zusanli, VB34 Yanglingquan, F3 Taichong, GI4 Hegu;
Shu-post. – V18 Ganshu;
Mu-ant. – F14 Qimen;
Lo – VB37 Guangming;
& – Taiyang (Extra), VB20 Fengchi, V2 Zanzhu, V1 Jingming, Qiuhou** (Extra), E1 Chengqi.

Formule

- GI4 + VB37; TR3 + VB37;
- VB20 + Taiyang + Qiuhou + VB37.

Modelul clinic 418

Sindromul Bao Mang

[Stagnarea Qi și Xue]

Simptome

scăderea progresivă a acuității vizuale cu senzație de distensie în regiunea globilor oculari (în anamneză sunt posibile diferite traume fizice). *Limba* – purpurie sau cu puncte purpurii. *Pulsul* – profund și rugos sau scurt și dur.

Tratamentul

ameliorarea circulației Qi și Xue:

- Shu – F8 Ququan, GI4 Hegu, F3 Taichong;
Shu-post. – V17 Geshu;
& – VB20 Fengchi, Qiuhou (Extra), V1 Jingming.

Formule

- GI4 + VB37; TR3 + VB37;

* Sindromul Bao Mang include patologiile care duc la scăderea progresivă a acuității vizuale sau pierderea vederii (retinopatiile, retinitile, corioretinitle, dezlipirea de retină, nevrita optică, atrofia nervului optic etc).

** Qiuhou – la granița 1/4 laterale și 3/4 mediale ale marginii inferioare a orbitei.

– GI4 + F3 + V17.

Modelul clinic 419

Sindromul Bao Mang

[Căldură în meridianul Intestinul Gros]

Simptome

scădere progresivă a acuității vizuale după afecțiuni acute ale nasului și gâtului (afecțiuni febrile); cefalee. *Limba* – roșie. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

eliminarea Căldurii, armonizarea circulației Qi și Xue în regiunea ochilor:

Shu – GI4 Hegu, GI11 Quchi, F3 Taichong;
Shu-post. – V18 Ganshu;
Lo – P7 Lieque;
& – VB20 Fengchi, Qiuhou (Extra), V1 Jingming.

Formula

GI11 + GI4 + VB37 + TR3.

Modelul clinic 420

Sindromul Bao Mang

[Căldură-Flegmă]

Simptome

scădere progresivă a acuității vizuale cu senzație de greutate în regiunea cefalică și ochi; inapetență, sete fără dorință de a bea, grețuri, scaune cu miros fetid. *Limba* – cu depozit galben, lipicios. *Pulsul* – alunecos și rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, reducerea Flegmei, armonizarea circulației Qi și Xue în regiunea ochilor:

Shu – GI4 Hegu, E41 Jiexi, VB41 Zulinqi;
Shu-post. – V20 Pishu;
Lo – E40 Fenglong;
& – VB20 Fengchi, Qiuhou (Extra), V1 Jingming, E1 Chengqi, VG23 Shangxing.

Formula

GI4 + VB37 + E40.

Modelul clinic 421

Sindromul Bao Mang

[Insuficiența Yang-Qi a Splinei și a Rinichilor]

Simptome

scăderea progresivă a acuității vizuale; ten palid; membre inferioare reci, slăbiciune în regiunea lombară și picioare; facies tumefiat; distensie abdominală, diaree cronică matinală, inapetență,

scădere ponderală. *Limba* – palidă, puțin tumefiată și umedă. *Pulsul* – profund și slab.

Tratamentul

fortificarea și încălzirea Splinei și a Rinichilor, armonizarea circulației Qi și Xue în regiunea ochilor:

- Shu – GI4 Hegu, E36 Zusanli;
- Shu-post. – VB20 Fengchi, V23 Shenshu;
- & – VB20 Fengchi, Qiuhou (Extra), V1 Jingming, VG4 Mingmen.

Formule

- GI4 + E36 + RP6 + R7 + F3 (formula antică);
- TR3 + VB37;
- R3 + RP6 + F3 + VB20 + VC4 + VB37.

Modelul clinic 422

Sindromul Bao Mang

[Insuficiența Qi și Xue]

Simptome

scăderea progresivă a acuității vizuale (în special în urma bolilor cronice, epuizante); piele și buze palide, astenie; anorexie. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab și gol.

Tratamentul

fortificarea Splinei și a Stomacului, armonizarea circulației Qi și Xue în regiunea ochilor:

- Shu – GI4 Hegu, E36 Zusanli;
- Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu, V18 Ganshu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, VB39 Xuanzhong;
- & – VB20 Fengchi, Qiuhou (Extra), V1 Jingming, VC6 Qihai, RP10 Xuehai, VG20 Baihui, VG23 Shangxing.

Formule

- VB20 + V18 + V23 + P9 + GI4 + V58 + R3 (formula antică);
- TR3 + VB37;
- VB1 + V2 + VG20 + GI4 + E36 + VC4.

Modelul clinic 423

Sindromul Bao Mang

[Insuficiența Xue a Inimii]

Simptome

scăderea progresivă a acuității vizuale după perioade lungi de anxietate, stresare, după diferite hemoragii; palpitații; insomnie, diminuarea memoriei; piele și buze palide. *Limba* – palidă. *Pulsul* – subțire.

Tratamentul

fortificarea Xue, armonizarea Inimii și a circulației Qi și Xue în regiunea ochilor:

- Shu – GI4 Hegu, C7 Shenmen;
- Shu-post. – V17 Geshu, V20 Pishu, V15 Xinshu;
- Lo – MC6 Neiguan, VB39 Xuanzhong;
- & – VB20 Fengchi, Qiuhou (Extra), V1 Jingming.

Formule

- GI4 + VB37 + V17 + V15;
- TR3 + VB37.

Modelul clinic 424

Sindromul Bao Mang

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului și Rinichilor]

Simptome

scăderea progresivă a acuității vizuale cu uscăciune a ochilor; slăbiciune, greutate, amorțire sau durere în regiunea lombară și în membrele inferioare; senzație de căldură în "cinci inimi", gură și gât uscate, transpirații nocturne; vertij, zgomote în urechi; pierderi seminale nocturne; oligomenoree sau amenoree. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – rapid și subțire.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi a Rinichilor și a Ficatului, armonizarea circulației Qi și Xue în regiunea ochilor:

- Shu – GI4 Hegu, R3 Taixi, F8 Ququan, F3 Taichong;
- Shu-post. – V18 Ganshu, V23 Shenshu, V17 Geshu;
- Lo – VB39 Xuanzhong;
- & – VB20 Fengchi, Qiuhou (Extra), V1 Jingming, R6 Zhaohai, VG20 Baihui, E1 Chengqi.

Formule

- GI4 + VB37 + R3 + F8;
- TR3 + VB37.

XIV.6. Hemeralopia

Modelul clinic 425

Hemeralopia congenitală

[Insuficiența Energiei Vitale / Insuficiența Splinei, Ficatului și a Rinichilor]

Simptome

diminuarea vederii (în special în întuneric și noaptea) la vârsta copilăriei; se evidențiază patologia retinei (procese degenerative).

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Energiei Vitale, Splinei, Ficatului și Rinichilor:

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V23 Shenshu, V18 Ganshu, V20 Pishu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, VB37 Guangming;
- & – VG4 Mingmen, Qiuhou (Extra), V1 Jingming.

Formule

- TR3 + VB37;
- E36 + VB37 + V23.

Modelul clinic 426

Hemeralopia (avitaminoza A)

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului și a Rinichilor / Insuficiența Qi a Splinei]

Simptome

diminuarea vederii (în special în întuneric și noaptea), uscăciune a ochilor; uscăciune în gât; senzație de căldură în "cinci inimi"; dureri lombare; slăbiciune în genunchi; transpirații nocturne; astenie; inapetență, distensie abdominală; tinitus, scăderea memoriei, insomnie; pierderi seminale nocturne, oligomenoree sau amenoree. *Limba* – roșie, cu depozit neînsemnat sau palidă. *Pulsul* – slab, gol sau întins și fin.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Ficatului, Rinichilor și a Splinei:

- Shu – E36 Zusanli, F2 Xingjian, P11 Shaoshang, GI4 Hegu;
- Shu-post. – V18 Ganshu, V23 Shenshu, V20 Pishu, V19 Danshu;
- Lo – VB37 Guangming, RP6 Sanyinjiao;
- & – Sifeng (Extra), V1 Jingming.

Formule

- TR3 + VB37;
- R3 + F8 + E36 + Sifeng.

* Sifeng – pe fața palmară a mâinii, pe pliurile interfalangiene proximale ale indexului, mediusului, inelarului și auricularului (câte 4 puncte pe fiecare mână).

XIV.7. Miopia

Modelul clinic 427

Miopia

[Insuficiența Yang-Qi a Inimii și a Rinichilor]

Simptome

pacientul nu vede la distanță, dar vede în apropiere (forma ereditară), adeseori se asociază cu astigmatismul; membre reci, aversiune față de frig; palpitații; oboseală. *Limba* – palidă, umedă, puțin tumefiată. *Pulsul* – adânc și slab.

Tratamentul

fortificarea și încălzirea Inimii și a Rinichilor, ameliorarea vederii:

Shu – GI4 Hegu, R3 Taixi;

Shu-post. – V15 Xinsu, V23 Shenshu;

Lo – VB37 Guangming, C5 Tongli;

Xi – IG6 Yanglao;

& – VB20 Fengchi, E1 Chengqi, V1 Jingming, VG4 Mingmen, Qiuhou (Extra).

Formule

- TR3 + VB37 + Qiuhou (în caz de miopie unilaterală acest punct se stimulează contralateral);
- C5 + MC6.

Modelul clinic 428

Miopia

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului și a Rinichilor]

Simptome

pacientul nu vede la distanță, dar vede în apropiere, uscăciune a ochilor; senzație de căldură în "cinci inimi", transpirații nocturne, gură și gât uscate; vertij, zgomot în urechi; slăbiciune în regiunea lombară și genunchi. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – rapid și subțire.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi și ameliorarea vederii:

Shu – GI4 Hegu, F3 Taichong, R3 Taixi;

Shu-post. – V18 Ganshu, V23 Shenshu;

Lo – VB37 Guangming;

Xi – IG6 Yanglao;

& – VB20 Fengchi, V1 Jingming, E1 Chengqi, Taiyang (Extra), Qiuhou (Extra).

Formule

- GI4 + Taiyang + E1 + R3;
- TR3 + VB37;
- VB37 + VB20 + VB1.

XIV.8. Blefaroptoza

Modelul clinic 429

Blefaroptoza

[Malnutriția mușchilor pleoapei în urma invaziei Vântului patogen pe fond de insuficiență congenitală și Insuficiență Qi a Splinei]

Simptome

pleoapa (sau pleoapele) este ptozată parțial sau total, acoperind globul ocular (ptoza poate fi izolată sau asociată cu alte semne – traumă fizică, periostită, sinuzită, encefalită etc.). Limba și pulsul pot fi diferite în funcție de predominarea tabloului clinic.

Tratamentul

eliminarea Vântului, fortificarea și armonizarea circulației Qi și Xue în regiunea ochilor:

- Shu – GI4 Hegu, E36 Zusanli;
- Shu-post. – V20 Pishu, V23 Shenshu;
- Lo – VB37 Guangming, RP6 Sanyinjiao;
- & – V2 Zanzhu, Taiyang (Extra), Yuyao (Extra), VB14 Yangbai, VB20 Fengchi, VG20 Baihui, VB15 Linqi, VC6 Qihai, RP21 Dabao.

Formula

GI4 (punctare contralaterală) + VB20 (punctare în direcția ochiului afectat) + moxa în punctele V23 + VG20 + RP21.

XIV.9. Strabismul

Modelul clinic 430

Strabismul concomitent

[Slăbiciune constituțională Qi și Xue, strabismul de genul R, F sau RP]

Simptome

strabismul apare în copilărie; motilitatea oculară este normală în toate direcțiile privirii, unghiul de deviație este egal în toate direcțiile privirii, deviația primară este egală cu cea secundară, diplopia și tulburările asociate lipsesc; iritabilitate, depresie; disconfort în hipocondru (genul F); distensie abdominală, inapetență, disbacterioză, maladii cronice ale organelor digestive (genul RP); slăbiciune în regiunea lombară și genunchi, patologii ale sistemului osos (genul R). Limba și pulsul sunt în funcție de etiopatogeneza maladiei.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea circulației Qi și Xue:

- Shu – GI4 Hegu, F3 Taichong;
- Shu-post. – V15 Xinshu, V18 Ganshu, V19 Danshu, V23 Shenshu;
- Lo – MC6 Neiguan, TR5 Waiguan, VB37 Guangming, RP6 Sanyinjiao;
- & – VB20 Fengchi, VG20 Baihui, Zhengguang 1* (Extra), Zhengguang 2* (Extra), VG14 Dazhui, Qiuhou (Extra), Taiyang (Extra), TR23 Sizhukong, V1 Jingming, V2 Zanzhu, E2 Sibai, Yintang (Extra), VB1 Tongzilliao, Yuyao (Extra).

Formule

- Qiuhou + Taiyang + TR23 + VB1 + GI4 (formulă indicată în esotropie);
- V1 + V2 + E2 + VB20 + Yuyao + Yintang (formulă indicată în exotropie);
- V18 + V19 + V23 + VB20 + VG14 (strabism de genul R);
- V18 + V20 + V21 + VC12 + VG20 + VB20 + MC6 + E36 + RP6 (strabism de genul RP);
- VB20 + V18 + V19 + VG20 + MC6 + F3 (strabism de genul F).

Modelul clinic 431

Strabismul paralic

[Strabismul]

Simptome

strabismul poate apărea la orice vârstă; motilitatea oculară este absentă în teritoriul de acțiune al mușchiului paralizat; unghiul de deviație este maxim în direcția mușchiului paralizat și nul în direcția opusă; deviația primară este mai mică decât cea secundară; sunt prezente diplopia și tulburările asociate (grețuri, vărsături, falsă proiecție și localizare a obiectelor în spațiu, poziție vicioasă a capului); deviația globului ocular are loc în direcția opusă acțiunii mușchiului paralizat. Limba și pulsul sunt schimbate în funcție de etiopatogeneza maladiei (leziuni vasculare, tulburări metabolice, boli infecțioase, intoxicații, traumatisme etc.).

Tratamentul

normalizarea circulației Qi și Xue:

- Shu – F3 Taichong, V64 Jinggu, GI4 Hegu;
- Lo – TR5 Waiguan, VB37 Guangming;
- & – VB1 Tongzilliao, E1 Chengqi, E2 Sibai, E8 Touwei, Qiuhou (Extra), Taiyang (Extra), TR23 Sizhukong,

* Zhengguang 1 – la granița 1/4 mediale și 3/4 laterale a marginii superioare a orbitei.

** Zhengguang 2 – la granița 1/4 laterale și 3/4 mediale a marginii superioare a orbitei.

Yuyao (Extra), Shangming* (Extra), V1 Jingming,
 V2 Zanzhu, V3 Meichong, V4 Quchai, VB14
 Yangbai, VB16 Muchuang, VB20 Fengchi, TR16
 Tianyou, Xiajingming** (Extra), Anmian (Extra).

Formule în strabismul convergent

- VB1 + VB20 + E2 + F3;
- Qiuhou + Taiyang + VB16 + TR5;
- TR23 + Yuyao + E8 + VB37.

Formule în strabismul divergent

- V1 + V3 + Yuyao + GI4;
- V2 + E2 + VB20 + F3;
- V4 + V64 + Xiajingming.

Formule în paraliză mușchilor

- V1 + Yintang + V2 (*m.rectus medialis*);
- VB1 (punctare spre Yuyao) + Taiyang + Anmian + TR23 (*m.rectus lateralis*);
- E1 + E2 + Taiyang (*m.rectus inferior*);
- Shangming + VB14 + Yintang + Yuyao (*m.rectus superior*);
- VB1 + Yuyao + V2 + TR16 + VB14 + VB16 + E2 + GI4 (*n.oculomotorius*);
- VB1 + TR23 + E2 + TR16 + VB15 + VB20 + GI4 (*n.abducens*).

* Shangming – pe marginea superioară a orbitei sub punctul Yuyao.

** Xiajingming – la 5 mm mai sus de punctul V1 Jingming.

XV

Acupunctura în afecțiunile ORL și stomatologie

- XV.1. Rinita. Sinuzitele**
- XV.2. Laringofaringită. Tonzilita**
- XV.3. Afonia**
- XV.4. Aftoza bucală**
- XV.5. Sialoreea**
- XV.6. Odontalgia**
- XV.7. Boala Meniere. Vertijele**
- XV.8. Tinitusul. Hipoacuzia**
- XV.9. Otita medie. Pruritul auricular**

XV.1. Rinita. Sinuzitele

Modelul clinic 432

Rinita. Sinuzitele

[Vânt-Frig]

Simptome

obstrucție nazală cu eliminări transparente, tuse, strănut; hipertermie, frison; cefalee, absență a transpirației. *Limba* – cu depozit alb, subțire. *Pulsul* – superficial.

Tratamentul

eliminarea Vântului-Frig, eliberarea căilor nazale și armonizarea Plămânilor:

- Shu – GI4 Hegu;
- Shu-post. – V13 Feishu;
- Lo – P7 Lieque;
- Xi – GI7 Wenliu;
- & – GI20 Yingxiang, GI19 Heliao, VG16 Fengfu, VG23 Shangxing, Yintang (Extra), VB20 Fengchi, VG24 Shenting.

Formule

- V7 + V67;
- GI20 + Yintang + GI4 + VB20 + P7.

Modelul clinic 433

Rinita. Sinuzitele

[Vânt-Căldură]

Simptome

obstrucție nazală cu eliminări galbene, tuse; hipertermie, transpirații, sete; aversiune față de frig. *Limba* – roșie, în special vârful și marginile. *Pulsul* – superficial și rapid.

Tratamentul

eliminarea Vântului-Căldură, restabilirea permeabilității căilor nazale și armonizarea Plămânilor:

- Shu – P10 Yuji, GI4 Hegu, GI11 Quchi;
- Shu-post. – V13 Feishu;
- Lo – P7 Lieque;
- & – GI20 Yingxiang, GI19 Heliao, V12 Fengmen, VG16 Fengfu, VG23 Shangxing, VG24 Shenting, VB14 Yangbai, Bitong (Extra), Yintang (Extra).

* Bitong – la 1 cm mai jos de unghiul intern al ochiului, în locul de unire a osului nazal și cartilajului.

Formule

- V7 + V67;
- GI20 + Yintang + GI4 + GI11 + TR5;
- GI4 + GI20 + VG22;
- VG23 + V4 + V12 + GI4.

Modelul clinic 434

Rinita. Sinuzitele

[Umiditate-Căldură]

Simptome

obstrucție nazală cu eliminări abundente și dense, care provoacă greață și scăderea sau pierderea simțului olfactiv; cefalee; amar în gură, gât tumefiat. *Limba* – roșie, cu depozit gros, de culoare galbenă. *Pulsul* – rapid, alunecos.

Tratamentul

eliminarea Umidității-Căldurii, restabilirea permeabilității căilor nazale și armonizarea Plămânilor:

- Shu – P5 Chize, P11 Shaoshang, GI11 Quchi, GI4 Hegu;
- Shu-post. – V13 Feishu;
- & – P2 Yunmen, GI20 Yingxiang, VG26 Renzhong, VG23 Shangxing, Yintang (Extra).

Formule

- GI4 + GI20 + P10 + E40;
- GI20 + Yintang + GI4 + GI11 + P5;
- GI20 + VG23 + V5 + GI19.

Modelul clinic 435

Rinita. Sinuzitele

[Căldură-Uscăciune]

Simptome

uscăciune a mucoasei nazale, eliminări nazale reduse de culoare galbenă, uneori cu striuri de sânge; senzație de amar în gură, gât uscat, scaune uscate; urini galbene. *Limba* – roșie, uscată. *Pulsul* – subțire și rapid.

Tratamentul

eliminarea Uscăciunii-Căldură, restabilirea permeabilității căilor nazale și armonizarea Plămânilor:

- Shu – P9 Taiyuan, GI4 Hegu;
- Shu-post. – V13 Feishu;
- Mu-ant. – P1 Zhongfu;
- & – GI20 Yingxiang, VG25 Suliao, VG23 Shangxing, Yintang (Extra).

Formula

GI20 + Yintang + GI4 + P9 + R3.

Modelul clinic 436

Rinita. Sinuzitele

[Stagnarea Căldurii în meridianul Plămân]

Simptome

obstrucție nazală cu eliminări de culoare gălbui și miros neplăcut, senzație de greutate în regiunea sinusurilor maxilare; față roșie; senzație de căldură cu aversiune față de rece; sete; cefalee cu senzație de distensie în regiunea frontală (ameliorare după eliminări nazale); tuse. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

eliminarea Căldurii, normalizarea funcției de difuzie Qi a Plămânilor:

- | | | |
|-----|---|---|
| Shu | – | P10 Yuji, GI4 Hegu, GI11 Quchi, IG3 Houxi; |
| Lo | – | P7 Lieque; |
| & | – | GI20 Yingxiang, VG14 Dazhui, VG23 Shangxing, VB20 Fengchi, Yintang (Extra). |

Formula

GI20 + Yintang + GI4 + P10 + P7.

Modelul clinic 437

Rinita. Sinuzitele

[Excesul Focului în Ficat și Veziculă Biliară]

Simptome

eliminări nazale de culoare galbenă și miros neplăcut; ochi roșii, cefalee; față roșie; tinitus; uscăciune a gurii, gust amar, scaune uscate; iritabilitate, tulburări ale somnului. *Limba* – roșie (în special marginile), cu depozit galben. *Pulsul* – întins și rapid.

Tratamentul

eliminarea Focului din Ficat și Veziculă Biliară, normalizarea funcției de difuzie Qi a Plămânilor:

- | | | |
|-----|---|--|
| Shu | – | GI4 Hegu, VB43 Xiaxi, F2 Xingjian; |
| Lo | – | P7 Lieque; |
| & | – | VB14 Yangbai, VB15 Linqi, VG23 Shangxing, GI20 Yingxiang, Yintang (Extra), VB20 Fengchi. |

Formule

- F2 + VB20 + VG23 + GI20 + Taiyang;
- VG23 + F3 + V62.

Modelul clinic 438

Rinita. Sinuzitele

[Insuficiența constituțională Qi a Plămânilor și a Qi-ului Defensiv al Rinichilor și Vasului Guvernor]

Simptome

eliminări nazale periodice transparente în timpul anului cu sen-

sibilitate crescută la vânt și rece (independent de anotimp); slăbiciune în spate și regiunea lombară; predispunere la răceală, senzație de rece în corp și membre; față palidă; respirație scurtă. *Limba* – palidă, cu depozit subțire și alb. *Pulsul* – slab și dispersat.

Tratamentul

tonifierea Plămânilor și a Rinichilor (Qi defensiv), fortificarea și armonizarea Vasului Guvernor:

- Shu – P9 Taiyuan, GI4 Hegu, E36 Zusanli, R3 Taixi, IG3 Houxi;
Shu-post. – V13 Feishu, V23 Shenshu;
Lo – P7 Lieque;
& – GI20 Yingxiang, VB20 Fengchi, VG4 Mingmen, VG12 Shenzhu, VG14 Dazhui, VG24 Shenting, VG23 Shangxing, Yintang (Extra).

Formule

- GI4 + GI20 + P9 + V13 + E36;
- V13 + V20 + V23;
- GI20 + Yintang + GI4 + R3 + E36 + IG3.

Modelul clinic 439

Rinita. Sinuzitele

[Insuficiența Qi a Splinei / Umiditate]

Simptome

obstrucție nazală cu eliminări profuze, transparente sau tulbure; senzație de greutate în regiunea cefalică; senzație de distensie în abdomen, scaune moi; edem al membrelor inferioare. *Limba* – palidă, cu depozit alb. *Pulsul* – încetinit.

Tratamentul

fortificarea Qi a Splinei, eliminarea Umidității, restabilirea permeabilității căilor nazale și armonizarea Plămânilor:

- Shu – GI4 Hegu, E36 Zusanli;
Shu-post. – V20 Pishu;
& – GI20 Yingxiang, VB20 Fengchi, VG23 Shangxing, Yintang (Extra).

Formule

- GI4 + GI20 + E40 + E36;
- GI20 + Yintang + GI4 + V20.

XV.2. Laringofaringita. Tonzilita

Modelul clinic 440

Laringofaringita. Tonzilita
[Vânt-Căldură]

Simptome

hiperemia vestibulului faringian, dureri în gât, senzație de corp străin în gât, deglutiție dificilă; febră, sete, aversiune față de rece; cefalee; tuse. *Limba* – roșie, cu puncte roșii în partea dreaptă sau stângă, cu depozit galben și subțire. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, eliminarea Vântului, eliberarea zonei laringofaringiene:

Shu – GI4 Hegu, GI11 Quchi, P11 Shaoshang;
& – VG14 Dazhui, VB20 Fengchi, IG17 Tianrong.

Formule

- IG1 + IG17;
- GI4 + P11 + GI1 ("triunghiul magic");
- GI4 + R1 + VC22 + E40.

Modelul clinic 441

Laringofaringita. Tonzilita
[Căldură-Exces]

Simptome

hiperemia vestibulului faringian, deglutiție dificilă; sete cu preferință de băuturi reci; facies roșu, hiperemie a sclerelor, iritabilitate; scaune uscate; urină de culoare roșietică. *Limba* – roșie, cu depozit galben și uscat. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, eliminarea toxinelor:

Shu – P5 Chize, P11 Shaoshang, GI11 Quchi, E44
Neiting, TR1 Guanchong;
& – IG17 Tianrong, GI18 Futu.

Formule antice

În laringofaringită cu afonie se folosesc punctele meridianului Stomac; în varianta clinică fără afonie – punctele meridianului Intestin Gros.

Modelul clinic 442

Laringofaringita. Tonzilita
[Căldură-Insuficiență]

Simptome

hiperemia vestibulului faringian, senzație de uscăciune în gât și gură; senzație de căldură în "cinci inimi"; disconfort sau slăbiciune

în regiunea lombară și articulațiile geninchilor; tinitus, diminuarea auzului. Simptomele se agravează în timpul nopții. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – filiform și rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii prin stimularea Yin-Qi:

- Shu – R3 Taixi, R7 Fuliu, GI4 Hegu, C8 Shaofu;
& – R6 Zhaohai, VC23 Lianquan.

Formule

- R3 + R6 + P10 + Jinjin-Yuye;
- R3 + GI4 + VC23.

XV.3. Afonia

Modelul clinic 443

Afonia

[Vânt-Frig]

Simptome

afonie în urma răcirii, frison, posibil tuse cu expectorații clare, rinoree; cefalee; absența setei. *Limba* – cu depozit alb, subțire. *Pulsul* – superficial și încordat.

Tratamentul

dispersarea Frigului și eliminarea Vântului, restabilirea vocii:

- Shu – GI4 Hegu;
& – V12 Fengmen, VC22 Tiantu, VC23 Lianquan, GI18 Futu.

Formula

TR5 + VC23 + E5 + GI18 + V12.

Modelul clinic 444

Afonia

[Vânt-Căldură]

Simptome

afonie cu hiperemia vestibulului faringian, dureri în gât cu deglutiție dificilă; uscăciune a mucoasei nazale, tuse cu expectorații galbene; febră cu sete. *Limba* – cu depozit galben, subțire. *Pulsul* – rapid și superficial.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, eliminarea Vântului și restabilirea vocii:

- Shu – GI4 Hegu, GI11 Quchi, P10 Yuji;
& – VG14 Dazhui, VC22 Tiantu, VC23 Lianquan, GI18 Futu.

Formule

- TR3 + TR5 + P7 + GI4;

- MC6 + P10;
- P10 + VC23 + VC22 + VB20;
- IG2 + IG17 + GI4;
- GI4 + P11 + GI1.

Modelul clinic 445

Afonia

[Stagnarea Qi a Ficatului]

Simpptome

afonie (apărută în urma emoțiilor negative); depresie psihică, iritabilitate; gust amar; senzație de distensie în piept și hipocondru.

Limba – normală. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

dinamizarea Qi, restabilirea vocii:

Shu – F3 Taichong, GI4 Hegu;

& – VC22 Tiantu, VC23 Lianquan, GI18 Futu.

Formule

- F3 + GI4 + VC23;
- VC22 + F14 + MC5 + C5 + F3.

Modelul clinic 446

Afonia

[Insuficiența Yin-Qi / Uscăciunea]

Simpptome

afonie la pacienții cu boli cronice; uscăciune a gurii și gâtului; senzație de căldură în "cinci inimi", transpirații nocturne; palpitații; tinitus; slăbiciune în regiunea lombară și articulațiile genunchilor.

Limba – roșie, fără depozit. *Pulsul* – filiform, rapid.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi, umectarea mucoaselor, restabilirea vocii:

Shu – R3 Taixi, GI4 Hegu;

& – VC22 Tiantu, VC23 Lianquan, GI18 Futu, R6 Zhaohai.

Formule antice

- P7 + GI4 (dispersie) + R6 (tonifiere);
- VC4 + R6 (tonifiere);
- R3 + VC23.

Modelul clinic 447

Afonia

[Obosirea coardelor vocale]

Simpptome

afonie în urma obosirii coardelor vocale (vorbitură fără repaus de lungă durată etc.); uscăciune a gurii și gâtului, sete cu preferință

de băuturi reci. *Limba* – roșie. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

armonizarea circulației Qi a Plămânilor, restabilirea vocii:

Shu – P10 Yuji, GI4 Hegu;

& – VC22 Tiantu, VC23 Lianquan, GI18 Futu.

Formula

P10 + VC23.

XV.4. Aftoza bucală

Modelul clinic 448

Aftoza bucală

[Căldură-Exces în Plămâni și Stomac]

Simptome

multiple afte pe buze și mucoasa cavității bucale, de culoare galbenă, cu marginile roșii și tumefiate, durere în regiunea ulcelor bucale la vorbire sau la mâncare; dureri în gât, tuse; sete, febră; cefalee; urină de culoare roșietică. Ulcerele apar în urma consumului exagerat de alcool, alimente picante sau la expoziție de Vânt-Căldură. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

eliminarea Căldurii toxice, diminuarea Focului:

Shu – GI11 Quchi, GI4 Hegu, P10 Yuji, E44 Neiting;

& – VC23 Lianquan, E6 Jiache, Jinjin - Yuye (Extra),
VC24 Chengjiang, E4 Dicang.

Formule

- GI11 + GI4 + E45 + VC12 + E36 (formulă cu efect de diminuare a Căldurii și armonizare a Stomacului);
- E44 + P10 + MC7 + C5 + MC6 + MC8 + VC23.

Modelul clinic 449

Aftoza bucală

[Acumularea Căldurii în Splină și Stomac]

Simptome

afte hiperemiate și dureroase pe buze și mucoasa cavității bucale, senzație de căldură și uscăciune în gură; iritabilitate; sete cu preferință de băuturi reci; urină galbenă-închis; constipație. *Limba* – roșie, cu depozit gros, galben sau lipicios. *Pulsul* – rapid, posibil alunecos.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, armonizarea Splinei și Stomacului:

Shu – E36 Zusanli;

Mu-ant. – E25 Tianshu;

- Xi – RP8 Diji;
- & – VC24 Chengjiang, E4 Dicang, RP10 Xuehai, Jinjin-Yuye (Extra), VC23 Lianquan.

Formule

- E44 + MC7 + MC6 + MC8 + C5;
- E44 + VC23.

Modelul clinic 450

Aftoza bucală

[Insuficiența Qi a Splinei / Acumularea Umidității cu transformare în Foc]

Simptome

afte bucale de diferite dimensiuni și forme, de culoare alb-cenușie (predomină edemul asupra hiperemiei); piele palidă; inapetență, scaune moi sau constipații; astenie. Această variantă este cronică cu recidive. *Limba* – palidă, tumefiată, cu amprente dentare, cu depozit albicios. *Pulsul* – subțire și slab sau profund și moale.

Tratamentul

fortificarea Qi a Splinei, diminuarea Umidității și a Focului;

- Shu – RP9 Yinlingquan, RP3 Taibai;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, RP4 Gongsun;
- & – VC24 Chengjiang, E4 Dicang, Jinjin-Yuye (Extra), VC23 Lianquan.

Formule

- RP3 + MC7 + MC6 + MC8 + C5;
- RP3 + VC23.

Modelul clinic 451

Aftoza bucală

[Insuficiența Yin-Qi / Foc-Insuficiență]

Simptome

afte unice, cu localizare variată, de culoare roză, cu marginile roz-pal; proces cronic cu recidive; uscăciune a gâtului și a gurii; senzație de căldură în "cinci inimi". *Limba* – roșie, fără depozit, uscată. *Pulsul* – subțire și rapid.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi, diminuarea Focului-Insuficienței;

- Shu – R3 Taixi, C8 Shaofu, C7 Shenmen;
- Xi – C6 Yinxi;
- & – E6 Jiache, VC23 Lianquan, Jinjin - Yuye (Extra), R6 Zhaohai, VC24 Chengjiang, E4 Dicang.

Formule

- R3 + MC7 + MC6 + MC8 + C5 + C8;
- R3 + C7 + VC23.

XV.5. Sialoreea

Modelul clinic 452

Sialoreea

[Invadarea Vântului patogen în meridianele Yangming]

Simptome

sialoreea apare la persoane cu Insuficiență a meridianului Yangming, sub influența Vântului patogen; semne de paralizie facială; aversiune față de vânt și rece. *Limba* – cu depozit alb. *Pulsul* – superficial și încordat.

Tratamentul

reglarea funcției meridianului Yangming, normalizarea circulației salivei:

Shu – GI4 Hegu;
& – E4 Dicang, VB20 Fengchi, TR17 Yifeng, VC24 Chengjiang.

Formula antică

V12 + VB20 + VG16 (trei puncte ale Vântului Extern).

Modelul clinic 453

Sialoreea

[Ascendența Vântului-Flegmă]

Simptome

sialoree la bolnavii cu hemiplegie, paralizii, tulburări de vorbire; accese astmatice. *Limba* – cu depozit suriu. *Pulsul* – alunecos și încordat.

Tratamentul

diminuarea Vântului și a Flegmei, reglarea funcției meridianului Yangming și normalizarea circulației salivei:

Shu – GI4 Hegu, F3 Taichong;
Lo – E40 Fenglong;
& – E4 Dicang.

Formule antice

- E40 + E6 + E4 + VC24 + GI4;
- TR17 + VB20 + VG16 (trei puncte ale Vântului Intern).

Modelul clinic 454

Sialoreea

[Căldură a Splinei și Stomacului]

Simptome

sialoree (apare în urma alimentației incorecte) însoțită de eroziuni bucale sau linguale, uscăciune a mucoasei bucale; gust amar; urină de culoare închisă; constipație; insomnie. *Limba* – roșie cu depozit gălbui. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

reglarea funcției meridianului Yangming și a circulației salivei:

- Shu – GI4 Hegu, E44 Neiting;
& – E4 Dicang.

Formula

E44 + E6 + E4 + VC24 + GI4.

Modelul clinic 455

Sialoreea

[Insuficiența Yang-Qi a Splinei cu dereglarea circulației salivei]

Simptome

salivație abundentă, macerarea buzelor și a bărbiei, fisuri în comisurile gurii; apetit scăzut, scaune râu formate, senzație de distensie abdominală; apatie; piele palidă. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Splinei, reglarea funcției meridianului Yangming, normalizarea circulației salivei:

- Shu – GI4 Hegu, E36 Zusanli;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – E4 Dicang.

Formula

V20 + E6 + E4 + VC24 + GI4 + E40.

XV.6. Odontalgia

Modelul clinic 456

Odontalgia

[Invadarea meridianului Yangming de Vânt-Foc]

Simptome

odontalgie (cu ameliorare la rece și agravare la cald); gingii roșii și tumefiate; febră, sete. *Limba* – roșie și uscată, cu depozit subțire. *Pulsul* – superficial și rapid.

Tratamentul

dispersia Vântului-Foc, drenarea colateralelor, diminuarea durerii:

- Shu – GI4 Hegu;
Lo – TR5 Waiguan;
& – E7 Xiaguan, E6 Jiache, VB20 Fengchi.

Formule

- V12 + VB20 + VG16 (trei puncte ale Vântului Extern);
- GI4 + E7 + E6 + TR2 + VB20;
- GI4 + E6 + E7 (în odontalgie a maxilarului inferior);
- E44 + E4 + E7 (în odontalgie a maxilarului superior);
- GI4 + E7 + TR17 + TR5.

Modelul clinic 457

Odontalgia

[Focul Stomacului]

Simptome

odontalgie cu hiperemie și tumefiere a gingiilor, pioree; miros urât din gură, constipație; urină galbenă; cefalee; sete. Acest model de odontalgie apare în urma consumului excesiv de alimente grase, dulci și picante. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – superficial și rapid.

Tratamentul

diminuarea Focului, drenarea colateralelor, diminuarea durerii:

Shu – GI4 Hegu, E44 Neiting, MC8 Laogong;
& – E7 Xiaguan, E6 Jiache.

Formula

E44 + GI4 + E7.

Modelul clinic 458

Odontalgia

[Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor / Insuficiența-Foc]

Simptome

odontalgie paroxismală (cu agravare noaptea și ameliorare ziua), tumefiere moderată a gingiilor, afectarea rădăcinii dinților (fără miros neplăcut din gură); disconfort în regiunea lombară și picioare; tinitus, insomnie cu coșmaruri; senzație de căldură în "cinci inimi". *Limba* – roșie, cu depozit neînsemnat. *Pulsul* – subțire și rapid.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi, reducerea Focului, diminuarea durerii:

Shu – GI4 Hegu, R3 Taixi, F2 Xingjian;
& – E7 Xiaguan, E6 Jiache.

Formule

– E44 + R7;
– R3 + GI4 + E7.

XV.7. Boala Meniere. Vertijele

Modelul clinic 459

Boala Meniere. Vertijele

[Ascendența Yang-Qi a Ficatului]

Simptome

vertije recurente (aggravate de oboseală și iritabilitate), cefalee; zgomote în urechi; față îmbujorată, ochi injectați; bolnavul evită mișcările capului; gust amar, grețuri, disconfort sau dureri în hipocondru, sete, scaune uscate; iritabilitate, somn neliniștit; urini

hipercrome. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – întins și rapid.

Tratamentul

normalizarea funcției Ficatului, diminuarea ascendenței Yang, normalizarea tonusului vascular:

- Shu – F2 Xingjian, F3 Taichong, VB43 Xiashi, R3 Taixi;
- Shu-post. – V18 Ganshu, V23 Shenshu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VB20 Fengchi, E8 Touwei, Yintang (Extra).

Formule

- R3 + F3;
- VB20 + GI11 + E36 + F3 + VB43 + F2;
- VB20 + V18 + V23 + R3 + F2.

Modelul clinic 460

Boala Meniere. Vertijele

[Vânt al Ficatului]

Simptome

vertije recurente, cefalee; tulburări de echilibru, instabilitate posturală, tremurături, tulburări de vorbire. *Limba* – roșie, tremurândă. *Pulsul* – rapid, încordat.

Tratamentul

calmarea Ficatului, diminuarea Vântului, normalizarea tonusului vascular:

- Shu – IG3 Houxi, R3 Taixi, F2 Xingjian, F3 Taichong, F8 Ququan;
- Shu-post. – V18 Ganshu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – E8 Touwei, VB20 Fengchi, VG16 Fengfu, TR17 Yifeng.

Formule antice

- VB2 + TR17;
- TR17 + VB20 + VG16 (trei puncte ale Vântului Intern).

Modelul clinic 461

Boala Meniere. Vertijele

[Insuficiența Qi a Splinei cu acumularea Flegmei / Descendența Qi a Splinei]

Simptome

vertij, senzație de greutate în cap, cutia toracică, abdomen sau membre; cefalee surdă, diminuarea procesului de concentrare a atenției (în special în orele de dimineață); grețuri, inapetență; oboseală; semne de ptoză viscerală. *Limba* – palidă, tumefiată. *Pulsul* – alunecos.

Tratamentul

fortificarea Splinei, diminuarea Flegmei, normalizarea tonusului vascular:

- Shu – GI4 Hegu, E36 Zusanli, RP3 Taibai, RP9 Yinlingquan;
Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
Lo – E40 Fenglong, MC6 Neiguan;
& – E8 Touwei, VG20 Baihui, TR17 Yifeng.

Formule

- E8 + VB20 + TR17 + MC6 + E36 + E40;
- VB20 + E40 + RP6 + RP3;
- E8 + MC6 + VC12 + E40 + V20.

Modelul clinic 462

Boala Meniere. Vertijele

[Insuficiența Qi și Xue]

Simptome

vertij (în special la efort fizic minimal și la schimbarea poziției corpului); astenie; diminuarea memoriei, insomnie, depresie; palpitații; față și buze palide. *Limba* – palidă și subțire. *Pulsul* – subțire și slab.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Qi și Xue:

- Shu – E36 Zusanli;
Shu-post. – V20 Pishu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – V43 Gaohuangshu, VC6 Qihai, VG20 Baihui.

Formule

- V20 + V21 + V17 + V18 + E36 + VG20;
- VG20 + VC6 + E36 + RP6 + V20.

Modelul clinic 463

Boala Meniere. Vertijele

[Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor / Insuficiența Esenței Rinichilor]

Simptome

vertij; hipoacuzie; slăbire a capacității de memorare, insomnie; dureri lombare și în genunchi. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – rapid, și subțire sau dispersat.

Tratamentul

alimentarea Yin-Qi a Rinichilor, normalizarea tonusului vascular:

- Shu – R3 Taixi;
Shu-post. – V23 Shenshu, V18 Ganshu;
Mu-ant. – VC4 Guanyuan;

- Lo – RP6 Sanyinjiao, VB39 Xuanzhong;
- & – TR17 Yifeng.

Formule

- VB20 + R7 + R3 + VG4;
- V23 + VG4 + VC4 + RP6 + R3.

XV.8. Tinitusul. Hipoacuzia

Modelul clinic 464

Tinitusul. Hipoacuzia

[Ascendența Focului din Ficat și Vezicula Biliară]

Simptome

tinitus intermitent (determinat de factori emoționali), posibil hipoacuzie, acufene; accese de vertij, cefalee; față roșie, ochi injectați; uscăciune în gât, gust amar, sete, constipații, disconfort sau dureri în hipocondru; iritabilitate. *Limba* – roșie (în special la margini). *Pulsul* – întins și rapid.

Tratamentul

diminuarea ascendenței Focului, armonizarea Ficatului și a Veziculei Biliare, normalizarea funcțiilor auditive:

- Shu – TR3 Zhongzhu, F2 Xingjian, F3 Taichong, VB40 Qiuxu, VB43 Xiaxi;
- Lo – TR5 Waiguan;
- & – VB2 Tinghui, VB8 Shuaigu, VB20 Fengchi, TR17 Yifeng.

Formule antice

- în hipoacuzie cu otalgie sunt indicate punctele meridianului Intestin Gros; în cazurile fără otalgie – punctele meridianului Veziculă Biliară;
- VB41 + TR5 + VB20;
- TR17 + VB2 + TR3 + VB43 + F3 + VB40;
- VB20 + VB34.

Modelul clinic 465

Tinitusul. Hipoacuzia

[Flegmă-Foc]

Simptome

tinitus sau hipoacuzie; cefalee cu senzație de greutate; senzație de opresiune în cutia toracică; sete. *Limba* – roșie, tumefiată, cu depozit galben. *Pulsul* – rapid, alunecos.

Tratamentul

diminuarea Flegmei și a Focului, tonifierea Splinei, normalizarea funcției auditive:

- Shu – GI4 Hegu, RP9 Yinlingquan, TR3 Zhongzhu, MC8 Laogong, VB43 Xiashi;
Shu-post. – V20 Pishu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
Lo – E40 Fenglong, TR5 Waiguan;
& – E7 Xiaguan, IG19 Tinggong, TR17 Yifeng, TR21 Ermen, VB2 Tinghui, VB20 Fengchi, VC9 Shuifen.

Formule

- VB2 + TR17 + VB43 + TR3 + E40 + VB34;
- E40 + TR17 + VB20 + VG16 + F2.

Modelul clinic 466

Hipoacuzia

[Căldură în Shao Yang cu diminuarea circulației Qi în urma administrării medicamentelor ototoxice]

Simptome

diminuarea auzului până la o surditate completă; în anamneză bolnavului i s-a administrat un tratament cu preparate ototoxice (streptomycină etc.). *Limba* – roz-pal. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

stimularea circulației Qi în regiunea auriculară, armonizarea Shao Yang;

- Shu – TR2 Yemen, VB41 Zulinqi, F3 Taichong, TR3 Zhongzhu, VB43 Xiashi;
Lo – RP6 Sanyinjiao, TR5 Waiguan;
& – IG19 Tinggong, VB2 Tinghui, VB20 Fengchi, TR17 Yifeng.

Formule

- VB41 + TR5 + VB2;
- TR3 + VB41 + VB43 + VB2 + VB20.

Modelul clinic 467

Tinitusul. Hipoacuzia

[Insuficiența Qi a Plămânilor / Insuficiența Qi a Focarului Superior]

Simptome

tinitus intermitent (se agravează la efort fizic); voce diminuată, astenie; dispnee; față palidă; transpirații spontane. *Limba* – palidă, zonele anterioare puțin tumefiate. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

tonifierea Qi a Plămânilor, normalizarea funcției de difuzie Qi a Plămânilor și a funcțiilor auditive:

- Shu – P9 Taiyuan, TR3 Zhongzhu, VB43 Xiaxi;
- Shu-post. – V13 Feishu;
- Mu-ant. – VC17 Shanzhong;
- Lo – P7 Lieque;
- & – E7 Xiaguan, IG19 Tinggong, V43 Gaohuangshu, TR16 Tianyou, TR17 Yifeng, VG20 Baihui, VB2 Tinghui.

Formula

P9 + V13 + VB43 + VB2.

Modelul clinic 468

Tinitusul. Hipoacuzia

[Insuficiența Qi a Stomacului și a Splinei]

Simptome

tinitus în asociere cu astenie pronunțată; apatie; culoare pământie a feței; inapetență, scaune moi, abdomen balonat. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

normalizarea Qi a Stomacului și a Splinei, ameliorarea funcțiilor auditive:

- Shu – E36 Zusanli, RP2 Dadu, VB43 Xiaxi, TR3 Zhongzhu;
- Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – E7 Xiaguan, TR17 Yifeng, VB2 Tinghui.

Formula

E36 + VC12 + VB43 + VB2.

Modelul clinic 469

Tinitusul. Hipoacuzia

[Insuficiența Xue a Inimii]

Simptome

tinitus intermitent sau hipoacuzie; vertij; palpitații; anxietate, insomnie, diminuarea memoriei; față și buze palide, astenie. *Limba* – palidă și subțire. *Pulsul* – slab și filiform.

Tratamentul

alimentarea Xue, normalizarea funcției auditive:

- Shu – MC5 Jianshi, TR3 Zhongzhu, VB43 Xiaxi;
- Shu-post. – V15 Xinshu;
- Mu-ant. – VC14 Juque, VC17 Shanzhong;
- Lo – C5 Tongli, RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;

- & – E7 Xiaguan, VB2 Tinghui, IG19 Tinggong, TR17 Yifeng.

Formula

V15 + RP6 + VB43 + VB2.

Modelul clinic 470

Tinitusul. Hipoacuzia

[Dezarmonia Inimă-Rinichi]

Simptome

tinitus sau hipoacuzie; vertij; uitucie, astenie intelectuală, insomnie; palpitații; dureri sau disconfort în regiunea lombară, precordială și în genunchi; gât uscat. *Limba* – roșie. *Pulsul* – filiform și rapid.

Tratamentul

armonizarea Inimii și a Rinichilor, normalizarea funcției auditive:

- Shu – C7 Shenmen, R3 Taixi, R7 Fuliu, TR3 Zhongzhu, VB43 Xiaxi;
Shu-post. – V15 Xinshu, V23 Shenshu;
Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
Lo – MC6 Neiguan;
& – E7 Xiaguan, TR17 Yifeng, VB2 Tinghui, VG4 Mingmen.

Formula

R3 + C7 + VB43 + VB2.

Modelul clinic 471

Tinitusul. Hipoacuzia

[Insuficiența Esenței Rinichilor]

Simptome

tinitus; cefalee; diminuarea graduală a auzului și a memoriei; dureri sau disconfort în regiunea lombară și în genunchi; diminuarea dorinței sexuale. *Limba* – palidă (predominare a Insuficienței Yang-Qi) sau roșie (predominare a Insuficienței Yin-Qi). *Pulsul* – slab și adânc (Insuficiența Yang) sau superficial și rapid (Insuficiența Yin); posibil puls dispersat.

Tratamentul

ameliorarea funcției Rinichilor, normalizarea funcției auditive:

- Shu – TR3 Zhongzhu, VB43 Xiaxi, R3 Taixi;
Shu-post. – V23 Shenshu;
Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – TR17 Yifeng, VB2 Tinghui, VG4 Mingmen.

Formule

- TR17 + VB2 + V23 + VC4 + R3 + E36 + GI4;
- R3 + VG4 + VB2.

Modelul clinic 472

Tinitusul. Hipoacuzia

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului și a Rinichilor]

Simptome

tinitus, hipoacuzie; durere în regiunea lombară și în membrele inferioare; senzație de căldură în "cinci inimi", transpirații nocturne; vertij, scăderea memoriei; gură și gât uscate; tulburări ale vederii, conjunctivă uscată; la femei ciclu menstrual la intervale mari, la bărbați – pierderi seminale nocturne. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – întins și fin.

Tratamentul

alimentarea Yin-Qi, armonizarea Rinichilor și a Ficatului, normalizarea funcției auditive:

Shu – R3 Taixi, R7 Fuli, VB43 Xiashi, TR3 Zhongzhu;
Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – E7 Xiaguan, TR17 Yifeng, VB2 Tinghui, VG4 Mingmen.

Formula

R3 + F8 + VB43 + VB2.

XV.9. Otita medie. Pruritul auricular

Modelul clinic 473

Otita medie. Pruritul auricular

[Vânt-Căldură]

Simptome

surgeri auriculare de culoare gălbuie; durere, hiperemie și prurit al canalului auditiv extern; obstrucție nazală; febră, sete; tuse; constipații. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

eliminarea Vântului și a Căldurii, diminuarea inflamației:

Shu – TR3 Zhongzhu, VB43 Xiashi, GI4 Hegu, GI11 Quchi;
Lo – TR5 Waiguan;
& – VB2 Tinghui, TR21 Ermen, IG19 Tinggong, TR17 Yifeng, TR20 Jiaosun, VB12 Wangu.

Formule

- IG2 + IG19;
- TR17 + VB2 + VB20 + GI4 + TR5 + GI11;
- TR17 + TR21 + TR5 + F2;
- IG19 + TR17 + TR5 + VB41 (stimulare ipsilaterală).

Modelul clinic 474

Otita medie. Pruritul auricular

[Umiditate-Căldură în Ficat și Vezicula Biliară]

Simptome

scurgeri auriculare de culoare galbenă, membrana timpanică perforată, canalul auditiv extern congestionat (posibil eczemă), diminuarea auzului; vertij, iritabilitate; gură uscată, gust amar. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – alunecos sau întins, rapid.

Tratamentul

diminuarea Umidității și Căldurii, armonizarea Ficatului și a Veziculei Biliare, diminuarea inflamației:

Shu – GI4 Hegu, GI11 Quchi, IG2 Qiangu, TR2 Yemen, TR3 Zhongzhu, VB43 Xiapi;
& – E7 Xiaguan, TR17 Yifeng, TR21 Ermen, VB2 Tinghui, VB20 Fengchi, VG14 Dazhui, VB12 Wangu.

Formule

- TR5 + TR17 + VB34 + F5;
- VB2 + VB8 + VB20 + VB41;
- E36 + RP9 + IG19 + TR17 + VB40 + GI4.

Modelul clinic 475

Otita medie. Pruritul auricular

[Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor]

Simptome

scurgeri auriculare transparente și albe de lungă durată (cu acutizări și remisii), diminuarea auzului, țiuit în urechi; slăbirea memoriei, vertij; dureri și slăbiciune în regiunea lombară și genunchi; senzație de căldură în "cinci inimi". *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – subțire și rapid.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Rinichilor, diminuarea inflamației:

Shu – TR3 Zhongzhu, VB43 Xiapi, R3 Taixi, TR2 Yemen, VB41 Zulingi;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – E7 Xiaguan, TR17 Yifeng, TR21 Ermen, VB2 Tinghui, VB20 Fengchi, VG4 Mingmen, VC5 Shimen, IG19 Tinggong, TR20 Jiaosun, R6 Zhaohai, VB12 Wangu.

Formule

- TR17 + VB2 + VB40 + E36 + R3;
- R3 + IG19 + TR17 + GI4.

Modelul clinic 476

Otita medie. Pruritul auricular

[Vânt-Uscăciune în urma insuficienței Xue]

Simptome

otită medie cu canalul auditiv extern uscat și cu cruste, prurit; piele și buze palide; slăbiciune. *Limba* – palidă și subțire. *Pulsul* – subțire.

Tratamentul

dispersia Vântului, înlăturarea Uscăciunii, fortificarea Xue:

Shu – TR3 Zhongzhu, VB43 Xiashi;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – RP10 Xuehai, VB20 Fengchi, TR21 Ermen, VB2 Tinghui, IG19 Tinggong, TR17 Yifeng, TR20 Jiaosun, VB12 Wangu.

Formula

IG19 + TR17 + GI4 + RP6 + RP10.

XVI

Acupunctura în tratamentul bolilor de piele

- XVI.1. Bolile de piele în afecțiunile
organelor Zang**
- XVI.2. Erupțiilele cutanate**
- XVI.3. Urticaria și angioedemul Quinke**
- XVI.4. Neurodermita**
- XVI.5. Eczema**
- XVI.6. Psoriazisul**
- XVI.7. Acneea vulgaris**
- XVI.8. Alopecia**
- XVI.9. Verucile**
- XVI.10. Vitiligo**
- XVI.11. Furunculoza, abcese și
limfadenitele**

XVI.1. Bolile de piele în afecțiunile organelor Zang

Modelul clinic 477

Bolile de piele în afecțiunile organelor Zang

[Afecțarea pielii de genul C]

piele caldă sau fierbinte; păr ondulat sau nu prea bogat; în afecțare apar leziuni de culoare roșie-închis, durere, erupții maculare, cruste hemoragice; afecțiunile, de regulă, au caracter acut și sunt provocate de Căldură și Focul patogen.

Tratamentul

diminuarea Căldurii și a Focului, armonizarea Inimii și a Pericardului.

Modelul clinic 478

Bolile de piele în afecțiunile organelor Zang

[Afecțarea pielii de genul RP]

piele palidă sau gălbuie; în afecțiuni apar vezicule, exudat, eroziuni, prurit, edem, care sunt rezistente la tratament; este caracteristică apariția eczemelor, furunculozelor, psoriazisului, dermatitelor provocate de Umiditate patogenă.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Splinei și a Stomacului, diminuarea Umidității.

Modelul clinic 479

Bolile de piele în afecțiunile organelor Zang

[Afecțarea pielii de genul P]

piele albicioasă; în afecțiuni apar eriteme, acnee și papule în diferite regiuni (preponderent în partea de sus a corpului; regiunea nasului și a obrazilor) provocate de Vântul patogen; este specifică apariția urticariei și pruritului; semnele patologice se instalează și se schimbă rapid (ca manifestare și localizare); sensibilitate crescută a sistemului limfatic și al pielii (adenite, acnee, eczeme, psoriazis, micoze etc.).

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Plămânilor și Intestinului Gros.

Modelul clinic 480

Bolile de piele în afecțiunile organelor Zang

[Afecțarea pielii de genul R]

piele palidă, moale; sunt tipice afecțiunile cronice, cauzate de disfuncții endocrine și tulburări autoimune (dermatomiozită, dermato-

scleroză, lupus eritematos, furunculoză etc.); afectarea pavilionului auricular și a meatului acustic; edeme matinale ale pleoapelor; bolile de piele sunt recidivante și rezistente la tratament.

Tratamentul

fortificarea Rinichilor, armonizarea organelor interne.

Modelul clinic 481

Bolile de piele în afecțiunile organelor Zang

[Afectarea pielii de genul F]

În afectarea pielii apar papule, vezicule, eroziuni (în special, în regiunea hipocondrului și organelor genitale externe); afectarea pielii în regiunea ochilor (pleoapele), scrotului (eczemă), ulceratii ale vulvei; reacții alergice la mușcături de insecte, la soare, medicamente (urticarie, eczemă etc); herpes (genital, ocular, bucal).

Tratamentul

armonizarea Ficatului și a Veziculei Biliare, eliminarea Umidității, diminuarea Căldurii și a Focului.

XVI.2. Erupțiile cutanate^{*}

Modelul clinic 482

Erupțiile cutanate

[Vânt-Căldură / Dezechilibrul Energiei Wei-Qi și Ying-Qi]

Simptome

erupții de culoare roșie, care apar brusc, prurit; febră, sete; iritabilitate; constipație. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – superficial și rapid.

Tratamentul

eliminarea Vântului, diminuarea Căldurii, armonizarea Energiilor Wei-Qi și Ying-Qi:

Shu – GI11 Quchi;

Shu-post. – V17 Geshu;

& – VB31 Fengshi, VB20 Fengchi, V12 Fengmen, RP10 Xuehai, GI15 Jianyu.

Formule

- VB41 + TR5 + VB31;
- P11 + VG14 + GI4;
- P5 + P7 + GI4;
- GI15 + GI4 + GI11;
- TR5 + GI4 + VB20 + VB31;

^{*} Erupțiile pot apărea în boli de piele, maladii infecțioase, alergice, afectarea organelor interne.

- GI11 + V12 + VB20 + GI4.

Modelul clinic 483

Erupțiile cutanate

[Vânt-Frig / Dezechilibrul Energiei Wei-Qi și Ying-Qi]

Simptome

erupții de culoare roz-pal, care apar brusc; febră, aversiune față de frig; rinoree. *Limba* – palidă, cu depozit alb și subțire. *Pulsul* – superficial și încordat.

Tratamentul

eliminarea Vântului, încălzirea Frigului, armonizarea Energiilor Wei-Qi și Ying-Qi:

- | | | |
|-----|---|--|
| Shu | - | GI11 Quchi; |
| & | - | VG14 Dazhui, VB20 Fengchi, V12 Fengmen, RP10 Xuehai. |

Formule antice

- V12 + VB20 + VG16 (trei puncte ale Vântului Extern);
- GI11 + V12 + VB20 + GI4.

Modelul clinic 484

Erupțiile cutanate

[Acumularea Căldurii în Stomac și Intestine]

Simptome

erupții de culoare roșie, care apar brusc și cuprind suprafețe mari ale corpului; dureri epigastrice, grețuri, vome, scaune moi; urină hiperchromă. *Limba* – roșie, cu depozit galben și gras. *Pulsul* – rapid și alunecos.

Tratamentul

fortificarea Splinei, eliminarea Căldurii din stratul nutritiv (Ying):

- | | | |
|---------|---|------------------------------|
| Shu | - | GI11 Quchi, E36 Zusanli; |
| Mu-ant. | - | E25 Tianshu; |
| Lo | - | MC6 Neiguan, RP6 Sanyinjiao. |

Formule

- P5 + GI11 + GI4 + E44;
- GI11 + GI4 + E36.

Modelul clinic 485

Erupțiile cutanate

[Insuficiența Qi și Xue]

Simptome

erupții de culoare palidă, cronice, recidivante; astenie; respirație scurtă; piele și buze palide; palpitații; inapetență. *Limba* – palidă și subțire. *Pulsul* – filiform și slab.

Tratamentul

fortificarea Qi a Focarului Mediu, armonizarea Qi și Xue:

Shu – E36 Zusanli, GI11 Quchi;

Shu-post. – V20 Pishu, V17 Geshu;

& – V12 Fengmen, VC6 Qihai, RP10 Xuehai.

Formule

– RP6 + RP10 + E36 + F8;

– V17 + V20 + RP6 + RP10;

– GI11 + GI4 + E36 + V17.

XVI.3. Urticaria și angioedemul Quincke*

Modelul clinic 486

Urticaria și angioedemul Quincke

[Vânt-Frig]

Simptome

urticarie de culoare roz sau palidă, care apare brusc pe piele sau mucoase, prurit cu senzație de durere sau furnicături (cu acutizare la frig și vânt; ameliorare la cald); edem la nivelul feței, pleoapelor, buzelor; obstrucție nazală cu eliminări transparente.

Limba – cu depozit albicios, subțire. *Pulsul* – superficial.

Tratamentul

eliminarea Vântului și a Frigului.

Shu – GI11 Quchi;

Shu-post. – V18 Ganshu;

& – VB20 Fengchi, V12 Fengmen, RP10 Xuehai, VC8 Shenque (moxibustie prin sare), E10 Shuitu (din dreapta), E14 Kufang (din stânga).

Formule

– GI11 + RP10 + RP6;

– V40 + V18 + E36;

– VB34 + V12 + GI11;

– GI11 + GI4 + RP10 + V17 + V40 + VG14.

Modelul clinic 487

Urticaria și angioedemul Quincke

[Vânt-Umiditate]

Simptome

urticarie roșie sau albă, edeme în diferite regiuni ale corpului,

* În varianta gravă a angioedemului Quincke este necesară aplicarea farmacoterapiei, inclusiv și a preparatelor hormonale.

senzație de prurit, durere, furnicături și greutate în tot corpul; grețuri; scăderea simțului olfactiv; cefalee cu senzație de greutate. *Limba* – cu depozit alb, uneori lipicios. *Pulsul* – superficial, moale.

Tratamentul

eliminarea Vântului și a Umidității:

- Shu – GI11 Quchi, E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan, V40 Weizhong;
Shu-post. – V17 Geshu, V18 Ganshu, V20 Pishu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
Lo – TR5 Waiguan, RP6 Sanyinjiao;
& – E10 Shuitu (punctul din dreapta), E14 Kufang (punctul din stânga), RP10 Xuehai, V12 Fengmen.

Formula

GI11 + RP10 + RP6.

Modelul clinic 488

Urticaria și angioedemul Quincke

[Vânt-Căldură]

Simptome

urticarie roșie care apare brusc pe piele sau mucoase, prurit însoțit de senzație dureroasă, arsură sau furnicături; edem la nivelul feței, pleoapelor, buzelor; obstrucție nazală cu eliminări galbene; insomnie; gură uscată. *Limba* – roșie. *Pulsul* – superficial și rapid.

Tratamentul

eliminarea Vântului și a Căldurii:

- Shu – GI11 Quchi, V40 Weizhong;
& – VB20 Fengchi, VG14 Dazhui, VB31 Fengshi, V12 Fengmen, RP10 Xuehai, E10 Shuitu (din dreapta), E14 Kufang (din stânga)

Formule

- TR10 + VB31;
- GI11 + RP10 + RP6;
- GI11 + GI4 + RP10 + V17 + V40 + VB31;
- GI11 + VB20 + E36 + RP10;
- GI11 + VG14 + V25; în funcție de aria afectată se asociază cu diferite puncte – capul și fața (TR23 + GI20 + VG20 + VG24 + VB20); peretele abdominal (E25 + VC12); partea superioară a peretelui abdominal (GI15 + TR10); regiunea lombară și spatelul (V13 + V20 + V23); membrele inferioare (VB31 + RP9 + V40).

Modelul clinic 489

Urticaria și angioedemul Quincke

[Vânt-Uscăciune / Insuficiența Xue]

Simptome

urticarie de culoare roz sau palidă, cronică (mai frecvent se mani-

festă la persoane în etate); uscăciune a mucoaselor; agravare după oboseală fizică. *Limba* – palidă, cu depozit subțire. *Pulsul* – subțire.

Tratamentul

eliminarea Vântului, umectarea mucoaselor, fortificarea Xue:

- Shu – GI4 Hegu, GI11 Quchi, E36 Zusanli;
- Mu-ant. – E25 Tianshu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VB31 Fengshi, E10 Shuitu (punctul din dreapta),
E14 Kufang (punctul din stânga).

Formule

- P5 + R6 + RP10;
- GI11 + RP10 + RP6.

Modelul clinic 490

Urticaria și angioedemul Quincke

[Acumularea Căldurii în Stomac și Intestine]

Simptome

urticarie roșie, care apare brusc și recidivează, prurit însoțit de senzație dureroasă, arsură și edem (față, buze, pleoape etc.); dureri în abdomen și epigastru, constipație sau diaree. *Limba* – cu depozit galben. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

eliminarea Căldurii și armonizarea organelor digestive:

- Shu – GI11 Quchi, E36 Zusanli, E44 Neiting, V40 Weizhong;
- Mu-ant. – E25 Tianshu;
- & – GI10 Shousanli, E10 Shuitu (punctul din dreapta),
E14 Kufang (punctul din stânga), RP10 Xuehai,
VG14 Dazhui.

Formule

- E36 + MC6;
- E44 + GI2
- GI11 + GI4 + RP10 + V17 + V40 + RP9.

Formule antice în prurit pronunțat

- V13 (sângerare + ventuze);
- GI11 + MC3 (dispersie + sângerare);
- GI4 + P7 + P10 + C7 + MC6.

Modelul clinic 491

Urticaria

[Disfuncția meridianelor Chong Mai și Ren Mai]

Simptome

urticarie, care apare cu 2–3 zile înainte de ciclul menstrual și dispare după finisarea menstrelor; prurit în regiunea inferioară a

abdomenului și a spatelui, regiunea lombară, pe suprafețele mediale ale coapsei și suprafața internă a labei piciorului. *Limba* – roșie-închis sau purpurie, cu depozit albicios. *Pulsul* – încordat.

Tratamentul

fortificarea Qi a organelor digestive, armonizarea Qi și Xue în meridianele Chong Mai și Ren Mai:

- Shu – V40 Weizhong;
- Shu-post. – V17 Geshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, RP4 Gongsun;
- & – RP10 Xuehai, E30 Qichong, VB31 Fengshi, E10 Shuitu (punctul din dreapta), E14 Kufang (punctul din stânga).

Formula antică

VC8 Shenque (aplicarea ventuzelor timp de 3–5 minute în zona punctului; procedura se repetă 3 zile la rând).

Modelul clinic 492

Urticaria și angioedemul Quincke

[Insuficiența Qi a Splinei și a Plămânilor]

Simpptome

urticarie palidă, care apare brusc și recidivează, prurit cu senzație de durere sau furnicături; edem la nivelul feței sau în alte regiuni ale corpului; abdomen balonat, inapetență, scaune moi; tuse astmatică cu expectorații diluate, de culoare albă; astenie, apatie. *Limba* – palidă, cu depozit alb, amprente dentare pe margini. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Plămânilor și a Splinei:

- Shu – P9 Taiyuan, RP2 Dadu, V40 Weizhong;
- Shu-post. – V13 Feishu, V20 Pishu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, P7 Lieque;
- & – GI20 Yingxiang, E10 Shuitu (din dreapta), E14 Kufang (din stânga), RP10 Xuehai, VC6 Qihai, VC9 Shuifen.

Formule

- P7 + TR6 + TR10 + VB31;
- V13 + F5 + VB41;
- GI11 + GI4 + RP10 + V17 + V40 + E36 + V20.

XVI.4. Neurodermita

Modelul clinic 493

Neurodermita cronică circumscrisă

[Vânt-Umiditate-Căldură]

Simptome

prurit, papule, infiltrație a pielii și lichenificare; afectarea mai frecvent localizată simetric, pe ceafă, coapse, organele genitale sau regiunea perianală, plicele coatelor, regiunea poplitee, pe fețele de extensie ale antebrăului; pielea afectată este pigmentată. *Limba* – cu depozit galben și subțire. *Pulsul* – moale și rapid.

Tratamentul

eliminarea Vântului, diminuarea Umidității-Căldurii, ameliorarea proceselor trofice, diminuarea pruritului;

Shu – GI4 Hegu, GI11 Quchi, E36 Zusanli;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – VG14 Dazhui, V12 Fengmen, VB20 Fengchi, VB31 Fengshi.

Formula

GI11 + RP10 + GI4 + RP6 + puncte locale (acele se înțepă de la granița afectării pielii spre centrul zonei afectate).

Modelul clinic 494

Neurodermita difuză generalizată

[Insuficiența Xue / Vânt-Uscăciune]

Simptome

papule, scuame fine cenușii și prurit generalizat (difuz); prin scărpinare apar papule punctiforme lățite și lucitoare, care cu timpul confluează, producând placarde lichenificate difuze, cu marginile neregulate. *Limba* – de culoare roșie-deschis sau pală, fără depozit sau cu depozit neînsemnat. *Pulsul* – subțire.

Tratamentul

fortificarea Xue, eliminarea Vântului, diminuarea Uscăciunii, ameliorarea proceselor trofice, diminuarea pruritului;

Shu – GI4 Hegu, GI11 Quchi, E36 Zusanli;

Shu-post. – V17 Geshu, V20 Pishu;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – VG14 Dazhui, RP10 Xuehai, VB20 Fengchi.

Formule

– RP6 + RP10 + R6 + P5;

– RP10 + V17.

XVI.5. Eczema

Modelul clinic 495

Eczema

[Vânt Extern / Umiditate-Căldură]

Simptome

pe suprafața pielii eritematoase apar vezicule mici cu conținut clar gălbui; în timpul scărpinatului veziculele se rup, lăsând suprafețe erozive, care după un interval de timp formează cruste gălbui; agitație; gură uscată (fără dorință de a bea), gust amar, inapetență, constipație; urină galbenă. *Limba* – roșie, cu depozit gros. *Pulsul* – rapid și moale.

Tratamentul

eliminarea Vântului, Umidității și a Căldurii, normalizarea metabolismului și a proceselor trofice:

Shu – GI11 Quchi, E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan, V40 Weizhong, VB34 Yanglingquan, VB38 Yangfu;
Shu-post. – V25 Dachangshu;
Lo – P7 Lieque, TR5 Waiguan;
& – E37 Shangjuxu, E39 Xiajuxu, RP10 Xuehai, V39 Weiyang.

Formule

- V40 + RP6 + RP9 + VB34 + TR6;
- VB38 + TR7 + GI11;
- GI11 + RP10 + punctele Ashi.

Formule în eczema la copii

GI4 + RP6; GI11 + E36; în cazul când semnele Umidității sunt aproximativ egale cu semnele Căldurii – VB20 + GI11 + TR5 + RP9; în caz de predominare a Căldurii asupra Umidității (față roșie, limbă roșie) – P5 + MC7 + RP10 + RP6 + VG14 + V40 (sângereare).

Modelul clinic 496

Eczema

[Insuficiența Xue cu acumularea Vântului și Căldurii Interne / Uscăciunea Xue]

Simptome

pe suprafața pielii eritematoase apar vezicule cu lichid galben, prurit permanent cu acutizare noaptea (în cazuri cronice se formează plăcarde de tegument îngroșat cu descuamare); insomnie (somn cu treziri repetate); senzație de căldură în corp, uscăciune a gurii; scaun uscat; ten palid. *Limba* – palidă și subțire, cu fisuri. *Pulsul* – subțire.

Tratamentul

alimentarea Xue, eliminarea Vântului și a Căldurii, normalizarea

metabolismului și a proceselor trofice:

- Shu – P5 Chize, P10 Yuji, GI11 Quchi, V40 Weizhong,
MC7 Daling, E36 Zusanli;
Shu-post. – V13 Feishu, V17 Geshu;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – RP10 Xuehai.

Formule

- RP6 + RP10 + GI4 + C7 + RP1 + MC9 + V40 (tehnica de sângereare);
- RP6 + R6 + E36 + GI4 + V17 + V20;
- GI11 + RP10 + puncte Ashi.

XVI.6. Psoriazisul

Modelul clinic 497

Psoriazisul

[Căldura Xue / Vânt]

Simptome

semne clinice ale perioadei progresive (eruptive) a psoriazisului: apar papule roșietice, de mărimea unui vârful de ac, bine delimitate, acoperite cu scuame fine de culoare albă, care se îndepărtează ușor; elementele eruptive mici continuă să se mărească în volum, ajungând până la 2–3 cm (contopirea mai multor elemente duce la formarea placardelor mari neregulate); erupția psoriatică începe pe fețele de extensie ale coatelor și genunchilor, se pot răspândi pe pielea capului, zona scapulară, antebrate etc.; erupțiile nu sunt însoțite de prurit. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – rapid și mare.

Tratamentul

eliminarea Vântului, diminuarea Căldurii, armonizarea Xue:

- Shu – GI11 Quchi, RP2 Dadu;
Shu-post. – V17 Geshu;
Lo – TR5 Waiguan;
& – VB20 Fengchi, VB31 Fengshi, RP10 Xuehai, puncte locale (în jurul zonei afectate).

Formule

- V15 + V17 + V18 + GI4 + GI11 + RP6 + E40;
- VB20 + GI11 + TR6 + RP10 + RP6 (afectarea membrilor superioare);
- GI11 + TR6 + E36 + RP10 + RP6 + RP9 + VB31 (afectarea membrilor inferioare);
- GI20 + VG25 + GI11 + GI4 + RP10 + RP6 (afectarea regiunii cefalice);
- GI11 + GI4 + V17 + E36 + RP9 + RP6 (afectarea trunchiului și pe-

- rineului);
- VG14 + GI11 + GI4 + RP10 + RP6 + E36 (toată suprafața corpului).

Modelul clinic 498

Psoriazisul

[Uscăciunea Xue / Vânt]

Simptome

semne clinice ale perioadei regresive a psoriazisului: erupții noi nu mai apar, resorbția infiltratului din centrul papulelor, apar pete pigmentate sau depigmentate în locul fostelor papule psoriatice, pielea în locul erupțiilor se îngroașă, uscăciune a pielii; insomnie; palpitații. *Limba* – palidă, cu depozit subțire. *Pulsul* – filiform.

Tratamentul

umectarea Xue, diminuarea Vântului;

Shu – GI11 Quchi, RP2 Dadu;

Shu-post. – V17 Geshu, V18 Ganshu;

Lo – RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;

& – An Mian (Extra), puncte locale (în jurul zonei afectate; acupunctură și moxibustie printr-o felle de usturoi).

Formule

- P5 + R6 + RP10;
- GI4 + P5 + RP6.

XVI.7. Acneea vulgaris

Modelul clinic 499

Acneea vulgaris

[Vânt-Căldură / Căldură în Plămâni]

Simptome

puncte negre pe suprafața pielii, pustule superficiale și profunde; senzație de căldură, față și buze roșii, gură uscată, sete (cu preferință de băuturi reci); nas uscat, urină galbenă. *Limba* – roșie (uneori cu papile proeminente în partea anterioară), cu depozit subțire și galben. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

eliminarea Căldurii și a Vântului;

Shu – GI1 Shangyang, GI4 Hegu, GI11 Quchi, V40 Weizhong;

Lo – P7 Lieque;

& – GI10 Shousanli, E4 Dicang, VG14 Dazhui.

Formule

- E7 + E6 + V2 + E36 (din stânga) + GI4 + E40 (din dreapta) + Guanxia* + RP6 (din dreapta; formula antică);
- puncte locale + puncte distale (acest principiu de tratament poate fi aplicat și la pacienții cu tulburări ale tonusului cutanat și muscular în regiunea feței sau în diferite riduri faciale). Pentru a determina punctele necesare, fața se împarte în 15 zone (6 simetrice și 3 asimetrice). În acest scop se trasează două linii orizontale (una – de-a lungul sprâncenelor și alta, paralelă cu ea, trecând pe marginile inferioare ale aripilor nazale) și două linii verticale (una trece prin unghiul extern al ochiului, alta – prin cel intern). Punctele se folosesc în funcție de zona afectată – Yintang + VG23 + V2 + V60 + V40 (zona supranazală); VB14 + VB34 + E44 + VB41 (zona supraorbitală); E8 + VB34 + E44 (zona latero-frontală); Yintang + VG25 + GI20 + GI4 + E44 + P7 (zona nazală); IG18 + E2 + IG6 + C8 + E44 (zona zigomatică); E7 + TR21 + TR5 + TR6 + E36 (zona preauriculară); E4 + VG26 + VC24 + GI4 + E36 + P7 (zona periorală); E6 + E5 + E44 + E36 (zona facioorală); TR17 + E6 + TR6 + MC6 + E36 (zona infraauriculară).

Modelul clinic 500

Acneea vulgaris

[Umiditate-Căldură în Splină și Stomac]

Simptome

puncte negre pe suprafața pielii, pustule superficiale și profunde; gust amar, salivă lipicioasă, balonări în epigastru și abdomen; senzație de greutate în corp; apatie; urină galbenă. *Limba* – roșie, cu depozit galben, lipicios. *Pulsul* – rapid, alunecos.

Tratamentul

refrigerarea Căldurii și eliminarea Umidității:

- Shu – RP9 Yinlingquan, E44 Neiting, GI11 Quchi, V40 Weizhong;
& – locale (în funcție de localizarea acnelor).

Formule

- E44 + VC24 + VG26 + GI4 + GI18 + GI20;
- TR6 + VB34 + GI4 + GI11;
- RP6 + RP9 + VB34 + VB38;
- RP9 + E44.

Modelul clinic 501

Acneea vulgaris

[Căldura Xue]

Simptome

puncte negre pe suprafața pielii, pustule superficiale și profunde;

* Guanxia – localizat la 5 fen sub punctul VC4 Guanyuan.

senzație de căldură; buze roșii; sunt posibile diferite hemoragii (epistaxis, menstr abundente). *Limba* – roșie. *Pulsul* – rapid și mare.

Tratamentul

refrigerarea Căldurii Xue:

- Shu – GI11 Quchi, V40 Weizhong;
- Shu-post. – V17 Geshu;
- & – RP10 Xuehai, VG14 Dazhui, puncte locale (în funcție de localizarea acneelor).

Formule

- V40 (sângerare) + GI5 + GI11 + GI17 + GI18 + IG5;
- V40 (sângerare) + IG16;
- V40 (sângerare) + GI4 + GI18 + VG10 + VG12 + VG14 + V17;
- F2 + MC7;
- IG5 + IG16;
- GI11 + MC3 + MC9 (sângerare).

Modelul clinic 502

Acneea vulgaris

[Dezarmonia Ren Mai-Chong Mai]

Simptome

puncte negre pe suprafața pielii, pustule; dismenoree, menoragie; tulburări psihoemoționale legate de sfera reproductivă (divorț etc.); insuficiența congenitală a organelor digestive. Limba și pulsul sunt în funcție de sindromul predominant.

Tratamentul

armonizarea Ren Mai și Chong Mai:

- Shu – GI4 Hegu, V40 Weizhong;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP4 Gongsun, P7 Lieque;
- & – E10 Shuitu, puncte locale (în funcție de localizarea acneelor).

Formula

P7 + VC4.

XVI.8. Alopecia

Modelul clinic 503

Alopecia

[Stagnarea Qi și Xue]

Simptome

plăci alopecice singulare, multiple, de mărime variată, localizate în diferite zone; senzație de amorțeală sau parestezii; cefalee;

dilatarea venelor superficiale, pielea feței de culoare închisă.
Limba – purpurie. *Pulsul* – dur, profund sau rugos.

Tratamentul

dinamizarea Qi și Xue, armonizarea proceselor trofice:

- Shu – F3 Taichong;
- Shu-post. – V17 Geshu;
- Lo – MC6 Neiguan;
- & – VG19 Houding, VB20 Fengchi, E8 Touwei, VG14 Dazhui, RP10 Xuehai, puncte Ashi (înțepare orizontală, de la marginea ariei de alopecie spre centrul zonei afectate), Fanglao (Extra) + Jiannao (Extra) + VB20 Fengchi ("trei puncte cefalice").

Formule

- GI4 + F3 + RP4 + RP8 + VC6;
- F3 + RP10 + V17 + RP6 + Ashi + "trei puncte cefalice";
- F3 + R3 + C7 + RP10 + Ashi;
- F3 + GI4.

Modelul clinic 504

Alopecia

[Căldură Xue]

Simptome

plăci alopecice singulare, multiple, de mărime variată, localizate în diferite zone; senzație de căldură, sete; față roșie, buze roșii; irascibilitate, neliniște, insomnie; menstrre în avans; sunt posibile diferite hemoragii (nazale, hematemeză etc.); urină galbenă.
Limba – roșie-purpurie, cu depozit galben și uscat. *Pulsul* – rapid și mare.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, armonizarea Xue și a proceselor trofice:

- Shu – GI11 Quchi;
- & – VG19 Houding, VB20 Fengchi, E8 Touwei, VG14 Dazhui, RP10 Xuehai, puncte Ashi.

Formule

- GI11 + R3 + C7 + RP10 + Ashi;
- GI11 + RP10 + RP6 + V40 + Ashi + "trei puncte cefalice".

Modelul clinic 505

Alopecia

[Insuficiența Xue]

Simptome

plăci alopecice singulare, multiple, bine conturate, rotunde, de

* Fanglao – la 1 cun posterior de punctul VG20 Baihui.

** Jiannao – la 1 cun mai jos de punctul VB20 Fengchi.

mărime variată, situate pe pielea capului, barbă, regiunea axilară și pubiană; păr uscat și subțire; insomnie, vertij; parestezii ale membrelor; piele și buze palide; palpitații. *Limba* – palidă și subțire. *Pulsul* – filiform și slab.

Tratamentul

fortificarea Xue, armonizarea proceselor trofice:

- Shu – C7 Shenmen, E36 Zusanli;
- Shu-post. – V20 Pishu, V17 Geshu, V18 Ganshu, V23 Shenshu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
- & – VB20 Fengchi, E8 Touwei, VG14 Dazhui, VG19 Houding, puncte Ashi;

Formule

- V17 + R3 + C7 + RP10 + Ashi;
- E36 + RP6 + RP10 + F8 + Ashi + "trei puncte cefalice".

Modelul clinic 506

Alopecia

[Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor și a Ficatului]

Simptome

plăci alopecice singulare, multiple, de mărime variată, localizate în diferite zone; semne de afectare a unghiilor, uscăciune a părului și a ochilor; gură uscată; senzație de căldură în "cinci inimi"; insomnie; tinitus; senzație de slăbiciune, greutate sau durere în regiunea lombară și membrele inferioare. *Limba* – roșie, cu depozit neînsemnat. *Pulsul* – întins și fin.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi, armonizarea Ficatului, Rinichilor și proceselor trofice:

- Shu – R3 Taixi;
- Shu-post. – V18 Ganshu, V23 Shenshu;
- & – VG19 Houding, VB20 Fengchi, E8 Touwei, VG14 Dazhui, puncte Ashi.

Formule

- F8 + R6 + RP6;
- F8 + R3 + C7 + RP10 + Ashi;
- R3 + V18 + V23 + V17 + RP6 + Ashi + "trei puncte cefalice".

XVI.9. Verucile

Modelul clinic 507

Veruca vulgară

[Verucile]

Simptome

ridicături rotunde sau ovale, izolate sau grupate, de dimensiuni variabile (de la 4 mm până la 1 cm), de culoarea pielii (uneori roz-gălbui sau negricioase), dure, nedureroase, cu suprafața neregulată brăzdată de șanțuri; veruca vulgară se localizează pe fața dorsală a mâinilor și picioarelor, degete, genunchi, mai rar pe față, palme, coate și nu se întâlnește pe trunchi; simptome subiective nu sunt. Limba și pulsul – normale.

Tratamentul

eliminarea verucilor:

- Shu – GI11 Quchi, TR3 Zhongzhu, GI4 Hegu;
- Shu-post. – V13 Feishu;
- & – VB31 Fengshi, RP10 Xuehai, Dagukong* (Extra);
puncte Ashi.

Formule

- GI4 + TR3 + Dagukong (înțepare la 0,3 cm în adâncime pe o durată de 30 minute);
- F2 + VB43 + TR3 + RP10 + Ashi (pentru stimularea punctelor Ashi se folosesc ace groase, care se înțeapă în centrul verucii "mamă", care a apărut prima în evoluția bolii sau este cea mai mare în dimensiuni; acele se rotesc cu o amplitudine mare, aproximativ de 30 ori, la extragerea acelor orificiul se lărgițește prin mărirea amplitudinii de rotire, după extragerea acului se presează pentru a obține câteva picături de sânge; în cazul când verucile sunt de dimensiuni mari, se înțeapă 2 sau 3 ace de acupunctură, pentru a penetra tot diametrul verucii după tehnica descrisă mai sus; procedura se efectuează de câteva ori, peste o zi. Pentru moxibustia punctelor Ashi preventiv se introduce un anestezic (de exemplu, soluție 1% de procaină) în zona afectată; după aceasta se plasează un moxa-con deasupra verucii (de aceeași dimensiune ca și veruca) și se aprinde. După moxibustie se încearcă de a înlătura veruca și a curăța atent locul afectat cu un bisturiu steril (procedura se termină prin aplicarea soluției de 2% verde brilliant).

* Dagukong – pe suprafața dorsală a degetului mare, la mijlocul plicii interfalangiene.

Modelul clinic 508

Verucile plane juvenile

[Verucile]

Simptome

mici papule plane, rotunde și poligonale, cu suprafața netedă, de culoarea pielii normale sau gălbuie; se localizează pe față și dosul mâinilor, gât, antebraț. Limba și pulsul sunt normale.

Tratamentul

Înlăturarea verucilor:

Shu – GI4 Hegu, GI11 Quchi, TR3 Zhongzhu;
& – VB20 Fengchi, RP10 Xuehai, Taiyang (Extra), VB14 Yangbai, Dagukong (Extra).

Formula

VB20 + GI11 + GI4 + E36 + RP10 + Ashi (tehnica de stimulare este similară cu cea descrisă mai sus).

XVI.10. Vitiligo

Modelul clinic 509

Vitiligo

[Insuficiență Xue / Insuficiență Yin-Qi a Rinichilor și a Ficatului / Căldură Xue / Vânt Intern]

Simptome

pete acromice, determinate de lipsa pigmentului melanic, având culoare albă, petele sunt de diferite dimensiuni, mai des cu localizare pe față, gât, suprafețele dorsale ale mâinilor. *Limba* – palidă (Insuficiență Xue) sau roșie, fără depozit (Insuficiență Yin-Qi). *Pulsul* – filiform sau întins și fin.

Tratamentul

fortificarea Xue, armonizarea Qi și Xue, alimentarea Yin-Qi și ameliorarea proceselor trofice:

Shu – E36 Zusanli, R3 Taixi, GI11 Quchi;
Shu-post. – V18 Ganshu, V23 Shenshu, V17 Geshu, V13 Feishu;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – RP10 Xuehai, VG4 Mingmen, VB20 Fengchi, punctele Ashi, Xiaxia* (Extra), Baidianfeng** (Extra).

Formule

– GI4 + GI11 + RP10 + RP6 + Ashi (întepare orizontală, de la granița petei acromice spre centrul ei);

* Xiaxia – la granița treimii mijlocii și de jos a marginii laterale a *m. biceps brachii*.

** Baidianfeng – pe suprafața palmară a plicii transversale a articulației distale interfalangiene a mediusului.

- Xiaxia + Baidianfeng: se aplică acupunctura și tehnica de sângereare, procedura se efectuează la fiecare 5–7 zile, alternând partea stângă și dreaptă. Este indicată moxibustia punctului Baidianfeng și a zonelor afectate, obținând o hiperemie (fără arsură). Se recomandă tapotajul zilnic al zonei depigmentate după tehnica fluier de prumier.

XVI.11. Furunculoza, abcesele și limfadenitele

Modelul clinic 510

Furunculoza. Abcesele

[Umiditate-Foc / Căldură toxică / Stagnarea Căldurii]

Simptome

furunculoză și abcese cu localizare diferită; febră, sete; scaune uscate. *Limba* – normală sau roșie, cu depozit galben și subțire. *Pulsul* – rapid, încordat.

Tratamentul

expulzarea Umidității și a Focului, diminuarea Căldurii, purificarea sângelui:

- Shu** – GI4 Hegu, GI11 Quchi, E36 Zusanli, E44 Neiting, V40 Weizhong, V65 Shugu, VB44 Zuqiaoyin, F3 Taichong;
- Shu-post.** – V15 Xinshu, V17 Geshu;
- &** – RP10 Xuehai, V12 Fengmen, V62 Shenmai, VB20 Fengchi, VG10 Lingtai.

Formule

- VG12 + VG10 + GI4 + V40 (sângereare); se folosesc ace subcutane, care sunt lăsate 24 ore (acele se introduc de la un punct spre altul – VG12-VG11, VG11-VG10, VG10-VG9);
- VG10 + GI4 + V40 + GI1 (afectarea feței);
- VG10 + GI4 + V40 + GI11 (afectarea membrelor superioare);
- VG10 + GI4 + V40 + VB21 + VB41 + C3 (afectarea spatelui);
- VG10 + GI4 + V40 + E36 + F3 (afectarea membrelor inferioare);

Modelul clinic 511

Limfadenitele

[Stagnarea Qi și Xue]

Simptome

ganglioni limfatici măriți în regiunea cervicală, axilară sau inghinală. *Limba* și *pulsul* – tablou diferit în funcție de predominarea factorilor patogeni și faza maladiei.

Tratamentul

normalizarea circulației Qi și Xue, purificarea sângelui:

- Shu – GI11 Quchi, V40 Weizhong, VB41 Zulinqi;
& – V43 Gaohuangshu, VB20 Fengchi, VB21 Jianjing,
VG10 Lingtai, RP10 Xuehai.

Formule

- punct Xi (al meridianului care traversează aria afectată) + Ashi;
- GI11 + TR5 + E12 + TR17 + VB20 (limfadenita cervicală);
- MC7 + VB38 + VB41 + V19 + TR5 + MC1 (limfadenita axilară);
- V40 + RP10 + RP11 (limfadenita inghinală).

XVII

Acupunctura în tratamentul bolilor infecțioase

XVII.1 Dizenteria

XVII.2. Tusea convulsivă

XVII.3. Parotidita epidemică

XVII.4. Zona Zoster

XVII.5. SIDA

XVII.1. Dizenteria

Modelul clinic 512

Dizenteria

[Invasia toxinelor patogene / Dizenteria fulminantă]

Simptome

tulburările se instalează brusc, apar dureri severe în abdomen, tenesme, scaune cu sânge de culoare roșie-închis sau puroi; febră, sete, cefalee, comă, convulsii. *Limba* – roșie-închis, cu depozit galben și gros sau cu depozit uscat. *Pulsul* – alunecos, rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, armonizarea circulației Qi și Xue, eliminarea toxinelor:

- | | | |
|---------|---|--|
| Shu | – | GI4 Hegu; |
| Mu-ant. | – | E25 Tianshu; |
| & | – | E37 Shangjuxu, VG14 Dazhui, Shixuan (Extra). |

Formule

- E25 + VC6 + E37 + GI4 (acele sunt reținute timp de 30–60 minute; procedura poate fi repetată la fiecare 8 ore; formula antică);
- GI4 + E25 + E37 + VG14 + Shixuan.

Modelul clinic 513

Dizenteria

[Umiditate-Căldură]

Simptome

defecații fetide, scaune cu mucus, puroi sau sânge, dureri abdominale cu senzație de distensie și greutate, tenesme, senzație de arsură în anus; posibil febră, sete. *Limba* – cu depozit galben și gros. *Pulsul* – alunecos, rapid.

Tratamentul

diminuarea Umidității-Căldurii, armonizarea circulației Qi și Xue, eliminarea toxinelor:

- | | | |
|---------|---|------------------------------------|
| Shu | – | GI4 Hegu, E44 Neiting, GI11 Quchi; |
| Mu-ant. | – | E25 Tianshu; |
| Lo | – | MC6 Neiguan; |
| & | – | E37 Shangjuxu. |

Formule

- RP4 + RP5 + RP6 + E36 + V20 (formulă cu efect de diminuare a Căldurii și eliminare a Umidității);
- V20 + V27 + V25 + GI11 + E37;
- GI4 + E25 + E37 + GI11 + E44;
- VC3 + VC12 + RP9 + RP6 + GI11 + E37;

- VC6 + VC10 + E25 + E39 + RP15;
- E25 + VC10 + R6;
- E44 + E25 + RP1 + VC6 + R6 + MC6;
- TR5 + VC12 + RP1 + E25 + V62.

Modelul clinic 514

Dizenteria

[Dizenterie intermitentă / Insuficiența Energiei Vitale /
Insuficiența Qi a Splinei și Rinichilor / Insuficiența Yang-Qi /
Insuficiența Yin-Qi]

Simptome

dizenterie intermitentă, rezistentă la tratament; scaune cu mucus de culoare albă sau cu sânge, periodic scaune moi, senzație de plenitudine în epigastriu, inapetență; senzație de căldură în "cinci inimi" sau de rece în membre; aversiune față de rece; iritabilitate sau somnolență, astenie. *Limba* – palidă, cu depozit alb (Insuficiența Yang-Qi) sau roșie, fără depozit (Insuficiența Yin-Qi). *Pulsul* – profund și lent (Insuficiența Yang-Qi) sau subțire și rapid (Insuficiența Yin-Qi).

Tratamentul

fortificarea Splinei și a Rinichilor, fortificarea și armonizarea Qi și Xue, Yin și Yang, eliminarea toxinelor:

- Shu – GI4 Hegu;
- Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu, V23 Shenshu;
- Mu-ant. – E25 Tianshu, VC4 Guanyuan;
- & – E37 Shangjuxu.

Formule

- GI4 + E25 + E37 + V20 + V21 + V23 (formulă indicată în Insuficiența Yang-Qi);
- GI4 + E25 + E37 + R6 + RP10 (formulă indicată în Insuficiența Yin-Qi);
- E25 + E37 + VC6 + V23 + VG20;
- VC12 + E25 + V20 + V22 + V25 + E36 + RP6.

Modelul clinic 515

Dizenteria

[Umiditate – Frig]

Simptome

scaune frecvente cu predominare a mucusului și puroiului, periodic cu sânge în cantități mici, dureri abdominale, inapetență, diminuarea senzațiilor gustative, absența setei; senzație de greutate în regiunea cefalică și tot corpul. *Limba* – palidă, cu depozit alb și gros. *Pulsul* – încetinit sau încordat.

Tratamentul

diminuarea Umidității, încălzirea Frigului, armonizarea circulației

Qi și Xue, eliminarea toxinelor:
 Shu – GI4 Hegu;
 Mu-ant. – E25 Tianshu, VC12 Zhongwan;
 & – E37 Shangjuxu, VC6 Qihai.

Formule

- VC8 + VC12 + E25 + V20 + V23 (moxibustie);
- GI4 + E25 + E37 + RP9 + VC6.

XVII.2. Tusea convulsivă

Modelul clinic 516

Tusea convulsivă (perioada catarală)
 [Vânt-Frig / Afectarea Wei-Qi]

Simptome

tuse necaracteristică moderată, cu acutizare noaptea și agravare cu fiecare zi a bolii; obstrucție nazală cu eliminări transparente, tuse cu spută transparentă, aversiune față de vânt și frig, frison; cefalee; în regiunea indexului se depistează venule pale. *Limba* – normală sau palidă, cu depozit alb, subțire. *Pulsul* – superficial.

Tratamentul

eliminarea Vântului și a Frigului, fortificarea Wei-Qi, eliberarea căilor respiratorii, calmarea tusei:

Shu – GI4 Hegu;
 Lo – P7 Lieque;
 & – V12 Fengmen, VC22 Tiantu, VG16 Fengfu.

Formula

V12 + V13 + Dingchuan + VC22 (stimulare fără a reține acele în țesuturi).

Modelul clinic 517

Tusea convulsivă (perioada catarală)
 [Vânt-Căldură / Afectarea Wei-Qi]

Simptome

tuse care devine din ce în ce mai spastică și sonoră, cu acutizare noaptea și spre dimineață; febră; obstrucție nazală cu eliminări galbene, tuse cu spută galbenă, gât uscat, sete; hiperemie a vestibulului faringian; în regiunea indexului se depistează venule roșii. *Limba* – roșie (în special la margini și la vârf), cu depozit galben și subțire. *Pulsul* – superficial, rapid.

Tratamentul

eliminarea Vântului-Căldurii, fortificarea Wei-Qi, eliberarea căilor respiratorii, calmarea tusei:

Shu – GI11 Quchi, GI4 Hegu, P10 Yuji;
 Lo – TR5 Waiguan, P7 Lieque;

& – VG14 Dazhui, VC22 Tiantu.

Formula

GI11 + V12 + VB20 + VG14.

Modelul clinic 518

Tusea convulsivă (perioada de tuse paroxistică)

[Căldură-Flegmă în Plămâni]

Simptome

accese puternice de tuse paroxistică, cu acutizare noaptea și spre dimineață (uneori ameliorare temporară după vomă), în timpul accesului se produce o inspirație adâncă, șuierătoare, stridoroasă, numită repriză (zgomotul este comparat cu zbieratul de măgar – "tuse mângărească"), care pune capăt accesului de tuse sau poate fi punctul de plecare al altor accese; spută profuză și groasă, de culoare galbenă, cu dificultate de eliminare, dispnee; se depistează venule de culoare violetă în regiunea indexului; fatigabilitate; constipație; urină galbenă; perioada de tuse paroxistică durează 2–4 săptămâni. *Limba* – roșie, cu depozit galben, lipicios; se evidențiază ulcerarea frâului limbii. *Pulsul* – rapid, alunecos.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, diminuarea Flegmei, eliberarea căilor respiratorii, calmarea tusei:

Shu – P5 Chize, E36 Zusanli;

Shu-post. – V13 Feishu;

Lo – E40 Fenglong;

Xi – P6 Kongzui;

& – V12 Fengmen, Sifeng (Extra).

Formule antice

- RP5 (acupunctură superficială) + V13 (moxibustie) + Sifeng (punctare cu ac triunghiular, cu eliminarea câtorva picături de lichid albicios sau gălbui);
- P11 + GI1 + VG12 (tehnica de sângerare în toate punctele);
- GI4 (acupunctură) + V43 (moxibustie);
- RP5 + GI11.

Modelul clinic 519

Tusea convulsivă (perioada de convalescență)

[Insuficiența Qi a Plămânilor și Splinei]

Simptome

tuse, intensitatea căreia diminuează pe zi ce trece, tuse cu eliminarea sputei subțiri, în cantități mici sau tuse seacă; astenie, voce slabă, senzație de rece în membre; inapetență, scaune moi, distensie abdominală; hiperhidroză spontană; urină clară. Perioada de convalescență durează 2–4 săptămâni. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Qi a Plămânilor și a Splinei, armonizarea Focarului Superior și Mediu:

- Shu – E36 Zusanli, P9 Taiyuan;
- Shu-post. – V13 Feishu, V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- & – VC6 Qihai.

Formula

P9 + V13 + V20.

Modelul clinic 520

Tusea convulsivă

[Insuficiența Yin-Qi a Plămânilor]

Simptome

tuse seacă, ineficientă, gât și gură uscate, posibil expectorații cu spută filantă și sangvinolentă; transpirații nocturne; senzații de căldură în "cinci inimi". *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – filiform, rapid.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi, armonizarea circulației Qi, diminuarea Insuficienței-Căldură:

- Shu – R3 Taixi, P10 Yuji;
- Shu-post. – V13 Feishu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, P7 Lieque;
- & – R6 Zhaohai.

Formule

- P9 + P6 + V13 + RP6 (formulă cu efect de alimentare Yin-Qi și fortificare Qi a Plămânilor);
- P7 + R3 + V13.

XVII.3. Parotidita epidemică

Modelul clinic 521

Parotidita epidemică

[Vânt Căldură / Căldură în Shao Yang și Yang Ming]

Simptome

tumefiere difuză, dureroasă, cu piele palidă în regiunea glandelor parotide; dificultate la deschiderea gurii; febră, frison; cefalee; greață, gură uscată, constipație; iritabilitate; urini de culoare galbenă-închis. Pot apărea dureri și tumefiere a țesuturilor. *Limba* – roșie, cu depozit albicios sau gălbui. *Pulsul* – superficial, rapid.

Tratamentul

eliminarea Vântului, diminuarea Căldurii, ameliorarea circulației Qi și Xue:

- Shu – GI1 Shangyang, GI4 Hegu, GI11 Quchi, TR1 Guanchong, F3 Taichong, TR2 Yemen;
Lo – P7 Lieque, TR5 Waiguan, F5 Ligou;
& – E6 Jiache, TR17 Yifeng, VG14 Dazhui, VB20 Fengchi.

Formule antice

- IG5 + IG17;
- TR17 + E6 + GI4 + P7 + E40 + E41 (durata procedurii 30–60 minute cu stimulare la fiecare 15 minute).

Modelul clinic 522

Parotidita epidemică

[Căldură toxică]

Simptome

tumefiere difuză și dureroasă în regiunea glandelor parotide cu senzație de arsură; dificultate la deschiderea gurii; febră înaltă; cefalee pronunțată, intoxicație generală; somnolență; sete, anorexie, vome, scaune uscate; semne de iritare a meningelor, convulsii; urină galbenă; durere și tumefiere a testiculelor. *Limba* – roșie, cu depozit galben-cenușiu. *Pulsul* – alunecos și rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, purificarea sângelui, ameliorarea circulației Qi și Xue:

- Shu – TR2 Yemen, GI4 Hegu, GI11 Quchi, F3 Taichong;
Lo – RP6 Sanyinjiao, TR5 Waiguan, E40 Fenglong;
& – VB20 Fengchi, TR17 Yifeng, E6 Jiache, RP10 Xuehai, VG26 Renzhong, Shixuan (Extra), VG14 Dazhui.

Formula

GI11 + RP10 + Shixuan + VG14.

XVII.4. Zona Zoster

Modelul clinic 523

Zona Zoster

[Vânt-Căldură / Umiditate-Căldură / Vânt-Uscăciune / Excesul Focului în Ficat]

Simptome

apar eriteme, vezicule cu lichid (izolate sau în ciorchine), apoi cruste, care corespund nervului afectat; nevralgie a nervului afectat care după durată depășește perioada acută a bolii, parestezii,

tulburări trofice. *Limba* – roșie. *Pulsul* – rapid și moale sau rapid și întins.

Tratamentul

eliminarea factorilor patogeni, diminuarea durerii, normalizarea circulației Qi și Xue:

- | | | |
|---------|---|---|
| Shu | – | GI11 Quchi, V40 Weizhong, TR6 Zhigou, VB34 Yanglingquan, VB41 Zulinqi, VB43 Xiashi, F2 Xingjian, F3 Taichong, E44 Neiting, E36 Zusanli; |
| Mu-ant. | – | F14 Qimen; |
| Lo | – | RP4 Gongsun, RP6 Sanyinjiao, TR5 Waiguna; |
| & | – | RP10 Xuehai, VB26 Daimai, VG10 Lingtai, VG14 Dazhui, puncte Ashi, Jiaji (Extra). |

Formule

- TR6 + VB31 + V40 + puncte Ashi – tehnica de sângerare în punctele localizate în jurul zonei afectate. La început sângerarea se efectuează în punctul localizat la 0,5 cun de la "baza" focarului (zona care a apărut prima în dinamica afectării), apoi sângerare în punctul localizat la 0,5 cun de la "vârful" focarului (zona care a apărut recent). În ultima instanță, se efectuează sângerarea în câteva puncte localizate de-a lungul flancurilor zonei afectate;
- V2 + Taiyang + VB2 + Jiaji (zona Zoster în regiunea cefalică);
- GI4 + GI11 + TR5 + Jiaji (zona Zoster superior de ombilic);
- F3 + E36 + VB43 + Jiaji (zona Zoster inferior de ombilic);
- GI11 + TR6 + VB34 + RP6 + RP10 + VG14 + Ashi + Jiaji (zona Zoster intercostală);
- GI4 + E36 + GI11 + V60 + VB41 + RP10 + TR23 + VB1 + VB14 + VB20 + Ashi (zona Zoster oftalmică);
- GI4 + GI11 + VB41 + VB34 + P7 + TR5 + VG14 + VB20 + RP10 + Ashi + Jiaji (zona Zoster cervico-brahială);
- GI4 + E36 + VB30 + VB41 + RP6 + RP10 + F3 + V23 + Ashi + Jiaji (zona Zoster sciatică).

XVII.5. SIDA*

Modelul clinic 524

SIDA

[Invasia factorilor patogeni exogeni]

Simptome

tuse, febră, hiperhidroză nocturnă, frison; dureri în diferite regiuni ale corpului și în gât; fatigabilitate; inapetență. *Limba* – cu depozit alb, subțire. *Pulsul* – superficial.

Tratamentul

expulzarea factorilor patogeni exogeni, armonizarea statusului imun:

- | | | |
|---------|---|----------------------------|
| Shu | – | E36 Zusanli, GI4 Hegu; |
| Mu-ant. | – | VC4 Guanyuan; |
| Lo | – | P7 Lieque; |
| & | – | VB20 Fengchi, VG14 Dazhui. |

Formula

E36 + VG13 + VG14 + GI11 + V33 + V17 ("șase puncte ale imunității").

Modelul clinic 525

SIDA

[Căldură toxică]

Simptome

febră persistentă înaltă, sete, ochi hiperemiați, piele roșie, cu eroziuni; iritabilitate, fatigabilitate; cefalee; adenopatii. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

eliminarea Căldurii toxice și armonizarea statusului imun:

- | | | |
|-----|---|------------------------------------|
| Shu | – | GI11 Quchi, E36 Zusanli, GI4 Hegu; |
| Lo | – | TR5 Waiguan; |
| & | – | VG14 Dazhui. |

Formula

Shixuan + "șase puncte ale imunității".

* Infecția HIV determină o gamă largă de perturbări imunologice și hematologice (tulburări ale hematopoezei, citopenii imunologice, coagulopatii etc.), cu un mare spectru de complicații fatale. SIDA nu a fost descrisă în medicina tradițională chineză, însă tratamentul multor tulburări este posibil, reieșind din concepția sindromală a medicinei tradiționale. Autorul, practicând acupunctura în China, a fost martor ocular când acupunctura, aplicată conform principiilor tradiționale, stabilizează sau ameliorează starea pacienților cu SIDA (evident, este vorba despre tratamentul simptomatic individualizat).

Modelul clinic 526

SIDA

[Stagnarea Qi a Ficatului]

Simptome

disconfort sau durere în hipocondru și cutia toracică (cu agravare la presiune); iritabilitate, depresie psihică; oftat frecvent; eructații. *Limba* – roșie sau roșie-închis. *Pulsul* – întins.

Tratamentul

Înlăturarea stagnării Qi, armonizarea statusului imun:

Shu – F3 Taichong, E36 Zusanli, TR6 Zhigou;

Shu-post. – V18 Ganshu;

Mu-ant. – F14 Qimen.

Formula

F3 + GI4 + TR6 + "șase puncte ale imunității".

Modelul clinic 527

SIDA

[Stagnarea Flegmei / Stagnarea Xue]

Simptome

dureri fixe în hipocondru sau cutia toracică; formațiuni tumorale abdominale cu senzație de plenitudine (agravare la presare); formațiuni nodulare multiple; facies întunecat; vertij; greață. *Limba* – roșie-închis, cu echimoze sau cu depozit gros, albicios. *Pulsul* – încordat sau alunecos.

Tratamentul

dinamizarea Xue, eliminarea Flegmei, armonizarea statusului imun:

Shu – C3 Shaohai, E36 Zusanli;

Mu-ant. – F14 Qimen;

& – VG20 Baihui, R23 Shenfeng.

Formula

F3 + GI4 + F14 + RP6 + "șase puncte ale imunității".

Modelul clinic 528

SIDA

[Vânt-Flegmă]

Simptome

apatie, demență, pierdere de cunoștință, convulsii, paralizii faciale, hemiplegie; spută profuză, dificultate la respirație. *Limba* – cu depozit alb, gros și gras. *Pulsul* – încordat și alunecos.

Tratamentul

diminuarea Vântului și a Flegmei, armonizarea psihicului și a statusului imun:

Shu – C7 Shenmen, MC7 Daling;

- Lo – E40 Fenglong;
- & – Yintang (Extra), VG26 Renzhong.

Formula

TR17 + VB20 + E40 + "șase puncte ale imunității".

Modelul clinic 529

SIDA

[Insuficiența Yang-Qi a Splinei și a Rinichilor]

Simptome

astenie, fatigabilitate; piele palidă; anorexie, scaune moi, diaree; disconfort și dureri în regiunea lombară și genunchi; membre reci, aversiune față de frig; impotență. *Limba* – palidă, umedă, cu depozit alb. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Yang-Qi a Splinei și Rinichilor, armonizarea statusului imun;

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V20 Pishu, V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- & – VG4 Mingmen.

Formula

V20 + V23 + "șase puncte ale imunității".

Modelul clinic 530

SIDA

[Insuficiența Qi și Xue]

Simptome

astenie, voce slabă, hiperhidroză spontană; piele și buze palide; vertij; palpitații. *Limba* – palidă, cu depozit albicios. *Pulsul* – filiform și slab.

Tratamentul

fortificarea Qi și Xue, armonizarea statusului imun;

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V20 Pishu, V15 Xinshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- & – VC6 Qihai, VG20 Baihui.

Formule

- V13 + V43 + E36;
- V20 + VC6 + "șase puncte ale imunității".

Modelul clinic 531

SIDA

[Insuficiența Qi și Yin-Qi]

Simptome

astenie, cașexie, voce slabă; respirație scurtă, tuse uscată cu spută în cantități mici; hiperhidroză spontană; senzație de căldură în "cinci inimi"; facies palid cu pomeți hiperemiați. *Limba* – roșietică, cu depozit neînsemnat. *Pulsul* – filiform, slab.

Tratamentul

fortificarea Qi, armonizarea Yin-Yang și a statusului imun:

Shu – E36 Zusanli, P9 Taiyuan;

Shu-post. – V13 Feishu;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – V43 Gaohuangshu.

Formule

– V13 + V43 + E36;

– V43 + "șase puncte ale imunității".

Modelul clinic 532

SIDA

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului și Rinichilor]

Simptome

vertij, tinitus, surditate; iritabilitate; disconfort sau durere în regiunea lombară, genunchi și hipocondru; senzație de căldură în "cinci inimi", hiperhidroză nocturnă; uscăciune a gurii și gâtului. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – întins și fin.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi a Ficatului și a Rinichilor, armonizarea statusului imun:

Shu – E36 Zusanli, R3 Taixi, F8 Ququan;

Shu-post. – V23 Shenshu;

Lo – RP6 Sanyinjiao.

Formula

R3 + F8 + "șase puncte ale imunității".

Modelul clinic 533

SIDA

[Insuficiența Yin-Qi și Yang-Qi]

Simptome

cașexie, voce slabă, pierdere de cunoștință, comă; uscăciune a gurii; vertij, tinitus; piele palidă; membre reci; hiperhidroză spontană sau hiperhidroză rece profuză. *Limba* – purpurie sau roșie, fără depozit. *Pulsul* – filiform și slab.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi și Yang -Qi, armonizarea statusului imun:

Shu – R3 Taixi, E36 Zusanli;

Shu-post. – V23 Shenshu;

Mu-ant. – VC4 Guanyuan;

& – VG4 Mingmen.

Formula

R3 + V23 + "șase puncte ale imunității".

XVIII

Acupunctura în tratamentul bolilor de sânge și hemoragiilor

- XVIII.1. Anemia**
- XVIII.2. Leucopenia**
- XVIII.3. Epistaxisul recidivant**
- XVIII.4. Hemoptizia**
- XVIII.5. Gingivoragia**
- XVIII.6. Hemoragiile gastrointestinale**
- XVIII.7. Hematuria**
- XVIII.8. Menoragia. Metroragia**
- XVIII.9. Menstruația vicariantă**
- XVIII.10. Peteșiile cutaneo-mucoase**

XVIII.1. Anemia

Modelul clinic 534

Anemia

[Insuficiența Qi și Xue a Splinei și a Inimii]

Simptome

anemie (confirmată prin analiza de laborator); vertij; insomnie (visuri), diminuarea memoriei, anxietate; piele și buze palide; inapetență, distensie abdominală, scaune moi; disconfort în regiunea precordială; astenie. *Limba* – palidă și subțire. *Pulsul* – filiform și slab.

Tratamentul

fortificarea Qi și Xue, armonizarea Splinei și Inimii:

- Shu – E36 Zusanli, C7 Shenmen;
- Shu-post. – V17 Geshu, V20 Pishu, V21 Weishu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan, VC4 Guanyuan, VC17 Shanzhong;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – RP10 Xuehai.

Formula

RP10 + RP6 + V17 + V20.

Modelul clinic 535

Anemia

[Insuficiența Yang-Qi a Splinei și a Rinichilor]

Simptome

anemie (confirmată prin analiza de laborator); astenie, nedorința de a vorbi; inapetență, distensie abdominală, scaune moi, diaree în orele de dimineață, diaree cronică; aversiune față de rece, membre reci; edeme ale abdomenului și ale membrelor; disconfort sau dureri în regiunea lombară. *Limba* – palidă, puțin tumefiată. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Yang-Qi, încălzirea și armonizarea Splinei și a Rinichilor:

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V17 Geshu, V20 Pishu, V23 Shenshu, V21 Weishu, V25 Dachangshu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan, VC4 Guanyuan (moxibustie), E25 Tianshu;
- Lo – VB39 Xuanzhong, RP6 Sanyinjiao;
- & – VC6 Qihai (moxibustie), VG4 Mingmen.

Formule

- E36 + VG4 + RP6;
- E36 + V43 + VC6 + RP6 + VG4.

Modelul clinic 536

Anemia

[Insuficiența Yin-Qi a Ficatului și a Rinichilor]

Simptome

anemie (confirmată prin analiza de laborator); cefalee în regiunea vertexului, vertij, tinitus; insomnie (visuri); amorțire a membrelor; senzație de căldură în "cinci inimi"; uscăciune a ochilor și a gâtului, tulburări de vedere; dureri sau disconfort în regiunea lombară și genunchi; hiperhidroză nocturnă; scaune uscate; posibil amenoree. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – întins și fin.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi a Ficatului și a Rinichilor, armonizarea sângelui;

Shu – F8 Ququan, R3 Taixi;

Shu-post. – V17 Geshu, V20 Pishu, V23 Shenshu, V18 Ganshu;

Mu-ant. – VC12 Zhongwan, VC4 Guanyuan;

Lo – VB39 Xuanzhong, RP6 Sanyinjiao;

& – RP10 Xuehai, R6 Zhaohai.

Formula

R3 + F8 + V17 + VB39.

Modelul clinic 537

Anemia

[Insuficiența Xue a Splinei și a Ficatului]

Simptome

anemie (confirmată prin analiza de laborator); piele și buze palide; vertij; fatigabilitate; scaune moi, inapetență; furnicături, parestezii în membre; tulburări ale vederii. *Limba* – palidă (în special la margini). *Pulsul* – filiform.

Tratamentul

fortificarea Qi și Xue, armonizarea Splinei și Ficatului;

Shu – E36 Zusanli, RP3 Taibai, F8 Ququan;

Shu-post. – V17 Geshu, V20 Pishu, V21 Weishu, V18 Ganshu;

Lo – RP6 Sanyinjiao.

Formula

V17 + V20 + E36 + F8.

XVIII.2. Leucopenia

Modelul clinic 538

Leucopenia

[Insuficiența Qi a Splinei]

Simptome

leucopenie (confirmată prin analiza de laborator); inapetență, distensie abdominală după mâncare, scaune moi; astenie, slăbiciune în membre. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Qi a Splinei, armonizarea sângelui:

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V17 Geshu, V20 Pishu, V21 Weishu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – RP10 Xuehai.

Formule

- RP2 + RP3 + E36 + V20 + F13 (formulă cu efect de fortificare Qi și armonizare a Splinei);
- VG14 + V20;
- E36 + RP6 + VB39 + RP10 + V17.

Modelul clinic 539

Leucopenia

[Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor]

Simptome

leucopenie (confirmată prin analiza de laborator); dureri lombare; senzație de rece în genunchi și spate, aversiune față de rece; slăbiciune în picioare (genunchi), edeme ale membrelor inferioare; impotență; astenie; urină clară; scaune moi. *Limba* – palidă, tumefiată, umedă. *Pulsul* – profund și slab.

Tratamentul

fortificarea și încălzirea Yang-Qi a Rinichilor, armonizarea sângelui:

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V17 Geshu, V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – V52 Zhishi, RP10 Xuehai, VG4 Mingmen, VC6 Qihai, Jinggong (Extra).

Formula

E36 + VG4 + VG14 + Jinggong.

* Jinggong – la 0,5 cun lateral de punctul V52 Zhishi.

Modelul clinic 540

Leucopenia

[Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor]

Simptome

leucopenie (confirmată prin analiza de laborator); vertij, tinitus, surditate; diminuarea memoriei; hiperhidroză nocturnă, uscăciune în gură în cursul nopții, sete, senzație de căldură în "cinci inimi"; dureri lombare și în oase; constipație. *Limba* – roșie, fără depozit.

Pulsul – filiform și rapid.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi a Rinichilor, armonizarea sângelui:

- Shu – E36 Zusanli, R3 Taixi;
Shu-post. – V17 Geshu, V23 Shenshu;
Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – RP10 Xuehai, R6 Zhaohai.

Formula

R3 + V17.

XVIII.3. Epistaxisul recidivant

Modelul clinic 541

Epistaxisul recidivant

[Căldură în Plămâni]

Simptome

epistaxis cu sânge fierbinte; tuse; febră, uscăciune a gurii; cefalee; urină galbenă. Epistaxisul apare în urma acțiunii factorilor patogeni (Vânt, Căldură, Uscăciune). *Limba* – uscată, roșie, cu papile proeminente în partea anterioară, uneori cu depozit subțire și galben în părțile anterioare. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

eliminarea Căldurii și reținerea sângelui în patul vascular:

- Shu – GI4 Hegu, P11 Shaoshang, IG1 Shaoze, IG3 Houxi, V64 Jinggu, RP1 Yinbai;
Shu-post. – V17 Geshu;
Lo – GI6 Pianli;
& – VG23 Shangxing, GI20 Yingxiang, V4 Quchai, VB20 Fengchi.

Formule

- P5 + V13 + VC17 + E40 + P11 (formulă cu efect de dispersie a Căldurii și armonizare a funcției Plămânilor);
- VG23 + GI4 + VG14 + GI20 + P11 (sângerare).

Modelul clinic 542

Epistaxisul recidivant

[Hiperactivitatea Focului în Stomac]

Simptome

epistaxis însoțit de respirație cu miros greu și senzație de sete cu preferință de băuturi reci; arsuri și durere în epigastriu, regurgitații acide, uneori vomă, ulceratii sau sângerare a gingiilor, constipație; anxietate; urină galbenă. Poate apărea după un exces de mâncare fierbinte, grasă sau picantă. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

eliminarea Focului din Stomac și reținerea sângelui în patul vascular:

Shu – E44 Neiting, GI4 Hegu;

& – GI20 Yingxiang, VG23 Shangxing, P3 Tianfu.

Formule

– VG23 + GI20 + GI4 + VG14 + E44;

– GI4 + F3 + E44.

Modelul clinic 543

Epistaxisul recidivant

[Excesul Focului în Ficat]

Simptome

epistaxis însoțit de amețeli, iritabilitate, tinitus, cefalee, dureri și roșeață a ochilor; uscăciune a gurii, senzație de arsură în hipocondru. *Limba* – roșie, cu depozit galben; uneori se depistează puncte roșii pe marginea stângă a limbii. *Pulsul* – rapid și întins.

Tratamentul

eliminarea Focului din Ficat și reținerea sângelui în patul vascular:

Shu – GI4 Hegu, F2 Xingjian;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – P3 Tianfu, GI20 Yingxiang, E3 Juliao, VG23 Shangxing.

Formule

– F2 + MC8 + R1 (dispersie) + F1 + MC9 (sângerare) + VG20 (armonizare; formula antică);

– VG23 + GI20 + GI4 + VG14 + F2.

Modelul clinic 544

Epistaxisul recidivant

[Dezarmonia Splină-Xue]

Simptome

epistaxis însoțit de alte fenomene de pierdere a sângelui (scaune cu sânge, scurgeri menstruale excesive, sângerări uterine); față

palidă; apatie. Apare după o boală de lungă durată, stresuri repetate, suprasolicitări nervoase. *Limba* – palidă. *Pulsul* – filiform și slab.

Tratamentul

restabilirea funcțiilor normale ale Splinei și reținerea sângelui în patul vascular:

- Shu – GI4 Hegu, RP1 Yinbai, E36 Zusanli;
- Shu-post. – V17 Geshu, V20 Pishu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VG23 Shangxing, P3 Tianfu, VG25 Suliao.

Formule

- VG23 + GI20 + GI4 + VG14 + RP6 + RP1;
- P3 + GI11 + RP6.

Modelul clinic 545

Epistaxisul recidivant

[Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor]

Simptome

epistaxis însoțit de amețeli, țiuit în urechi; uscăciune a gurii; durere în regiunea lombară și în articulațiile genunchilor; roșeață malară, febră după amiază; constipație; urină galbenă. *Limba* – roșie, cu depozit foarte subțire sau fără depozit. Poate apărea o fisură lungă și adâncă pe linia mediană a limbii. *Pulsul* – rapid, subțire.

Tratamentul

fortificarea Rinichilor și reținerea sângelui în patul vascular:

- Shu – R1 Yongquan, R3 Taixi, GI4 Hegu, V64 Jinggu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VG23 Shangxing.

Formula

R3 + VG23 + GI20 + GI4.

Modelul clinic 546

Epistaxisul recidivant

[Leziunea traumatică]

Simptome

epistaxisul apare imediat după o leziune traumatică (uneori neînsemnată). *Limba* și *pulsul* normale.

Tratamentul

reținerea sângelui în patul vascular:

- Shu – V60 Kunlun, IG1 Shaoze, RP1 Yinbai, MC8 Laogong;
- Xi – C6 Yinxi;
- & – P3 Tianfu, GI20 Yingxiang, VG23 Shangxing.

Formula

IG1 + P3.

XVIII.4. Hemoptizia

Modelul clinic 547

Hemoptizia

[Excesul Focului în Ficat cu invadarea Plămânilor]

Simptome

hemoptizii; gust amar, durere în hipocondru; iritabilitate; vertij.

Limba – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – rapid și întins.

Tratamentul

diminuarea Focului în Ficat, normalizarea circulației Qi, reținerea sângelui în patul vascular:

Shu – P11 Shaoshang, GI11 Quchi, F2 Xingjian;

Shu-post. – V17 Geshu;

Xi – P6 Kongzui;

& – P3 Tianfu, RP10 Xuehai.

Formule

– F2 + MC8 + R1 (dispersie) + F1 + MC9 (sângerare) + VG20 (armonizare; formula antică);

– P6 + F2; P6 + P10.

Modelul clinic 548

Hemoptizia

[Insuficiența Yin-Qi a Plămânilor]

Simptome

tuse cu expectorarea unor cantități mici de spută lipicioasă și sangvinolentă, gât uscat; senzație de căldură în "cinci inimi", transpirații nocturne. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – rapid, filiform.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi, reținerea sângelui în patul vascular:

Shu – P9 Taiyuan, P10 Yuji, E36 Zusanli, R3 Taixi;

Shu-post. – V13 Feishu;

Mu-ant. – P1 Zhongfu;

Xi – P6 Kongzui;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – VG14 Dazhui.

Formule

– P9 + P6 + V13 + RP6 (formulă cu efect de alimentare Yin-Qi și fortificare a Plămânilor);

– P10 + C7 + GI11;

– P6 + R1 + MC4.

Modelul clinic 549

Hemoptizia

[Vânt-Uscăciune-Căldură]

Simptome

hemoptizie; tuse seacă, gură și nas uscate; aversiune față de frig.
Limba – roșie (în special la margini și la vârf). *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii și Uscăciunii, expulzarea Vântului, reținerea sângelui în patul vascular:

Shu – P9 Taiyuan, P10 Yuji, P11 Shaoshang, GI4 Hegu;

Shu-post. – V13 Feishu;

Xi – P6 Kongzui;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – V12 Fengmen, VG16 Fengfu.

Formula

P10 + V12 + P6.

XVIII.5. Gingivoragia

Modelul clinic 550

Gingivoragia

[Căldură în Stomac]

Simptome

gingivoragie, inflamația gingiilor; sete; cefalee frontală. *Limba* – roșie, cu depozit galben și uscat. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, reținerea sângelui în patul vascular:

Shu – GI4 Hegu, GI11 Quchi, E42 Chongyang, E44 Neiting;

Xi – GI7 Wenliu, E34 Liangqiu;

& – E3 Juliao, E21 Liangmen.

Formule

- E30 + E36 + E37 + E39 + E44 + E6 (dispersie timp de 15 minute; formula antică);
- E45 + GI4 + GI11 + VC12 + E36 (formulă cu efect de diminuare a Căldurii și armonizare a Stomacului).

Modelul clinic 551

Gingivoragia

[Insuficiența Qi a Stomacului și a Splinei]

Simptome

gingii palide, hemoragii cronice; buze palide; astenie; inapetență, scaune moi. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Qi a Stomacului și a Splinei, reținerea sângelui în patul vascular:

- Shu – GI4 Hegu, E36 Zusanli, E42 Chongyang;
- Shu-post. – V17 Geshu, V20 Pishu, V21 Weishu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
- Xi – E34 Liangqiu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – RP10 Xuehai.

Formula

E34 + E36 + V20.

Modelul clinic 552

Gingivoragia

[Insuficiența Yin-Qi a Stomacului]

Simptome

inflamația gingiilor, gingivoragie, uscăciune în gură și gât, carie dentară, dureri în epigastriu. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – rapid, filiform.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi a Stomacului, reținerea sângelui în patul vascular:

- Shu – GI4 Hegu, GI11 Quchi, E36 Zusanli, E42 Chongyang, E44 Neiting;
- Shu-post. – V17 Geshu;
- Xi – E34 Liangqiu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – RP10 Xuehai.

Formula

E21 + E44 + E34.

XVIII.6. Hemoragiile gastrointestinale

Modelul clinic 553

Hemoragia gastrointestinală

[Umiditate-Căldură în Intestine]

Simptome

scaune cu sânge și cu mucus, dureri abdominale. *Limba* – roșie, cu depozit galben și gras (în special la rădăcină). *Pulsul* – rapid, alunecos.

Tratamentul

eliminarea Umidității și a Căldurii, reținerea sângelui în patul vascular:

- Shu – GI11 Quchi, RP9 Yinlingquan, RP1 Yinbai;

- Shu-post. – V20 Pishu, V22 Sanjiaoshu, V25 Dachangshu;
- Mu-ant. – E25 Tianshu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – RP10 Xuehai, E37 Shangjuxu, VC10 Xiawan, V57 Chengshan, VG1 Changqiang.

Formule

- V17 + GI11 + V57;
- V57 + V20 + V52 + VG1 (hemoragie rectală).

Modelul clinic 554

Hemoragia gastrointestinală

[Insuficiența Qi a Splinei și a Stomacului]

Simptome

scaune moi cu mucus și cu sânge, dureri în abdomen, fațes palid; astenie. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

normalizarea Qi a Splinei și a Stomacului, reținerea sângelui în patul vascular:

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan, E25 Tianshu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – E37 Shangjuxu, RP10 Xuehai, VG20 Baihui, VC6 Qihai.

Formule antice

- RP6 + E36 + VG20 (acupunctura + moxibustie) + RP1 (moxibustie);
- VC4 + RP1 (moxibustie);
- V20 + V18 + VC13, după aceasta – moxibustie (10 minute) la RP1 Yinbai.

Modelul clinic 555

Hemoragia gastrointestinală

[Dezarmonia Ficat-Stomac]

Simptome

dureri în epigastru și hipocondru, eructație, regurgitație cu suc gastric, gust amar, greață, vomă cu sânge; iritabilitate, insomnie. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – întins și rapid.

Tratamentul

armonizarea organelor digestive, reținerea sângelui în patul vascular:

- Shu – E36 Zusanli, C7 Shenmen, MC5 Jianshi, F2 Xingjian;
- Shu-post. – V17 Geshu, V18 Ganshu, V20 Pishu;
- Mu-ant. – F14 Qimen;

Lo – RP4 Gongsun, MC6 Neiguan.

Formula antică

V13 + V18 + V20 + V23 (stimulare timp de 2 minute), apoi E36 + MC5 (20 minute).

XVIII.7. Hematuria

Modelul clinic 556

Hematuria

[Excesul lojei energetice Foc]

Simptome

hematurie; dureri spasmodice în abdomen (periombilicale), constipație; hiperexcitare psiho-emoțională; dureri în regiunea precordială; gură și gât uscate. *Limba* – roșie (în special vârful). *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

restabilirea echilibrului în loja energetică Foc, reținerea sângelui în patul vascular:

Shu – GI11 Quchi, C7 Shenmen, C8 Shaofu, IG2 Qianggu, R2 Rangu, MC7 Daling;

Shu-post. – V27 Xiaochangshu;

Mu-ant. – VC3 Zhongji, VC4 Guanyuan.

Formule

- C7 + V15 + MC8 + E36 + C6 (formulă cu efect de diminuare a Focului și armonizare a Inimii);
- MC7 + MC4.

Modelul clinic 557

Hematuria

[Căldură în Vezica Urinară]

Simptome

hematurie; dureri în abdomenul inferior; urini de culoare galbenă-închis; sete; fața roșie; insomnie. *Limba* – roșie (uneori cu pete roșii la rădăcină). *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, reținerea sângelui în patul vascular:

Shu – GI11 Quchi, C8 Shaofu, IG2 Qianggu;

Shu-post. – V28 Pangguangshu;

Mu-ant. – VC3 Zhongji;

Xi – V63 Jinmen;

& – RP10 Xuehai, V66 Tonggu.

Formule

- V28 + V32 + V57 + RP1 + TR6;

- V60 + V66 + V63.

Modelul clinic 558

Hematuria

[Excesul Focului în Ficat]

Simptome

hematurie; amețeli, tinitus, cefalee; iritabilitate; senzație de arsură în hipocondru. *Limba* – roșie. *Pulsul* – întins și rapid.

Tratamentul

eliminarea Focului din Ficat și reținerea sângelui în patul vascular:

- Shu – F2 Xingjian, F3 Taichong;
- Mu-ant. – VC3 Zhongji;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – RP10 Xuehai.

Formula antică

F2 + MC8 + R1 (dispersie) + F1 + MC9 (sângerare) + VG20 (armonizare).

Modelul clinic 559

Hematuria

[Dezarmonia Splină-Xue / Insuficiența Qi a Splinei și a Rinichilor]

Simptome

hematurie cronică; fața palidă; inapetență, distensie abdominală; astenie, slăbiciune în regiunea lombară și genunchi; tinitus; apatie. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

restabilirea funcției normale a Splinei și a Rinichilor, reținerea sângelui în patul vascular:

- Shu – E36 Zusanli, RP1 Yinbai;
- Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu, V23 Shenshu, V28 Pangguangshu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
- Xi – V63 Jinmen;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – RP10 Xuehai, VG20 Baihui, VC6 Qihai.

Formula antică

V17 + V22 + V23 (după obținerea senzației de acupunctură acele se manipulează timp de 1 minut, apoi sunt lăsate în puncte 20 de minute), după aceasta se stimulează punctele P7 + F13 și în cele din urmă moxibustie timp de 10–20 minute în punctul F1 Dadun.

Modelul clinic 560

Hematuria

[Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor / Insuficiența Yin-Qi a Plămânilor și a Rinichilor]

Simptome

hematurie; dureri în regiunea lombară și în genunchi; senzație de căldură în "cinci inimi", transpirații nocturne; tuse seacă, gură și gât uscate; slăbirea memoriei, vertij, țiuț în urechi; urini hiper-crome. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – subțire și rapid.

Tratamentul

alimentarea Yin-Qi, armonizarea Plămânilor și a Rinichilor, reținerea sângelui în patul vascular:

- Shu – P9 Taiyuan, R2 Rangu, R3 Taixi;
- Shu-post. – V23 Shenshu, V28 Pangguangshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Xi – R5 Shuiquan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – V29 Zhonglushu, R6 Zhaohai, RP10 Xuehai.

Formula

R5 + P9.

XVIII.8. Menoragia. Metroragia

Modelul clinic 561

Menoragia. Metroragia

[Umiditate-Căldură în Uter]

Simptome

menoragie, metroragie (fără cheaguri); leucoree; senzație de greutate, distensie și arsură în abdomenul inferior; senzație de arsură la urinare, urină de culoare galbenă-închis. *Limba* – cu depozit gros, galben. *Pulsul* – alunecos.

Tratamentul

eliminarea Căldurii și a Umidității, reținerea sângelui în patul vascular:

- Shu – GI11 Quchi, RP1 Yinbai;
- Shu-post. – V22 Sanjiaoshu;
- Mu-ant. – VC3 Zhongji;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, RP4 Gongsun;
- Xi – RP8 Diji;
- & – RP10 Xuehai.

Formule

- VC6 + VC3 + R10 + RP6 + F3 + F11 + R2 (formula antică; punctarea în ordinea indicată; se stimulează ușor până la obținerea senzației de acupunctură, apoi acele sunt lăsate timp de 20-30

- minute);
- RP8 + VC3 + GI11.

Modelul clinic 562

Menoragia. Metroragia

[Căldura Xue]

Simptome

menoragie, sângerare înainte și după terminarea ciclului menstrual, menstrale în avans; senzație de căldură, fața roșie, gura uscată, sete; irascibilitate, neliniște; constipație. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – rapid, mare, dicrot.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, armonizarea Xue și reținerea sângelui în patul vascular:

- Shu – GI11 Quchi, RP1 Yinbai, F3 Taichong;
- Xi – RP8 Diji;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – RP10 Xuehai, VC2 Qugu.

Formule

- F2 + MC8 + R1 (dispersie) + F1 + MC9 (sângerare) + VG20 (armonizare; formula antică);
- VC3 + F1;
- VC3 + RP6 + RP10 + RP1 (moxibustie);
- F3 + R2;
- VC6 + F3 + RP1 (moxibustie);
- VC4 + R2 + R3;
- VC6 + F1 + R10 + F3 + R2 + RP6 + VC3.

Modelul clinic 563

Menoragia. Metroragia

[Stagnarea Xue]

Simptome

menstrale dureroase, sânge menstrual roșu-închis, cu cheaguri (după eliminarea acestor cheaguri durerile diminuează), menoragie, metroragie; dureri și senzație de distensie în abdomenul inferior. *Limba* – purpurie. *Pulsul* – profund și rugos.

Tratamentul

înlăturarea stagnării Qi și Xue, armonizarea Focarului Inferior și reținerea sângelui în patul vascular:

- Shu – TR6 Zhigou, F1 Dadun, F3 Taichong;
- Xi – RP8 Diji;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – E30 Qichong, RP10 Xuehai.

Formula

RP8 + F3 + TR6.

Modelul clinic 564

Menoragia. Mentrorația

[Dezarmonia Splină-Xue]

Simptome

menoragie, sângerare periodică (cronică) în afara perioadei normale a ciclului menstrual, sânge palid; față palidă, astenie, apatie; inapetență, scaune moi. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab sau timpanic.

Tratamentul

restabilirea funcției normale a Splinei și reținerea sângelui în patul vascular:

- Shu – E36 Zusanli;
- Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VG20 Baihui, VC6 Qihai.

Formule antice

- VC6 + E36 + RP1 (moxibustie 15 minute);
- VC4 + V20 + VG20 (moxibustie 10 minute).

Modelul clinic 565

Menoragia. Mentrorația

[Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor]

Simptome

menstre tardive, sângerare în afara perioadei normale a ciclului menstrual, sânge palid; extremități reci, edeme și dureri lombare și în articulațiile genunchilor; față palidă. *Limba* – palidă, tumefiată. *Pulsul* – profund.

Tratamentul

potențarea Yang-Qi a Rinichilor și reținerea sângelui în patul vascular:

- Shu – E36 Zusanli, R7 Fuliu;
- Shu-post. – V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – E30 Qichong, VC6 Qihai.

Formula antică

VC4 + E36 + RP6 + TR4 (tonifiere) + RP1 (moxibustie).

Modelul clinic 566

Menoragia. Mentrorația

[Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor]

Simptome

sângerare în afara perioadei normale a ciclului menstrual; dureri lombare și în articulațiile genunchilor, slăbiciune lombară; senza-

ție de căldură în "cinci inimi", transpirații nocturne, uscăciune în gură și gât, sete; Insomnie; tinitus, amețeli. *Limba* – roșie, uscată, fără depozit. *Pulsul* – subțire, timpanic sau dicrot.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi a Rinichilor și reținerea sângelui în patul vascular:

- Shu – E36 Zusanli, R2 Rangu, R3 Taixi;
- Shu-post. – V23 Shenshu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – RP10 Xuehai, VC6 Qihai.

Formule

- VC4 + RP6 + R10 + R2;
- R3 + VC4.

XVIII.9. Menstruația vicariantă

Modelul clinic 567

Menstruația vicariantă

[Căldură în Ficat]

Simptome

ciclu menstrual scurt, cu scurgeri minimale; epistaxis sau hematemeză apărute înainte sau în timpul menstruațiilor ("menstruație în sens invers"); senzație de căldură cu hiperemie a sclerelor și buze roșii, sete; gust amar; anxietate, agitație. *Limba* – roșie, cu depozit gălbui. *Pulsul* – întins și rapid.

Tratamentul

refrigerarea Ficatului, diminuarea Căldurii, reținerea sângelui în patul vascular:

- Shu – F2 Xingjian, GI2 Erjian, GI4 Hegu;
- & – VC6 Qihai, E29 Guilai, RP10 Xuehai.

Formula

F2 + RP10.

Modelul clinic 568

Menstruația vicariantă

[Insuficiența Yin-Qi / Căldura Xue]

Simptome

cicluri menstruale lungi sau scurte; epistaxis sau hematemeză apărute înainte sau după menstruație; senzație de căldură în "cinci inimi"; gură uscată, buze roșii; vertij, acufene; tuse seacă. *Limba* – cu depozit gălbui. *Pulsul* – filiform, rapid.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi, diminuarea Căldurii, reținerea sângelui în patul vascular;

- Shu – R2 Rangu, MC8 Laogong, GI11 Quchi, V40
Weizhong;
Shu-post. – V17 Geshu;
Xi – R5 Shuiquan.

Formula

R5 + GI11 + V40.

Modelul clinic 569

Menstruația vicariantă

[Uscăciune cu lezarea vaselor Plămânilor]

Simptome

ciclu menstrual scurt cu sânge puțin; epistaxis sau hematemă înainte de menstruație; buze și gură uscate, sete; vertij, acufene; tuse. *Limba* – cu depozit gălbui. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

umectarea Uscăciunii, diminuarea Căldurii, reținerea sângelui în patul vascular;

- Shu – P10 Yuji, P11 Shaoshang, GI11 Quchi, R3 Taixi, R7
Fuliu;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – V42 Pihu,

Formula

R7 + P10.

XVIII.10. Peteșiile cutaneo-mucoase

Modelul clinic 570

Peteșiile cutaneo-mucoase

[Căldura Xue]

Simptome

peteșii de culoare roșie-aprins, diferite hemoragii (epistaxis, hematurie etc.); febră, sete, gură uscată, buze roșii; anxietate. Acest sindrom se instalează pe fond de maladii febrile. *Limba* – roșie, fără depozit, cu puncte roșii. *Pulsul* – rapid, vast.

Tratamentul

diminuarea Căldurii și reținerea sângelui în patul vascular;

- Shu – GI11 Quchi, V40 Weizhong, R2 Rangu, F3
Taichong;
Shu-post. – V17 Geshu, V20 Pishu;
Lo – RP4 Gongsun, RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
Xi – IG6 Yanglao;

& – RP10 Xuehai.

Formula

GI11 + IG6 + RP10.

Modelul clinic 571

Peteșiile cutaneo-mucoase

[Stagnarea Xue]

Simptome

peteșii; durere și tumefiere localizată (delimitată fix); astenie, dispnee, hiperhidroză. *Limba* – purpurie cu puncte violete sau cianotice. *Pulsul* – rugos.

Tratamentul

întăritarea stagnării Qi și Xue, reținerea sângelui în patul vascular:

Shu – RP1 Yinbai, V40 Weizhong;

Shu-post. – V17 Geshu, V20 Pishu

Mu-ant. – F13 Zhangmen;

Lo – RP6 Sanyinjiao, P7 Lieque;

& – RP10 Xuehai.

Formula

V17 + RP10 + RP6.

Modelul clinic 572

Peteșiile cutaneo-mucoase

[Insuficiența Qi cu pierderea controlului asupra Xue]

Simptome

peteșii de culoare roză-palid; fața palidă; inapetență; vertij, astenie. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea Qi și reținerea sângelui în patul vascular:

Shu – P9 Taiyuan, E36 Zusanli;

Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu;

Mu-ant. – VC12 Zhongwan;

Lo – RP4 Gongsun, RP6 Sanyinjiao;

Xi – IG6 Yanglao;

& – RP10 Xuehai, VC6 Qihai.

Formule

– RP1 + RP6 + RP8 + RP10 + V20 + VC6 + VG20;

– V20 + IG6 + VC12 + RP10.

Modelul clinic 573

Peteșiile cutaneo-mucoase

[Insuficiența Yin-Qi]

Simptome

peteșii, diverse hemoragii; senzație de căldură în "cinci inimi", gură și gât uscate, transpirații nocturne. *Limba* – roșie, fără depozit.
Pulsul – filiform și rapid.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi și reținerea sângelui în patul vascular:

Shu – GI11 Quchi, R2 Rangu, R3 Taixi, F3 Taichong;
Shu-post. – V20 Pishu;
Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
Xi – IG6 Yanglao;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – RP10 Xuehai, R6 Zhaohai.

Formula

R3 + IG6 + RP10.

XIX

Acupunctura în pediatrie

- XIX.1. Malnutriția infantilă**
- XIX.2. Diareea infantilă**
- XIX.3. Ascaridoza**
- XIX.4. Enurezisul**
- XIX.5. Hiperchinezia infantilă**
- XIX.6. Convulsiile infantile**
- XIX.7. Boala ticurilor**
- XIX.8. Pavorul nocturn**
- XIX.9. Surdomutismul**
- XIX.10. Hernia inghinală**

XIX.1. Malnutriția infantilă

Modelul clinic 574

Malnutriția infantilă

[Insuficiența Qi a Stomacului și a Splinei]

Simptome

inapetență, abdomen balonat, scaune moi cu miros fetid; astenie; iritabilitate, plâns permanent; culoarea pământie a feței; semne de ptoză viscerală; piele uscată. *Limba* – palidă, cu depozit alb. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Qi și Xue a Splinei și Stomacului, ameliorarea digestiei:

Shu – E36 Zusanli, RP3 Taibai;
Shu-post. – V20 Pishu, V21 Weishu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan, F13 Zhangmen;
Lo – RP4 Gongsun, RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan;
& – VC10 Xiawan, Sifeng (Extra).

Formula

E36 + RP3 + Sifeng (sângerare).

XIX.2. Diareea infantilă

Modelul clinic 575

Diareea infantilă

[Umiditate-Căldură în Splină și Stomac]

Simptome

balonare abdominală, dureri în abdomen și epigastru, scaune moi, senzație de arsură în anus, grețuri, gust amar. *Limba* – roșie, cu depozit galben. *Pulsul* – alunecos, rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii, eliminarea Umidității și ameliorarea digestiei:

Shu – GI11 Quchi, E36 Zusanli, RP9 Yinlingquan;
Mu-ant. – E25 Tianshu, VC4 Guanyuan, VC12 Zhongwan;
& – E37 Shangjuxu, VC6 Qihai, VC11 Jianli.

Formula

GI11 + E25 + E37.

Modelul clinic 576

Diareea infantilă

[Insuficiența Qi a Splinei și a Stomacului]

Simptome

balonare abdominală, inapetență, scaune moi sau lichide; fatigabilitate; semne de ptoză viscerală. *Limba* – palidă, cu depozit alb. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Splinei și a Stomacului, ameliorarea digestiei:

Shu – E36 Zusanli;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan, E25 Tianshu;
& – VC6 Qihai.

Formula antică

VC12 + E25 + VC6 + E36 (acupunctura se efectuează în ordinea expusă, se stimulează fără a reține acele în țesuturi).

XIX.3. Ascaridoza

Modelul clinic 577

Crizele de ascaridoză

[Blocajul Qi al Ficatului și Veziculei Biliare cu acumularea Umidității în Intestine]

Simptome

inapetență, greață matinală, vomă, salivă abundentă, diaree sau constipație, dureri în abdomen și în hipocondrul drept; irascibilitate, somn agitat, scădere a memoriei, copiii sunt neatenți și absenți. Uneori apar manifestări alergice (exantem, prurit). *Limba* – palidă, cu depozit gros. *Pulsul* – subțire și încordat.

Tratamentul

Înlăturarea blocajului Qi, dispersarea Umidității și armonizarea organelor digestive:

Shu – E36 Zusanli, V67 Zhiyin, VB34 Yanglingquan;
Shu-post. – V19 Danshu, V18 Ganshu;
Mu-ant. – VC12 Zhongwan, F14 Qimen;
Lo – F5 Ligou, RP6 Sanyinjiao.

Formule

- Sifeng + MC6 + VC12 + E36 + VB34 + VG10 + V16;
- V67 + R7 + E25 + VC12;
- VB24 + F3 + VB34 + E36;
- V67 + R7 + VC14 + TR8;
- E36 + GI4 + RP15 + VC6 + VC12.

XIX.4. Enurezisul

Modelul clinic 578

Enurezisul

[Excesul Focului în Ficat]

Simptome

enurezis; coșmaruri, trezire repetată în cursul nopții, iritabilitate; sete, gust amar în gură, dureri sau disconfort în hipocondru. *Limba* – roșie, în special la margini, cu depozit galben. *Pulsul* – rapid și întins.

Tratamentul

diminuarea Focului în Ficat, armonizarea a Trei Focare:

- Shu – F2 Xingjian, C7 Shenmen;
- Shu-post. – V28 Pangguangshu;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – RP11 Jimen, F12 Jimaí.

Formula

F3 + VC4 + VC3 + RP6.

Modelul clinic 579

Enurezisul

[Insuficiența Qi a Plămânilor și a Splinei cu pierderea controlului asupra Lichidelor]

Simptome

enurezisul se manifestă mai des în urma unor maladii grave și cronice; scădere ponderală, scădere a apetitului; predispunere la răceală. *Limba* – palidă, cu depozit alb. În caz de predominare a Insuficienței Qi a Splinei, limba devine flască, pe marginile ei apar amprente dentare; în caz de predominare a Insuficienței Qi a Plămânilor limba devine flască și puțin tumefiată în partea anterioară. *Pulsul* – slab și subțire.

Tratamentul

fortificarea Qi a Plămânilor și a Splinei, restabilirea controlului asupra Lichidelor, armonizarea a Trei Focare:

- Shu – E36 Zusanli, C8 Shaofu;
- Shu-post. – V13 Feishu, V20 Pishu;
- Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
- Lo – RP6 Sanyinjiao;
- & – VC6 Qihai, VG14 Dazhui, VG20 Baihui, VC2 Qugu, RP11 Jimen.

Formule

- V20 + V13 + E36 + VC4 + VC3 + RP6;
- VC4 + VC3 + RP6 + V23 + V28 + P9 + E36;
- VC4 + E36 + P7 + RP9;
- VC4 + VG20;

- V62 Shenmai (tonifiere la copii cu somn adânc).

Modelul clinic 580

Enurezisul

[Insuficiența Qi a Rinichilor / Insuficiența Yang-Qi a Rinichilor]

Simptome

astenie, ten palid; extremități reci; senzație de greutate și dureri surde în regiunea lombară; senzații de micțiune frecvente noaptea, poluții; *Limba* – puțin tumefiată, palidă, umedă, cu depozit alb. *Pulsul* – slab și profund.

Tratamentul

fortificarea Rinichilor și armonizarea Focarului Inferior:

Shu – C8 Shaofu, R3 Taixi, R7 Fuli;
 Shu-post. – V23 Shenshu, V28 Pangguangshu;
 Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
 Xi – R5 Shuiquan;
 Lo – RP6 Sanyinjiao;
 & – V52 Zhishi, VG4 Mingmen, VC2 Qugu, VC6 Qihai, RP11 Jimen.

Formule antice

- VC4 + VG20 + RP6;
- V23 + VC4 + RP6; V28 + VC3 + F1. În punctele V23 Shenshu, V28 Pangguangshu, VC3 Zhongji și VC4 Guanyuan acele sunt extrase îndată după obținerea senzației de acupunctură; în punctele RP6 Sanyinjiao și F1 Dadun acele sunt lăsate timp de 5 minute. Formula pentru moxibustie (5–10 minute) – F1 + VC4;
- VG20 + GI4 + E36 + P7 + VC3 (în Insuficiența Qi a Rinichilor și Plămânilor);
- VC3 + R3 + V23.

Modelul clinic 581

Enurezisul

[Insuficiența Yin-Qi a Rinichilor]

Simptome

dureri în regiunea lombară și în articulațiile genunchilor; tinitus, vertij; gât uscat; căldură în "cinci inimi"; somn neliniștit; urini hiperchrome. *Limba* – roșie, fără depozit. *Pulsul* – rapid și subțire.

Tratamentul

fortificarea Yin-Qi, armonizarea a Trei Focare:

Shu – R3 Taixi;
 Shu-post. – V23 Shenshu, V28 Pangguangshu;
 Mu-ant. – VC4 Guanyuan, VC3 Zhongji;
 Lo – RP6 Sanyinjiao;
 & – RP11 Jimen.

Formula

R3 + VC3.

XIX.5. Hiperchinezia infantilă

Modelul clinic 582

Hiperchinezia infantilă

[Vânt al Ficatului / Yang-Qi se transformă în Vânt]

Simptome

hiperactivitate psihomotorie, copilul nu se poate concentra; gură uscată. *Limba* – roșie (mai pronunțat la margini și la vârf), tremurândă, cu depozit galben și uscat. *Pulsul* – întins și rapid.

Tratamentul

calmarea Ficatului, alimentarea Yin, diminuarea Vântului și armonizarea Shen:

- | | | |
|-----|---|---|
| Shu | – | GI11 Quchi, C7 Shenmen, F3 Taichong, F8 Ququan; |
| Lo | – | RP6 Sanyinjiao, MC6 Neiguan; |
| & | – | VB12 Wangu, VB20 Fengchi. |

Formula

F3 + VB20.

XIX.6. Convulsiile infantile

Modelul clinic 583

Convulsiile infantile

[Vânt-Căldură]

Simptome

pierdere a cunoștinței, rigiditate a cefei, convulsii, încheștare a fălcilor, opustotonus, spasme musculare ale membrelor; febră, sete; tuse; cefalee, iritabilitate. *Limba* – roșie. *Pulsul* – rapid.

Tratamentul

eliminarea Vântului și a Căldurii, restabilirea cunoștinței:

- | | | |
|-----|---|---|
| Shu | – | P11 Shaoshang, GI1 Shangyang, GI11 Quchi, C9 Shaochong, IG1 Shaoze, MC9 Zhongchong, TR1 Guanchong, F3 Taichong; |
| & | – | VG14 Dazhui, Yintang (Extra), Yaoqi* (Extra), R6 Zhaohai, V62 Shenmai. |

Formule

- VG14 + VG16 + VG20; VG1 + VG2 + VG4 (prima grupă de puncte se stimulează prin tonifiere, a doua – prin dispersie; formula antică);
- VG14 + GI4 + F3 + VB34 (dispersie fără reținerea acelor în țesuturi) + Jing-distale (sângerare); formula este indicată în convulsii hipertermice;

* Yaoqi – 2 cun mai sus de vârful cocisului.

- VG20 + VG26 + IG3 + R1 (stimulare până la restabilirea cunoștinței și oprirea convulsiilor);
- MC9 + VG14 + Yintang;
- VC15 + VG14 + Yaoqi + MC5 + E40;
- P11 + GI4.

Modelul clinic 584

Convulsiile infantile

[Flegmă-Căldură-Vânt]

Simptome

bolnavul nu-i cunoaște pe cei din jur, este dezorientat în spațiu, uneori accese de nebunie, neliniște, iritabilitate sau somnolență, convulsii; febră; anorexie, senzație de distenție sau durere în abdomen; tuse cu expectorație a sputei de culoare galbenă; urină galbenă. *Limba* – roșie, cu depozit galben, lipicios. *Pulsul* – rapid, alunecos.

Tratamentul

eliminarea Flegmei, Căldurii și a Vântului, restabilirea cunoștinței:

- Shu – GI4 Hegu, F3 Taichong;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
- Lo – E40 Fenglong;
- & – TR18 Qimai, VG26 Renzhong, Yintang (Extra).

Puncte indicate în status epilepticus:

- Shu – F3 Taichong, GI4 Hegu, R1 Yongquan, C7 Shenmen;
- Lo – RP6 Sanyinjiao, E40 Fenglong;
- & – VG26 Renzhong, VG20 Baihui, Shixuan (Extra), Yintang (Extra), VB20 Fengchi, Yaoqi (Extra), R6 Zhaohai, V62 Shenmai.

Formule

- F3 + MC6;
- VG26 + VC15 + VG14 + MC5 + F3 + E40 (formulă anticonvulsivă în caz de urgență);
- E40 + GI4 + MC7 + V15 + V18 + V20 + C7 (epilepsie cu predominarea depresiei psihice);
- E40 + GI4 + MC7 + VG26 + P11 + VG16 + GI11 (epilepsie cu predominarea excitației psihomotorii);
- R1 + F3 + punct empiric al epilepsiei (localizat la mijlocul distanței între RP3 Taibai și RP4 Gongsun);
- VC15 + VG14 + Yaoqi + MC5 + E40;
- VG26 + VG14 + GI4 + Shixuan + VB34 + F3 (convulsii infantile acute);
- VC12 + E40.

Modelul clinic 585

Convulsiile infantile

[Insuficiența constituțională a Energiei Vitale]

Simptome

convulsiile sau spasmele musculare apar după stresuri emoționale, spaimă, frică; insomnie, coșmaruri; membre reci. *Limba* – normală (uneori roșie la vârf sau la margini). *Pulsul* – rapid, superficial.

Tratamentul

fortificarea Energiei Vitale, armonizarea Qi și Xue, calmarea mentală:

Shu – R1 Yongquan, MC8 Laogong, F3 Taichong;
& – VG26 Renzhong, Yintang (Extra), Sishencong (Extra), Yaoqi (Extra), R6 Zhaohai, V62 Shenmai.

Formule

- V15 + Yintang + C7 + RP6 + R3 + Yaoqi (armonizare 15–30 minute); formula este indicată în perioada interconvulsivă. La această formulă se adaugă punctele R6 Zhaohai în caz de convulsii pe parcursul zilei sau punctul V62 Shenmai – pe parcursul nopții;
- C7 + F3 + R3 + Yintang + TR19;
- VC15 + VG14 + Yaoqi + MC5 + E40;
- VB13 + VG21 + VG22 + V10 (la copiii stresați și speriați).

Modelul clinic 586

Convulsiile infantile

[Insuficiența Yang-Qi a Splinei și a Rinichilor]

Simptome

convulsii intermitente; senzație de slăbiciune și greutate în regiunea lombară și membre; ten palid, facies tumefiat, membre reci; scădere ponderală; abdomen balonat, diaree cu alimente nedigerate, diaree matinală. *Limba* – palidă, tumefiată. *Pulsul* – profund și slab.

Tratamentul

fortificarea și armonizarea Splinei și Rinichilor, calmarea mentală:

Shu – E36 Zusanli;
Shu-post. – V20 Pishu, V23 Shenshu;
Mu-ant. – VC4 Guanyuan, VC12 Zhongwan;
Lo – RP6 Sanyinjiao;
& – VG20 Baihui, VG24 Shenting, Yaoqi (Extra), R6 Zhaohai, V62 Shenmai.

Formule

- VC4 + VG14;
- VC15 + VG14 + VG4 + Yaoqi + MC5 + E40;
- VG20 + VG1 (moxibustie, 6 ședințe la un curs de tratament).

Modelul clinic 587

Convulsiile infantile

[Insuficiența Xue]

Simptome

convulsii intermitente; astenie, piele și buze palide; cefalee, vertij; dereglări pronunțate ale somnului; parestezii ale membrelor, membre reci; palpitații. *Limba* – palidă și subțire. *Pulsul* – filiform și slab.

Tratamentul

alimentarea Xue, armonizarea Qi și Xue, calmarea mentală:

Shu – E36 Zusanli, R2 Rangu, F3 Taichong;

Shu-post. – V15 Xinshu, V20 Pishu;

Lo – RP6 Sanyinjiao;

& – RP10 Xuehai, VG20 Baihui, VG24 Shenting, Yaoqi (Extra), R6 Zhaohai, V62 Shenmai.

Formule

– VC15 + VG14 + Yaoqi + MC5 + E40 + V20;

– E36 + RP6 + VG24.

XIX.7. Boala ticurilor

Modelul clinic 588

Ticurile ochilor

[Vânt Intern]

Simptome

mișcări involuntare în regiunea ochilor, care periodic pot fi controlate.

Tratamentul

diminuarea Vântului Intern și armonizarea proceselor psihice:

Shu – C7 Shenmen, E36 Zusanli, F2 Xingjian, TR6 Zhigou;

Lo – MC6 Neiguan;

& – V62 Shenmen, R6 Zhaohai, VB14 Yangbai, VB20 Fengchi, V2 Zanzhu, E1 Chengqi, Yintang (Extra), Taiyang (Extra), Yuyao (Extra), IG19 Tinggong, E5 Daying, E22 Guanmen.

Formula

VB20 + VB14 + Taiyang + C7.

Modelul clinic 589

Ticurile feței

[Vânt Intern]

Simptome

mișcări involuntare în regiunea feței, care periodic pot fi contro-

late.

Tratamentul

diminuarea Vântului Intern și armonizarea proceselor psihice:

- Shu – C7 Shenmen, E36 Zusanli, E45 Lidui, V60 Kunlun, GI11 Quchi;
Lo – MC6 Neiguan;
& – E4 Dicang, TR17 Yifeng, IG18 Quanliao, VB20 Fengchi, GI10 Shousanli.

Formula

VB20 + TR17 + Taiyang + C7.

XIX.8. Pavorul nocturn

Modelul clinic 590

Pavorul nocturn

[Tulburarea spiritului de spaimă / Hiperactivitatea Focului Inimii / Căldură-Exces]

Simptome

În cursul zilei copiii sunt liniștiți, normali, pe când în timpul somnului sunt neliniștiți, strigă, terori nocturne; hiperhidroză; membrele și abdomenul sunt calde, respirație caldă; constipație; urină galbenă; pe pielea indexului se observă venule de culoare deschisă. *Limba* – roșie la vârf. *Pulsul* – agitat.

Tratamentul

diminuarea Focului, calmarea și armonizarea proceselor psihice:

- Shu – C7 Shenmen, P11 Shaoshang, GI11 Quchi, V40 Weizhong, IG3 Houxi, MC5 Jianshi, RP1 Yinbai, E44 Neiting;
Lo – MC6 Neiguan;
& – Yintang (Extra), VG14 Dazhui.

Formule

- C7 + V15 + MC8 + E36 + C6 (formulă cu efect de diminuare a Focului și armonizare a Inimii);
- Yintang + C7.

Modelul clinic 591

Pavorul nocturn

[Insuficiența Yang-Qi a Splinei]

Simptome

copiii sunt liniștiți în cursul zilei și neliniștiți în timpul somnului, terori nocturne; pielea palidă; membrele și abdomenul sunt reci; respirație rece; apetit scăzut, grețuri, distensie abdominală, scaune moi sau diaree; pe pielea indexului se identifică venule de culoare închisă. *Limba* – palidă. *Pulsul* – slab.

Tratamentul

fortificarea și încălzirea Yang-Qi a Splinei, armonizarea proceselor psihice:

- Shu – E36 Zusanli;
- Mu-ant. – VC12 Zhongwan;
- Lo – MC6 Neiguan;
- & – VG22 Xinhui (moxibustie 10–15 minute; la copii mici înțeparea acestui punct este periculoasă din cauza închiderii incomplete a fontanelei).

Formule

- V18 + VG4 (moxibustie);
- RP4 + MC6 + VC24 + Yintang;
- MC6 + E36 + VC12.

XIX.9. Surdomutismul

Modelul clinic 592

Surdomutismul

[Surdomutismul congenital / Stagnarea Qi și Xue / Umiditate / Căldură toxică]

Simptome

surdomutism (apărut după naștere sau după boli febrile), meningite, encefalite, intoxicație cu streptomycină sau alte substanțe ototoxice. Membrana timpanică la examinare este normală. Limba și pulsul sunt normale sau se schimbă în corespundere cu etiopatogeneza maladiei.

Tratamentul

deschiderea orificiilor, armonizarea circulației Qi și Xue în meridiene, înlăturarea factorilor patogeni.

Surditate:

- Shu – TR3 Zhongzhu;
- Lo – TR5 Waiguan;
- & – TR21 Ermen, IG19 Tinggong, VB2 Tinghui, TR17 Yifeng, VB20 Fengchi.

Formule

- TR5 + TR21;
- VB40 + F3 + VB2;
- IG19 + TR17 + TR3.

Mutism:

- Shu – GI4 Hegu;
- Lo – C5 Tongli;
- & – VG15 Yamen, VC23 Lianquan.

Formula

C5 + VC23.

XIX.10. Hernia inghinală

Modelul clinic 593

Hernia inghinală

[Afectarea circulației normale a Qi în urma suprasolicitării fizice / Prăbușirea în scrot a Qi-ului Intestin Subțire]

Simptome

hernie inghinală (apărută după suprasolicitare fizică – ridicare de greutate, oboseală etc.); durere cu senzație de distensie în abdomenul inferior cu iradierea în testicule (când pacientul stă în picioare, conținutul scrotului se mărește și durerile se intensifică); inapetență, scaune moi; hiperhidroză spontană; respirație scurtă. *Limba* – cu depozit alb-suriu. *Pulsul* – profund și lent.

Tratamentul

fortificarea și ascendența Qi-ului, diminuarea durerii:

Shu – F3 Taichong;
Mu-ant. – VC4 Guanyuan;
& – E29 Guilai, VC8 Shenque (moxibustie prin sare),
Sanjiaojiu (Extra).

Formule

- F1 + Sanjiaojiu (moxibustia, câte 5–7 minute, este efectivă pentru profilaxia recidivelor, formula antică);
- VC1 + E30.

Modelul clinic 594

Hernia inghinală

[Căldură-Umiditate în Focarul Inferior / Căldură-Umiditate în Ficat și Splină / Stagnarea Qi și Xue în meridianul Ficat și Ren Mai]

Simptome

hernie inghinală, durere sau edeme în regiunea testiculelor și scrotului, hiperemie și senzație de arsură în scrot, durere în abdomenul inferior cu senzație de apăsare în jos și greutate (agravare la presare); posibil febră cu aversiune față de frig; cefalee. *Limba* – cu depozit gros și galben sau suriu. *Pulsul* – moale și rapid.

Tratamentul

diminuarea Căldurii-Umidității, armonizarea circulației Qi și Xue în meridiane și colaterale, diminuarea durerii și a edemului:

Shu – F1 Dadun, RP9 Yinlingquan;
& – E30 Qichong, VC3 Zhongji, R6 Zhaohai.

* Sanjiaojiu – 2 puncte localizate din ambele părți ale liniei mediane a abdomenului, formând cu ombilicul un triunghi cu laturile egale (lungimea fiecărei laturi este egală cu distanța dintre colțurile gurilor).

Formule

- F3 + F8 + VC4;
- F3 + E29.

Modelul clinic 595

Hernia inghinală

[Stagnarea Qi și Xue în meridianul Ficat și Ren Mai / Frig-Umiditate]

Simptome

hernie inghinală, durere în abdomenul inferior și testicule cu iradierea în cutia toracică și hipocondru, senzație de rece în scrot; extremități reci; piele palidă. *Limba* – palidă, cu depozit alb. *Pulsul* – întins sau adânc.

Tratamentul

Încălzirea organismului, dispersia Frigului și a Umidității, armonizarea circulației Qi și Xue în meridiane și colaterale, diminuarea durerii:

- Shu - E36 Zusanli, F1 Dadun (moxibustie), F3 Taichong;
- Shu-post. - V18 Ganshu;
- Mu-ant. - F14 Qimen;
- & - E33 Yinshi, VC6 Qihai, VC2 Qugu, VC8 Shenque (moxibustie prin sare).

Formule antice

- RP6 (contralateral, moxibustie) + E29 (ipsilateral, moxibustie);
- R6 + VC7 + F8.

XX

Cronoacupunctura

- XX.1. Ritmicitatea diurnă a organelor și meridianelor**
- XX.2. Metoda Zi Wu Liu Zhu**
- XX.3. Metoda Ling Kwei Liao Fa**
- XX.4. Metoda "balanței spațiale complexe"**

XX.1. Ritmicitatea diurnă a organelor și meridianelor

Tratamentul acupunctiv efectiv presupune nu numai folosirea punctelor concrete, a metodelor de stimulare, dar și efectuarea tratamentului în anumite perioade ale zilei, săptămânii sau anotimpului. Este necesar de a evidenția starea organismului și a organelor în fiecare moment, pentru a realiza un tratament efectiv individual. Organismul uman plutește ca un pește în "oceanul energetic", el este supus influenței multor factori ritmici: zi-noapte, cald-frig, întuneric-lumină etc. Multe din aceste influențe nu sunt percepute de organism, acționând la nivel sub pragul de percepție. La rândul lor, influențele externe induc în organism o serie de schimbări ritmice. În afară de aceasta, organismul posedă o bioritmicitate endogenă, care este indusă și controlată de Energia Ancestrală. O activitate ritmică bine definită este caracteristică și pentru sistemul bioenergetic al meridianelor și acupunctelor. Conform concepției tradiționale, în anumite perioade ale zilei unele puncte de acupunctură sunt "deschise", altele "închise". Aceste proprietăți ale acupunctelor (și în special a punctelor antice) pulsează într-un anumit ritm, în funcție de particularitățile geografice, timp (an, anotimp, lună, zi, oră). Cronoacupunctura este o ramură a acupuncturii tradiționale, care studiază ritmicitatea organismului și a fenomenelor înconjurătoare și în funcție de aceasta, folosind calendarul tradițional, stabilește punctele și metodele necesare pentru un tratament efectiv. La momentul actual se cunosc mai mult de 300 procese fiziologice în organism, care sunt supuse schimbărilor ritmice. Însă, cu toate acestea, numai unele din ele sunt folosite în medicina practică pentru tratamentul și profilaxia bolilor. În acest aspect medicina tradițională a acumulat o experiență practică milenară, formulând postulatele de bază ale ritmicității proceselor în organism și în afara lui încă în sec. IV—III î.e.n. Cronobiologia modernă confirmă multe din fenomenele descrise de medicina chineză cu privire la ritmicitatea și unitatea organismului și naturii.

În acupunctura practică este răspândită concepția ritmicității diurne a organelor și meridianelor. Cunoașterea acestei concepții dă posibilitatea de a realiza un diagnostic și tratament efectiv. În acest scop se folosesc punctele de tonifiere, dispersie și Yuan (tab. 39).

Un efect sedativ mai pronunțat în meridian se poate obține în perioada activă, un efect de tonifiere mai pronunțat se obține în perioada de reflux energetic (această perioadă durează 2 ore, îndată după perioada de activitate maximă) sau în perioada pasivă. Cunoașterea ritmicității organelor și meridianelor permite realizarea efectivă a profilaxiei acutizării bolii. Începutul perioadei de activitate maximă se poate calcula după formula: $t_{\max} = (n \cdot 2) + 1$, unde "n" este numărul de ordine al meridianului conform marii circulații energetice.

De exemplu, pentru Intestinul Gros începutul perioadei de activitate maximă este ora 5 [$t_{\max} = (2 \cdot 2) + 1 = 5$]. Ritmicitatea diurnă, descrisă în operele antice, coincide cu datele moderne, obținute prin metode clinice, fiziologice, biochimice etc. Este cunoscut faptul că accesele astmului bronșic sunt mult mai frecvente în orele de dimineață; acutizarea (accesele) maladiilor renale este mai frecventă seara (orele 17–20); acutizarea maladiilor hepato-biliare este mai frecventă între orele 23–3 etc. Aceste date, obținute pe un lot foarte mare de pacienți, coincid cu perioadele de activitate a organelor corespunzătoare descrise în operele antice. Ritmicitatea diurnă este folosită pentru a obține efecte terapeutice mai pronunțate sub acțiunea remediilor farmacologice (cronofarmacologia).

Tabelul 39.

Aplicarea punctelor de dispersie, tonifiere și Yuan
în acord cu ritmicitatea diurnă a meridianelor

Meridiane	Perioada activă		Perioada de reflux		Perioada pasivă		Puncte Yuan
	Ora	Puncte de dis- persie	Ora	Puncte de tonifiere	Ora	Puncte de tonifiere	
Plămân	3 – 5	P5	5 – 7	P9	15 – 17	P9	P9
Intestin Gros	5 – 7	GI2	7 – 9	GI11	17 – 19	GI11	GI4
Stomac	7 – 9	E45	9 – 11	E41	19 – 21	E41	E42
Splină- Pancreas	9 – 11	RP5	11 – 13	RP2	21 – 23	RP2	RP3
Inimă	11 – 13	C7	13 – 15	C9	23 – 1	C9	C7
Intestin Subțire	13 – 15	IG8	15 – 17	IG3	1 – 3	IG3	IG4
Vezică	15 – 17	V65	17 – 19	V67	3 – 5	V67	V64
Rinichi	17 – 19	R1, R2	19 – 21	R7	5 – 7	R7	R3
Pericard	19 – 21	MC7	21 – 23	MC9	7 – 9	MC9	MC7
Trei Focare	21 – 23	TR10	23 – 1	TR3	9 – 11	TR3	TR4
Veziculă Biliară	23 – 1	VB38	1 – 3	VB43	11 – 13	VB43	VB40
Ficat	1 – 3	F2	3 – 5	F8	13 – 15	F8	F3

Ritmicitatea diurnă se bazează pe divizarea zilei și nopții în intervale a câte 2 ore fiecare (Td. – *Time divison*). Schematic răsăritul soarelui are loc la ora 6, miezul zilei – ora 12, asfințitul soarelui – ora 18 și miezul nopții – ora 24. În realitate, însă, aceste intervale se schimbă în funcție de zona geografică și anotimpul anului. Cea mai mare deviere de la orele medii (schematice) are loc în perioada de vară și iarnă. Pentru a folosi efectiv ritmicitatea diurnă a meridianelor și organelor este necesar de a calcula precis activitatea lor în

dependență de situația concretă. Acest calcul poate fi efectuat în baza a doi parametri de bază – timpul apusului și răsăritului de soare, care, evident, se schimbă în diferite regiuni geografice și anotimpuri (tab.40).

Tabelul 40.

*Determinarea începutului (ora) perioadei de activitate maximă (P.A.M.) a meridianelor **

Coeficientul	Meridianul	Formula (începutul P.A.M.)	Exemplu de calcul ($t_{as} = 7,59$; $t_{ap} = 16,04$)	
			Coeficientul	Începutul (ora) P.A.M.
$A = \frac{M.N. - t_{ap}}{6}$	MC	$t_{ap} + A$	$A = \frac{24 - 16,04}{6} = 1,26$	$16,04 + 1,26 = 17,30$
	TR	$t_{ap} + 3 \cdot A$		$16,04 + (3 \cdot 1,26) = 20,22$
	VB	$M.N. - A$		$24 - 1,26 = 22,34$
$B = \frac{t_{as}}{6}$	F	B	$B = \frac{7,59}{6} = 1,26$	1,26
	P	$B \cdot 3$		$3 \cdot 1,26 = 4,12$
	GI	$t_{as} - B$		$7,59 - 1,26 = 6,33$
$C = \frac{M.Z. - t_{as}}{6}$	E	$t_{as} + C$	$C = \frac{12 - 7,59}{6} = 0,66$	$7,59 + 0,66 = 8,25$
	RP	$t_{as} + 3 \cdot C$		$7,59 + (3 \cdot 0,66) = 9,57$
	C	$M.Z. - C$		$12 - 0,66 = 11,54$
$D = \frac{t_{ap} - M.Z.}{6}$	R	$t_{ap} - D$	$D = \frac{16,04 - 12}{6} = 0,67$	$16,04 - 0,67 = 15,37$
	IG	$M.Z. + D$		$12 + 0,67 = 13,07$
	V	$M.Z. + 3 \cdot D$		$12 + (3 \cdot 0,67) = 14,01$

Notă: M.N. – miezul nopții; M.Z. – miezul zilei; * calcul conform orei când apune (t_{ap}) și răsare (t_{as}) soarele.

XX.2. Metoda Zi Wu Liu Zhu

Omul este creat (reprodus) în rezultatul interacțiunii Energiilor (Qi) Cosmosului și a Pământului. Toate procesele din organism sunt influențate de aceste Energii. Omul și natura formează un tot întreg. Reieșind din această premisă, teoria cronobiologică tradițională a elaborat anumite metode și procedee, care permit optimizarea procesului de diagnosticare, profilaxie și tratament. Una din metodele cele mai răspândite este Zi Wu Liu Zhu, care după sensul ei poate fi numită "circulația Energiei în 12 meridiane principale de la mijlocul zilei până la miezul nopții".

Conform cronobiologiei tradiționale ziua este împărțită în 12 intervale, a câte 2 ore fiecare. Primul interval (Zi) corespunde orelor 23–1, al șaptelea interval (Wu) corespunde orelor 11–13. Aceste intervale sunt liniile de demarcație ale Energiei Yin și Yang. În intervalul Zi Yin-ul atinge perioada de dezvoltare maximă, pe când Yang-ul abia începe să crească (intensitatea luminii treptat crește, se mărește

temperatura aerului etc.). În intervalul Wu Yang-ul atinge o dezvoltare maximă, pe când Yin-ul începe să se mărească. Când 12 semne ciclice se referă la lunile anului, primul interval (Zi) corespunde cu luna a XI-a a calendarului lunar, intervalul al șaptelea (Wu) corespunde cu luna a V-a. Wu corespunde solstițiului de vară, pe când Zi corespunde solstițiului de iarnă. Toate schimbările în organism sunt în strânsă legătură cu schimbările ciclice observate în natura înconjurătoare. Releșind din cele expuse, este clar de ce ieroglifele Zi și Wu, fiind puncte de reper importante în schimbările ritmice energetice, sunt incluse în denumirea metodei (Zi Wu Liu Zhu). Ierogliful Liu poate fi interpretat ca "curgere" sau "circulație", ierogliful Zhu ca "reunire". În sens mai larg noțiunea de Zi Wu Liu Zhu înseamnă schimbările nu numai în perioada de 24 ore, dar și transformările în spațiu și timp care au loc în diferite perioade (lună, anotimp, ani sau cicluri de 12 și 60 ani).

Metoda Zi Wu Liu Zhu se bazează pe concepțiile filosofice și astronomice tradiționale. În astronomie există noțiunile de 10 Trunchiuri Celeste și 12 Ramuri Terestre. Aceste semne ciclice permit crearea unui model matematic al transformărilor ciclice legate de mișcarea lunii și a soarelui.

Trunchiurile Celeste reflectă procesele ciclice ale "cerului". Ele sunt grupate, ca și alte fenomene, conform teoriei Yin-Yang, celor 5 elemente etc. (tab. 41).

Tabelul 41.

Corespondența dintre cele 10 Trunchiuri Celeste, 5 elemente, meridiane și Energia Yang-Yin

Element	Lemn		Foc		Pământ		Metal		Apă	
Trunchi Celest	Jia S _I	Yi S _{II}	Bing S _{III}	Ding S _{IV}	Wu S _V	Ji S _{VI}	Geng S _{VII}	Xin S _{VIII}	Ren S _{IX}	Gui S _X
Organ Meridian	VB	F	IG	C	E	RP	GI	P	V, TR	R, MC
Yin-Yang	Yang	Yin	Yang	Yin	Yang	Yin	Yang	Yin	Yang	Yin

Altă noțiune astronomică care stă la baza metodei este noțiunea de Ramuri Terestre. În tab. 42 este redată corespondența dintre cele 12 Ramuri Terestre, 5 elemente, meridiane (organe) și perioadele de timp. După cum se vede din tab. 41 și 42, meridianele TR și MC sunt incluse la rubrica Apă (conform clasificării tradiționale ele se referă la elementul Foc). În literatura tradițională acest fapt este explicat ca fiind util din punct de vedere practic.

În calendarul tradițional chinez Trunchiurile Celeste și Ramurile Terestre sunt folosite pentru denumirea anului, lunii, zilei sau a orei (primul este indicat semnul ciclic al Trunchiului Celest, al doilea – al Ramurii Terestre).

Tabelul 42.

Correspondența dintre cele 12 Ramuri Terestre, 5 elemente, meridiane și perioadele de timp

Elemente	Meridiane (organe)	Ramuri Terestre	Ore	Calendar lunar	
				grigorian	tradițional
Lemn	Veziculă Biliară Ficat	B ₁ Zi	23 – 1	ianuarie	XI
		B ₂ Chou	1 – 3	februarie	XII
Metal	Plămâni Intestin Gros	B ₃ Yin	3 – 5	martie	I
		B ₄ Mao	5 – 7	aprilie	II
Pământ	Stomac Splină-Pancreas	B ₅ Chen	7 – 9	mai	III
		B ₆ Si	9 – 11	iunie	IV
Foc	Inimă Intestin Subțire	B ₇ Wu	11 – 13	iulie	V
		B ₈ Wei	13 – 15	august	VI
Apă	Vezică Rinichi	B ₉ Shen	15 – 17	septembrie	VII
		B ₁₀ You	17 – 19	octombrie	VIII
Apă	Pericard Trei Focare	B ₁₁ Xu	19 – 21	noiembrie	IX
		B ₁₂ Xai	21 – 23	decembrie	X

Tabelul 43.

Tabelul semnelor ciclice (ciclul de 60 ani)

RT \ TC*	S _I Jia	S _{II} Yi	S _{III} Bing	S _{IV} Ding	S _V Wu	S _{VI} Ji	S _{VII} Geng	S _{VIII} Xin	S _{IX} Ren	S _X Gui
B ₁ Zi (23 – 1)	1		13		25		37		49	
B ₂ Chou (1 – 3)		2		14		26		38		50
B ₃ Yin (3 – 5)	51		3		15		27		39	
B ₄ Mao (5 – 7)		52		4		16		28		40
B ₅ Chen (7 – 9)	41		53		5		17		29	
B ₆ Si (9 – 11)		42		54		6		18		30
B ₇ Wu (11 – 13)	31		43		55		7		19	
B ₈ Wei (13 – 15)		32		44		56		8		20
B ₉ Shen (15 – 17)	21		33		45		57		9	
B ₁₀ You (17 – 19)		22		34		46		58		10
B ₁₁ Xu (19 – 21)	11		23		35		47		59	
B ₁₂ Xai (21 – 23)		12		24		36		48		60

* TC – Trunchiuri Celeste; RT – Ramuri Terestre

Tabelul 44.

Formarea SB al anului conform ciclului de 60 ani

S ₁ B ₁	S ₂ B ₂	S ₃ B ₃	S ₄ B ₄	S ₅ B ₅	S ₆ B ₆	S ₇ B ₇	S ₈ B ₈	S ₉ B ₉	S ₁₀ B ₁₀
S ₁ B ₁₁	S ₂ B ₁₂	S ₃ B ₁	S ₄ B ₂	S ₅ B ₃	S ₆ B ₄	S ₇ B ₅	S ₈ B ₆	S ₉ B ₇	S ₁₀ B ₈
S ₁ B ₉	S ₂ B ₁₀	S ₃ B ₁₁	S ₄ B ₁₂	S ₅ B ₁	S ₆ B ₂	S ₇ B ₃	S ₈ B ₄	S ₉ B ₅	S ₁₀ B ₆
S ₁ B ₇	S ₂ B ₈	S ₃ B ₉	S ₄ B ₁₀	S ₅ B ₁₁	S ₆ B ₁₂	S ₇ B ₁	S ₈ B ₂	S ₉ B ₃	S ₁₀ B ₄
S ₁ B ₅	S ₂ B ₆	S ₃ B ₇	S ₄ B ₈	S ₅ B ₉	S ₆ B ₁₀	S ₇ B ₁₁	S ₈ B ₁₂	S ₉ B ₁	S ₁₀ B ₂
S ₁ B ₃	S ₂ B ₄	S ₃ B ₅	S ₄ B ₆	S ₅ B ₇	S ₆ B ₈	S ₇ B ₉	S ₈ B ₁₀	S ₉ B ₁₁	S ₁₀ B ₁₂

În scopul aplicării metodei Zi Wu Liu Zhu este necesar de a efectua calcule speciale, conform calendarului tradițional chinez, cu scopul de a aprecia apartenența anului, lunii, zilei și a orelor zilei. Pentru a determina anul după calendarul astronomic chinez, se adaugă la anul calendaristic grigorian cifra 2397, apoi suma se împarte la 60. Restul de la rezultatul obținut indică numărul anului conform ciclului de 60 ani, care poate fi determinat, folosind *tab. 43*. De exemplu, calculul pentru anul 1990: $1990 + 2397 = 4387 : 60 = 73$ și 7 în rest. Cifra 7, conform *tab. 43*, indică pe verticală Trunchiul Celest VII (Geng) și pe orizontală Ramura Terestră 7 (Wu). Deci anul 1990 aparține semnelor ciclice VII/7. ($S_{VII} B_7$). O metodă simplă de determinare SB a anului este redată în *tab. 44*. Conform acestui tabel, știind corespondențele anilor (de exemplu, 1930, 1990 – $S_{VII} B_7$; 1940, 2000 – $S_{VII} B_8$; 1950, 2010 – $S_{VII} B_9$; 1960, 2020 – $S_{VII} B_1$; 1970, 2030 – $S_{VII} B_{11}$; 1980, 2040 – $S_{VII} B_2$ etc.), ușor se poate deduce SB al fiecărui an necesar.

Este important de a nu confunda binomul anului și binomul pentru prima zi a anului nou. Conform calculelor efectuate la Institutul de Medicină Tradițională (Shanghai), semnele ciclice (SB) pentru 1 ianuarie sunt următoarele:

1997 – $S_X B_4$	2003 – $S_I B_{11}$
1998 – $S_V B_9$	Anii bisecți:
1999 – $S_X B_2$	1996 – $S_{IV} B_{10}$
2001 – $S_I B_1$	2000 – $S_V B_7$
2002 – $S_{VI} B_6$	2004 – $S_{VI} B_4$

Calculul zilei și lunii conform calendarului tradițional se bazează pe ciclul de 10 zile, în care semnele ciclice ale Trunchiurilor Celeste se repetă în fiecare 10 zile. De exemplu, semnul ciclic al primei zile este Jia (I), acest semn fiind caracteristic și pentru zilele 11, 21, 31. Al doilea semn ciclic este Yi (II), deci zilele 12, 22 ale lunii se referă la același semn Yi etc. Această legitate stă la bază formulei pentru calculul semnului ciclic al lunii și zilei necesare:

$$S = SA + N \pm R + 1B,$$

unde S este semnul ciclic al Trunchiului Celest pentru ziua căutată; SA – semnul ciclic al Trunchiului Celest pentru prima zi a primei luni a anului nou; N – numărul de zile în corespundere cu ziua (data) căutată; R – rectificarea lunară. Această rectificare este diferită în funcție de an. Pentru anul simplu: lunile 1, 4, 5 – se scade 1; luna a 3-a – se scade 2; lunile 2, 6, 7 – rectificarea nu se face; luna a 8 – se adaugă 1; lunile 9, 10 – se adaugă 2; lunile 11, 12 – se adaugă 3. Pentru anul bisect se adaugă 1(+1B) pentru fiecare lună, începând cu luna a 3-a. În cazul când suma cifrelor este mai mare decât 10, ea se împarte la 10, restul obținut indică semnul ciclic al Trunchiului Celest căutat.

De exemplu, este necesar de a determina semnul ciclic pentru 2 ianuarie 1990. Prima zi a primei luni a anului 1990 aparține semnului

Bing (S_{III}). Reieșind din aceasta, pentru calcul se va folosi cifra 3. Conform formulei ($3 + 2 - 1 = 4$), 2 Ianuarie 1990 se referă la semnul ciclic Ding (S_{IV}). O metodă simplă de determinare a semnelor ciclice (SB) ale zilelor este folosirea calendarului anual permanent.

Conform acestui calendar, cifra romană indicată mai sus de numărul zilei se folosește pentru determinarea S, cifra arabă situată mai jos de numărul zilei se folosește pentru aprecierea B. Binomul SB pentru ziua necesară se determină în felul următor. La început se găsește data (ziua) în care se efectuează tratamentul. Apoi, cifra ce corespunde cu S se sumează cu cifra S a primei zile a anului curent. Dacă suma obținută este mai mare de 10, ea se împarte la 10. Restul obținut corespunde cu S căutat. Cifra ce corespunde cu B se sumează cu cifra B a primei zile a anului curent. Dacă suma obținută depășește cifra 12, ea se împarte la 12. Restul obținut indică numărul semnelui ciclic B. În anii bisecți la rezultatul obținut se adaugă cifra 1 atât pentru S, cât și pentru B.

Calendarul anual permanent pentru calcularea semnelor ciclice (SB) ale zilei

Ianuarie

1 0	2 1	3 2	4 3	5 4	6 5	7 6	8 7
9 VIII	10 IX	11 X	12 I	13 II	14 III	15 IV	16 V
17 VI	18 VII	19 VIII	20 IX	21 X	22 I	23 II	24 III
25 IV	26 V	27 VI	28 VII	29 VIII	30 IX	31 X	
12	1	2	3	4	5	6	

Februarie

1 I	2 II	3 III	4 IV	5 V	6 VI	7 VII	8 VIII
9 IX	10 X	11 I	12 II	13 III	14 IV	15 V	16 VI
17 VII	18 VIII	19 IX	20 X	21 I	22 II	23 III	24 IV
25 V	26 VI	27 VII	28 VIII				
7	8	9	10				

Martie

1 IX	2 X	3 I	4 II	5 III	6 IV	7 V	8 VI
9 VII	10 VIII	11 IX	12 X	13 I	14 II	15 III	16 IV
17 V	18 VI	19 VII	20 VIII	21 IX	22 X	23 I	24 II
25 III	26 IV	27 V	28 VI	29 VII	30 VIII	31 IX	
11	12	1	2	3	4	5	

Aprilie

1 X 6	2 I 7	3 II 8	4 III 9	5 IV 10	6 V 11	7 VI 12	8 VII 1
9 VIII 2	10 IX 3	11 X 4	12 I 5	13 II 6	14 III 7	15 IV 8	16 V 9
17 VI 10	18 VII 11	19 VIII 12	20 IX 1	21 X 2	22 I 3	23 II 4	24 III 5
25 IV 6	26 V 7	27 VI 8	28 VII 9	29 VIII 10	30 IX 11		

Mai

1 X 12	2 I 1	3 II 2	4 III 3	5 IV 4	6 V 5	7 VI 6	8 VII 7
9 VIII 8	10 IX 9	11 X 10	12 I 11	13 II 12	14 III 1	15 IV 2	16 V 3
17 VI 4	18 VII 5	19 VIII 6	20 IX 7	21 X 8	22 I 9	23 II 10	24 III 11
25 IV 12	26 V 1	27 VI 2	28 VII 3	29 VIII 4	30 IX 5	31 X 6	

Iunie

1 I 7	2 II 8	3 III 9	4 IV 10	5 V 11	6 VI 12	7 VII 1	8 VIII 2
9 IX 3	10 X 4	11 I 5	12 II 6	13 III 7	14 IV 8	15 V 9	16 VI 10
17 VII 11	18 VIII 12	19 IX 1	20 X 2	21 I 3	22 II 4	23 III 5	24 IV 6
25 V 7	26 VI 8	27 VII 9	28 VIII 10	29 IX 11	30 X 12		

Iulie

1 I 1	2 II 2	3 III 3	4 IV 4	5 V 5	6 VI 6	7 VII 7	8 VIII 8
9 IX 9	10 X 10	11 I 11	12 II 12	13 III 1	14 IV 2	15 V 3	16 VI 4
17 VII 5	18 VIII 6	19 IX 7	20 X 8	21 I 9	22 II 10	23 III 11	24 IV 12
25 V 1	26 VI 2	27 VII 3	28 VIII 4	29 IX 5	30 X 6	31 I 7	

August

1 II 8	2 III 9	3 IV 10	4 V 11	5 VI 12	6 VII 1	7 VIII 2	8 IX 3
9 X 4	10 I 5	11 II 6	12 III 7	13 IV 8	14 V 9	15 VI 10	16 VII 11
17 VIII 12	18 IX 1	19 X 2	20 I 3	21 II 4	22 III 5	23 IV 6	24 V 7
25 VI 8	26 VII 9	27 VIII 10	28 IX 11	29 X 12	30 I 1	31 II 2	

Septembrie

1 III 3	2 IV 4	3 V 5	4 VI 6	5 VII 7	6 VIII 8	7 IX 9	8 X 10
9 I 11	10 II 12	11 III 1	12 IV 2	13 V 3	14 VI 4	15 VII 5	16 VIII 6
17 IX 7	18 X 8	19 I 9	20 II 10	21 III 11	22 IV 12	23 V 1	24 VI 2
25 VII 3	26 VIII 4	27 IX 5	28 X 6	29 I 7	30 II 8		

Octombrie

1 III 9	2 IV 10	3 V 11	4 VI 12	5 VII 1	6 VIII 2	7 IX 3	8 X 4
9 I 5	10 II 6	11 III 7	12 IV 8	13 V 9	14 VI 10	15 VII 11	16 VIII 12
17 IX 1	18 X 2	19 I 3	20 II 4	21 III 5	22 IV 6	23 V 7	24 VI 8
25 VII 9	26 VIII 10	27 IX 11	28 X 12	29 I 1	30 II 2	31 III 3	

Noiembrie

1 IV 4	2 V 5	3 VI 6	4 VII 7	5 VIII 8	6 IX 9	7 X 10	8 I 11
9 II 12	10 III 1	11 IV 2	12 V 3	13 VI 4	14 VII 5	15 VIII 6	16 IX 7
17 X 8	18 I 9	19 II 10	20 III 11	21 IV 12	22 V 1	23 VI 2	24 VII 3
25 VIII 4	26 IX 5	27 X 6	28 I 7	29 II 8	30 III 9		

Decembrie

1 IV 10	2 V 11	3 VI 12	4 VII 1	5 VIII 2	6 IX 3	7 X 4	8 I 5
9 II 6	10 III 7	11 IV 8	12 V 9	13 VI 10	14 VII 11	15 VIII 12	16 IX 1
17 X 2	18 I 3	19 II 4	20 III 5	21 IV 6	22 V 7	23 VI 8	24 VII 9
25 VIII 10	26 IX 11	27 X 12	28 I 1	29 II 2	30 III 3	31 IV 4	

Câteva exemple de calcul.

1. Este necesar de a determina SB pentru 10 iunie 1988 (an bisect).
Semnele ciclice pentru prima zi a anului nou sunt $S_{II}B_4$.

$$S = (X + II) : 10 = 1...2; \quad B = 4 + 4 = 8$$

Rezultatul: $S_{III}B_9$ (se adaugă 1, an bisect).

2. Este necesar de a determina SB pentru 8 aprilie 1985 (an simplu).
Semnele ciclice pentru prima zi a anului nou sunt $S_{VII}B_1$.

$$S = (VII + VII) : 10 = 1...4; \quad B = 1 + 1 = 2$$

Rezultatul: $S_{IV}B_2$.

Tabelul 45.

Puncte "deschise" în diferite ore ale zilei

Ziua SI (predomină Qi a Veziculei Biliare)						
Td	S _I ¹¹ B ₁₁	S _{III} ¹³ B ₁	S _V ¹⁵ B ₃	S _{VII} ¹⁷ B ₅	S _{IX} ¹⁹ B ₇	S _I ²¹ B ₉
Ore	19 – 21	23 – 1	3 – 5	7 – 9	11 – 13	15 – 17
Meridiane	VB	IG	E	GI	V	TR
Puncte	VB44	IG2	E43, VB40	GI5	V40	TR2
Elemente	Metal	Apă	Lemn	Foc	Pământ	Apă
Ziua SII (predomină Qi a Ficatului)						
Td	S _{II} ²² B ₁₀	S _{IV} ²⁴ B ₁₂	S _{VI} ²⁶ B ₂	S _{VIII} ²⁸ B ₄	S _X ³⁰ B ₆	S _{II} ³² B ₈
Ore	17 – 19	21 – 23	1 – 3	5 – 7	9 – 11	13 – 15
Meridiane	F	C	RP	P	R	MC
Puncte	F1	C8	RP3, F3	P8	R10	MC8
Elemente	Lemn	Foc	Pământ	Metal	Apă	Foc
Ziua SIII (predomină Qi a Intestinului Subțire)						
Td	S _{III} ³³ B ₉	S _V ³⁵ B ₁₁	S _{VII} ³⁷ B ₁	S _{IX} ³⁹ B ₃	S _I ⁴¹ B ₅	S _{III} ⁴³ B ₇
Ore	15 – 17	19 – 21	23 – 1	3 – 5	7 – 9	11 – 13
Meridiane	IG	E	GI	V	VB	TR
Puncte	IG1	E44	GI3, GI4	V60	VB34	TR3
Elemente	Metal	Apă	Lemn	Foc	Pământ	Lemn
Ziua SIV (predomină Qi a Inimii)						
Td	S _{IV} ⁴⁴ B ₈	S _{VI} ⁴⁶ B ₁₀	S _{VIII} ⁴⁸ B ₁₂	S _X ⁵⁰ B ₂	S _{II} ⁵² B ₄	S _{IV} ⁵⁴ B ₆
Ore	13 – 15	17 – 19	21 – 23	1 – 3	5 – 7	9 – 11
Meridiane	C	RP	P	R	F	MC
Puncte	C9	RP2	P9, C7	R7	F8	MC7
Elemente	Lemn	Foc	Pământ	Metal	Apă	Pământ
Ziua SV (predomină Qi a Stomacului)						
Td	S _V ⁵⁵ B ₇	S _{VII} ⁵⁷ B ₉	S _{IX} ⁵⁹ B ₁₁	S _I ¹ B ₁	S _{III} ³ B ₃	S _V ⁵ B ₅
Ore	11 – 13	15 – 17	19 – 21	23 – 1	3 – 5	7 – 9
Meridiane	E	GI	V	VB	IG	TR
Puncte	E45	GI2	V65, E42	VB38	IG8	TR6
Elemente	Metal	Apă	Lemn	Foc	Pământ	Foc

Notă: În pătrățelele mici, alături de Td, sunt indicate cifrele semnelor ciclice conform ciclului de 60 de ani, luate din tab. 43.

Tabelul 45. Continuare

Ziua S _{VI} (predomină Qi a Splinel)						
Td	S _{VI} ⁶ B ₆	S _{VIII} ⁸ B ₈	S _X ¹⁰ B ₁₀	S _{II} ¹² B ₁₂	S _{IV} ¹⁴ B ₁₄	S _{VI} ¹⁶ B ₁₆
Ore	9 – 11	13 – 15	17 – 19	21 – 23	1 – 3	5 – 7
Meridiane	RP	P	R	F	C	MC
Puncte	RP1	P10	R3, RP3	F4	C3	MC5
Elemente	Lemn	Foc	Pământ	Metal	Apă	Metal
Ziua S _{VII} (predomină Qi a Intestinului Gros)						
Td	S _{VII} ¹⁷ B ₇	S _{IX} ¹⁹ B ₉	S _I ²¹ B ₁	S _{III} ²³ B ₁₁	S _V ²⁵ B ₁₃	S _{VII} ²⁷ B ₁₅
Ore	7 – 9	11 – 13	15 – 17	19 – 21	23 – 1	3 – 5
Meridiane	GI	V	VB	IG	E	TR
Puncte	GI1	V66	VB41, GI4	IG5	E36	TR10
Elemente	Metal	Apă	Lemn	Foc	Pământ	Pământ
Ziua S _{VIII} (predomină Qi a Plămânilor)						
Td	S _{VIII} ²⁸ B ₈	S _X ³⁰ B ₁₀	S _{II} ³² B ₁₂	S _{IV} ³⁴ B ₁₄	S _{VI} ³⁶ B ₁₆	S _{VIII} ³⁸ B ₁₈
Ore	5 – 7	9 – 11	13 – 15	17 – 19	21 – 23	1 – 3
Meridiane	P	R	F	C	RP	MC
Puncte	P11	R2	F3, P9	C4	RP9	MC3
Elemente	Lemn	Foc	Pământ	Metal	Apă	Apă
Ziua S _{IX} (predomină Qi a Vezicii)						
Td	S _{IX} ³⁹ B ₉	S _I ⁴¹ B ₁	S _{III} ⁴³ B ₃	S _V ⁴⁵ B ₅	S _{VII} ⁴⁷ B ₇	S _{IX} ⁴⁹ B ₉
Ore	3 – 5	7 – 9	11 – 13	15 – 17	19 – 21	23 – 1
Meridiane	V	VB	IG	E	GI	TR
Puncte	V67	VB43	IG3, V64, TR4	E41	GI11	TR1
Elemente	Metal	Apă	Lemn	Foc	Pământ	Metal
Ziua S _X (predomină Qi a Rinichilor)						
Td	S _X ⁵⁰ B ₁₂	S _{II} ² B ₂	S _{IV} ⁴ B ₄	S _{VI} ⁶ B ₆	S _{VIII} ⁸ B ₈	S _X ¹⁰ B ₁₀
Ore	1 – 3	5 – 7	9 – 11	13 – 15	17 – 19	21 – 23
Meridiane	R	F	C	RP	P	MC
Puncte	R1	F2	C7, R3, MC7	RP5	P5	MC9
Elemente	Lemn	Foc	Pământ	Metal	Apă	Lemn

În sfârșit, este necesar de a determina perioada de 2 ore, conform semnelor ciclice. De exemplu, astăzi este ziua I (Jia), orele 13–15. Această perioadă corespunde cu perioada a 8-a (Wei). Conform *tab. 43*, pe verticală de la semnul Zi (1) până la semnul Wei sunt 8 intervale. Deci, pentru a determina semnul Trunchiului Celest corespunzător, este necesar pe orizontală de numărat 8 intervale de la semnul Jia (I), inclusiv acest semn. Se obține semnul Xin (VIII). Rezultatul obținut – pentru ziua I (Jia), orele 13–15: VIII/8 (Xin/Wei). Punctele "deschise" în acest caz sunt P5 Chize și P10 Yuji (*tab. 45*).

Pentru a simplifica calculele semnelor ciclice (SB) ale intervalelor de zi (Td) se poate folosi un tabel special (*tab. 46*).

Tabelul 46.

Determinarea semnelor ciclice (SB) ale intervalelor de zi (Td)

<i>Td</i> \ Ziua	<i>S₁</i> <i>S₆</i>	<i>S₂</i> <i>S₇</i>	<i>S₃</i> <i>S₈</i>	<i>S₄</i> <i>S₉</i>	<i>S₅</i> <i>S₁₀</i>
23 – 1 <i>B₁</i>	<i>S₁</i> <i>B₁</i>	<i>S₃</i> <i>B₁</i>	<i>S₅</i> <i>B₁</i>	<i>S₇</i> <i>B₁</i>	<i>S₉</i> <i>B₁</i>
1 – 3 <i>B₂</i>	<i>S₂</i> <i>B₂</i>	<i>S₄</i> <i>B₂</i>	<i>S₆</i> <i>B₂</i>	<i>S₈</i> <i>B₂</i>	<i>S₁₀</i> <i>B₂</i>
3 – 5 <i>B₃</i>	<i>S₃</i> <i>B₃</i>	<i>S₅</i> <i>B₃</i>	<i>S₇</i> <i>B₃</i>	<i>S₉</i> <i>B₃</i>	<i>S₁</i> <i>B₃</i>
5 – 7 <i>B₄</i>	<i>S₄</i> <i>B₄</i>	<i>S₆</i> <i>B₄</i>	<i>S₈</i> <i>B₄</i>	<i>S₁₀</i> <i>B₄</i>	<i>S₂</i> <i>B₄</i>
7 – 9 <i>B₅</i>	<i>S₅</i> <i>B₅</i>	<i>S₇</i> <i>B₅</i>	<i>S₉</i> <i>B₅</i>	<i>S₁</i> <i>B₅</i>	<i>S₃</i> <i>B₅</i>
9 – 11 <i>B₆</i>	<i>S₆</i> <i>B₆</i>	<i>S₈</i> <i>B₆</i>	<i>S₁₀</i> <i>B₆</i>	<i>S₂</i> <i>B₆</i>	<i>S₄</i> <i>B₆</i>
11 – 13 <i>B₇</i>	<i>S₇</i> <i>B₇</i>	<i>S₉</i> <i>B₇</i>	<i>S₁</i> <i>B₇</i>	<i>S₃</i> <i>B₇</i>	<i>S₅</i> <i>B₇</i>
13 – 15 <i>B₈</i>	<i>S₈</i> <i>B₈</i>	<i>S₁₀</i> <i>B₈</i>	<i>S₂</i> <i>B₈</i>	<i>S₄</i> <i>B₈</i>	<i>S₆</i> <i>B₈</i>
15 – 17 <i>B₉</i>	<i>S₉</i> <i>B₉</i>	<i>S₁</i> <i>B₉</i>	<i>S₃</i> <i>B₉</i>	<i>S₅</i> <i>B₉</i>	<i>S₇</i> <i>B₉</i>
17 – 19 <i>B₁₀</i>	<i>S₁₀</i> <i>B₁₀</i>	<i>S₂</i> <i>B₁₀</i>	<i>S₄</i> <i>B₁₀</i>	<i>S₆</i> <i>B₁₀</i>	<i>S₈</i> <i>B₁₀</i>
19 – 21 <i>B₁₁</i>	<i>S₁</i> <i>B₁₁</i>	<i>S₃</i> <i>B₁₁</i>	<i>S₅</i> <i>B₁₁</i>	<i>S₇</i> <i>B₁₁</i>	<i>S₉</i> <i>B₁₁</i>
21 – 23 <i>B₁₂</i>	<i>S₂</i> <i>B₁₂</i>	<i>S₄</i> <i>B₁₂</i>	<i>S₆</i> <i>B₁₂</i>	<i>S₈</i> <i>B₁₂</i>	<i>S₁₀</i> <i>B₁₂</i>

Notă: de exemplu, este necesar de a determina semnele ciclice (SB) ale intervalelor de zi (Td) pentru orele 13–15 ale zilei *S₁*. Rezultatul (*S₈* *B₈*) poate fi găsit la intersecția orizontalei ce corespunde cu ziua *S₁* și verticalei ce corespunde cu *Td* *B₈* (orele 13–15).

Ținând cont de faptul că pătrățelele din *tab. 43* care corespund Trunchiurilor Celeste pare sunt goale, apare o particularitate în calculele efectuate. De exemplu, tratamentul se realizează în ziua Yi (II) și ora Yin (3). Conform *tab. 43*, pe verticală de la semnul ciclic Zi (I) până la semnul Yin (3) sunt 3 intervale. În acest caz, însă, pe orizontală, conform recomandărilor tradiționale, se socot 3 intervale nu de la semnul ciclic Yi (II), ci de la semnul următor – Bing (III). În

rezultat se obține binomul V/3(Wu/Yin). Punctele "deschise" sunt E43 Xiangshu și VB40 Qixu (*tab. 45*).

Metoda Zi Wu Liu Zhu poate fi folosită în două variante de bază: alegerea Ramurilor Terestre și alegerea Trunchiurilor Celeste. Alegerea Ramurilor Terestre este o metodă de tratament mai simplă, în care nu se folosesc Trunchiurile Celeste. Se știe că fiecare meridian (organ) are o perioadă de activitate maximă în ciclul diurn, care durează două ore. În această perioadă este efectivă dispersia organului aflat în Exces energetic. Dispersia poate fi realizată prin folosirea punctelor "fiu" ale meridianului (organului) afectat sau a punctelor care aparțin altor meridiane, aflate în legătură energetică "fiu" cu organele afectate. Pe de altă parte, tonifierea meridianului (organului) aflat în Insuficiența energetică poate fi realizată mai efectiv în perioada refluxului energetic, care durează timp de două ore și se începe imediat după perioada de activitate maximă. Pot fi stimulate punctele "mamă" ale meridianelor afectate sau punctele altor meridiane, aflate în legătură energetică "mamă" față de organul afectat. În toate cazurile efectul va fi maximal dacă procedurile se vor desfășura în anumite perioade de timp, conform concepției cronobiologice. Cea mai simplă variantă a acestei metode este redată în *tab. 47*.

Tabelul 47.
Metoda Zi Wu Liu Zhu: alegerea Ramurilor terestre conform regulii
"mamă-fiu"

Meridian	Td	Tonifiere		Dispersie		Punct Yuan
		"Mamă"	Td	"Fiu"	Td	
P	B ₃	P9	B ₄	P5	B ₃	P9
GI	B ₄	GI11	B ₅	GI2	B ₄	GI4
E	B ₅	E41	B ₆	E45	B ₅	E42
RP	B ₆	RP2	B ₇	RP5	B ₆	RP3
C	B ₇	C9	B ₈	C7	B ₇	C7
IG	B ₈	IG3	B ₉	IG8	B ₈	IG4
V	B ₉	V67	B ₁₀	V65	B ₉	V64
R	B ₁₀	R7	B ₁₁	R1	B ₁₀	R3
MC	B ₁₁	MC9	B ₁₂	MC7	B ₁₁	MC7
TR	B ₁₂	TR3	B ₁	TR10	B ₁₂	TR4
VB	B ₁	VB43	B ₂	VB38	B ₁	VB40
F	B ₂	F8	B ₃	F2	B ₂	F3

Punctele "mamă" ale meridianului corespund cu punctele de tonifiere ale acestui meridian, pe când punctele "fiu" corespund cu punctele de dispersie. Pentru potențarea efectului de tonifiere sau de dispersie se asociază punctele Yuan ale meridianelor afectate. Aceste puncte sunt folosite și atunci când timpul optimal pentru tonifiere sau

dispersie a trecut.

A doua variantă de tratament (alegerea Trunchiurilor Celeste) este mai complicată, însă mai efektivă. În zilele Yang și Yang Td se aleg pentru tratament punctele de pe meridianele Yang; în zilele Yin și Yin Td se aleg punctele de pe meridianele Yin. Conform concepției celor 5 elemente, sunt alese meridianele și punctele corespunzătoare (tab. 45).

De exemplu, pentru tratamentul migrenei, reieșind din etiopatogeneza ei, sunt necesare aplicarea punctelor meridianelor Ficatul și Veziculei Biliare. Dacă tratamentul se realizează în ziua S_{VII} B_{11} , se punctează acupunctele VB41 Zulinqi și GI4 Hegu în Td S_7 B_9 . În următoarea zi (S_{VIII} B_{12}) se vor puncta F3 Taichong și P9 Taiyuan în Td S_{II} B_8 . În ziua a treia (S_{IX} B_1) se vor folosi punctele VB43 Xiashi în Td S_1 B_3 etc. În felul acesta se va obține un efect terapeutic bun.

XX.3. Metoda Ling Kwei Liao Fa

Această metodă se bazează pe folosirea punctelor cheie și de legătură a meridianelor curioase. Pentru calcul sunt necesare cifrele de substituție, folosite în formulele bazate pe teoria cronobiologică chineză (tab. 48, 49).

Tabelul 48.
Cifrele de substituție pentru semnele ciclice (SB) ale zilei conform metodei Ling Kwei Liao Fa

Cifre de substituție	10	9	8	7
Trunchiuri Celeste	S_I S_{VI}	S_{II} S_{VII}	S_{IV} S_{IX}	S_V S_X S_{III} S_{VIII}
Ramuri Terestre	B_5 B_8 B_{11} B_2	B_9 B_{10}	B_3 B_4	B_6 B_7 B_{12} B_1

Tabelul 49.
Cifrele de substituție pentru semnele ciclice (SB) ale perioadei de zi (Td) conform metodei Ling Kwei Liao Fa

Cifre de substituție	9	8	7	6	5	4
Trunchiuri Celeste	S_I S_{VI}	S_{II} S_{VII}	S_{III} S_{VIII}	S_{IV} S_{IX}	S_V S_X	
Ramuri Terestre	B_1 B_7	B_2 B_8	B_3 B_9	B_4 B_{10}	B_5 B_{11}	B_6 B_{12}

Calculul se efectuează în felul următor. Suma cifrelor de substituție (S ziua + B ziua + STd + BTd) se împarte la 6, dacă ziua se referă la categoria Yin, sau la 9, dacă ziua se referă la Yang. Restul

obținut (cifra) indică punctul cheie al meridianului curios (*tab.50*). În cazul, când restul este egal cu zero, se folosește punctul cheie, care corespunde cu cifra 9 sau 6 (cifra folosită în formulă pentru ziua Yin sau Yang).

Tabelul 50.

Determinarea punctului cheie al meridianului curios conform metodei Ling Kwei Liao Fa

<i>Punct cheie</i>	<i>Cifra</i>	<i>Meridian curios</i>
RP4	6	Chong Mai
MC6	8	Yin Wei Mai
IG3	7	Du Mai
V62	1	Yang Qiao Mai
VB41	4	Dai Mai
TR5	3	Yang Wei Mai
P7	9	Ren Mai
R6	2 (5)	Yin Qiao Mai

Exemplu: este necesar de a determina punctul cheie al meridianului curios pentru perioada de zi B_5 în ziua de 5 martie 1987. În acest caz semnele ciclice ale zilei de 5 martie sunt $S_x B_2$, perioada de zi se referă la semnele ciclice $S_{III} B_5$ (*tab. 46*).

Înlocuim datele obținute (folosind *tab. 48 și 49*) în formula de mai sus:

$$(S_x + B_2 + S_{III} + B_5) : 6 = (7 + 10 + 7 + 5) : 6 = 4 \dots 5.$$

Restul obținut (cifra 5) indică punctul cheie R6 Zhaohai (*tab. 50*).

Alegerea punctelor cheie ale meridianelor curioase conform acestei metode este redată în *tab. 51*. Bolnavul este invitat pentru tratament în perioada optimală, când punctul cheie respectiv este "deschis".

Pentru a obține efecte terapeutice bune, este necesar de a combina această metodă de alegere a punctelor cheie cu metoda clinică – evidențierea meridianului curios conform manifestărilor clinice ale afectării lor. Meridianele curioase se aplică și în cazurile când se evidențiază puncte dureroase la palpăre (sau spontane) pe traseul lor. O importanță diagnostică și terapeutică mare au punctele cheie și de legătură, punctele de alarmă și punctele Xi ale meridianelor extra-ordinare.

Pentru un tratament efektiv este necesară asocierea punctelor "deschise" cu punctele, stimularea cărora nu depinde de timp (puncte simptomatice, puncte specifice etc.), la început se puntează punctele "deschise", apoi alte puncte.

Tabelul 51.
Determinarea punctului cheie al meridianului curios (metoda Ling Kwei Liao Fa)

Orele Ziua	B ₁ 23-1	B ₂ 1-3	B ₃ 3-5	B ₄ 5-7	B ₅ 7-9	B ₆ 9-11	B ₇ 11-13	B ₈ 13-15	B ₉ 15-17	B ₁₀ 17-19	B ₁₁ 19-21	B ₁₂ 21-23
S ₁ B ₁	8	6	4	2	9	3	7	5	3	1	4	2
S ₂ B ₂	5	3	1	4	2	6	4	2	5	3	1	5
S ₃ B ₃	2	5	3	1	8	6	6	4	2	9	7	1
S ₄ B ₄	3	1	5	3	6	4	2	6	4	1	5	3
S ₅ B ₅	5	3	6	4	2	9	4	7	5	3	1	8
S ₆ B ₆	5	3	1	5	3	6	4	2	6	4	1	5
S ₇ B ₇	5	3	1	4	2	9	4	2	5	3	1	8
S ₈ B ₈	1	4	2	6	4	2	5	3	1	5	3	6
S ₉ B ₉	7	5	3	1	4	2	6	4	2	5	3	1
S ₁₀ B ₁₀	1	5	2	6	4	2	6	3	1	5	3	1
S ₁₁ B ₁₁	2	9	7	5	3	6	1	8	6	4	7	5
S ₁₂ B ₁₂	2	6	4	1	5	3	1	5	2	6	4	2
S ₃ B ₁	1	4	2	9	7	5	5	3	1	8	6	9
S ₄ B ₂	5	3	1	5	2	6	4	2	6	3	1	5
S ₅ B ₃	3	1	4	2	9	7	2	5	3	1	8	6

Tabelul 51. Continuare

Orele Ziua	B ₁ 23-1	B ₂ 1-3	B ₃ 3-5	B ₄ 5-7	B ₅ 7-9	B ₆ 9-11	B ₇ 11-13	B ₈ 13-15	B ₉ 15-17	B ₁₀ 17-19	B ₁₁ 19-21	B ₁₂ 21-23
S ₆ B ₄	6	4	2	6	4	1	5	3	1	5	2	6
S ₇ B ₅	8	6	4	7	5	3	7	5	8	6	4	2
S ₈ B ₆	4	1	5	3	1	5	2	6	4	2	6	3
S ₉ B ₇	5	3	1	8	2	9	4	2	9	3	1	8
S ₁₀ B ₈	2	6	3	1	5	3	1	4	2	6	4	2
S ₁₁ B ₉	1	8	6	4	2	5	9	7	5	3	6	4
S ₁₂ B ₁₀	4	2	6	3	1	5	3	1	4	2	6	4
S ₃ B ₁₁	4	7	5	3	1	8	8	6	4	2	9	3
S ₄ B ₁₂	2	6	4	2	5	3	1	5	3	6	4	2
S ₅ B ₁	2	9	3	1	8	6	1	4	2	9	7	5
S ₆ B ₂	2	6	4	2	6	3	1	5	3	1	4	2
S ₇ B ₃	6	4	2	5	3	1	5	3	6	4	2	9
S ₈ B ₄	5	2	6	4	2	6	3	1	5	3	1	4
S ₉ B ₅	8	6	4	2	5	3	7	5	3	6	4	2
S ₁₀ B ₆	5	3	6	4	2	6	4	1	5	3	1	5

Tabelul 51. Continuare

Orele Ziua	B ₁ 23-1	B ₂ 1-3	B ₃ 3-5	B ₄ 5-7	B ₅ 7-9	B ₆ 9-11	B ₇ 11-13	B ₈ 13-15	B ₉ 15-17	B ₁₀ 17-19	B ₁₁ 19-21	B ₁₂ 21-23
S ₁ B ₇	8	6	4	2	9	3	7	5	3	1	4	2
S ₂ B ₈	5	3	1	4	2	6	4	2	5	3	1	5
S ₃ B ₉	3	6	4	2	9	7	7	5	3	1	8	2
S ₄ B ₁₀	4	2	6	4	1	5	3	1	5	2	6	4
S ₅ B ₁₁	5	3	6	4	2	9	4	7	5	3	1	8
S ₆ B ₁₂	5	3	1	5	3	6	4	2	6	4	1	5
S ₇ B ₁	5	3	1	4	2	9	4	2	5	3	1	8
S ₈ B ₂	1	4	2	6	4	2	5	3	1	5	3	6
S ₉ B ₃	6	4	2	9	3	1	5	3	1	4	2	9
S ₁₀ B ₄	6	4	1	5	3	1	5	2	6	4	2	6
S ₁₁ B ₅	2	9	7	5	3	6	1	8	6	4	7	5
S ₁₂ B ₆	2	6	4	1	5	3	1	5	2	6	4	2
S ₁₃ B ₇	1	4	2	9	7	5	5	3	1	8	6	9
S ₁₄ B ₈	5	3	1	5	2	6	4	2	6	3	1	5
S ₁₅ B ₉	4	2	5	3	1	8	3	6	4	2	9	7

Tabelul 51. Continuare

Orele Ziua	B ₁ 23-1	B ₂ 1-3	B ₃ 3-5	B ₄ 5-7	B ₅ 7-9	B ₆ 9-11	B ₇ 11-13	B ₈ 13-15	B ₉ 15-17	B ₁₀ 17-19	B ₁₁ 19-21	B ₁₂ 21-23
S ₆ B ₁₀	1	5	3	1	5	2	6	4	2	6	3	1
S ₇ B ₁₁	8	6	4	7	5	3	7	5	8	6	4	2
S ₈ B ₁₂	4	1	5	3	1	5	2	6	4	2	6	3
S ₉ B ₁	5	3	1	8	2	9	4	2	9	3	1	8
S ₁₀ B ₂	2	6	3	1	5	3	1	4	2	6	4	2
S ₁₁ B ₃	9	7	5	3	1	4	8	6	4	2	5	3
S ₁₂ B ₄	3	1	5	2	6	4	2	6	3	1	5	3
S ₁₃ B ₅	4	7	5	3	1	8	8	6	4	2	9	3
S ₁₄ B ₆	2	6	4	2	5	3	1	5	3	6	4	2
S ₁₅ B ₇	2	9	3	1	8	6	1	4	2	9	7	5
S ₁₆ B ₈	2	6	4	2	6	3	1	5	3	1	4	2
S ₁₇ B ₉	7	5	3	6	4	2	6	4	7	5	3	1
S ₁₈ B ₁₀	6	3	1	5	3	1	4	2	6	4	2	5
S ₁₉ B ₁₁	8	6	4	2	5	3	7	5	3	6	4	2
S ₂₀ B ₁₂	5	3	6	4	2	6	4	1	5	3	1	5

XX.4. Metoda "balanței spațiale complexe"

Această metodă se bazează pe folosirea hexagramelor plasate în pătratul mare ($8 \cdot 8 = 64$) Lo Shu. Acest pătrat este interpretat ca o schemă a balanței. El este folosit în medicină, astronomie, muzică etc. După cum se vede din *tab. 52*, una din caracteristicile de bază ale pătratului Lo Shu este următoarea: suma cifrelor în diferite colonite (pe verticală sau orizontală) este egală cu 260. Substituirea cifrelor din pătratul mare Lo Shu cu hexagramele corespunzătoare (echivalente) creează un sistem special, în care suma liniilor întrerupte (—, Yin) este egală cu suma liniilor neîntrerupte (—, Yang), atât în colonitele pe verticală, cât și în cele pe orizontală (*tab. 53*). Pentru aplicarea acestei metode au fost create tabele speciale, conform teoriei circulației Qi și Xue în punctele antice ale meridianelor principale (*tab. 54*). Folosirea practică a metodei "balanței spațiale complexe" necesită următoarea informație:

1. ora nașterii bolnavului (Td, Ramura Terestră);
2. ziua (data) nașterii;
3. luna nașterii (conform calendarului lunar);
4. anul nașterii (conform calendarului ciclic de 60 de ani);
5. timpul când se efectuează procedura de tratament.

Apresiasi anulului conform ciclului de 60 de ani a fost descrisă mai sus (*tab. 43, 44*). Ramurile Terestre (conform orei de naștere a pacientului) sunt indicate în tabelul 4. Alegerea punctelor optime după această metodă se face după formula:

$$\frac{Na + Nl + Dn + On + Cr}{64}$$

unde Na – numărul anului; Nl – numărul lunii; Dn – data nașterii; On – ora nașterii (Ramura Terestră); Cr – coeficientul de rectificare. Restul obținut conform acestei formule este cifra inițială necesară pentru determinarea punctelor de acupunctură. Coeficientul de rectificare se calculează în felul următor: miezul nopții se egalează cu zero, apoi fiecare jumătate de oră care urmează se egalează cu o unitate. De exemplu, coeficientul de rectificare pentru ora 7²⁰ este egal cu 15. Ora efectuării procedurii terapeutice dă posibilitatea de a alege tabelul necesar (*tab. 54*). De exemplu, procedura se efectuează la orele 10¹⁰. Acest timp corespunde cu meridianul Stomacului (pătratul 3 din *tab. 54*). Restul obținut din formula de mai sus indică numărul din pătratul corespunzător (unul din cele 64) și punctul de acupunctură, care se află sub acest număr. În așa fel se determină primul punct necesar. Al doilea punct este, reieșind din sensul pătratului Lo Shu, diametral opus, în așa fel, încât suma cifrelor care indică pătrățelele primului și celui de al doilea punct să fie egală întotdeauna cu 65. Următoarele 6 puncte sunt depistate, reieșind din amplasarea simetrică în pătratul mare Lo Shu (*tab. 52, 53, fig. 156*).

































































Tabelul 52.

Pătratul mare Lo Shu

21	23	33	35	48	46	28	26
24	22	36	34	45	47	25	27
12	10	61	63	52	50	5	7
9	11	64	62	49	51	8	6
57	59	13	15	4	2	56	54
60	58	16	14	1	3	53	55
37	39	20	18	29	31	44	42
40	38	17	19	32	30	41	43

Tabelul 53.

Substituirea cifrelor în pătratul mare Lo Shu cu hexagramele echivalente

 21	 23	 33	 35	 48	 46	 28	 26
 24	 22	 36	 34	 45	 47	 25	 27
 12	 10	 61	 63	 52	 50	 5	 7
 9	 11	 64	 62	 49	 51	 8	 6
 57	 59	 13	 15	 4	 2	 56	 54
 60	 58	 16	 14	 1	 3	 53	 55
 37	 39	 20	 18	 29	 31	 44	 42
 40	 38	 17	 19	 32	 30	 41	 43

21	23	33	35	48	46 x x	28	26
24	22	36	34 x x	45	47	25	27
12	10	61	63	52	50	5	7
9	11	64	62	49	51	8	6
57	59	13	15	4	2	56	54 x x
60	58	16	14	1	3	53	55
37	39	20	18	29	31	44	x x x 42
40	38	17	19	32	30	41	43

Fig. 156. Reprezentarea schematică a balanței celor 64 hexagrame în pătratul mare Lo Shu.

21	23	33	35	48	46	28	26
24	22	36	34	45	47	25	27
12	10	61	63	52	50	5	7
9	11	64	62	49	51	8	6
57	59	13	15	4	2	56	54
60	58	16	14	1	3	53	55
37	39	20	18	29	31	44	42
40	38	17	19	32	30	41	43

Fig. 157. Reprezentarea schematică a balanței hexagramelor în pătratul mare Lo Shu în caz clinic particular (vezi textul).

Tabelul 54 (1--12).

Circulația Qi și Xue în cele 66 puncte antice ale meridianelor principale.

I. 3:00-3:30 / 9:00-9:30															Piămâni	
P11	1	P10	2	P9	3	P8	4	P5	5	GI1	6	GI2	7	GI3	8	
GI4	9	GI5	10	GI11	11	E45	12	E44	13	E43	14	E42	15	E41	16	
E36	17	RP1	18	RP2	19	RP3	20	RP5	21	RP9	22	C9	23	C8	24	
C7	25	C4	26	C3	27	IG1	28	IG2	29	IG3	30	IG4	31	IG5	32	
IG8	33	V65	34	V64	35	V60	36	V40	37	R1	38	R2	39	R3	40	
R7	41	R10	42	MC9	43	MC8	44	MC7	45	MC5	46	MC3	47	TR1	48	
TR2	49	TR3	50	TR4	51	TR6	52	TR10	53	VB44	54	VB43	55	VB41	56	
VB40	57	VB38	58	VB34	59	F1	60	F2	61	F3	62	F4	63	F8	64	
II. 3:30-4:00 / 9:30-10:00															Intestin Gros	
GI1	1	GI2	2	GI3	3	GI4	4	GI5	5	GI11	6	E45	7	E44	8	
E43	9	E42	10	E41	11	E36	12	RP1	13	RP2	14	RP3	15	RP5	16	
RP9	17	C9	18	C8	19	C7	20	C4	21	C3	22	IG1	23	IG2	24	
IG3	25	IG4	26	IG5	27	IG8	28	V67	29	V66	30	V65	31	V64	32	
V60	33	V40	34	R3	35	R7	36	R10	37	MC9	38	MC8	39	MC7	40	
MC5	41	MC3	42	TR1	43	TR2	44	TR3	45	TR4	46	TR6	47	TR10	48	
VB44	49	VB43	50	VB41	51	VB40	52	VB38	53	VB34	54	F1	55	F2	56	
F3	57	F4	58	F8	59	P11	60	P10	61	P9	62	P8	63	P5	64	
III. 4:00-4:30 / 10:00-10:30															Stomac	
E45	1	E44	2	E43	3	E42	4	E41	5	E36	6	RP1	7	RP2	8	
RP3	9	RP5	10	RP9	11	C9	12	C8	13	C7	14	C4	15	C3	16	
IG1	17	IG2	18	IG3	19	IG4	20	IG5	21	IG8	22	V67	23	V66	24	
V65	25	V64	26	V60	27	V40	28	R1	29	R2	30	R3	31	R7	32	
R10	33	MC7	34	MC5	35	MC3	36	TR1	37	TR2	38	TR3	39	TR4	40	
TR6	41	TR10	42	VB44	43	VB43	44	VB41	45	VB40	46	VB38	47	VB34	48	
F1	49	F2	50	F3	51	F4	52	F8	53	P11	54	P10	55	P9	56	
P8	57	P5	58	GI1	59	GI2	60	GI3	61	GI4	62	GI5	63	GI11	64	

Tabelul 54. Continuare

IV. 4:30-5:00 / 10:30-11:00								Splină-Pancreas							
RP1	1	RP2	2	RP3	3	RP5	4	RP9	5	C9	6	C8	7	C7	8
C4	9	C3	10	IG1	11	IG2	12	IG3	13	IG4	14	IG5	15	IG8	16
V67	17	V66	18	V65	19	V64	20	V60	21	V40	22	R1	23	R2	24
R3	25	R7	26	R10	27	MC9	28	MC8	29	MC7	30	MC5	31	MC3	32
TR3	33	TR4	34	TR6	35	TR10	36	VB44	37	VB43	38	VB41	39	VB40	40
VB38	41	VB34	42	F1	43	F2	44	F3	45	F4	46	F8	47	P11	48
P10	49	P9	50	P8	51	P5	52	GI1	53	GI2	54	GI3	55	GI4	56
GI5	57	GI11	58	E45	59	E44	60	E43	61	E42	62	E41	63	E36	64
V. 5:00-5:30 / 11:00-11:30								Inima							
C9	1	C8	2	C7	3	C4	4	C3	5	IG1	6	IG2	7	IG3	8
IG4	9	IG5	10	IG8	11	V67	12	V66	13	V65	14	V64	15	V60	16
V40	17	R1	18	R2	19	R3	20	R7	21	R10	22	MC9	23	MC8	24
MC7	25	MC5	26	MC3	27	TR1	28	TR2	29	TR3	30	TR4	31	TR6	32
TR10	33	VB41	34	VB40	35	VB38	36	VB34	37	F1	38	F2	39	F3	40
F4	41	F8	42	P11	43	P10	44	P9	45	P8	46	P5	47	GI1	48
GI2	49	GI3	50	GI4	51	GI5	52	GI11	53	E45	54	E44	55	E43	56
E42	57	E41	58	E36	59	RP1	60	RP2	61	RP3	62	RP5	63	RP9	64
VI. 5:30-6:00 / 11:30-12:00								Intestin Subțire							
IG1	1	IG2	2	IG3	3	IG4	4	IG5	5	IG8	6	V67	7	V66	8
V65	9	V64	10	V60	11	V40	12	R1	13	R2	14	R3	15	R7	16
R10	17	MC9	18	MC8	19	MC7	20	MC5	21	MC3	22	TR1	23	TR2	24
TR3	25	TR4	26	TR6	27	TR10	28	VB44	29	VB43	30	VB41	31	VB40	32
VB38	33	VB34	34	F3	35	F4	36	F8	37	R11	38	R10	39	P9	40
P8	41	P5	42	GI1	43	GI2	44	GI3	45	GI4	46	GI5	47	GI11	48
E45	49	E44	50	E43	51	E42	52	E41	53	E36	54	RP1	55	RP2	56
RP3	57	RP5	58	RP9	59	C9	60	C8	61	C7	62	C4	63	C3	64

Tabelul 54. Continuare

VII. 6:00-6:30 / 12:00-12:30												Vezică			
V67	1	V66	2	V65	3	V64	4	V60	5	V40	6	R1	7	R2	8
R3	9	R7	10	R10	11	MC9	12	MC8	13	MC7	14	MC5	15	MC3	16
TR1	17	TR2	18	TR3	19	TR4	20	TR6	21	TR10	22	VB44	23	VB43	24
VB41	25	VB40	26	VB38	27	VB34	28	F1	29	F2	30	F3	31	F4	32
F8	33	P9	34	P8	35	P5	36	GI1	37	GI2	38	GI3	39	GI4	40
GI5	41	GI11	42	E45	43	E44	44	E43	45	E42	46	E41	47	E36	48
RP1	49	RP2	50	RP3	51	RP5	52	RP9	53	C9	54	C8	55	C7	56
C4	57	C3	58	IG1	59	IG2	60	IG3	61	IG4	62	IG5	63	IG8	64
VIII. 6:30-7:00 / 12:30-1:00												Rinichi			
R1	1	R2	2	R3	3	R7	4	R10	5	MC9	6	MC8	7	MC7	8
MC5	9	MC3	10	TR1	11	TR2	12	TR3	13	TR4	14	TR6	15	TR10	16
VB44	17	VB43	18	VB41	19	VB40	20	VB38	21	VB34	22	F1	23	F2	24
F3	25	F4	26	F8	27	P11	28	P10	29	P9	30	P8	31	P5	32
GI3	33	GI4	34	GI5	35	GI11	36	E45	37	E44	38	E43	39	E42	40
E41	41	E36	42	RP1	43	RP2	44	RP3	45	RP5	46	RP9	47	C9	48
C8	49	C7	50	C4	51	C3	52	IG1	53	IG2	54	IG3	55	IG4	56
IG5	57	IG8	58	V67	59	V66	60	V65	61	V64	62	V60	63	V40	64
IX. 7:00-5:30 / 1:00-1:30												Pericard			
MC9	1	MC8	2	MC7	3	MC5	4	MC3	5	TR1	6	TR2	7	TR3	8
TR4	9	TR6	10	TR10	11	VB44	12	VB43	13	VB41	14	VB40	15	VB38	16
VB34	17	F1	18	F2	19	F3	20	F4	21	F8	22	P11	23	P10	24
P9	25	P8	26	P5	27	GI1	28	GI2	29	GI3	30	GI4	31	GI5	32
GI11	33	E43	34	E42	35	E41	36	E36	37	RP1	38	RP2	39	RP3	40
RP5	41	RP9	42	C9	43	C8	44	C7	45	C4	46	C3	47	IG1	48
IG2	49	IG3	50	IG4	51	IG5	52	IG8	53	V67	54	V66	55	V65	56
V64	57	V60	58	V40	59	R1	60	R2	61	R3	62	R7	63	R10	64

Tabelul 54. Continuare

X. 7:30-8:00 / 1:30-2:00								Trei Focare							
TR1	1	TR2	2	TR3	3	TR4	4	TR6	5	TR10	6	VB44	7	VB43	8
VB41	9	VB40	10	VB38	11	VB34	12	F1	13	F2	14	F3	15	F4	16
F8	17	P11	18	P10	19	P9	20	P8	21	P5	22	GI1	23	GI2	24
GI3	25	GI4	26	GI5	27	GI11	28	E45	29	E44	30	E43	31	E42	32
E41	33	E36	34	RP3	35	RP5	36	RP9	37	C9	38	C8	39	C7	40
C4	41	C3	42	IG1	43	IG2	44	IG3	45	IG4	46	IG5	47	IG8	48
V67	49	V66	50	V65	51	V64	52	V60	53	V40	54	R1	55	R2	56
R3	57	R7	58	R10	59	MC9	60	MC8	61	MC7	62	MC5	63	MC3	64
XI. 8:00-8:30 / 2:00-2:30								Veziculă Biliară							
VB44	1	VB43	2	VB41	3	VB40	4	VB38	5	VB34	6	F1	7	F2	8
F3	9	F4	10	F8	11	P11	12	P10	13	P9	14	P8	15	P5	16
GI1	17	GI2	18	GI3	19	GI4	20	GI5	21	GI11	22	E45	23	E44	24
E43	25	E42	26	E41	27	E36	28	RP1	29	RP2	30	RP3	31	RP5	32
RP9	33	C7	34	C4	35	C3	36	IG1	37	IG2	38	IG3	39	IG4	40
IG5	41	IG8	42	V67	43	V66	44	V65	45	V64	46	V60	47	V40	48
R1	49	R2	50	R3	51	R7	52	R10	53	MC9	54	MC8	55	MC7	56
MC5	57	MC3	58	TR1	59	TR2	60	TR3	61	TR4	62	TR6	63	TR10	64
XII. 8:30-9:00 / 2:30-3:00								Ficat							
F1	1	F2	2	F3	3	F4	4	F8	5	P11	6	P10	7	P9	8
P8	9	P5	10	GI1	11	GI2	12	GI3	13	GI4	14	GI5	15	GI11	16
E45	17	E44	18	E43	19	E42	20	E41	21	E36	22	RP1	23	RP2	24
RP3	25	RP5	26	RP9	27	C9	28	C8	29	C7	30	C4	31	C3	32
IG3	33	IG4	34	IG5	35	IG8	36	V67	37	V66	38	V65	39	V64	40
V60	41	V40	42	R1	43	R2	44	R3	45	R7	46	R10	47	MC9	48
MC8	49	MC7	50	MC5	51	MC3	52	TR1	53	TR2	54	TR3	55	TR4	56
TR6	57	TR10	58	VB44	59	VB43	60	VB41	61	VB40	62	VB38	63	VB34	64

Un exemplu de calcul conform metodei "balantei spațiale complexe" pentru un bolnav născut la 5.VI.1951, orele 8⁰⁰ dimineața. Procedura de tratament se efectuează la orele 10¹⁰ dimineața. Conform formulei de mai sus, obținem: $(28 + 6 + 5 + 5 + 21) : 64 = 1$ (rest 1). Ținând cont de faptul că procedura se realizează la ora 10¹⁰, dimineața, apelăm la tabelul respectiv (pătratul 3, *tab. 54*). Cifra 1 indică punctul E45 Lidui. Apoi, reieșind din cele expuse mai sus, conform *tab. 53* și *fig. 156, 157*, se determină celelalte 7 pătrățele necesare, care corespund cu punctele de acupunctură căutate: 64 (GI11 Quchi), 2 (E44 Neiting), 63 (GI5 Yangxi), 14 (C7 Shenmen), 51 (F3 Taichong), 13 (C8 Shaofu), 52 (F4 Zhongfeng). Aceste puncte sunt niște "ferestre" ale structurii energetice a organismului. Folosirea lor include direct sau indirect toate sistemele organismului, active la momentul tratamentului, reieșind din legitățile cronoacupuncturii. Este important că unele erori, legate de data imprecisă a nașterii bolnavului, se nivelează, având în vedere folosirea mai multor puncte de acupunctură după principiul simetriei și opoziției.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

- Acupuncture treatment of common diseases based upon differentiation of syndromes*, The People's Medical Publishing House, Beijing, 1997.
- Bărbulescu P.*: Senzația de acupunctură (SA) și propagarea senzației pe meridian (PSM), *Rev. Rom. Acup.*, 1: 127-134, 1991.
- Borsarello I.*: Manuel clinique d'acupuncture traditionnelle, Masson, Paris, 1981.
- Bossy J., Guevin F., Nguyen Tai Thu.*: Acupuncture et médecine traditionnelle orientale. Prévention et thérapeutique, Sats, 1996.
- Bossy J., Guevin F., Yasui H.*: Nosologie traditionnelle chinoise et acupuncture, Masson, Paris, 1990.
- Bossy J., Maurel J., Dang-Vu Hung.*: Formulaire d'acupuncture, Masson, 1986.
- Brătilă F., Pârvu E.*: Diagnosticul în acupunctură, Ed. PACO, 1995.
- Caba T.*: Acupunctura. Diagnostic și tratament, București. Ed. Litera, 1978.
- Chamfrault A.*: Traite de medecine chinoise, Angoulême, 1954.
- Chen Moxun et al.*: Atlas of cross sectional anatomy of human 14 meridians and acupoints. Science Press, Beijing, 1996.
- Chen Youbang, Deng Liangyue.*: Essentials of contemporary Chinese acupuncturists' clinical experiences, Foreign Languages Press, Beijing, 1989.
- Clim Georgeta.*: Psihismul și acupunctura, București, Ed. Litera, 1988.
- Constantin D., Ionescu-Tîrgoviște C.*: Acupunctura – de la tradiție la științele moderne, Ed. științifică și enciclopedică, București, 1988.
- Cui Yongqiang, Chen Ken.*: Tests. Chinese acupuncture and moxibustion, Foreign Languages Press, 1993.
- Deng Liangyue et al.*: Chinese Acupuncture and Moxibustion, Beijing, 1987.
- Doboș A.*: Medicină ayurvedică, Ed. Nirvana, Colecția Satva, 1995.
- Dumitrescu I. Fl., Constantin D.*: Acupunctura științifică modernă, Ed. Junimea, Iași, 1977.
- Gaponiuk P. I., Klimenco L. M., Levin V. N.*: Acupunctura (reflectornopunctura) terapia, Iaroslavl, 1983.
- Geng Junying, Huang Wenquan, Sun Yongping.*: Selecting the right acupoints, New World Press, Beijing, 1995.
- Geng Junying, Su Zhihong.*: Acupuncture and moxibustion, New World Press, Beijing, 1997.
- Hou Jinglun.*: Acupuncture and moxibustion therapy in gynecology and obstetrics, Beijing Science and Technology Press, 1995.
- Ionescu-Tîrgoviște C.*: Acupunctura și bioenergetica umană, Ed. Sport-Turism, București, 1986.
- Ionescu-Tîrgoviște C.*: Teoria și practica acupuncturii moderne, Ed. Academiei Române, București, 1993.
- James Tin Yau So.*: Treatment of disease with acupuncture, Paradigm Publications, 1987.

Ji Xiaoping.: Modern practical prescriptions of acupuncture and moxibustion, Science Press, Beijing, 1996.

Jiao Shunfa.: Scalp acupuncture and clinical cases, Foreign Languages Press, Beijing, 1997.

Kacean A. T.: Kitaiskaia bioritmologhia, St.-Peterburg, 1991.

Kong Yaoqi, Ren Xingsheng, Lu ShouKang.: The acupuncture treatment for paralysis, Science Press, Beijing, 1996.

La Fuye R.: Traite d'acupuncture, Paris, 1956.

Lacusta V., Grossu G.: Shor bases of reflexotherapy, Chişinău, "Ştiinţa", 1980.

Lacusta V., Ionescu-Tîrgovişte C.: Traditional basis of acupuncture. Ed.Gherman D., academician. Chişinău, Maga, 1995.

Lacusta V., Ling Zhi Sheng, Şincarenco I.: Cijeni-iziterapia bronhialnoi astmă. Chişinău, 1995.

Lacusta V., Ling Zhi Sheng.: Zhen-jui therapy of pain syndromes and urgent situations. Ed.Ghidirim Gh., academician. Chişinău, Maga, 1995.

Lacusta V.: Acupunctura clinică, Centrul European de Studii Postuniversitare în Acupunctură, Chişinău, 1996.

Lanza U., Ionescu-Tîrgovişte C.: Agopunctura classica, vol.I-II, Mario Gras / Tomasone, Torino, 1976.

Lavier J.: Theorie et pratique de l'acupuncture, Paris, 1960.

Lebarbier A.: Acupuncture pratique, Maisonneuve, Paris, 1975.

Lecţiile cursului de acupunctură, Universitatea de Medicină Tradiţională Chineză, Nanjin, 1997, 1998.

Leon Hammer.: Dragon rises, red bird flies. Psychology and chinese medicine, Station Hill Press, New York, 1990.

Li Boning, Wu Peilin.: Clinical acupuncture: diagnosis and treatment, Satas, 1994.

Li Peigen.: Treating migraine with fengchi as a principal point, Jheng Jin Lin Chuang Ja Zhi, 1994.

Li Wenfu.: Clinical guide to proper selection of acupoints, Science Press, Beijing, 1996.

Lin Shi Shan.: Formules magistrales en acupuncture, Institut Yin-Yang, 1991.

Liu Gongwang, Akira Hyodo.: Fundamentals of acupuncture and moxibustion, Tianjin Science and Technology Translation and Publishing Corporation, 1994.

Liu Gongwang.: Clinical acupuncture and moxibustion, Tianjin Science and Technology Translation and Publishing Corporation, 1996.

Lu Yubin.: Pulse diagnosis, Shandong Science and Technology Press, 1996.

Luc de Schepper.: Acupuncture for the practitioner, California, 1984.

Luc Vangermeersch, Sun Pei-Lin.: Bi-syndromes or rheumatic disorders treated by traditional chinese medicine, Satas, 1994.

Luvsan G.: Ocerki metodov vostocinnoi reflexoterapii, Novosibirsk. Nauka, 1991.

Maciocia G.: L'examen de la langue en medicine chinoise, Bruxelles, Satas,

1989.

Maciocia G.: The practice of chinese medicine, Churchill Livingstone, 1994.

Mann F.: Acupuncture the ancient chinese art of healing and how its works scientifically, Vintage Books, New York, 1971.

Ming Shunpei, Yang Shunyi.: Advanced textbook on traditional chinese medicine and pharmacology, New World Press, Beijing, 1997.

Mingqing Zhu.: A handbook for treatment of acute syndromes by using acupuncture and moxibustion, 8 Dragons Publishing, HongKong, 1992.

Morant G.S.: L'acupuncture Chinoise, Maloine, Paris, 1979.

Orei A.E., Kamenev V.Iu.: Osnovī jeni-tziuterapii, Donețk, Ratmos, 1995.

Ouyang Bing, Gu Zhen.: Essentials of traditional chinese medicine, Shandong Science and Technology Press, 1996.

Ovecikin A.M.: Cliniceskaia acupunctura v oftalmologhii, Ioșkar-Ola, 1994.

Pașcanu V.: Tratament naturist integral, Ed. Moldova, Iași, 1994.

Pișeli I.V., Șapiro M.I., Șapiro I.I.: Anato-mo-kliniceskii atlas reflexoterapii, Moskva, Meditina, 1989.

Raut C.: The treatment of hemorrhoid by acupuncture, Amer.J. Acupuncture 2: 109-112, 1974.

Ross J.: Acupuncture point combinations. The key to clinical success, Churchill Livingstone, 1995.

Samosiuk I.Z. Liseniuk V.P.: Acupunctura. Enciclopedie, Kiev, 1994.

State standard of the People's Republic of China. The location of acupoints, Foreign Languages Press, Beijing, 1990.

Sun Xue Quan.: Applied chinese acupuncture for clinical practitioners, Shandong Science and Technology Press, 1985.

Suru V.: Diagnosticul în acupunctură. În: Acupunctura în terapeutila medicală, Focșani, 1988.

Tabeeva D.M.: Rukovodstvo po igloreflexoterapii, Moskva. Meditina, 1980.

Tao, Jian Wen, Dan Mirahorian, Florin Brătîlă.: Cartea căii și virtuții (Tao Te King). Lao Tsen, Colecția Cîmp Fundamental, București, 1992.

Tureanu L., Tureanu V.: Acupunctura în obstetrică și ginecologie, Ed. ALL, București, 1994.

Vogralik V.G., Vogralik M.V.: Igloreflexoterapia, Gorkii, Volgo-Veatskoe cnijnoe izdatelstvo, 1978.

Wang P., Duhamel O.: Medicine chinoise, Masson, Paris, 1991.

Zhang Dengbu, Du Guangzhong.: Acupuncture – moxibustion therapy, Shandong Science and Technology Press, 1996.

Zhang Rui Fu, Wu Xiu Fen.: Les points d'acupuncture et leur mecanisme d'action, Masson, Paris, 1992.

Zhao Xin, Fu Jianping.: A guide-book to the proficiency examination for international acupuncture and moxibustion professionals, China Medico-Pharmaceutical Science and Technology Publishing House, 1994.

Zhongguo Zhenjiuxue.: China zhenjiuology, Tianjin Science and Technology, 1996.